

Possibile svolgimento della prova del 15 gennaio 2024 – Modulo A

- 1) (a) Calcoliamo prima le potenze separatamente:

$$(1+i)^4 = ((1+i)^2)^2 = (2i)^2 = -4$$

$$(1-i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$$

Quindi:

$$z = \frac{-4}{-2i} = -2i$$

Per trovare le radici quarte, scriviamo z in forma esponenziale:

$$z = 2i = 2e^{-i\pi/2}$$

Le radici quarte sono date da:

$$\sqrt[4]{z} = \sqrt[4]{2}e^{i(-\pi/8+k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

- (b) Studiamo la successione $\left\{\frac{n-1}{n^2}\right\}_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$ la cui immagine è l'insieme A .

La derivata della funzione $f(x) = \frac{x-1}{x^2}$ è:

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3} = \frac{2-x}{x^3}$$

Per $x > 0$, è positiva su $(0, 2)$ e negativa su $(2, +\infty)$. Quindi f è strettamente crescente su $(0, 2)$ e strettamente decrescente su $(2, +\infty)$.

Il massimo si ha per $n = 2$ ed è uguale a $1/4$. Per $n = 1$: $\frac{1-1}{1^2} = 0$ Per $n \rightarrow \infty$: $\frac{n-1}{n^2} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \rightarrow 0$

Quindi:

$$\sup A = \max A = \frac{1}{4}, \quad \inf A = \min A = 0$$

- 2) Per il primo limite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin(x)} - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin(x)} - 1}{\sin(x)} \cdot \frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{1}{x^2}$$

Usando i limiti notevoli:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1$$

Otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin(x)} - 1}{x^3} = 1 \cdot 1 \cdot (+\infty) = +\infty$$

Per il secondo limite:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{\sin(x)}{x^2} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \frac{\sin(x)}{x^2} (1 + o(1)) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0 \end{aligned}$$

- 3) Per la derivabilità in $x = 2$, devono essere soddisfatte: 1) Continuità in $x = 2$ 2) Esistenza e uguaglianza delle derivate destre e sinistre in $x = 2$

Per la continuità:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\log(x+1)}{x-1} = \log(3) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (ax^3 + bx^2) = 8a + 4b$$

Per la derivabilità:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{(x+1)(x-1)} - \frac{\log(x+1)}{(x-1)^2} = \frac{1}{3} - \log 3 = \lim_{x \rightarrow 2^+} (3ax^2 + 2bx) = 12a + 4b$$

Risolvendo il sistema:

$$\begin{cases} 8a + 4b = \log(3) \\ 12a + 4b = 1/3 - \log 3 \end{cases}$$

otteniamo:

$$a = 1/12(1 - 6 \log(3)), \quad b = (5 \log(3))/4 - 1/6$$

Asintoti verticali: dato che con i valori di a e b sopra determinati f è continua sul suo dominio, gli unici punti in cui cercare asintoti verticali sono $x = -1$ e $x = 1$.

- Per $x \rightarrow -1^+$: $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\log(x+1)}{x-1} = \frac{-\infty}{-2} = +\infty$
- Per $x \rightarrow 1^\pm$: $\lim_{x \rightarrow 1^\pm} \frac{\log(x+1)}{x-1} = \frac{\log 2}{0^\pm} = \pm\infty$

Non ci sono asintoti orizzontali né obliqui per $x \rightarrow \infty$ essendo f un polinomio di grado 3 per $x > 2$.

- 4) Una forma del teorema di de L'Hôpital afferma che se $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ sono derivabili, $g(x), g'(x) \neq 0$ in un intorno destro di a , se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ oppure entrambi sono $\pm\infty$, e se esiste $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, allora:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Per $f(x) = x \cos(x^2)$:

Partendo da $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + o(x^8)$

Sostituendo x^2 e moltiplicando per x :

$$\begin{aligned} f(x) &= x \cos(x^2) = x - \frac{x^5}{2!} + \frac{x^9}{4!} - \frac{x^{13}}{6!} + o(x^{13}) \\ &= x - \frac{x^5}{2} + \frac{x^9}{24} + o(x^9) \end{aligned}$$

Da qui, deduciamo che la formula di MacLaurin di ordine 8 è

$$f(x) = x - \frac{x^5}{2} + o(x^8),$$

e inoltre $f^{(9)}(0)/9! = 1/24$ e quindi $f^{(9)}(0) = 9!/24$.

Per calcolare l'integrale:

$$\int_{\sqrt{\pi}}^0 x \cos(x^2) dx,$$

facciamo la sostituzione $u = x^2$. Quindi $du = 2x dx$. Per $x = 0$, abbiamo $u = 0$ e per $x = \sqrt{\pi}$, abbiamo $u = \pi$. L'integrale diventa:

$$= \frac{1}{2} \int_{\pi}^0 \cos(u) du = \frac{1}{2} [\sin(u)]_{\pi}^0 = 0.$$