

1) a)

Determinare la forma esponenziale del numero complesso

$$\left(-\frac{3^{\frac{2}{3}}}{2} + 3^{\frac{2}{3}} \frac{\sqrt{3}i}{2}\right)^7$$

$$\left(-\frac{3^{\frac{2}{3}}}{2} + 3^{\frac{2}{3}} \frac{\sqrt{3}i}{2}\right)^7 = \left(3^{\frac{2}{3}}\right)^7 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2}\right)^7$$

Poiché $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2} = e^{\frac{2\pi i}{3}}$

$$\left(3^{\frac{2}{3}}\right)^7 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2}\right)^7 = 3^2 \cdot \left(e^{\frac{2\pi i}{3}}\right)^7 = 9 e^{\frac{14\pi i}{3}} = 9 e^{\frac{2\pi i}{3}}$$

b) Determinare il dominio e l'immagine delle funzioni

$$f(x) = \arcsin(x^3 - 1); \quad g(x) = \sinh\left(\log_{\frac{1}{2}} x\right)$$

f: dato che la funzione $y = \arcsin x$ è definita su $[-1, 1]$

dove ora $\begin{cases} x^3 - 1 \geq -1 \\ x^3 - 1 \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^3 \geq 0 \\ x^3 \leq 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x \leq \sqrt[3]{2} \end{cases}$

Quindi $\text{dom} f = [0, \sqrt[3]{2}]$

f è una funzione strettamente crescente in quanto composta da funzioni strettamente crescenti inoltre è continua quindi

$$\text{Im} f = [f(0), f(\sqrt[3]{2})] = [\arcsin(-1), \arcsin 1] = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

g: la funzione $y = \sinh x$ è definita su \mathbb{R} , quindi dato g è uguale al dominio della funzione $y = \log_{\frac{1}{2}} x$, cioè $(0, +\infty)$

Anche g è composta da due funzioni monotone

$$x \in (0, +\infty) \mapsto \log_{\frac{1}{2}} x \text{ strett. decrescente e}$$

$$x \in \mathbb{R} \mapsto \sinh x \text{ strett. crescente}$$

Quindi g è strettamente decrescente. Essendo composta da funzioni continue, è continua e dunque $\text{Im} g = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x), \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)\right) = (-\infty, +\infty)$

2) Determinare dominio e asintoti della funzione

$$f(x) = \frac{x^8 - x - 2}{(x-1)(x+1)^2}$$

Stabilire, poi, il numero di zeri reali di f.

$\text{dom} f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. f è continua nel suo dominio dato che è una funzione razionale. Gli unici asintoti verticali sono quindi da cercare nei punti -1 e 1

dom $f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. f è continua nel suo dominio dato che è una funzione razionale. Gli unici asintoti verticali sono quindi da cercare nei punti -1 e 1 .

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$: il numeratore tende a -2 il denominatore tende a 0^+ dato che $x-1 > 0$ e $x \rightarrow 1^+$ e $(x+1)^2 \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$; quindi $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$ e la retta $x=1$ è asintoto verticale a destra

Analogamente $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$ dato che il numeratore tende a 0^- e la retta $x=1$ è anche asintoto verticale a sinistra

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$: il numeratore tende a 0 e anche il denominatore

Possiamo applicare le regole di de l'Hopital

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{8x^7 - 1}{(x+1)^2 + 2(x+1)(x-1)} = \left[\frac{-9}{0} \right]$$

Studiamo il segno del denominatore: $(x+1)^2 + 2(x+1)(x-1) > 0$

$$\Leftrightarrow (x+1)(x+1+2x-2) = (x+1)(3x-1)$$

Quindi il denominatore assume valori positivi in un intorno sinistro di -1 e negativi su un intorno destro, pertanto

$$+\infty = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{8x^7 - 1}{(x+1)^2 + 2(x+1)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \quad \text{e}$$

$$-\infty = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{8x^7 - 1}{(x+1)^2 + 2(x+1)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$$

quindi la retta $x = -1$ è asintoto verticale sia a dx che a sx.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^8}{x^3} = +\infty \quad \text{non c'è asintoto orizzontale per } x \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^8}{x^4} = +\infty \quad \text{" " " obliquo " "}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^8}{x^3} = -\infty \quad \text{" " " orizzontale " } x \rightarrow -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^8}{x^4} = +\infty \quad \text{" " " obliquo " "}$$

Gli zeri di f sono gli zeri del polinomio $p(x) = x^8 - x - 2$ al numeratore

a condizione che non coincidano con uno degli zeri del denominatore, dove f non è definita! (quindi non possono essere zeri di f poiché non sono punti del dominio di f). Nel nostro caso $p(1) = -2 \neq 0$ ma $p(-1) = 0$. Quindi -1 è da escludere.

o denominatore, dove f non è definito, (quindi non possono esserci zeri o perché non sono punti del dominio di f). Nel nostro caso $p(1) = -2 \neq 0$ ma $p(-1) = 0$. Quindi -1 è da escludere.

Studiamo il polinomio p per stabilire se esso ha altri zeri reali.

Poiché $p(0) = -2$ e $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} p(x) = +\infty$, per il teorema degli zeri

della funzione continua p ha almeno uno zero x_1 in $(0, +\infty)$ e almeno uno x_2 in $(-\infty, 0)$

cerchiamo di capire se ci sono altri zeri reali.

$$p'(x) = 8x^7 - 1; \quad p'(x) > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{\sqrt[7]{8}}$$

Quindi p è strettamente crescente sull'intervallo $(-\infty, \frac{1}{\sqrt[7]{8}})$

e strettamente crescente su $(\frac{1}{\sqrt[7]{8}}, +\infty)$ da cui deduciamo che

x_1 e x_2 sono gli unici zeri di p .

$$\left[\begin{array}{l} \text{Basta osservare che } x_0 = \frac{1}{\sqrt[7]{8}} \text{ è un minimo assoluto di } p \text{ e} \\ p\left(\frac{1}{\sqrt[7]{8}}\right) < p(0) < 0; \quad \text{pertanto } x_1 \in \left(\frac{1}{\sqrt[7]{8}}, +\infty\right) \\ \text{dove } p \text{ è strettamente crescente e } x_2 \in (-\infty, 0) \subset (-\infty, \frac{1}{\sqrt[7]{8}}) \\ \text{dove } p \text{ è strettamente decrescente} \end{array} \right]$$

È chiaro che l'unico zero negativo, x_2 , coincide con -1 ; quindi p ha solo uno zero cioè x_1 che deve anche essere strettamente maggiore di 1 dato che $p(1) = -2 < 0 = p(x_1)$ e p è strett. crescente in $(\frac{1}{\sqrt[7]{8}}, +\infty)$

3) Calcolare

$$\int_1^e \frac{x+1}{x(\log x + x)} dx$$

Esiste $\bar{x} \in (1, e)$ tale che $\frac{\bar{x}+1}{\bar{x}(\log \bar{x} + \bar{x})} = \frac{\log(1+e)}{e-1}$? Giustificare la risposta.

$$\text{Posto } \log x + x = t, \quad dt = \left(\frac{1}{x} + 1\right) dx = \frac{1+x}{x} dx$$

$$\text{abbiamo } \int_1^{1+e} \frac{1}{t} dt = \log t \Big|_1^{1+e} = \log(1+e)$$

Dato che la media integrale su $[1, e]$ della funzione integranda è

dunque $\frac{\log(1+e)}{e-1}$ e la funzione integranda è continua, \bar{x} esiste per il teorema delle medie integrali per le funzioni continue

4) Dare la definizione di funzione avente limite $l \in \bar{\mathbb{R}}$ per $x \rightarrow x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$

- 4) Dare la definizione di funzione avente limite $l \in \bar{\mathbb{R}}$ per $x \rightarrow x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$
Enunciare e dimostrare il teorema del doppio confronto per l'esistenza del
limite di una funzione

Per la definizione si veda p. 82 del manuale. Per enunciato e dimostrazione,
si vedano le pagg. 88 e 89 del manuale