Introduction

Dire cest quoi leffet cheerios etc ...

Dans le cadre de l'UE Projet en Calcul Scientifique Numérique, nous devions travailler sur un projet, afin de nous apprendre plus en détail, la programmation et le calcul numérique avec un langage compilé, le C. Notre sujet était sur l'"Effet Cheerios", ou l'interaction d'objets à la surface d'un liquide par l'effet de la gravité et la déformation interfaciale. Cet effet se caractérise par la tension d'une surface liquide sous le poids d'un objet, par exemple une punaise sur l'eau. Lorsque nous ajoutons plusieurs objets sur la même surface, à distance plus ou moins grande, les objets vont potentiellement s'attirer puis créer des tas mobiles. Ce phénomène est notamment visible avec des céréales dans du lait, d'où le nom de Cheerios, célèbre marque de céréales américaine. Pour réaliser à bien ce projet nous avons du faire de nombreuses recherches sur la mécanique des fluides, les collisions inélastiques et nous avons également du faire un travail conséquent sur l'optimisation de notre algorithme.

1 nescescites

1.1 Effet Cheerios

Les formules pour les calculs viennent principalement de [1] On mets les formules et peut etre demontrer ou ils viennes et sourtout les cas ou on peux utiliser ces formulles les cas ou ca marche pas etc...

$$F(l) = -2\pi\gamma R B^{5/2} K_1 \left(\frac{l}{L_c}\right) \tag{1}$$

1.2 Integration de verlet

Developement limite de Taylor Young de f(x) au point x_0

$$DL_n f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i + o((x - x_0)^n)$$
 (2)

Si on applique le Developement limite de ordre 3 la position($\boldsymbol{x}(t+\mathrm{d}t)$) au point $t+\mathrm{d}t$ on a : On a ca avec le developement limite a t et t_0 cest le pas temps precedent

$$DL_3 \boldsymbol{x}(t) = \boldsymbol{x}(t_0) + \boldsymbol{x}'(t_0)(t - t_0) + \frac{\boldsymbol{x}''(t_0)}{2!}(t - t_0)^2 + o((t - t_0)^3)$$

Si t_0 cest le pas de temps precedent et $\boldsymbol{x}'(t)$ vitesse et $\boldsymbol{x}''(t)$ lacceleration on

$$DL_{3}x(t+dt) = x(t) + x'(t)(t+dt-t) + \frac{x''(t)}{2!}(t+dt-t)^{2} + o(t+dt-t)$$

$$\implies DL_3 \boldsymbol{x}(t+\mathrm{d}t) = \boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{v}(t)(\mathrm{d}t) + \frac{\boldsymbol{a}(t)}{2!}(\mathrm{d}t)^2 + o(\mathrm{d}t^3)$$

L'erreur sur le temps t_n cest de lordre $o(\exp^{(Lt_n)}dt^2)$

Et comme notre acceleration ne depend pas de le changement de vitesse mais de l'equation 1 on peux calculer l'acceleration a partir du principe fondamentale de la dynamique avec masse constante. Cest important de faire ca apres le calcul de position et avant la vitesse car la position prend lacceleration precedent et la vitesse prend celui de avant et pendant le temps.

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a} \Longrightarrow \mathbf{a} = \frac{\sum \mathbf{F}}{m} \tag{3}$$

Et maintenat comme on a la nouvelle position et lacelleration on peux calculer la nouvelle vitesse.

$$\mathbf{v}(t+dt) = \mathbf{v}(t) + \frac{\mathbf{a}(t) + \mathbf{a}(t+dt)}{2}dt$$
(4)

1.3 Collsisions

Expliquer comment on a deduit que les collisions etait des collisions inelastic parfait et metre les equations utilise

2 Comment on a concue notre probleme

- On a pris l'interaction des forces totale sur chaque particule par la fonction dans l'article 'Cheerios effect'
- et de ca on deduis la force que reagis a chaque cheerios pour un pas de temps
- Check si il ya des collisions ou pas et si il ya on change les proprietes des cheerios par rapport aux collisions
- De la force en utilisant l'integration de verlet et le principe fondamentale de la dynamique somme forces = derive (masse*vitesse) on peux changer les positions des cheerios

Conclusion

Bibliographie

- [1] D. VELLA et L. MAHADEVAN, « The Cheerios effect, » American Journal of Physics, t. 73, n° 9, p. 817-825, sept. 2005, ISSN: 0002-9505, 1943-2909. DOI: 10.1119/1.1898523. adresse: http://aapt.scitation.org/doi/10.1119/1.1898523 (visité le 29/11/2022).
- [2] R. Benzi, S. Succi et M. Vergassola, « Introduction to the Lattice Boltzmann Equation for Fluid Dynamics, » in *Relaxation in Complex Systems and Related Topics*, sér. NATO ASI Series, I. A. Campbell et C. Giovannella, éd., Boston, MA: Springer US, 1990, p. 329-334, ISBN: 978-1-4899-2136-9. Doi: 10.1007/978-1-4899-2136-9_45. adresse: https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2136-9_45 (visité le 03/10/2022).
- [3] D. CHAN, J. HENRY et L. WHITE, « The interaction of colloidal particles collected at fluid interfaces, » Journal of Colloid and Interface Science, t. 79, n° 2, p. 410-418, fév. 1981, ISSN: 00219797. DOI: 10.1016/0021-9797(81)90092-8. adresse: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0021979781900928 (visité le 29/11/2022).
- [4] N. CHARLTON. « Drawing and Animating Shapes with Matplotlib. » (s. d.), adresse: https://nickcharlton.net/posts/drawing-animating-shapes-matplotlib.html (visité le 16/11/2022).
- [5] K. D. DANOV, R. DIMOVA et B. POULIGNY, « Viscous drag of a solid sphere straddling a spherical or flat surface, » Physics of Fluids, t. 12, no 11, p. 2711, 2000, ISSN: 10706631. DOI: 10.1063/1.1289692. adresse: http://scitation.aip.org/content/aip/journal/pof2/12/11/10.1063/1.1289692 (visité le 29/11/2022).
- [6] H. N. DIXIT et G. M. HOMSY, « Capillary effects on floating cylindrical particles, » Physics of Fluids, t. 24, no 12, p. 122102, déc. 2012, ISSN: 1070-6631, 1089-7666. DOI: 10.1063/1.4769758. adresse: http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4769758 (visité le 29/11/2022).
- [7] D.-x. Feng et A. V. Nguyen, « Contact angle variation on single floating spheres and its impact on the stability analysis of floating particles, » *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Enginee-ring Aspects*, t. 520, p. 442-447, mai 2017, ISSN: 09277757. DOI: 10.1016/j.colsurfa.2017.01.057. adresse: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927775717300948 (visité le 29/11/2022).
- [8] M. A. FORTES, « Attraction and repulsion of floating particles, » Canadian Journal of Chemistry, t. 60, no 23, p. 2889-2895, 1er déc. 1982, ISSN: 0008-4042, 1480-3291. DOI: 10.1139/v82-414. adresse: http://www.nrcresearchpress.com/doi/10.1139/v82-414 (visité le 29/11/2022).

- [9] W. GIFFORD et L. SCRIVEN, « On the attraction of floating particles, » Chemical Engineering Science, t. 26, no 3, p. 287-297, mars 1971, ISSN: 00092509. DOI: 10.1016/0009-2509(71)83003-8. adresse: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0009250971830038 (visité le 29/11/2022).
- [10] J. B. Keller, « Surface tension force on a partly submerged body, » *Physics of Fluids*, t. 10, no 11, p. 3009-3010, nov. 1998, ISSN: 1070-6631, 1089-7666. DOI: 10.1063/1.869820. adresse: http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.869820 (visité le 29/11/2022).
- [11] P. A. KRALCHEVSKY et K. NAGAYAMA, « Capillary interactions between particles bound to interfaces, liquid films and biomembranes, » Advances in Colloid and Interface Science, t. 85, n° 2-3, p. 145-192, mars 2000, ISSN: 00018686. DOI: 10.1016/S0001-8686(99)00016-0. adresse: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0001868699000160 (visité le 29/11/2022).
- [12] J. -. LOUDET, M. QIU, J. HEMAUER et J. J. FENG, « Drag force on a particle straddling a fluid interface: Influence of interfacial deformations, » *The European Physical Journal E*, t. 43, n° 2, p. 13, fév. 2020, ISSN: 1292-8941, 1292-895X. DOI: 10.1140/epje/i2020-11936-1. adresse: http://link.springer.com/10.1140/epje/i2020-11936-1 (visité le 29/11/2022).
- [13] E. H. Mansfield, H. R. Sepangi et E. A. Eastwood, « Equilibrium and mutual attraction or repulsion of objects supported by surface tension, » *Philosophical Transactions of the Royal Society of London.* Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, t. 355, n° 1726, p. 869-919, 15 mai 1997, ISSN: 1364-503X, 1471-2962. DOI: 10.1098/rsta.1997.0049. adresse: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.1997.0049 (visité le 29/11/2022).
- [14] A. MARCHAND, J. H. WEIJS, J. H. SNOEIJER et B. ANDREOTTI, « Why is surface tension a force parallel to the interface? » American Journal of Physics, t. 79, n° 10, p. 999-1008, oct. 2011, ISSN: 0002-9505, 1943-2909. DOI: 10.1119/1.3619866. adresse: http://aapt.scitation.org/doi/10.1119/1.3619866 (visité le 29/11/2022).
- [15] J. C. MAXWELL, The Scientific Papers of James Clerk Maxwell, 1^{re} éd., W. D. NIVEN, éd. Cambridge University Press, 20 jan. 2011, ISBN: 978-1-108-01538-7 978-0-511-71037-7. DOI: 10.1017/CB09780511710377. adresse: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9780511710377/type/book (visité le 29/11/2022).
- [16] M. M. NICOLSON, « The interaction between floating particles, » Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, t. 45, n° 2, p. 288-295, avr. 1949, ISSN: 0305-0041, 1469-8064. DOI: 10.1017/S0305004100024841. adresse: https://www.cambridge.org/core/

- product/identifier/S0305004100024841/type/journal_article (visité le 29/11/2022).
- [17] « Calculateur de Tension Superficielle dune Aiguille ń Flottante ż Hydraulique Fluides Convertisseurs dunités En Ligne. » (s. d.), adresse: https://www.translatorscafe.com/unit-converter/fr-FR/calculator/surface-tension/ (visité le 07/11/2022).
- [18] « Compressible Lattice Boltzmann Method and Applications | SpringerLink. » (s. d.), adresse: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-11842-5_3 (visité le 01/10/2022).
- [19] T. Ondarçuhu, P. Fabre, E. Raphaël et M. Veyssié, « Specific properties of amphiphilic particles at fluid interfaces, » *Journal de Physique*, t. 51, n° 14, p. 1527-1536, 1990, ISSN: 0302-0738. DOI: 10.1051/jphys:0199000510140152700. adresse: http://www.edpsciences.org/10.1051/jphys:0199000510140152700 (visité le 29/11/2022).
- [20] J. Onishi, A. Kawasaki, Y. Chen et H. Ohashi, « Lattice Boltzmann simulation of capillary interactions among colloidal particles, » Computers & Mathematics with Applications, t. 55, no 7, p. 1541-1553, avr. 2008, ISSN: 08981221. DOI: 10.1016/j.camwa.2007.08.027. adresse: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0898122107006463 (visité le 29/11/2022).
- [21] REDUCIBLE, director, Building Collision Simulations: An Introduction to Computer Graphics, 19 jan. 2021. adresse: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eED4bSkYCB8&ab_channel=Reducible (visité le 03/10/2022).
- [22] N. B. VARGAFTIK, B. N. VOLKOV et L. D. VOLJAK, «International Tables of the Surface Tension of Water, » Journal of Physical and Chemical Reference Data, t. 12, no 3, p. 817-820, juill. 1983, ISSN: 0047-2689, 1529-7845. DOI: 10.1063/1.555688. adresse: http://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.555688 (visité le 29/11/2022).
- [23] N. D. VASSILEVA, D. van den Ende, F. Mugele et J. Mellema, « Capillary Forces between Spherical Particles Floating at a Liquid-Liquid Interface, » Langmuir, t. 21, n° 24, p. 11190-11200, 1er nov. 2005, ISSN: 0743-7463, 1520-5827. DOI: 10.1021/la0511860. adresse: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/la0511860 (visité le 29/11/2022).
- [24] D. Vella et L. Mahadevan, « The 'Cheerios effect', » American Journal of Physics, t. 73, no 9, p. 817-825, sept. 2005, ISSN: 0002-9505, 1943-2909. Doi: 10.1119/1.1898523. arXiv: cond-mat/0411688. adresse: http://arxiv.org/abs/cond-mat/0411688 (visité le 29/11/2022).

- [25] D. Vella, P. D. Metcalfe et R. J. Whittaker, « Equilibrium conditions for the floating of multiple interfacial objects, » *Journal of Fluid Mechanics*, t. 549, p. 215, -1 8 fév. 2006, ISSN: 0022-1120, 1469-7645. DOI: 10.1017/S0022112005008013. adresse: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0022112005008013 (visité le 29/11/2022).
- [26] D. J. R. Vella, « The Fluid Mechanics of Floating and Sinking, » p. 143, s. d.