

מכרזים למיקסום רווח

Revenue-Maximizing Auctions

אראל סגל-הלוי

מקורות:

הקורס של טים, הרצאה 5 והלאה:

<http://theory.stanford.edu/~tim/f13/f13.html>

מיקסום רווח לעומת מיקסום סכום ערכים

נניח שאנחנו מוכרים חפץ אחד ויש קונה אחד.

איזה מכרז ממקסם את סכום הערכים?
• זה קל – נותנים לו את החפץ בחינם.

איזה מכרז ממקסם את הרווח של המוכרים?
• זה קשה – תלוי בערך של השחקן!

במקום רווח – ננסה למקסם תוחלת רווח.
• זה דורש מידע סטטיסטי על ערכים של שחקנים ("סקר שוק").

מיקסום רווח – חפץ אחד וקונה אחד

דוגמה: סקר-שוק הראה שהערך של קונה מתפלג אחיד בין 10 ל-30.
איזה מכרז משיג תוחלת-רווח גדולה ביותר?

• מכרז ויקרי ממקסם סכום ערכים, אבל הרווח שלו הוא 0!

• מכרז מאירסון לא חייב למקסם סכום ערכים, ולכן יש סיכוי שייתן לנו תוחלת רווח חיובית.

• כדי להשתמש בו צריך להגדיר כלל בחירה.

מכרז מאירסון – חפץ אחד וקונה אחד

דוגמה: סקר-שוק הראה שהערך של קונה מתפלג אחיד בין 10 ל-30.
איזה מכרז משיג תוחלת-רווח גדולה ביותר?

- כללי-בחירה אפשריים כשיש שחקן אחד:
- בחר את הקונה אם ורק אם ערכו גדול מ- p .

- התשלום הוא ערך הסף – p .

- איזה p נותן את תוחלת-הרווח הגדולה ביותר?

מכרז מאירסון – חפץ אחד וקונה אחד

• בכלל-הבחירה "מקסם את סכום הערכים":
ערך-הסף=0, התשלום=0, תוחלת הרווח=0.

• בכלל-הבחירה "בחר את הקונה אם"ם הערך
שלו לפחות 10": ערך-הסף=10, הקונה
תמיד נבחר (בהסתברות 1) ותמיד משלם,
תוחלת הרווח=10.

• בכלל-הבחירה "בחר את הקונה אם"ם הערך
שלו לפחות 15", ערך-הסף=15, הקונה נבחר
בהסתברות $\frac{3}{4}$, רווח $= \frac{3}{4} * 15 = 11.25$.

מכרז מאירסון – חפץ אחד וקונה אחד

בכלל-הבחירה "בחר את הקונה אם"ם הערך
שלו לפחות p ", ערך-הסף $=p$, הקונה נבחר
בהסתברות:

- $(30-p)/(30-10)$

• תוחלת הרווח:

$$\begin{aligned} E[\text{Revenue}(p)] &= p * \text{Prob}[v > p] \\ &= p * (30-p)/(30-10) \end{aligned}$$

$$\text{derivative by } p = (30-2p)/20 \rightarrow p_{opt} = 15$$

מכרז מאירסון – חפץ אחד וקונה אחד

הכללה: נניח שאספנו נתונים סטטיסטיים על ערכי קונים, והגענו למסקנה שהם מתפלגים כ:

$$\text{Prob}[v < p] = F(p)$$

איזה מחיר ממקסם את תוחלת הרווח?

$$E[\text{Revenue}(p)] = p \cdot \text{Prob}[v > p] = p \cdot [1 - F(p)]$$

$$p' = 0 \iff p - \frac{1 - F(p)}{F'(p)} = 0$$

נגדיר את פונקציית הערך הוירטואלי:

$$r(v) := v - \frac{1 - F(v)}{F'(v)}$$

המכרז האופטימלי הוא: מכור אם $r(v) > 0$.

ראו: `code/virtual_valuations_uniform.ggb`

מיקסום רווח בשיטת מאירסון - כללי

נתון: שוק חד-פרמטרי:

- לכל משתתף יש ערך כספי יחיד ל"היבחרות".
- הערך של משתתף j לקוח מהתפלגות F_j .
- (למה התפלגות שונה לכל משתתף? למשל מאפיינים דמוגרפיים).

דרושים:

- כלל-בחירה לבחירת תת-קבוצה של משתתפים.
- כלל-תשלומים שאיתו כלל-הבחירה אמיתי.

כזכור, לפי משפט מאירסון, ברגע שיש כלל-בחירה –
יש כלל-תשלומים יחיד שאיתו הכלל אמיתי.
נחפש כלל-בחירה שממקסם את תוחלת הרווח.

מיקסום רווח בשיטת מאירסון - כללי

לכל כלל-תשלומים p , תוחלת הרווח היא:

$$E[\text{Revenue}(v_1, \dots, v_n)] = E[\sum_{j=1}^n p_j(v_1, \dots, v_n)]$$

לפי משפט מאירסון, כלל-התשלומים הוא פונקציה של כלל-הבחירה c . אחרי פיתוח ארוך, מקבלים:

$$E[\text{Revenue}(v_1, \dots, v_n)] = E[\sum_{j=1}^n c_j(v_1, \dots, v_n) \cdot r_j(v_j)]$$

במילים: תוחלת הרווח של כלל-בחירה c
= תוחלת סכום הערכים הוירטואליים של הנבחרים.

מיקסום רווח בשיטת מאירסון - כללי

$$E[\text{Revenue}(v_1, \dots, v_n)] = E[\sum_{j=1}^n c_j(v_1, \dots, v_n) \cdot r_j(v_j)]$$

תוחלת הרווח = תוחלת סכום הערכים הוירטואליים של הנבחרים.

מסקנה:

כלל-הבחירה c הממקסם את תוחלת הרווח הוא:

בחר את הקבוצה שבה סכום הערכים הוירטואליים הוא הגדול ביותר.

מיקסום רווח בשיטת מאירסון – חפץ אחד

תוחלת הרווח = תוחלת סכום הערכים הוירטואליים של הנבחרים.

$$r_j(v) := v - \frac{1 - F_j(v)}{F'_j(v)}$$

דוגמה א. קונה אחד:

תוחלת הרווח = תוחלת הערך הוירטואלי $r(v)$.

כלל-הבחירה הממקסם את הרווח הוא:

מכור אם-ורק-אם $r(v) > 0$.

*** הכלל אמיתי בתנאי ש- r היא פונקציה עולה.

התשלום הוא ערך-הסף $r^{-1}(0)$.

מיקסום רווח בשיטת מאירסון – חפץ אחד

תוחלת הרווח = תוחלת סכום הערכים הוירטואליים של הנבחרים.

$$r_j(v) := v - \frac{1 - F_j(v)}{F'_j(v)}$$

דוגמה ב. הרבה קונים מאותה התפלגות F , ולכן

עם אותה פונקציה r (נניח ש- r פונקציה עולה).

תוחלת הרווח = תוחלת $r(v_j)$ של המנצח.

כלל-הבחירה הוא: מכור למשתתף עם v_j הכי גבוה,

בתנאי ש $r(v_j) > 0$.

התשלום הוא ערך-הסף: הערך השני בגובהו

או $r^{-1}(0)$ - הגבוה מביניהם.

--- שקול למכרז מחיר שני עם מחיר מינימום $r^{-1}(0)$!

מיקסום רווח בשיטת מאירסון – חפץ אחד

תוחלת הרווח = תוחלת סכום הערכים הוירטואליים של הנבחרים.

$$r_j(v) := v - \frac{1 - F_j(v)}{F'_j(v)}$$

דוגמה ג. שני קונים עם התפלגויות שונות:
תוחלת הרווח $r_j(v_j)$ של המנצח.

כלל-הבחירה הוא: מכור למשתתף עם $r_j(v_j)$ הכי גבוה, בתנאי ש $r_j(v_j) > 0$. התשלום = ערך-הסף.

דוגמה: $F_a = \text{Unif}[10, 30]$, $F_b = \text{Unif}[20, 40]$

$$r_a(v) = 2v - 30, \quad r_b(v) = 2v - 40.$$

אם a אמר 23 ו- b אמר 27, אז a יזכה! וישלם את ערך-הסף שלו שהוא 22 [ערך הסף של b הוא 28].

הדמיה בקובץ `code/revenue_maximization.ods`

מיקסום רווח במערכת הפירסום של יאהו *

- עד 2008, יאהו השתמשה במחירי-מינימום נמוכים וזהים עבור כל מילות-החיפוש.
- ב-2008 בוצע מחקר סטטיסטי שנועד להעריך את ההתפלגות F עבור כל מילה בנפרד.
- חושב מחיר-מינימום שונה עבור כל מילה.
- המנהלים לא הסכימו להשתמש במחירים החדשים אלא עשו ממוצע בין הישנים לחדשים.
- **התוצאה: עליה גדולה ברווחים בסוף 2008.**

* <http://theory.stanford.edu/~tim/f13/II6.pdf>

* Ostrovsky, Michael, and Michael Schwarz. "Reserve prices in internet advertising auctions: A field experiment." Proceedings of the 12th ACM conference on Electronic commerce. ACM, 2011.