וּנְחַלְתֵם אוֹתָה אִישׁ כְּאַחִיו" יחזקאל מז 11)

#### חלוקה הוגנת עם שיתוף מינימלי Fair Division with Minimal Sharing

#### אראל סגל-הלוי



## חלוקת חפצים בדידים

כשהחפצים לא ניתנים לחלוקה, בדרך-כלל אי אפשר למצוא חלוקה פרופורציונלית וללא קנאה (דוגמה: בית).

פתרונות מקובלים:

1)הוספת כסף למערכת. דוגמה<sup>,</sup> אלגוריםמי חלום

דוגמה: אלגוריתמי חלוקת שכר-דירה.

2)חלוקה ללא-קנאה-בקירוב. דוגמה: חלוקת תכשיטים ומקומות בקורסים.

3)שיתוף מספר מינימלי של חפצים. דוגמה: אלגוריתם "המנצח המתוקן".

#### ?איך "חותכים" חפץ בדיד

החפץ שצריך "לחתוך" נשאר בבעלות משותפת. לא קל, אבל בדרך-כלל אפשרי:

- ילדים משמורת משותפת;
- **דירת מגורים** השכרה וחלוקת הרווחים;
- **דירת נופש, רכב** שימוש בזמנים שונים;
  - י **חפצים לא יקרים** הגרלה;
    - פשרה יצירתית כלשהי.

# חלוקת חפצים בין שני אנשים

- נתונים:
- שני שותפים (למשל: דונאלד ואיוואנה).
- חפצים או נושאים שיש עליהם מחלוקת. $m \bullet$ 
  - כל שותף מייחס ערך באחוזים לכל נושא. •

- :האתגר להחליט מי יקבל כל חפץ/נושא כך ש
  - לא תהיה קנאה.
  - התוצאה תהיה יעילה פארטו.
  - נצטרך לחתוך/לשתף חפץ אחד לכל היותר.

#### "אלגוריתם "המנצח המתוקן" (Adjusted Winner) Brams and Taylor, 1996

א. סדר חפצים בסדר עולה של יחס הערכים: ערך-עבור-*דונאלד* / ערך-עבור-איוואנה.

ב. אתחול: תן את כל החפצים לדונאלד.

ג. העבר חפצים לאיואנה לפי הסדר, עד ש:

- איואנה, או של דונאלד שווה לסכום של איואנה, או (1)
- .2) יש חפץ אחד שאם "נחתוך" אותו הסכום ישתווה

.winner.ods ראו גליון אלקטרוני מצורף

#### "אלגוריתם "המנצח המתוקן"

**משפט**: אלגוריתם "המנצח המתוקן" מחזיר תמיד חלוקה יעילה פארטו.

הוכחה: יהי r יחס-הערכים של החפץ האחרון שהועבר מדונאלד לאיוואנה (או שותף ביניהם). נגדיר:  $v_i$ =הערך לאיוואנה,  $v_i$ =הערך לאיוואנה,  $v_i$ 

$$v_j = r * v_i$$

לכל החפצים מימין לחפץ המשותף,

$$v_d/v_i \leq r \rightarrow v_j \geq v_d$$

לכל החפצים משמאל לחפץ המשותף,

$$v_d/v_i \ge r \longrightarrow v_j \le v_d$$

# אלגוריתם "המנצח המתוקן" המשך הוכחה: בחלוקה הסופית,

;לחפצים מימין  $v_{_{\!\scriptscriptstyle i}} \geq v_{_{\!\scriptscriptstyle d}}$  והם נמסרים לאיוואנה לחפצים משמאל  $v_{i} \leq v_{d}$ והם נמסרים לדונאלד;

מכאן - החלוקה הסופית ממקסמת את הסכום:

$$v_j + v_d$$

$$= r * v_i + v_d$$

כל חלוקה הממקסמת סכום של פונקציה עולה \*\*\* של הערכים, היא יעילה פארטו.

# "אלגוריתם "המנצח המתוקן

**משפט**: אלגוריתם "המנצח המתוקן" מחזיר תמיד חלוקה ללא קנאה.

**הוכחה**: לשני השותפים ניקוד שווה.

אילו הניקוד היה קטן מ-50, הם היו יכולים להתחלף וזה היה שיפור פארטו – סתירה למשפט הקודם. \*\*\*

אלגוריתם "המנצח המתוקן" מחזיר חלוקה יעילה והוגנת עם שיתוף של **חפץ אחד לכל היותר**.

שיתוף זה לא נוח. לכן נעדיף חלוקה יעילה והוגנת **בלי** שיתוף בכלל, אם אפשר.

משפט: כל חלוקה יעילה פארטו בין שני אנשים, מתקבלת ע"י סידור החפצים *בסדר עולה של יחס הערכים*, ו"חיתוך" הסדרה בנקודה כלשהי.

<- הוכחה

**הוכחת המשפט**: נניח שדונאלד קיבל את חפץ 1 או חלק ממנו, ואיוואנה קיבלה את חפץ 2 או חלק ממנו, ויחס הערכים הוא לא לפי הסדר הנכון:

$$v_{d1}/v_{i1} < v_{d2}/v_{i2}$$
  
 $v_{d1}/v_{d2} < v_{i1}/v_{i2}$ 

נעביר קצת (v) חפץ 1 מדונאלד לאיוואנה, בתמורה לקצת (z) חפץ 2, כאשר:

$$v_{d1}/v_{d2} < z/y < v_{i1}/v_{i2}$$

:יכי: איפור פארטו (חזק), כי:

$$z v_{d2} > y v_{d1} \qquad y v_{i1} > z v_{i2}$$

הוכחת המשפט - דוגמה מהקובץ winner.ods, שני

החפצים מימין:

		אחוזת
נושא:	תכשיטים	גריניץ
דונאלד:	15	15
איואנה:	40	25
יחס:	0.375	0.6

נניח שדונאלד קיבל את התכשיטים (חפץ 1) ואיוואנה את האחוזה (חפץ 2). אז:

$$v_{d1} = 15, \ v_{d2} = 15, \ v_{d1}/v_{d2} = 1$$

$$v_{i1} = 40, \ v_{i2} = 25, \ v_{i1}/v_{i2} = 1.6$$

$$z/y = 1.2$$
;  $z = 0.6$ ,  $y = 0.5$ 

נבחר למשל:

דונאלד נותן לאיוואנה 0.5 מהתכשיטים תמורת 0.6 מהאחוזה. הוא מפסיד 7.5 אבל מרויח 9;

איוואנה מפסידה 15 אבל מרויחה 20. שיפור פארטו חזק!

מסקנה: אם יחס-הערכים הוא שונה לכל חפץ, אז יש רק *דרך אחת* לסדר את החפצים לפי יחס-הערכים.

לכן, יש רק m+1 חלוקות יעילות-פארטו בלי שיתופים.

:אפשר לבדוק את כולן בזמן פולינומיאלי

- ;אם אחת מהן ללא קנאה מחזירים אותה
  - אחרת מריצים את "המנצח המתוקן".

האלגוריתם הזה מוצא את החלוקה היעילה וללא-קנאה עם מספר השיתופים *המינימלי*. \*\*\*

הערה: אם יחס-הערכים הוא שווה לכל החפצים, אז בעיית השיתוף המינימלי היא NP-קשה.

## שיתוף מינימלי עם n שחקנים

n-1 משפט 1. כשיש n שחקנים, ייתכן שנצטרך m-1 משפט שיתופים כדי להשיג חלוקה הוגנת.

הוכחה. ייתכן שיש n-1 חפצים זהים.

משפט 2. אם קיימת חלוקה א עם מספר שיתופים, כלשהו, אז קיימת חלוקה ב עם עד n-1 שיתופים, הנותנת לכל שחקן לפחות את הערך שהיה לו בחלוקה א.

#### מסקנות.

- . שיתופים n-1 שיתופים.
  - הדבר נכון גם כשלשחקנים יש זכויות שונות.

### שיתוף מינימלי עם n שחקנים

#### הוכחת משפט 2. סימונים:

- . הערך שקיבל שחקן i בחלוקה א $=t_i$
- בחלוקה בi בחלוקה בתרך שיקבל שחקן i בחלוקה ב $t_i + y_i$ 
  - j בייחס מייחס וויחס וויחס i בייחס  $v_{ij}$
- בחלוקה בj בחלוקה מקבל מחפץ בחלוקה בi בחלוקה ב $z_{ij}$

#### נמצא את חלוקה ב בעזרת תוכנית ליניארית:

Maximize  $v_{n1} \cdot z_{n1} + ... + v_{nm} \cdot z_{nm}$  [value of player n] Subject to:

$$v_{i1} \cdot z_{i1} + ... + v_{im} \cdot z_{im} = t_i + y_i$$
 for all i in 1,...,n-1  $z_{1j} + ... + z_{nj} = 1$  for all j in 1,...,m  $z_{ij} \ge 0$  for all i in 1,...,n & j in 1,...,m  $y_i \ge 0$  for all i in 1,...,n-1

#### משפט על תוכניות ליניאריות

משתנים N משפט. נתונה תוכנית ליניארית כלשהי, עם M אילוצי שיוויון, מהצורה:  $X_1, \ldots, X_N$ 

```
Maximize c_1x_1 + ... + c_Nx_N

Subject to a_{11}x_1 + ... + a_{1N}x_N = b_1

...

a_{M1}x_1 + ... + a_{MN}x_N = b_M

x_i \ge 0 for all i in 1,...,N
```

אם קיים לה פתרון אופטימלי כלשהו, אז קיים לה פתרון אופטימלי עם לכל היותר M משתנים שונים מאפס.

**הרעיון**. אם בוחרים M משתנים כלשהם, ומציבים 0 בשאר המשתנים, אז מקבלים מערכת של M משוואות ב-M נעלמים, ו"בדרך כלל" למערכת כזאת יש פתרון.

הערה: ניתן למצוא פתרון כזה בעזרת אלגוריתם "סימפלקס".

# שיתוף מינימלי - המשך

```
Maximize v_{n1} \cdot z_{n1} + ... + v_{nm} \cdot z_{nm}
Subject to:
```

```
v_{i1} \cdot z_{i1} + ... + v_{im} \cdot z_{im} = t_i + y_i for all i in 1,...,n-1
                   for all j in 1,...,m
z_{1i} + ... + z_{ni} = 1
        for all i in 1,..,n & j in 1,..,m
z_{ii} \geq 0
       for all i in 1,..,n-1
y_i \ge 0
בתוכנית למציאת חלוקה ב, יש m+n-1 אילוצי שיוויון.
 לכן יש לה פתרון אופטימלי עם עד m+n-1 משתנים
    חפצים n-1 שונים מאפס. אז יש לכל היותר (z_{ii})
 מתוך m, ששניים או יותר מהמשתנים שלהם שונים
*** מאפס. לכן: יש לכל היותר n-1 חפצים משותפים.
```

#### מסקנה

ניתן להקים ממשלה עם n מפלגות, ולחלק את התיקים **בהגינות מדוייקת** (לא בקירוב), בהתאם לגדלים השונים של המפלגות,

