

212398713

-1187

2020

1:1

המשפט הראשון: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.1)

המשפט השני: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3} = \frac{\pi^2}{6}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.2)

המשפט השלישי: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^2}{90}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.3)

המשפט הרביעי: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^5} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.4)

המשפט החמישי: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^6} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.5)

המשפט השישי: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^7} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.6)

המשפט השביעי: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^8} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.7)

המשפט השמיני: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^9} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.8)

המשפט התשיעי: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{10}} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.9)

המשפט העשירי: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{11}} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.10)

המשפט האחד עשר: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{12}} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.11)

המשפט השנים עשר: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{13}} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.12)

המשפט השלושה עשר: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{14}} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.13)

המשפט הארבעה עשר: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{15}} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.14)

המשפט החמשה עשר: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{16}} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.15)

המשפט הששה עשר: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{17}} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.16)

המשפט השבעה עשר: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{18}} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.17)

המשפט האשור עשר: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{19}} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.18)

המשפט התשעה עשר: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{20}} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.19)

המשפט העשרה עשר: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{21}} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.20)

המשפט האחד עשרה עשר: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{22}} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.21)

המשפט השנים עשרה עשר: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{23}} = \frac{\pi^2}{945}$ (הוכחה: ראו תרגיל 1.22)

$b_1 = b_2$, $T_2(b_1) = T_2(b_2)$. לפי 2 יתכן ש T_2 היא פונקציה קבועה

משפט 2.1.1 (המשפט הראשון של פאלי) $b_1, b_2, \dots, b_n$ הם מספרים שלמים.

1772 12 25

2. $K_1(b_2) = t_1(b_1, b_2)$ - 2-й шаг функции t_1 на b_1 и b_2 (то есть t_1 на b_1 и b_2).

2. 1ste xk: $K_2(b_1) = t_2(b_1, b_2)$

הנהגתו של השר
היה לו מוסר

אם a, b, c מסתנים אז a, b, c הם צדדים של משולש. לכן a, b, c הם מסתנים.

13/11 2. rek- $K_2(b_1) + b_1 = t_2(b_1, b_2)$

$$k_1(b_2) \pm k_2(b_2) \pm b_2 = 0 \text{ wegen } 1 \neq k, \quad k_1(b_2) = k_2(b_2), \quad t_2(b_1, b_2) \pm b_2 = t_1(b_1, b_2) \quad b_1 \neq b_2 \text{ wegen } 1 \neq n$$
$$\cdot K_2(b_1) + b_1 + K_1(b_2) = 0 \quad \text{wrt } K_2(b_1) + b_1 = K_1(b_2), \quad t_2(b_1, b_2) = t_1(b_1, b_2) \quad b_2 > b_1$$

$(b_1, b_2) \rightarrow K_2(b_1) + K_1(b_2) + b_1 = 0$, $(b_1, b_2) \rightarrow K_1(b_1) + K_1(b_2) + b_2 = 0$ - קבוצת 2 נקודות

↓

$$K_2(b_1) = -K_1(b_2) - b_2 : b_1 \neq b_2 \text{ } \forall b_1, b_2 \text{ } \text{ممكن}$$

המשפט 1.1.1 $K_2(b_1) = -C$

$$K_1(b_2) = -b_2 + c$$
$$b_2 \cdot b_1 \text{ [5]} \quad b_1 \cdot b_2 \quad \gamma^* \quad -\cancel{K} + \cancel{K} - b_2 + b_1 = 0 \quad -\lambda_j \text{ en } x_j \text{ en } p_j$$

גב' מרת נחמי פסנ' . סטירה ■