

(3) כל היתר שכתב אינו מתאים-אשר, ומסבך, והוא (1)

נאלץ בה אמתה שהיה אסור - נאלץ' 2 מתקנים ו-2 אכסר"ו
היה נא בטלוי הביאה -

אלו חוץ

אכסר"ו 2	אכסר"ו 1	א' שנת
1	5	א' שנת
20	5	ז' שנת

של המון - היותו הוא אחר ה-כפול -
 $20 \cdot 2 = 40 > 25 = 5 \cdot 5$

אחר באכסר"ו 2

אם לא - (היה נא המון א' (אשר היה זאף ההג')

סכום האחרים כסדרו (היה נא היתר א' המון ג) -

אכסר"ו 2	אכסר"ו 1
20	5

ולכן המס' הוא 20

סכום האחרים נמצאה מתחת - 5

ולכן המס' א' המון א' חל
 $20 - 5 = 15$

היה נא א' המון א' (היה נא המון) היא -
 $5 - 15 = -10$

ולכן היא נכס' מההג' -

אם המון א' היה נא א' אחר שיהיה 1 היה נא היא 0

כעת האלף יתר שיהיה 2 (20 > 0)
וצדק המון א' -

2	1	א'
1	0	א'
20	5	ז'

סכום האחרים הוקטנו' כזו' - 20

סכום האחרים נמצאה מתחת - 20

היה נא - $20 - 20 = 0$

סה"כ היותו - $1 - 0 = 1$

אכן ע"י אחר - המון א' אחר א' היותו א' -

(2) נניח שהאלג' ~~הוא~~ קוד גורם חלקן אפילו וזו כוונתנו

f שאינה מתקסמת אך הסביר, אך היום הגילי ניה -
המיליון / מיליון i הוא היום מהלך הוא מהלך המיליון
מסביר המיליון של vcc היא -

$$p_i = \sum_{j \neq i} u_j(\text{best without } i) - \sum_{j \neq i} u_j(\text{outcome})$$

זמן המיליון של מיליון i היא -

$$U_i = u_i(\text{outcome}) - \left(\sum_{j \neq i} (\text{best without } i) - \sum_{j \neq i} u_j(\text{outcome}) \right)$$

$$U_i = u_i(\text{outcome}) + \sum_{j \neq i} u_j(\text{outcome}) - \sum_{j \neq i} u_j(\text{best without } i)$$

סביר הצדקה חסר של המיליון -
ל- i יע יע יע יע יע יע יע יע
אם הסביר

מיליון מיליון מיליון מיליון -
אין יע יע יע יע יע יע יע יע

כך המיליון מיליון - ל- המיליון, המיליון חסר מהמיליון יע

(אפשר שמתקסמת אם סביר הערכים, כוונתנו $\sum u$

אין ל- הערך המיליון, המיליון קוד גאסטרל שאינה מתקסמת
אם סביר הערכים ל- סוף f

ל- א- המיליון מתקין חסר כ- X

וא- המיליון מהמיליון גורם כ- Y

אם $X \neq Y$ המיליון קבוצה כי אם הוא יע יע, המיליון

ל- ג- המיליון יע יע יע יע יע יע יע יע

ל- המיליון מיליון ו' צדד צדד מיליון כ- סביר f מהמיליון

מהמיליון X היא המיליון ל-