


n שתיים $n-1$ חצות בקצות. צריך את כל 1 ו 2 למק.



ד. השווה אורכי רגליים = מקסימום זמן סכום הערכות:

22. 18. 333 33-111 1111
 33 1111 1111

ההקדמה זה הסדר קטנה וזמן אל החל הסכמים.

$O(n^3) \rightarrow$ זיהוי בין כל זוג של קצוות אם יש להם קצה משותף.
 זה לא פתרון טוב כי יש n קצוות, כל קצה יכול להיות מחובר לכל קצה אחר, אז יש n^2 זוגות קצוות.

אם יש קשר בין שני משתנים - χ^2 test

[illegible]

2. השארת תחילת הקו - חלוקה משמאל לימין והתחברות עם הקו הבא.

הצגה אלו היא פסל מידת המספרים הממשיים על המספרים הרציונליים. $\log$ (הצגה)

$$X = \begin{matrix} \text{مرد} \\ \text{زن} \end{matrix}$$

$$\sum_{i=1}^n \omega_{i,x} = \sum_{i=1}^n \log(v_{ix}) = \log\left(\prod_{i=1}^n v_{ix}\right)$$

اگر x مرد باشد $\rightarrow$ $\log$ از حاصلضرب $\rightarrow$ $\log$ از مجموع $\rightarrow$ $\log$ از $\frac{1}{2}$

[illegible][illegible]

מש אהרן ור הסוף הגב.

$O(n^3)$

2. מיליון ה' נחשב כמאה שנה לפני ה' - כלומר, 1000000 = 10^6

3. For β : $\mu = 0.76$

ניצור רשומה A על כף הסרכים V_i

אנינו מודפס אר העניינים הני לכה
מספר אלמס 'גלן טולן, אר יד חסד בליוני
א ד לקדח חס מוסר יסדן א בלח יסדן
ד. ת.

$low = -\infty$ $high = N-1$ $low = 0$

low ≤ high 3 or 6

$$mid = \lfloor \frac{low + high}{2} \rfloor$$
$$T = A[mid]$$

הצדק נה דרך לו - (הוא יבין) כי יש דברים שיש להם חשיבות רבה יותר מכל דבר אחר (הוא יבין) כי יש דברים שיש להם חשיבות רבה יותר מכל דבר אחר.

best-T = T : 780 250 500 1000

best_modeling = 12

low = mid + 1

high = mid + 1 - ~~one~~

best-matching נ"נ

$O(n^3 / \log n)$ - זמן

[illegible]

אין ארץ ישראל חסידים רבים וזוהי אחת הסיבות