Introdução ao JAMOVI

Produzido por: Dr. Erick Faria

www.balaiocientifico.com

Prezado(a) leitor(a),

Fico feliz e agradeço por você ter escolhido ler a Apostila de Introdução ao Jamovi. Espero que este recurso seja útil para você em sua jornada de aprendizado e aplicação de análises estatísticas com o Jamovi.

É importante mencionar também que a apostila está em constante atualização. À medida que novas versões forem lançadas, novos recursos, exemplos e aprimoramentos serão adicionados. Recomendo que você visite regularmente a página do PDF no repositório da apostila para obter a versão mais atualizada da apostila. Dessa forma, você poderá se beneficiar de novos conteúdos e melhorias à medida que são disponibilizados.

A edição web e os materiais complementares estão reunidos na página da apostila no Balaio Científico. O PDF e a edição web podem receber revisões em momentos diferentes; confira a data de atualização de cada material.

Além disso, incentivo você a compartilhar e usar este material com outras pessoas interessadas em aprender sobre análise estatística com o Jamovi. Acredito no poder do conhecimento compartilhado e na colaboração para promover um aprendizado mais amplo e significativo.

Se você deseja colaborar com esse projeto, você pode acessar o repositório dessa apostila no Github. As videoaulas complementares estão disponíveis no canal do YouTube indicado ao final desta página.

Mais uma vez, agradeço sua leitura e interesse pela Apostila do Jamovi. Espero que ela seja útil para você em seus estudos e projetos. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou feedback, não hesite em entrar em contato comigo. Estou sempre buscando melhorar e fornecer recursos de alta qualidade para a comunidade.

Aproveite o material e bons estudos!

Acompanhe as videoaulas:
Balaio Científico no YouTube

Atualizado em: 25 de outubro de 2026

Licença do Documento

Prezado(a) leitor(a),

Gostaria de ressaltar que este documento está licenciado sob a licença Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0), o que significa que você tem a liberdade de usar, compartilhar e adaptar o material.

No entanto, é importante fornecer as devidas atribuições ao autor original. Essas atribuições são uma maneira de reconhecer e valorizar o trabalho que foi dedicado para criar esta apostila.

Você tem o direito de:

Compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato
Adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial.

De acordo com os termos seguintes:

Atribuição — Você deve dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.
Sem restrições adicionais - Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.

Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Sumário

1 Introdução ao Jamovi 2

1.1 O que é o jamovi? . . . 2

1.1.1 Estatística com interface gráfica . . . 2

1.1.2 Um software modular . . . 2

1.1.3 Um caminho para aprender R . . . 3

1.2 Instalação e acesso . . . 3

1.2.1 Jamovi para desktop . . . 3

1.2.2 Jamovi em nuvem . . . 5

1.3 Primeiros passos com o Jamovi . . . 5

1.4 Instalando módulos no Jamovi . . . 7

1.4.1 Biblioteca de módulos . . . 7

1.4.2 O exemplo do Rj . . . 7

1.4.3 Documentando os módulos usados . . . 7

1.5 Como estudar com os exemplos da apostila . . . 7

2 Manipulação de Dados no Jamovi 9

2.1 Introdução à Manipulação de Dados . . . 9

2.2 Interface do Jamovi . . . 11

2.3 Importação de Dados . . . 13

2.3.1 Preparação dos dados antes da importação . . . 13

2.3.2 Processo de importação no Jamovi . . . 13

2.3.3 Abrir e importar não são a mesma operação . . . 15

2.3.4 Biblioteca de dados integrada . . . 15

2.3.5 Formatos de arquivo suportados . . . 15

2.4 Inserir variável no Jamovi . . . 16

2.4.1 Quando inserir variáveis diretamente no Jamovi . . . 16

2.4.2 Adicionando uma nova variável . . . 16

2.4.3 Nomeando e configurando a variável . . . 17

2.4.4 Inserindo dados manualmente . . . 17

2.4.5 Apagando variáveis . . . 18
2.5 Tipos de Medidas de dados . . . 18
2.5.1 A importância dos tipos de medida . . . 18
2.5.2 Tipos de medida e identificadores . . . 19
2.5.3 Variáveis Nominais . . . 19
2.5.4 Variáveis Ordinais . . . 20
2.5.5 Variáveis Contínuas . . . 20
2.5.6 Como configurar o tipo de medida no Jamovi . . . 21
2.5.7 Identificando o tipo de medida correto . . . 21
2.5.8 Erros comuns na configuração de tipos de medida . . . 21
2.5.9 Impacto dos tipos de medida nas análises . . . 22
2.6 Criação de Categorias . . . 22
2.7 Inserindo descrição nas variáveis . . . 29
2.7.1 Importância das descrições de variáveis . . . 29
2.7.2 Adicionando descrições às variáveis . . . 29
2.7.3 Boas práticas para descrição de variáveis . . . 30
2.7.4 Exemplo prático . . . 30
2.7.5 Visualizando as descrições . . . 31
2.7.6 Considerações finais . . . 31
2.8 Filtro de Dados . . . 31
2.8.1 O que são filtros e por que usá-los . . . 31
2.8.2 Criando um filtro básico . . . 32
2.8.3 Sintaxe para expressões de filtro . . . 32
2.8.4 Visualizando o efeito do filtro . . . 33
2.8.5 Combinando múltiplos critérios . . . 33
2.8.6 Ativando e desativando filtros . . . 34
2.8.7 Considerações importantes . . . 34
2.9 Variáveis calculadas e valores ausentes . . . 35
2.9.1 Calculando uma mudança individual . . . 35
2.9.2 Cálculos por linha e por coluna . . . 35
2.9.3 Ausência de resposta não é zero . . . 35
2.10 Organizando as variáveis . . . 36
2.10.1 Padronização de variáveis . . . 36
2.10.2 Editando propriedades das variáveis . . . 36
2.10.3 Configurando tipos de dados . . . 37
2.10.4 Configurando casas decimais . . . 37
2.10.5 Configurando o tipo de medida . . . 37
2.10.6 Melhores práticas para organização de variáveis . . . 38

2.11 Salvar e Exportar Dados . . . 38
2.11.1 Salvando seu projeto no Jamovi . . . 38
2.11.2 Separando projeto, dados e resultados . . . 39
2.11.3 Dicas importantes para salvar e exportar . . . 39

3 Estatística Descritiva **40**
3.1 Um conjunto de dados para praticar . . . 40
3.1.1 Abrindo a análise descritiva . . . 41
3.2 Medidas de tendência central . . . 41
3.2.1 Média . . . 41
3.2.2 Mediana . . . 41
3.2.3 Moda . . . 42
3.3 Medidas de dispersão . . . 43
3.3.1 Amplitude, variância e desvio padrão . . . 43
3.3.2 Quartis e intervalo interquartil . . . 43
3.3.3 Desvio padrão e erro padrão da média . . . 44
3.4 Escolhendo tabelas e gráficos . . . 44
3.4.1 Histogramas e boxplots . . . 44
3.4.2 Frequências para variáveis categóricas . . . 44
3.5 Como relatar a análise descritiva . . . 45

4 Testes de Hipóteses **46**
4.1 Hipóteses, valor de p e decisões . . . 46
4.1.1 Formulando uma pergunta antes da análise . . . 46
4.1.2 O que um teste não permite concluir . . . 47
4.1.3 Intervalo de confiança e tamanho de efeito . . . 47
4.2 Teste t de uma amostra . . . 47
4.2.1 Executando no jamovi . . . 48
4.3 Teste de hipóteses unicaudal e bilateral . . . 48
4.4 Duas amostras independentes: Student e Welch . . . 49
4.4.1 Configurando a comparação . . . 49
4.5 Amostras pareadas: antes e depois . . . 49
4.5.1 Configurando e interpretando . . . 50
4.6 Pressupostos e alternativas . . . 50
4.7 Escolhendo a análise a partir do desenho . . . 50
4.8 Mann–Whitney e Wilcoxon na prática . . . 51
4.8.1 Dois grupos independentes . . . 51
4.8.2 Duas medidas pareadas . . . 52
4.9 Erros, poder e planejamento amostral . . . 52

4.10 Múltiplas perguntas e ajustes . . . 53
4.11 Vamos praticar: perguntas e comentários . . . 53

5 Análise de Variância (ANOVA) 55
5.1 Da pergunta ao modelo . . . 55
5.1.1 Condições que precisamos examinar . . . 56
5.2 ANOVA de um fator no jamovi . . . 56
5.2.1 Conferindo o exemplo clássico . . . 56
5.3 Comparações múltiplas . . . 57
5.4 Magnitude e relato do resultado . . . 57
5.5 Contrastes planejados e comparações posteriores . . . 58
5.6 ANOVA fatorial: duas características no mesmo modelo . . . 58
5.6.1 Configurando no jamovi . . . 59
5.6.2 Conferindo e interpretando a interação . . . 59
5.7 ANOVA de medidas repetidas . . . 60
5.7.1 Organizando fatores e células . . . 60
5.7.2 Esfericidade e graus de liberdade . . . 61
5.8 ANOVA mista: tempo e grupos . . . 61
5.9 ANCOVA: comparando grupos com uma covariável . . . 62
5.10 Kruskal–Wallis e Friedman . . . 62
5.11 Vamos praticar: perguntas e comentários . . . 63

6 Regressão Linear 64
6.1 Correlação e regressão . . . 64
6.2 O modelo de uma reta . . . 64
6.3 Ajustando a regressão no jamovi . . . 65
6.3.1 Conferindo a equação e as unidades . . . 65
6.3.2 O que o R quadrado informa . . . 66
6.4 Resíduos, pressupostos e limites . . . 66
6.5 Regressão múltipla: incluindo a nota anterior . . . 67
6.5.1 Configurando e conferindo os coeficientes . . . 67
6.5.2 R quadrado ajustado e comparação de modelos . . . 68
6.6 Preditores categóricos e categorias de referência . . . 68
6.6.1 Quando acrescentar uma interação . . . 69
6.7 Colinearidade, influência e análise de sensibilidade . . . 69
6.8 Estimar uma média e prever uma pessoa . . . 70
6.9 Como relatar a regressão . . . 70
6.10 Vamos praticar: perguntas e comentários . . . 71

7 Análise de Dados Categóricos 72
7.1 Tabela de contingência e denominadores . . . 72
7.2 Configurando a tabela no jamovi . . . 73
7.3 Teste qui-quadrado de independência . . . 73
7.3.1 Quando examinar Fisher e a estrutura do estudo . . . 74
7.4 Magnitude da associação . . . 74
7.4.1 Razão de chances não é razão de probabilidades . . . 74
7.5 Como relatar uma associação . . . 75
7.6 Uma proporção: teste binomial e intervalo . . . 75
7.6.1 Executando no jamovi . . . 75
7.7 Aderência: uma variável com várias categorias . . . 76
7.8 Respostas pareadas: o teste de McNemar . . . 77
7.8.1 Configurando a tabela pareada . . . 77
7.8.2 Mudança em pontos percentuais . . . 78
7.9 Medidas de associação e sua incerteza . . . 78
7.10 Regressão logística binária . . . 78
7.10.1 Configurando evento e referência . . . 79
7.10.2 Coeficientes, chances e probabilidades . . . 79
7.10.3 Ajuste, classificação e limites . . . 80
7.11 Vamos praticar: perguntas e comentários . . . 81

Capítulo 1

Introdução ao Jamovi

1.1 O que é o jamovi?

O jamovi é um software estatístico livre e de código aberto que combina uma planilha de dados com uma interface gráfica para análises. Você pode explorar distribuições, produzir tabelas e realizar testes sem começar pela programação. O programa também se integra à linguagem R, permitindo avançar para análises por código quando isso fizer sentido para seu trabalho (Jamovi, 2022; The jamovi project, 2026c).

Nesta apostila, vamos aprender a organizar os dados, escolher procedimentos compatíveis com a pergunta e interpretar os resultados. O objetivo é entender as decisões da análise. A interface ajuda a executar os cálculos, mas não escolhe, sozinha, o desenho do estudo ou a interpretação adequada.

1.1.1 Estatística com interface gráfica

Na tela principal, os dados aparecem à esquerda e os resultados à direita. Ao alterar uma variável ou uma opção de análise, os resultados correspondentes são atualizados. Isso facilita comparar escolhas e acompanhar o que foi calculado (The jamovi project, 2026h).

Podemos começar pelas funções disponíveis nos menus e, gradualmente, aprender a ler tabelas, gráficos e equações. Mesmo sem escrever código, precisamos conferir o tipo de cada variável, as observações incluídas e as opções selecionadas. Um resultado bem apresentado ainda pode responder à pergunta errada se a configuração estiver incorreta.

1.1.2 Um software modular

As análises básicas estão disponíveis na instalação do jamovi; módulos adicionais ampliam suas possibilidades. Um módulo pode oferecer procedimentos especializados ou outras formas de trabalhar com dados. A escolha deve acompanhar a pergunta e a documentação do procedimento, e não apenas a quantidade de opções disponíveis.

1.1.3 Um caminho para aprender R

O **Modo de sintaxe (Syntax mode)**, acessível no menu de opções da aplicação, mostra o código R equivalente às análises compatíveis. Já o módulo **Rj** permite escrever e executar código dentro do jamovi. Para as análises básicas, você não precisa instalar R separadamente; o ambiente usado pelo jamovi já inclui os componentes necessários (The jamovi project, 2026c).

Dica de Conteúdo

Para acompanhar os primeiros conceitos com uma demonstração em vídeo, confira a aula de introdução ao jamovi.

Introdução ao Jamovi

1.2 Instalação e acesso

Você pode usar a versão para computador ou acessar a opção em nuvem apresentada no site oficial. Para baixar o programa, comece por `https://www.jamovi.org`. Confira o sistema operacional, a arquitetura e as orientações de instalação indicadas na página de download.

1.2.1 Jamovi para desktop

A instalação local permite trabalhar com arquivos do seu computador. Selecione o instalador adequado e siga as instruções correspondentes ao seu sistema operacional. Os passos não são idênticos em Windows, macOS e Linux.

As figuras 1.1 e 1.2 registram telas de versões anteriores do site e ajudam a reconhecer a lógica de escolha do instalador. A organização visual da página atual pode ser diferente.

Figura 1.1: Exemplo da área de download para desktop em uma versão anterior do site





Figura 1.2: Exemplo da seleção de um instalador para o sistema operacional




Depois de instalar, abra o programa e registre sua versão nas anotações do projeto. Ao compartilhar um arquivo, esse registro ajuda a explicar diferenças entre telas, opções ou resultados de versões distintas.

1.2.2 Jamovi em nuvem

O acesso em nuvem permite usar o programa pelo navegador, sem instalar a versão desktop naquele computador. Verifique no site oficial as condições de acesso, os recursos e os limites vigentes. Evite decidir a partir de uma captura antiga de preços ou planos, pois essas condições podem mudar.

Escolha a forma de acesso considerando a conexão disponível, as regras do seu projeto e onde os arquivos serão armazenados. Em qualquer ambiente, salve uma cópia do trabalho e confira se consegue reabri-la antes de encerrar a sessão.

Figura 1.3: Exemplo de acesso à opção em nuvem em uma versão anterior do site




1.3 Primeiros passos com o Jamovi

Ao abrir o programa, você encontrará a planilha e o painel de resultados, como ilustra a figura 1.4. Cada coluna contém uma variável; cada linha costuma representar uma unidade observada, como uma pessoa. Essa interpretação deve ser confirmada para o banco que você está

usando: alguns arquivos contêm contagens agregadas ou várias linhas por pessoa.

Figura 1.4: Planilha de dados e painel de resultados do jamovi



Você pode digitar um banco pequeno ou abrir um arquivo existente. No menu de arquivos, no canto superior esquerdo, escolha **Abrir (Open)** e depois **Este PC (This PC)** ou **Biblioteca de dados (Data library)**. A biblioteca traz exemplos para praticar (The jamovi project, 2026h).

Para acompanhar os capítulos seguintes, o repositório desta apostila inclui uma pasta `dados`, com arquivos CSV fictícios e um dicionário das variáveis. Comece por `exemplo_notas.csv`. Após importar, confira os nomes das colunas, os tipos de medida, o número de linhas e a presença de valores ausentes.

Dica de Conteúdo

Se quiser acompanhar a interface em uma demonstração, veja a videoaula de primeiros passos. Os nomes traduzidos podem variar; ao longo da apostila, indicaremos também nomes em inglês para facilitar a localização.

▶ Primeiros Passos

1.4 Instalando módulos no Jamovi

1.4.1 Biblioteca de módulos

Para instalar um módulo, clique no símbolo + no canto superior direito, escolha a **Biblioteca jamovi (jamovi library)** e abra a lista de módulos disponíveis. Localize o módulo desejado e selecione **Instalar (Install)**. Esse é o fluxo apresentado na documentação oficial (The jamovi project, 2026j).

Ao procurar uma análise, diferencie os grupos de menus, como Exploração, Testes t, ANOVA, Regressão e Frequências, de módulos adicionais. Esses nomes de menus não significam que você precise instalar um módulo separado para cada análise básica.

1.4.2 O exemplo do Rj

O Rj é uma opção quando você deseja executar código R no mesmo ambiente dos dados. Depois de instalar o módulo, abra o editor Rj pelo grupo R na aba de análises. O banco aberto fica acessível ao código como `data`. O Rj pode usar o R incluído no jamovi; o uso de uma instalação externa exige configuração e pacotes compatíveis (The jamovi project, 2026c).

Não é necessário começar pelo Rj para acompanhar as análises desta apostila. Ele pode ser um próximo passo depois que você compreender o procedimento pela interface.

1.4.3 Documentando os módulos usados

Antes de empregar uma análise adicional, leia a documentação do módulo e confira sua compatibilidade com a versão instalada. Registre o nome e a versão do módulo no projeto. Ao compartilhar resultados, preserve também os dados, as opções e a justificativa das decisões para que outra pessoa possa compreender a análise.

Dica de Conteúdo

Esta videoaula complementa a leitura sobre instalação e gerenciamento de módulos. Use a documentação oficial para conferir os nomes e as opções da versão que você está usando.
Como Instalar Módulos no Jamovi

1.5 Como estudar com os exemplos da apostila

Vamos trabalhar em uma sequência que pode ser retomada conforme sua experiência. Os CSVs estão disponíveis na pasta de dados do repositório, acompanhados de um dicionário e de resultados de conferência. Todos são fictícios e foram construídos para ensino; eles não documentam

pesquisas com participantes reais.

1. Comece com `exemplo_notas.csv`: importe os dados, confira tipos e filtros, descreva as variáveis e identifique os pares antes/depois. Use o mesmo banco para acompanhar testes t, ANOVA de um fator e regressão linear.

2. No capítulo 4, formule a hipótese e escreva qual diferença está sendo estimada antes de ler o valor de p. Compare sua interpretação com os comentários dos exercícios.

3. No capítulo 5, use `exemplo_fatorial.csv` para entender interação e `exemplo_medidas_repetidas.csv` para distinguir pessoas e ocasiões.

4. No capítulo 6, compare modelos simples e múltiplos e diferencie o intervalo da média do intervalo de uma nova observação individual.

5. No capítulo 7, observe quais arquivos contêm pessoas e quais contêm contagens. Passe de proporções e tabelas para McNemar e regressão logística, sempre identificando o evento e as referências.

Para cada atividade, guarde o arquivo `.omv` com um nome que identifique o exemplo e registre a versão do jamovi. Escreva um pequeno parágrafo com a pergunta, as observações incluídas, as opções e a interpretação. Se o resultado numérico diferir do indicado, confira primeiro filtros, ausentes, tipos de variáveis, ordem das categorias e correções selecionadas.

Os comentários ao final dos capítulos ajudam a conferir o raciocínio; tente responder antes de consultá-los. Ao levar o procedimento para sua pesquisa, volte ao desenho do estudo: reproduzir um cálculo é uma etapa diferente de justificar sua aplicação a novos dados.

Capítulo 2

Manipulação de Dados no Jamovi

O foco deste capítulo é a manipulação de dados, uma habilidade essencial para qualquer pessoa que esteja interessada em análise de dados. Vamos explorar as diversas funções e recursos do Jamovi para tratar, organizar e manipular conjuntos de dados. Se você já se perguntou como criar e gerenciar categorias, transformar dados ou manipular variáveis no Jamovi, este capítulo irá te guiar através desses processos passo a passo.

No capítulo anterior você deu os primeiros passos e apresentamos a você a interface do Jamovi para manipulação de dados. Nesse capítulo discutiremos o fluxo de trabalho ideal para o tratamento de um conjunto de dados. O objetivo é garantir que você tenha uma compreensão sólida das ferramentas disponíveis e de como usá-las eficientemente.

Em seguida, abordaremos como criar novas categorias a partir de variáveis existentes. Isso pode ser útil em uma variedade de contextos, como quando você deseja agrupar respostas de pesquisas ou classificar dados em grupos específicos. Também ensinaremos a transformar variáveis, permitindo que você mude o formato dos seus dados de uma maneira que melhor atenda às suas necessidades analíticas.

Finalmente, traremos exemplos práticos para aplicar o conhecimento adquirido. O intuito é promover a familiarização com as ferramentas do software e reforçar a compreensão das funcionalidades abordadas.

Lembre-se, a manipulação eficaz dos dados é a base de qualquer análise de qualidade. Por isso, este capítulo desempenha um papel fundamental no seu aprendizado sobre o uso do Jamovi. Esperamos que ao final desta etapa, você se sinta confiante para manipular conjuntos de dados e prepará-los para a análise de uma maneira eficiente e eficaz.

2.1 Introdução à Manipulação de Dados

Nesta seção, apresentaremos o papel crucial da manipulação de dados na análise de dados. Exploraremos seu propósito, benefícios e relevância no contexto do software Jamovi.

Deixe-me contar algo importante antes de começarmos a falar sobre análises estatísticas com-

plexas. Sabe aquele momento em que você recebe um conjunto de dados e se pergunta ”por onde começo”? Pois é, antes de criar aqueles gráficos impressionantes ou realizar testes estatísticos sofisticados, existe uma etapa fundamental que muitas vezes passa despercebida: a manipulação de dados.

Quando eu comecei a trabalhar com análise de dados, confesso que subestimava essa etapa. Achava que era apenas uma questão de abrir a planilha e começar a analisar. Mas rapidamente aprendi que dados do mundo real raramente vêm organizados e prontos para uso. Eles chegam com erros de digitação, valores faltantes, formatos inconsistentes e tantos outros problemas que, se não tratados adequadamente, podem comprometer toda a análise posterior.

A preparação dos dados começa pela conferência dos registros e de seu significado. Ela envolve desde a limpeza básica (corrigir erros, eliminar duplicatas), passando pela transformação de variáveis (converter formatos, criar novas variáveis a partir das existentes), até filtragem, agregação e reestruturação dos dados. Parece trabalhoso? Sim, pode ser. Mas acredite, este investimento inicial economiza horas de frustração mais tarde.

O Jamovi, felizmente, nos ajuda bastante nessa jornada. Ele oferece várias ferramentas que facilitam a manipulação básica e intermediária dos dados. Você pode criar e transformar variáveis, recodificar valores, filtrar observações, tratar dados ausentes e muito mais, tudo através de uma interface amigável que não exige conhecimentos avançados de programação.

No entanto, é importante que você saiba que, como qualquer software, o Jamovi tem suas limitações. Quando trabalhamos com conjuntos de dados muito grandes ou precisamos fazer operações de reestruturação complexas, podemos enfrentar alguns desafios. O desempenho depende do volume de dados, das análises e dos recursos do computador. Operações mais complexas de reestruturação podem exigir ferramentas complementares.

Por isso, em muitos dos meus projetos, acabo utilizando uma abordagem híbrida. Uso o Excel ou Google Sheets para algumas limpezas iniciais e organização básica, principalmente quando preciso fazer verificações visuais rápidas ou ajustes em massa. Para manipulações mais complexas, recorro ocasionalmente ao R ou Python, especialmente em projetos maiores. Só então importo os dados para o Jamovi para a análise estatística final.

Não se preocupe se você não tem experiência com essas outras ferramentas. O Jamovi é perfeitamente capaz de lidar com a maioria das situações que você encontrará, especialmente em contextos acadêmicos e pesquisas de pequeno a médio porte. E neste capítulo, vou compartilhar com você algumas dicas e truques que aprendi ao longo dos anos para contornar as limitações do software.

O mais importante é entender que a manipulação de dados não é apenas uma etapa técnica, mas uma parte fundamental do processo analítico que influencia diretamente a qualidade dos seus resultados. Quanto mais limpos e bem organizados estiverem seus dados, mais confiáveis serão suas análises e conclusões.

Nas próximas páginas, vamos explorar juntos como realizar essas tarefas no Jamovi, com exem-

plos práticos e orientações passo a passo. Meu objetivo é que, ao final deste capítulo, você se sinta confiante para organizar os dados e documentar as decisões necessárias para uma análise reproduzível.

2.2 Interface do Jamovi

Antes de mergulharmos nas análises estatísticas, é fundamental conhecermos bem a interface do Jamovi. Uma compreensão clara da organização do programa nos permitirá navegar com eficiência e aproveitar todo seu potencial.


Ao abrir o Jamovi pela primeira vez, você se deparará com uma tela dividida em duas áreas principais :

- **Área de Dados (esquerda):** Nesta região ficam exibidas todas as variáveis do seu conjunto de dados, similar a uma planilha. Aqui você visualizará, criará e modificará suas variáveis.
- **Área de Resultados (direita):** É a seção onde serão exibidos todos os outputs das análises, como tabelas, gráficos e estatísticas. Esta área, inicialmente identificada pelo logotipo do Jamovi sobre fundo branco, será preenchida conforme você executa análises.

Na parte superior da interface, encontramos a barra de ferramentas principal com quatro menus essenciais:

- **Menu Arquivo:** Localizado no extremo superior esquerdo, permite criar um novo banco de dados, abrir arquivos existentes, importar dados de outros formatos, salvar seu trabalho e exportar resultados. Logo abaixo deste menu, você encontrará um histórico dos arquivos recentemente abertos, facilitando o acesso rápido a projetos em andamento.
- **Menu Variáveis:** Oferece opções para criar novas variáveis, adicionar descrições (conhecidas como "labels" em outros softwares estatísticos), transformar variáveis existentes e gerenciar seus metadados (Figura 2.1).
- **Menu Dados:** Concentra as funcionalidades relacionadas à manipulação do conjunto de dados como um todo, permitindo transformações, cálculos, adição ou remoção de casos, entre outras operações.
- **Menu Análises:** Possivelmente o mais utilizado, contém todas as ferramentas estatísticas disponíveis no programa, desde análises descritivas básicas (frequências, medidas de tendência central) até testes mais avançados como regressão, ANOVA e testes não-paramétricos.

Figura 2.1: Visão geral da interface do Jamovi, mostrando as áreas de dados e resultados



Um diferencial interessante do Jamovi é seu **Editor de Resultados**, acessível através do menu "Editar". Esta funcionalidade transforma a área de resultados em um documento editável, semelhante a um relatório técnico. Você pode adicionar textos explicativos, títulos formatados, links e até fórmulas matemáticas entre suas análises. Por exemplo, é possível inserir a famosa equação $E = mc^2$ usando a função de fórmulas, criar cabeçalhos para seções do seu relatório, ou adicionar textos em itálico para destacar conceitos importantes.

Esta capacidade de documentação integrada elimina a necessidade de exportar resultados para outro software antes de elaborar seu relatório final, tornando seu fluxo de trabalho mais eficiente.

O design do Jamovi prioriza a simplicidade sem sacrificar a funcionalidade. Embora a interface possa parecer minimalista à primeira vista, ela contém todas as ferramentas necessárias para análises estatísticas robustas. Como veremos ao longo desta apostila, o Jamovi consegue ser simultaneamente acessível para iniciantes e poderoso para usuários avançados.

À medida que nos aprofundarmos em cada funcionalidade nas próximas seções, recomendo que você explore a interface por conta própria. Familiarizar-se com a localização das ferramentas agora facilitará significativamente seu trabalho quando começarmos a realizar análises estatísticas propriamente ditas.

Dica de Conteúdo

Preparei um vídeo apresentando a Interface do Jamovi, que vai te ajudar a dar os primeiros passos nessa incrível ferramenta estatística. Depois de ler a seção da apostila, não deixe de conferir essa videoaula, tenho certeza de que você vai adorar e aprender muito. Clique no link abaixo e aproveite!

Jamovi - Interface do Jamovi

2.3 Importação de Dados

A importação de dados é um dos primeiros passos fundamentais para começar a trabalhar com análises estatísticas no Jamovi. O software oferece uma interface simples e intuitiva para este processo, permitindo importar dados de diversas fontes e formatos.

2.3.1 Preparação dos dados antes da importação

Antes de iniciar a importação propriamente dita, é fundamental realizar uma preparação prévia dos seus dados. Esta etapa, muitas vezes negligenciada, pode poupar tempo e evitar problemas durante as análises subsequentes:

- **Limpe seus dados em uma planilha**: Abra seus dados em softwares como Excel ou Google Sheets antes de importá-los para o Jamovi.
- **Remova células mescladas**: Arquivos com células mescladas frequentemente causam problemas durante a importação.
- **Trate valores ausentes**: Identifique e padronize como os dados ausentes estão representados.
- **Verifique a consistência**: Certifique-se de que as variáveis estão no formato adequado (numérico, texto, data).
- **Salve em formato compatível**: Preferencialmente, salve os dados em formato CSV para garantir melhor compatibilidade.


Esta preparação prévia é especialmente importante quando trabalhamos com dados de fontes oficiais, como IBGE, que frequentemente vêm com formatações específicas que podem dificultar a importação direta.

2.3.2 Processo de importação no Jamovi

O processo de importação de dados no Jamovi é bastante simples e direto:

1. Abra o Jamovi e clique no botão **Abrir** localizado no canto superior esquerdo da interface.
2. Na janela que se abre, você verá duas opções principais:
    - **Este PC**: Para importar arquivos salvos no seu computador.
    - **Biblioteca de dados**: Para acessar conjuntos de dados já incluídos no Jamovi.
3. Para importar dados externos, selecione **Este PC**.
4. Navegue até a pasta onde seu arquivo está armazenado, ou use o botão **Procurar** para localizar o arquivo.
5. Selecione o arquivo desejado e clique em **Abrir**.
6. O Jamovi importará os dados automaticamente, realizando configurações iniciais baseadas nos tipos de dados detectados.
7. Verifique se a importação ocorreu corretamente, confirmando se todas as variáveis e observações estão presentes e no formato adequado.

Figura 2.2: Importando dados no Jamovi através do menu Arquivo



2.3.3 Abrir e importar não são a mesma operação

Neste tutorial, usamos **Abrir** para começar um trabalho com um arquivo. A opção **Importar**, quando usada sobre um projeto já configurado, atualiza os dados e reaplica as configurações e análises existentes. A documentação informa que essa operação substitui as linhas e relaciona as colunas pelos nomes. Trabalhe em uma cópia se precisar preservar a versão anterior e confira as correspondências antes de interpretar a atualização (The jamovi project, 2026x).

2.3.4 Biblioteca de dados integrada

O Jamovi inclui uma biblioteca de conjuntos de dados pré-carregados que podem ser úteis para prática e ensino:

- Na tela de abertura de arquivos, selecione **Biblioteca de dados**.
- Você encontrará diversos conjuntos clássicos, como o dataset Iris de Anderson, frequentemente usado em cursos introdutórios de estatística.
- Estes dados são particularmente úteis para professores e estudantes que desejam praticar técnicas estatísticas sem precisar coletar ou importar dados externos.

2.3.5 Formatos de arquivo suportados

O Jamovi suporta diversos formatos de arquivo, incluindo:

- CSV (Comma-Separated Values)
- Excel (.xlsx, .xls)
- Arquivos de texto (.txt)
- Arquivos SPSS (.sav)
- Arquivos SAS (.sas7bdat)
- Arquivos Stata (.dta)
- Arquivos R (.rdata, .rds)
- Arquivos do próprio Jamovi (.omv)

Entre esses formatos, o CSV é geralmente recomendado por sua simplicidade e compatibilidade universal, minimizando problemas de importação.

Dica de Conteúdo

Para ver este processo em ação, confira meu tutorial em vídeo sobre importação de dados no Jamovi. O vídeo demonstra passo a passo como importar diferentes tipos de arquivos e resolver problemas comuns de importação.

Importação de Dados no Jamovi

2.4 Inserir variável no Jamovi

Embora o Jamovi seja principalmente usado para analisar dados já existentes, às vezes precisamos adicionar novas variáveis diretamente no software. Nesta seção, aprenderemos como inserir novas variáveis no Jamovi e adicionar dados manualmente.

2.4.1 Quando inserir variáveis diretamente no Jamovi

Antes de aprendermos o processo de inserção de variáveis, é importante considerar quando é apropriado fazê-lo:

- **Pequenas adições**: Quando precisamos adicionar uma ou poucas variáveis a um conjunto de dados já importado.
- **Variáveis calculadas**: Quando precisamos criar uma variável que é resultado de cálculos baseados em outras variáveis.
- **Categorização**: Quando desejamos criar uma variável categórica a partir de dados existentes.
- **Protótipos**: Para criar pequenos conjuntos de dados para testes ou demonstrações.

No entanto, é importante ressaltar que para conjuntos de dados grandes ou completos, é geralmente mais eficiente preparar os dados em planilhas como Excel ou Google Sheets antes de importá-los para o Jamovi.

2.4.2 Adicionando uma nova variável

O processo para adicionar uma nova variável no Jamovi é bastante simples:

1. Na aba **Dados (Data)**, acesse as ferramentas de variáveis.
2. Selecione a opção **Adicionar**.
3. Na janela que aparece, selecione **Acrescentar** para adicionar uma nova coluna ao final da tabela.

4. Uma nova variável será adicionada com um nome padrão (geralmente ”var”).

Alternativamente, você pode:

1. Clicar com o botão direito do mouse em qualquer cabeçalho de variável.
2. Selecionar a opção **Adicionar Variável** no menu de contexto.

2.4.3 Nomeando e configurando a variável

Após adicionar a variável, é importante configurá-la adequadamente:

1. Clique no nome padrão da variável para editá-lo.
2. Atribua um nome seguindo as boas práticas de nomenclatura:
    - Use nomes curtos e descritivos.
    - Evite espaços (use underscore “_” se necessário);
    - Não use acentos ou caracteres especiais.
    - Prefira letras minúsculas.
    - Não inicie com números.
    - Mantenha um padrão de nomenclatura.
3. Adicione uma descrição à variável no campo apropriado.
4. Configure o tipo de medida (nominal, ordinal ou contínua) conforme necessário.

Estas boas práticas de nomenclatura são particularmente importantes se você planeja exportar seus dados para outros softwares como R ou Python no futuro, pois evitam problemas de compatibilidade.

2.4.4 Inserindo dados manualmente

Para inserir dados na nova variável:

1. Clique duas vezes na célula onde deseja inserir o dado.
2. Digite o valor desejado.
3. Pressione Enter ou clique em outra célula para confirmar.
4. Continue preenchendo as demais células conforme necessário.

2.4.5 Apagando variáveis

Se precisar remover uma variável, existem duas maneiras de fazê-lo:

1. **Método 1:**
    - Clique no menu **Variáveis**.
    - Selecione a variável que deseja apagar.
    - Clique no botão **Apagar**.
2. **Método 2:**
    - Clique com o botão direito no cabeçalho da variável.
    - Selecione a opção **Apagar Variável**.

Para apagar múltiplas variáveis de uma vez:

1. Mantenha a tecla Shift pressionada e clique nos cabeçalhos das variáveis que deseja selecionar.
2. Clique com o botão direito em uma das variáveis selecionadas.
3. Escolha a opção **Apagar Variável**.

Dica de Conteúdo

Para ver na prática como inserir e gerenciar variáveis no Jamovi, confira meu tutorial em vídeo. Nele, mostro passo a passo como adicionar, configurar e remover variáveis, além de dicas úteis para uma melhor organização dos seus dados.
Como Inserir Variáveis no Jamovi

2.5 Tipos de Medidas de dados

A correta identificação e configuração dos tipos de medidas das variáveis é um aspecto fundamental para garantir a qualidade e precisão das análises estatísticas. Nesta seção, aprenderemos sobre os diferentes tipos de medidas disponíveis no Jamovi e como configurá-los adequadamente.

2.5.1 A importância dos tipos de medida

Antes de analisarmos dados, é essencial compreender que diferentes variáveis representam diferentes tipos de informação. O tipo de medida (ou nível de mensuração) determina:

- Quais análises estatísticas são apropriadas para cada variável

- Como os dados podem ser matematicamente manipulados
- Como os resultados devem ser interpretados

Configurar incorretamente o tipo de medida pode levar a análises inadequadas e conclusões equivocadas. Por isso, dedicamos esta seção especial para compreender a fundo este conceito.

2.5.2 Tipos de medida e identificadores

Para as análises desta apostila, vamos distinguir nominal, ordinal e contínua. O jamovi também oferece o tipo **ID**, destinado a identificadores. Tipo de medida não é a mesma coisa que tipo de armazenamento: uma coluna de números inteiros pode conter categorias ou identificadores (The jamovi project, 2026w).

1. **Nominal**
2. **Ordinal**
3. **Contínua**

Vamos explorar cada um deles em detalhes:

2.5.3 Variáveis Nominais

- **Definição**: São variáveis categóricas onde os valores representam grupos distintos, sem ordem natural entre eles.
- **Características**:
  - Classificam dados em categorias mutuamente exclusivas
  - Não possuem ordem intrínseca (nenhuma categoria é ”maior”ou ”melhor”que outra)
  - Podem ser representadas por números, mas estes funcionam apenas como rótulos
- **Exemplos**:
  - Sexo (masculino/feminino)
  - Cor de cabelo (preto, castanho, loiro, ruivo)
  - Porto de embarque (Cherbourg, Queenstown, Southampton)
  - Sobrevivência ao naufrágio (sim/não)
- **Operações permitidas**: Contagem de frequências, verificação de igualdade ($=$, $\neq$)
- **No Jamovi**: Configure o tipo de medida como nominal, mesmo que as categorias estejam codificadas por números.

2.5.4 Variáveis Ordinais

- **Definição**: São variáveis categóricas com uma ordem natural entre as categorias.
- **Características**:
  - Possuem uma ordem intrínseca (um valor é ”maior”ou ”menor”que outro)
  - As distâncias entre categorias não são necessariamente iguais ou significativas
  - Não permitem operações aritméticas entre seus valores
- **Exemplos**:
  - Nível de escolaridade (fundamental, médio, superior)
  - Classe social (baixa, média, alta)
  - Grau de satisfação (insatisfeito, neutro, satisfeito)
  - Escala Likert (discordo totalmente, discordo, neutro, concordo, concordo totalmente)
- **Operações permitidas**: Todas as da nominal, mais comparações de ordem ($<$, $>$, $\leq$, $\geq$)

2.5.5 Variáveis Contínuas

- **Definição**: São variáveis numéricas que representam uma escala com valores que têm significado quantitativo.
- **Características**:
  - Permitem operações aritméticas entre seus valores
  - Possuem unidades de medida bem definidas
  - As distâncias entre valores são uniformes e significativas
  - Podem representar escalas de intervalo ou de razão. Proporções só têm interpretação direta quando a escala possui zero significativo; 40 graus Celsius não é o dobro da temperatura de 20 graus Celsius.
- **Exemplos**:
  - Idade em anos
  - Preço de bilhete em libras
  - Altura em centímetros
  - Peso em quilogramas
- **Operações permitidas**: Todas as anteriores, mais operações aritméticas ($+$, $-$, $\times$, $\div$)

2.5.6 Como configurar o tipo de medida no Jamovi

Para verificar e alterar o tipo de medida de uma variável no Jamovi:

1. Clique duas vezes no cabeçalho da variável que deseja configurar, ou:
2. Na aba **Dados**, selecione a variável e abra **Configurar (Setup)**
3. Na janela que se abre, você verá opções para definir o tipo de medida (nominal, ordinal ou contínua)
4. Selecione a opção apropriada para aquela variável
5. Confirme a alteração clicando fora da área de edição

2.5.7 Identificando o tipo de medida correto

Para determinar qual o tipo de medida apropriado para cada variável, faça as seguintes perguntas:

1. A variável representa apenas categorias distintas sem ordem natural? **Se sim, é nominal**.
2. A variável representa categorias com uma ordem natural, mas sem relação matemática definida entre elas? **Se sim, é ordinal**.
3. A variável é quantitativa e será tratada em uma escala numérica de intervalo ou de razão? **Nesse caso, use contínua no jamovi**. A natureza discreta ou contínua da variável continua sendo uma distinção estatística relevante.

2.5.8 Erros comuns na configuração de tipos de medida

- **Tratar IDs como contínuas**: Números de identificação, mesmo sendo numéricos, não são medidas quantitativas. Use o tipo ID quando sua função for apenas identificar registros.
- **Confundir contagem com ordinal**: Contagens, como número de filhos, são quantitativas discretas. No jamovi, podem ser configuradas como contínuas para as análises numéricas pertinentes; isso não as torna variáveis contínuas em sentido estatístico.
- **Ignorar a ordem em variáveis ordinais**: Classificar como nominal uma variável que possui ordem natural (ex: nível de educação).
- **Interpretar códigos numéricos literalmente**: Um código numérico (ex: 1=masculino, 2=feminino) não torna uma variável contínua ou ordinal se os números são apenas rótulos.

2.5.9 Impacto dos tipos de medida nas análises

A configuração correta dos tipos de medida afeta diretamente:

- **Quais testes estatísticos estarão disponíveis**: Por exemplo, testes paramétricos geralmente requerem variáveis contínuas.
- **Como os dados serão visualizados**: O tipo de gráfico sugerido pelo Jamovi depende do tipo de medida.
- **Que resumos estatísticos serão calculados**: Médias e desvios padrão são apropriados para variáveis contínuas, mas não para nominais.
- **A precisão dos resultados**: Análises com tipos de medida incorretos podem levar a conclusões errôneas.

Dica de Conteúdo

Para aprofundar sua compreensão sobre os tipos de medida no Jamovi, confira meu vídeo tutorial detalhado. Nele, demonstro como identificar e configurar corretamente cada tipo de medida, com exemplos práticos usando conjuntos de dados reais.
Tipos de Medidas de Dados no Jamovi

2.6 Criação de Categorias

Nessa seção, discutiremos como criar e gerenciar categorias no Jamovi. Isso é particularmente útil ao lidar com variáveis categóricas e dados de pesquisa.

Para ilustrar como isso é feito, usaremos o Dataset de População - IBGE como exemplo. Este dataset contém dados sobre a população dos municípios brasileiros, com informações coletadas nos censos de 2010 e 2022, bem como projeções populacionais realizadas pelo IBGE. Os dados de população são especialmente adequados para a criação de categorias, já que podem ser agrupados de várias maneiras.

Neste tutorial, iremos focar em como usar esse dataset para criar categorias populacionais que representam cidades grandes, médias e pequenas. Este é um exemplo comum de como os dados populacionais são categorizados para análises demográficas, urbanísticas ou sociais.

Para começar, precisamos definir quais são os critérios para uma cidade ser considerada grande, média ou pequena. Essa definição pode variar dependendo do contexto, mas para os fins deste tutorial, iremos definir as categorias da seguinte forma: cidades pequenas são aquelas com população de até 20.000 habitantes, cidades médias possuem mais de 20.000 e até 100.000 habitantes, e cidades grandes são aquelas com mais de 100.000 habitantes.[1]

[1] Por favor, note que essa classificação é puramente ilustrativa e serve apenas para o propósito deste

Após a importação dos dados, o primeiro passo para criar categorias no Jamovi é utilizar a opção ”Transformar Variáveis”. Existem duas maneiras de acessar essa funcionalidade.


A primeira maneira é através do menu de dados. Clique no menu ”Dados”na parte superior da interface do Jamovi. Em seguida, selecione a opção ”Transformar”. Neste ponto, você pode selecionar a variável que deseja transformar em categorias.

A segunda opção, que é um pouco mais direta, envolve clicar com o botão direito do mouse no cabeçalho da variável que você deseja transformar. No menu que aparecerá, selecione a opção ”Transformar”.

Essas ações são ilustradas na Figura 2.3. Essa figura indica onde você precisa clicar para acessar a opção de transformação de variáveis.

Por favor, note que a escolha do método para acessar a opção de transformação de variáveis depende da sua preferência. Ambos os métodos levam ao mesmo resultado, então você pode escolher o que achar mais conveniente.

Figura 2.3: Selecionando a Opção Transformar no Jamovi



No exemplo que vamos tratar neste tutorial, estaremos utilizando a variável *pop_ibge_2022*. Esta variável refere-se à população dos municípios brasileiros conforme estimado no censo do IBGE de 2022. Esta variável contínua será transformada em uma variável categórica que repre-

tutorial. Essa divisão de categorias não possui uma base científica rigorosa e pode variar consideravelmente dependendo do contexto específico. É importante ressaltar que, em sua própria análise, você está livre para definir suas próprias categorias com base nos critérios que considerar mais relevantes para o seu estudo.


senta cidades grandes, médias e pequenas, de acordo com os critérios de classificação que definimos anteriormente.

Agora, precisamos configurar a nova variável categórica que será criada. Nesta etapa, você deverá escolher um nome para a nova variável. No nosso exemplo, chamaremos essa variável de *cat_pop_2022*, mas sinta-se livre para escolher o nome que preferir.

Além disso, é uma boa prática incluir uma descrição para a variável, que explique brevemente o que ela representa. No nosso caso, a descrição será "Categoria do tamanho das cidades". Mais uma vez, sinta-se à vontade para criar uma descrição que se adeque ao seu contexto.

É importante confirmar que a variável alvo, neste caso *pop_ibge_2022*, foi corretamente selecionada, como é mostrado na Figura 2.4. Essa verificação ajuda a evitar erros na transformação dos dados.


Figura 2.4: Configurando a nova variável categoórica



Conforme pode ser observado na Figura 2.5, a nova variável foi criada e agora precisamos configurar a transformação que será aplicada. Para isso, basta clicar no botão para adicionar uma nova transformação.

É importante salientar que estamos considerando, para fins deste tutorial, que você nunca realizou uma transformação desse tipo antes. Portanto, se este for o seu caso, não se preocupe, pois todas as etapas serão explicadas detalhadamente para auxiliá-lo(a) neste processo.

Figura 2.5: Nova variável categórica criada




Neste ponto, você deverá especificar um nome para a configuração da transformação. Esta etapa é similar à definição de uma função em programação - o Jamovi irá armazenar esta configuração que poderá ser usada posteriormente.

A Figura 2.6 ilustra esta etapa. O primeiro campo é onde você insere o nome da transformação. Em seguida, você tem a opção de adicionar uma descrição. Embora isso seja opcional, sempre aconselho a preencher este campo para ajudar a lembrar o que a transformação faz, especialmente se você planeja compartilhar seu trabalho com outras pessoas ou se estiver trabalhando em um projeto de longo prazo.

Finalmente, o passo 3 é onde você seleciona a opção ”Adicionar condição de recodificação”. Esta é a etapa onde você irá definir as múltiplas condições que irão criar a sua variável categórica.

Figura 2.6: Configura as categorias para criação das categorias




Chegamos agora à fase em que iremos definir as condições para a criação da nossa variável categórica no Jamovi. Para fazer isso, precisaremos escrever expressões lógicas, um recurso muito comum em programação.

As regras são avaliadas pelo editor de transformações do próprio jamovi. Não é necessário escrever um programa em R para realizar essa recodificação: selecione as condições e os resultados desejados no painel.

Se precisar de ajuda para escrever uma expressão, consulte as funções disponíveis no editor e a documentação oficial. Mantenha uma descrição da regra e confira casos próximos aos limites de cada categoria (The jamovi project, 2026m).

Veja na Figura 2.7, o local em que você deve selecionar as condições para criarmos as categorias de cidades: pequenas, médias e grandes. Clique na seção de operadores e selecione ou escreva conforme eu escrevi na tabela 2.8

Figura 2.7: Seleciona a caixa para escrever as condições no Jamovi




Vamos entender a lógica que o Jamovi utiliza para criar categorias. O Jamovi avalia as condições em sequência, considerando a condição anterior. Por exemplo, ao definir a categoria "Pequena"para cidades com população menor ou igual a 20.000 habitantes, inserimos a expressão $\leqslant 20000$. Em seguida, para classificar as cidades de tamanho "Médio", utilizamos a expressão $\leqslant 100000$. Neste momento, o Jamovi, automaticamente, entende que esta condição se refere à população que varia de 20.001 a 100.000 habitantes, já que a classificação anterior já considerou as cidades com população menor ou igual a 20.000.

Na última condição, vamos utilizar o operador ELSE para definir as cidades grandes, pois agora só restam elas a serem classificadas.

A Figura 2.8 mostra os 4 passos. Os três primeiros passos são as definições das condições de transformação e a quarta etapa é a verificação.

Um recurso interessante do Jamovi é que, enquanto você configura as transformações, o software automaticamente começa a criar as categorias para você, permitindo visualizar em tempo real se a recodificação está ocorrendo corretamente.

Figura 2.8: Criando as condições para Transformação de Variáveis



No editor de fórmulas, textos como "Pequena", "Média" e "Grande" devem estar entre aspas. Valores numéricos usados nos limites são escritos sem aspas. Confira também se as observações com população ausente permanecem ausentes na variável recodificada; não as classifique automaticamente como cidades grandes.

Se você quiser criar categorias com códigos numéricos, as etapas são as mesmas, mas você deve utilizar números sem aspas. Por exemplo, poderíamos codificar "Pequena" como 1, "Média" como 2 e "Grande" como 3. Nesse caso, ao invés de escrever "Pequena", "Média" e "Grande" nas condições, escreveríamos os números correspondentes.

É importante lembrar que, ao usar códigos numéricos, será necessário criar uma legenda para lembrar o que cada número significa. Jamovi permite que você faça isso através de "Níveis de Variáveis".

Com a definição de todas as condições, a variável categórica está pronta para ser utilizada em suas análises. Como você pode ver, o processo de transformar uma variável contínua em uma variável categórica é bastante simples e intuitivo no Jamovi.

Para consolidar esse aprendizado, sugerimos que pratique o processo de criação de categorias com outros conjuntos de dados e exemplos. Lembre-se, a prática é uma parte importante do aprendizado. Quanto mais você praticar, mais natural o processo se tornará.

2.7 Inserindo descrição nas variáveis

Ao trabalhar com conjuntos de dados complexos, é fundamental compreender o significado de cada variável presente. Uma prática essencial para facilitar esse entendimento é adicionar descrições detalhadas às variáveis. Nesta seção, aprenderemos como inserir descrições nas variáveis do Jamovi, um recurso simples mas que pode melhorar significativamente a organização e compreensão dos seus dados.

2.7.1 Importância das descrições de variáveis

Antes de aprendermos o processo propriamente dito, é importante entender por que a inserção de descrições nas variáveis é uma prática recomendada:

- **Clareza de entendimento**: Evita confusões sobre o significado de cada variável, principalmente quando o nome das variáveis é abreviado ou codificado.
- **Documentação integrada**: Funciona como um dicionário de dados embutido no próprio arquivo.
- **Colaboração eficiente**: Facilita o compartilhamento de dados com colegas que não estão familiarizados com o conjunto de dados.
- **Memória futura**: Ajuda você mesmo a relembrar o significado das variáveis quando revisitar o projeto meses depois.
- **Especificação de códigos**: Permite documentar o significado de códigos numéricos (ex: 0 = Não, 1 = Sim).

2.7.2 Adicionando descrições às variáveis

O processo de inserção de descrições no Jamovi é bastante simples e intuitivo:

1. Abra o conjunto de dados no Jamovi.
2. Na aba **Dados (Data)**, acesse as ferramentas de variáveis.
3. Para cada variável na lista que aparece, você verá um campo de descrição à direita do nome da variável.
4. Clique neste campo e digite a descrição desejada.
5. Após inserir a descrição, clique em qualquer outra área para confirmar.

2.7.3 Boas práticas para descrição de variáveis

Para maximizar a utilidade das descrições de variáveis, considere as seguintes recomendações:

- **Seja conciso mas completo**: Inclua informações essenciais sem escrever parágrafos extensos.
- **Especifique unidades de medida**: Para variáveis numéricas, indique a unidade (ex: idade em anos, peso em kg).
- **Documente códigos**: Para variáveis categóricas, especifique o significado dos códigos (ex: "0 = Não, 1 = Sim").
- **Mencione dados ausentes**: Se relevante, indique como os dados ausentes são representados.
- **Use linguagem clara**: Evite jargões ou abreviações que possam não ser compreendidos por todos.

2.7.4 Exemplo prático

Usando um conjunto de dados sobre o Titanic como exemplo, poderíamos adicionar as seguintes descrições:

- **id**: Identificador único do passageiro
- **survived**: Se o passageiro sobreviveu ou não (0 = Não, 1 = Sim)
- **class**: Classe na qual o passageiro viajava
- **name**: Nome completo do passageiro
- **sex**: Sexo do passageiro
- **age**: Idade do passageiro em anos
- **sib_sp**: Número de irmãos/cônjuges a bordo
- **parch**: Número de pais/filhos a bordo
- **ticket**: Número do bilhete
- **fare**: Preço pago pelo bilhete em libras
- **cabin**: Número da cabine
- **embarked**: Porto de embarque (C = Cherbourg, Q = Queenstown, S = Southampton)

2.7.5 Visualizando as descrições

Uma vez que as descrições tenham sido adicionadas, elas se tornam parte integrante do seu arquivo Jamovi. Ao passar o mouse sobre o nome de uma variável durante a análise ou seleção de variáveis, você verá a descrição aparecer como uma dica flutuante, facilitando a identificação rápida do significado de cada variável.

2.7.6 Considerações finais

A adição de descrições às variáveis pode parecer uma tarefa simples e até mesmo opcional, mas é uma prática que distingue análises de dados amadoras de análises profissionais. Uma boa documentação não apenas facilita seu próprio trabalho, mas também demonstra rigor metodológico e consideração pelos futuros leitores ou colaboradores do seu projeto.

Adote o hábito de adicionar descrições claras às suas variáveis logo após importar ou criar um novo conjunto de dados. Este pequeno investimento de tempo inicial economizará horas de confusão e retrabalho no futuro, especialmente em projetos mais extensos ou que envolvam múltiplos colaboradores.

Dica de Conteúdo

Para uma demonstração visual de como inserir descrições nas variáveis do Jamovi, confira meu tutorial em vídeo. Nele, mostro o processo passo a passo usando um conjunto de dados do Titanic como exemplo.

Como Inserir Descrição nas Variáveis no Jamovi

2.8 Filtro de Dados

Uma das funcionalidades mais úteis do Jamovi é a capacidade de criar filtros que permitem focar suas análises em subconjuntos específicos dos seus dados. Nesta seção, aprenderemos como criar e gerenciar filtros no Jamovi, uma ferramenta essencial para análises mais direcionadas e específicas.

2.8.1 O que são filtros e por que usá-los

Filtros permitem selecionar apenas uma parte dos seus dados para análise, sem remover as observações do conjunto de dados original. Isso é particularmente útil quando:

- Você precisa analisar um subgrupo específico (ex: apenas mulheres ou apenas participantes de determinada faixa etária)
- Você deseja comparar resultados entre diferentes subgrupos

- Você quer excluir temporariamente casos com valores extremos ou ausentes
- Você precisa testar hipóteses em segmentos específicos da sua amostra

A grande vantagem dos filtros, em comparação com a exclusão permanente de dados, é que você pode facilmente ativar e desativar esses filtros conforme necessário, mantendo a integridade do seu conjunto de dados original.

2.8.2 Criando um filtro básico

Para criar um filtro no Jamovi:

1. Na aba **Dados (Data)**, acesse as ferramentas de variáveis
2. Selecione a opção **Filtros (Filters)** na aba Dados
3. O Jamovi criará uma coluna especial de filtro na sua planilha de dados
4. Adicione uma descrição para o filtro, explicando seu propósito (ex: ”Sobreviventes do Titanic”)
5. Na caixa de expressão, clique no botão de função (f(x)) e selecione a variável que deseja usar como critério
6. Complete a expressão com a condição desejada

2.8.3 Sintaxe para expressões de filtro

Os filtros usam o editor de fórmulas do próprio jamovi; ele não executa código R arbitrário. Confira os nomes de funções e os operadores na documentação e no seletor de funções (The jamovi project, 2026m). Aqui estão algumas operações comuns:

- **Igualdade**: Use o operador == (dois sinais de igual). Ex: `survived == 1`
- **Desigualdade**: Use o operador !=. Ex: `sex != "male"`
- **Menor que**: Use o operador <. Ex: `age < 30`
- **Maior que**: Use o operador >. Ex: `fare > 100`
- **Menor ou igual**: Use o operador <=. Ex: `sib_sp <= 2`
- **Maior ou igual**: Use o operador >=. Ex: `parch >= 1`

É importante observar que:

- Para variáveis de texto, os valores devem estar entre aspas simples ou duplas. Ex: `sex == "female"`
- Para variáveis numéricas, os valores são inseridos diretamente. Ex: `age < 30`
- O operador de igualdade é sempre == (dois sinais de igual), nunca apenas um sinal de igual

2.8.4 Visualizando o efeito do filtro

Uma das características mais úteis do Jamovi é a visualização instantânea do efeito do filtro. Ao criar um filtro:

- As linhas que não atendem aos critérios do filtro ficarão sombreadas na visualização de dados
- Você pode rolar pela planilha para verificar quais observações estão sendo incluídas ou excluídas
- As análises estatísticas realizadas após a aplicação do filtro considerarão apenas as observações não sombreadas

2.8.5 Combinando múltiplos critérios

Você pode criar filtros mais complexos combinando múltiplos critérios:

1. **Usando operadores lógicos em um único filtro**:
    - **E lógico**: Use `and`. Ex: `survived == 1 and sex == 'female'`
    - **OU lógico**: Use `or`. Ex: `age < 18 or age > 60`
2. **Criando múltiplos filtros separados**:
    - Crie um primeiro filtro (ex: apenas sobreviventes)
    - Crie um segundo filtro (ex: apenas mulheres)
    - Crie um terceiro filtro (ex: apenas menores de 30 anos)

Vários filtros ativos restringem conjuntamente os casos analisados. Filtros separados são aplicados em cascata: cálculos como médias ou escores padronizados em um filtro posterior podem usar apenas os casos que passaram pelo anterior. Portanto, a ordem pode importar quando o critério depende de resumos do conjunto de dados (The jamovi project, 2026w). Confira o número de casos após cada etapa.

2.8.6 Ativando e desativando filtros

Uma grande vantagem dos filtros é a possibilidade de ativá-los e desativá-los conforme necessário:

- Para desativar um filtro, desmarque a caixa de seleção ”Ativo”na definição do filtro
- Para ativar um filtro previamente desativado, basta marcar novamente a caixa ”Ativo”
- Você pode ter vários filtros definidos, mas ativar apenas aqueles relevantes para a análise atual

Esta flexibilidade permite executar diferentes análises em diferentes subconjuntos dos dados sem precisar recriar os filtros a cada vez.

2.8.7 Considerações importantes

Ao trabalhar com filtros no Jamovi, lembre-se de:

- **Documentar seus filtros**: Sempre adicione descrições claras aos seus filtros para lembrar seu propósito
- **Verificar o número de observações**: Após aplicar um filtro, verifique se o número resultante de observações corresponde ao esperado
- **Considerar o impacto em análises estatísticas**: Filtros muito restritivos podem reduzir excessivamente seu tamanho amostral
- **Documentar o estado dos filtros**: Ao compartilhar a análise, preserve os filtros que definem a amostra e explique quais estão ativos. Desativá-los muda os resultados; para outro exercício, salve uma cópia e confira o subconjunto desejado.
- **Salvar versões com e sem filtros**: Para análises complexas, considere salvar diferentes versões do seu arquivo

Dica de Conteúdo

Para ver na prática como criar e utilizar filtros no Jamovi, confira meu tutorial em vídeo. Nele, demonstro como criar filtros simples e complexos, e como combinar múltiplos critérios para realizar análises mais específicas.

Como Criar Filtros no Jamovi

2.9 Variáveis calculadas e valores ausentes

2.9.1 Calculando uma mudança individual

Abra `exemplo_notas.csv`, disponível na pasta `dados` do repositório. Na aba **Dados**, escolha **Calcular (Compute)**, dê à nova variável o nome `mudanca` e use a fórmula:

```
depois - antes
```

A fórmula é aplicada linha por linha. Para a pessoa de `id` igual a 1, o resultado é $50 - 45 = 5$ pontos. Preserve as duas colunas originais: assim, outra pessoa poderá conferir como a mudança foi calculada. Essa coluna também ajuda a examinar a distribuição das diferenças antes de um teste pareado.

2.9.2 Cálculos por linha e por coluna

A função `MEAN(antes, depois)` calcula uma média para cada pessoa, usando as duas medidas daquela linha. Já `VMEAN(depois)` resume a coluna de notas posteriores. O prefixo V distingue funções que operam sobre a variável das funções que trabalham linha por linha. Use o seletor de funções para conferir os argumentos, inclusive a regra para ausentes (The jamovi project, 2026m).

Uma média entre antes e depois não é uma medida de mudança. Para estudar o sentido e a magnitude da mudança, use a diferença explicitamente definida. Escolha a fórmula a partir da pergunta, e não apenas porque ela produz uma nova coluna.

2.9.3 Ausência de resposta não é zero

Uma célula vazia e uma resposta igual a zero podem ter significados diferentes. Se uma pessoa não realizou uma prova, atribuir zero a ela muda a interpretação da nota. Verifique no dicionário do banco como foram registrados não resposta, recusa e valores fora do domínio. Códigos numéricos como 999 precisam ser reconhecidos e tratados como ausentes quando esse for seu significado.

Preserve o dado original e documente a regra de tratamento. Confira na saída o número de casos efetivamente usado por cada análise: um teste pareado precisa de pares completos, enquanto resumos de variáveis diferentes podem ter quantidades válidas diferentes. Não substitua automaticamente os ausentes pela média; essa operação altera a distribuição e pode distorcer a incerteza. O procedimento adequado depende do motivo da ausência e da análise planejada.

2.10 Organizando as variáveis

A organização adequada das variáveis é um aspecto fundamental para garantir análises estatísticas precisas e facilitar a interpretação dos resultados. Nesta seção, aprenderemos como padronizar e organizar as variáveis no Jamovi, incluindo a edição de suas propriedades, tipos de dados e configurações de exibição.

2.10.1 Padronização de variáveis

Manter um padrão consistente na nomenclatura e configuração das variáveis é uma prática recomendada em análise de dados por diversos motivos:

- **Legibilidade**: Nomes padronizados facilitam a identificação rápida das variáveis.
- **Compatibilidade**: Evita problemas ao exportar dados para outros softwares.
- **Colaboração**: Facilita o trabalho em equipe quando múltiplos pesquisadores utilizam o mesmo conjunto de dados.
- **Reprodutibilidade**: Torna mais fácil replicar análises no futuro.

Algumas recomendações de padronização incluem:

- Usar letras minúsculas para todos os nomes de variáveis
- Evitar espaços e caracteres especiais
- Manter consistência nos prefixos e sufixos
- Usar nomes curtos, mas significativos

2.10.2 Editando propriedades das variáveis

O Jamovi oferece duas formas principais para editar as propriedades das variáveis:

1. **Através do menu Variáveis**:
    - Na aba **Dados (Data)**, acesse as ferramentas de variáveis.
    - Localize a variável que deseja editar.
    - Clique duas vezes sobre o nome ou descrição para modificá-los.
    - Ajuste os tipos de medida e outras configurações conforme necessário.
2. **Diretamente na área de dados**:
    - Clique duas vezes sobre o cabeçalho da coluna (nome da variável).
    - Uma janela de edição se abrirá, permitindo modificar todas as propriedades.

2.10.3 Configurando tipos de dados

Um aspecto crucial da organização de variáveis é garantir que cada uma esteja configurada com o tipo de dado apropriado:

- **Inteiro**: Para valores numéricos sem casas decimais (ex: idade em anos completos, contagens).
- **Decimal**: Para valores numéricos com casas decimais (ex: preços, medidas precisas).
- **Texto**: Para dados não numéricos ou identificadores.

Por exemplo, ao configurar uma variável de idade onde todos os valores são anos completos:

1. Abra as propriedades da variável.
2. Na seção "Tipo de dado", selecione "Inteiro".
3. Confira os valores antes de converter: alterar o tipo de armazenamento não deve ser usado apenas para esconder casas decimais, pois pode alterar os dados.

2.10.4 Configurando casas decimais

Para variáveis que exigem casas decimais, é importante observar que:

- Nas fórmulas desta apostila, use ponto decimal, como `10.5`. Na importação de arquivos, confira o separador decimal e o delimitador das colunas: convenções locais podem variar e uma coluna numérica pode ser lida como texto.
- É possível configurar o número de casas decimais exibidas para cada variável.

2.10.5 Configurando o tipo de medida

Além do tipo de dado, é importante configurar corretamente o tipo de medida de cada variável:

- **Nominal**: Para categorias sem ordem (ex: gênero, cor dos olhos).
- **Ordinal**: Para categorias com ordem natural (ex: nível de educação, grau de satisfação).
- **Contínua**: Para medidas numéricas com significado quantitativo (ex: altura, temperatura).

Esta configuração é crucial pois determina quais análises estatísticas serão disponibilizadas para cada variável no Jamovi.

2.10.6 Melhores práticas para organização de variáveis

Ao organizar suas variáveis no Jamovi, considere as seguintes recomendações:

- **Revise seus dados após a importação**: Verifique se os tipos de dados foram detectados corretamente.
- **Corrija formatos inadequados**: Confira se números, textos e códigos foram interpretados como pretendido, preservando a precisão dos registros originais.
- **Documente suas variáveis**: Adicione descrições claras para facilitar futuras consultas.
- **Mantenha consistência**: Use o mesmo padrão de nomenclatura e configuração para todas as variáveis.
- **Salve regularmente**: Após realizar modificações nas propriedades das variáveis, salve seu trabalho para evitar perda de configurações.

Uma organização cuidadosa das variáveis não só facilita o processo de análise, mas também reduz significativamente a probabilidade de erros e interpretações equivocadas dos resultados.

Dica de Conteúdo

Para ver na prática como padronizar e organizar variáveis no Jamovi, confira meu vídeo tutorial detalhado. Nele, demonstro como editar as propriedades das variáveis, configurar tipos de dados e aplicar boas práticas para manter seus dados organizados e prontos para análise.

Como Organizar Variáveis no Jamovi

2.11 Salvar e Exportar Dados

Ao trabalhar com o Jamovi, é fundamental saber como salvar seu trabalho e exportar seus dados para compartilhar ou usar em outros programas. O Jamovi oferece diferentes opções para salvar seus projetos e exportar seus dados em vários formatos, tornando o processo simples e flexível.

2.11.1 Salvando seu projeto no Jamovi

O projeto do jamovi preserva os dados e as análises, permitindo retomar o trabalho. Ao terminar uma etapa, salve o projeto e confira se as alterações foram gravadas.

Para salvar seu projeto no Jamovi:

1. Clique no menu **Arquivo** localizado no canto superior esquerdo da interface.

2. Selecione a opção **Salvar Como...** para salvar o arquivo pela primeira vez ou em um novo local.

3. Escolha o local de destino e digite um nome para o arquivo.

4. Confirme clicando em **Salvar**.

O arquivo será salvo com a extensão .omv, que é o formato nativo do Jamovi. Este formato preserva todas as informações do seu projeto, incluindo dados, análises e configurações.

2.11.2 Separando projeto, dados e resultados

O arquivo `.omv` preserva o projeto de análise. Um CSV é uma tabela de dados e não conserva todo o trabalho feito no jamovi. Já PDF e HTML são formatos para apresentar resultados; não substituem o banco que permite refazer a análise.

Para exportar, abra o menu de arquivos e selecione **Exportar (Export)**. Escolha um formato entre os oferecidos pela versão instalada, defina o nome e o local e abra o arquivo resultante para conferir. Ao preparar um relatório em PDF ou HTML, verifique a disposição das tabelas e gráficos. Para usar uma tabela ou figura em outro documento, examine também as opções de cópia no menu de contexto do próprio resultado.

Mantenha uma cópia dos dados originais, do projeto `.omv` e do relatório final. Registre quais filtros, transformações e exclusões foram utilizados. Se distribuir somente o relatório, o leitor poderá consultar os resultados, mas não terá todos os elementos necessários para reproduzi-los.

2.11.3 Dicas importantes para salvar e exportar

- **Salve com frequência**: Salve o projeto e confira se ele pode ser reaberto.
- **Identifique as versões**: Inclua a data ou a versão no nome do arquivo.
- **Confira a exportação**: Abra o arquivo exportado e confira dados, tabelas e gráficos.

Dica de Conteúdo

Para ver como salvar e exportar dados no Jamovi na prática, confira meu tutorial em vídeo. Nele, mostro passo a passo todas as opções de salvamento e exportação, além de dicas úteis para preservar seu trabalho.

Salvar e Exportar Dados no Jamovi

Capítulo 3

Estatística Descritiva

Antes de escolher um teste, precisamos conhecer os dados. Quantas pessoas participaram? Há valores ausentes? As notas estão concentradas ou variam bastante? Neste capítulo, vamos usar tabelas e gráficos para responder a essas perguntas. A análise descritiva ajuda a verificar o banco e a comunicar o que foi observado; ela também orienta as análises dos próximos capítulos.

Vamos manter uma sequência simples: conferir as variáveis, descrever o centro e a dispersão e, por fim, examinar a distribuição. Os conceitos de média, mediana e moda seguem a apresentação do manual do NIST/SEMATECH e dos livros já indicados nesta apostila (NIST/SEMATECH, 2026e; Triola, 2017).

3.1 Um conjunto de dados para praticar

Preparei o arquivo `dados/exemplo_notas.csv`, disponível no repositório da apostila. Ele contém **18 pessoas fictícias**, distribuídas entre três atividades: Leitura, Vídeo e Oficina. Cada linha representa uma pessoa; as colunas `antes` e `depois` guardam duas notas dessa mesma pessoa. A coluna `horas` registra horas de estudo.

Abra o CSV no jamovi e confira os tipos: `id` como identificador, `grupo` como nominal e as demais colunas como contínuas. No arquivo, a categoria Vídeo aparece como `Video`, sem acento. Ao longo da apostila, vamos reutilizar esse banco para que você possa acompanhar o mesmo exemplo de diferentes maneiras.

Dica de Conteúdo

Os dados são de elaboração própria e servem para aprender a configurar análises. Os resultados não demonstram a eficácia de uma atividade de ensino. Mantenha todos os filtros desativados, exceto quando o exercício indicar um subconjunto, e salve seu trabalho em um arquivo `.omv`.

3.1.1 Abrindo a análise descritiva

No menu **Análises (Analyses)**, acesse **Exploração (Exploration)** e depois **Descritivas (Descriptives)**. Mova `depois` para **Variáveis (Variables)**. Em **Estatísticas (Statistics)**, selecione as medidas que deseja examinar. Para comparar grupos, mova `grupo` para **Dividir por (Split by)**. Essa análise oferece resumos numéricos, tabelas de frequência e gráficos (The jamovi project, 2026g).

Os nomes traduzidos podem variar entre versões. Por isso, indico também os nomes em inglês. As capturas de tela dos capítulos anteriores ilustram a organização geral; registre a versão do jamovi usada no seu trabalho para facilitar a reprodução.

3.2 Medidas de tendência central

3.2.1 Média

A média aritmética é a soma dos valores dividida pelo número de observações válidas:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

Para as notas $5, 6, 7, 8, 9$, a soma é 35 e a média é 7. Isso não significa que todas as pessoas tenham nota 7: a média resume o conjunto em um único número.

No arquivo de exemplo, a média de `depois` é aproximadamente 64,56 pontos. Ao dividir por `grupo`, você deve encontrar:

Tabela 3.1: Resumo das notas posteriores nos dados fictícios

Atividade	n	Média	Desvio padrão amostral
Leitura	6	59,17	7,03
Vídeo	6	64,67	7,76
Oficina	6	69,83	8,57

Esses números descrevem as pessoas do arquivo. A diferença entre médias observadas, por si só, não resolve a pergunta sobre diferenças populacionais. Vamos tratar dessa distinção no capítulo de ANOVA.

3.2.2 Mediana

Para encontrar a mediana, ordenamos os valores e localizamos o centro da lista. Considere $2, 12, 5, 10, 8, 7, 3$. A ordenação correta é $2, 3, 5, 7, 8, 10, 12$; como há sete valores, o quarto é a mediana: 7. A figura 3.1 destaca essa posição.



Figura 3.1: A mediana é obtida pela posição na lista ordenada. Elaboração própria.

Quando há um número par de observações numéricas, calculamos a média dos dois valores centrais. Para $2, 3, 5, 7, 8, 10$, ela é $(5 + 7)/2 = 6$. A mediana pode, portanto, ser um valor que não aparece originalmente na lista.

Compare agora $5, 6, 7, 8, 9$ com $5, 6, 7, 8, 90$. A média passa de 7 para 23,2, enquanto a mediana continua igual a 7. Esse exemplo ajuda a perceber por que convém examinar a distribuição antes de escolher um resumo. A mediana descreve a posição central; ela não equivale a dividir a área de qualquer histograma desenhado a partir da amostra exatamente ao meio.

3.2.3 Moda

A moda é o valor ou categoria com maior frequência. No conjunto $1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10$, o valor 6 aparece duas vezes e cada um dos demais aparece uma vez. Assim, a moda é 6.




Figura 3.2: O valor mais frequente está destacado em vermelho. As posições são apenas ilustrativas. Elaboração própria.

Pode haver empate entre valores mais frequentes. Para uma variável nominal, como meio de transporte, a moda é uma categoria; calcular a média de seus códigos não produz uma medida útil. Em variáveis contínuas, muitos valores distintos podem aparecer uma única vez. Nessa situação, observe também o histograma e não interprete uma moda isolada como um centro estável da distribuição.

3.3 Medidas de dispersão

Ter a mesma média não significa ter a mesma distribuição. Os conjuntos $4, 5, 6$ e $0, 5, 10$ têm média 5, mas o segundo é muito mais disperso. A figura 3.3 mostra os próprios valores, sem representar frequências como se fossem desvios padrão.




Figura 3.3: Mesma média, dispersões diferentes: $s_A = 1$ e $s_B = 5$. Elaboração própria.

3.3.1 Amplitude, variância e desvio padrão

A amplitude total é o máximo menos o mínimo. Para $4, 5, 6$, vale $6-4 = 2$. Ela é fácil de calcular, mas depende apenas dos dois extremos.

A variância amostral e o desvio padrão amostral são dados por:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}, \qquad s = \sqrt{s^2}.$$

Primeiro subtraímos a média de cada valor; depois elevamos **cada diferença** ao quadrado e somamos os quadrados. Dividimos por $n-1$ e extraímos a raiz para obter s. Para $4, 5, 6$, isso resulta em $s^2 = (1 + 0 + 1)/2 = 1$ e $s = 1$. Se somássemos as diferenças antes de elevá-las ao quadrado, obteríamos zero e perderíamos a informação sobre dispersão.

O desvio padrão volta à unidade da variável: notas em pontos têm desvio padrão em pontos, enquanto a variância fica em pontos ao quadrado. Ele não é a média aritmética das distâncias absolutas à média. A distinção entre essas medidas é apresentada pelo NIST/SEMATECH (NIST/SEMATECH, 2026f).

Em **Descritivas**, selecione **Desvio padrão (Std. deviation)**, **Variância (Variance)** e **Amplitude (Range)**. O desvio padrão amostral de `depois`, sem divisão por grupos, é aproximadamente 8,60. Não confunda essa medida com o erro padrão da média.

3.3.2 Quartis e intervalo interquartil

Os quartis resumem posições na distribuição: Q_1 corresponde ao percentil 25, Q_2 à mediana e Q_3 ao percentil 75. O intervalo interquartil é $IIQ = Q_3 - Q_1$ e descreve a dispersão da parte central

dos dados. Ao comparar cálculos manuais e softwares, confira o método de interpolação: amostras pequenas podem produzir quartis diferentes conforme a convenção usada.

O boxplot combina quartis e extremos segundo uma regra de construção. Na convenção usual de Tukey, valores além de $Q_1 - 1{,}5\,IIQ$ ou de $Q_3 + 1{,}5\,IIQ$ são sinalizados como potenciais valores atípicos. Os bigodes vão até as observações extremas que permanecem dentro desses limites (NIST/SEMATECH, 2026a). Um ponto sinalizado merece investigação; isso não autoriza apagá-lo automaticamente.

3.3.3 Desvio padrão e erro padrão da média

O desvio padrão descreve a variabilidade entre observações. Já o erro padrão quantifica a variabilidade amostral de um estimador. Para a média de observações independentes, estimamos:

$$EP(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

No nosso exemplo, $8{,}597/\sqrt{18} \approx 2{,}026$. Se você informar apenas o erro padrão, o leitor não terá uma descrição direta da dispersão das notas. Em um relatório descritivo, identifique explicitamente se os números apresentados são DP ou EP.

3.4 Escolhendo tabelas e gráficos

3.4.1 Histogramas e boxplots

Em **Gráficos (Plots)**, selecione um histograma para `depois` e compare-o com um boxplot, usando `grupo` em **Dividir por**. O histograma agrupa observações em intervalos; sua aparência depende da largura desses intervalos. O boxplot resume posições e facilita a comparação entre grupos, mas não mostra todos os detalhes da distribuição. Com apenas seis pessoas por grupo, os pontos individuais são especialmente informativos.

Procure valores incompatíveis com a escala, assimetrias e diferenças de dispersão. Uma nota 650 em uma prova de 0 a 100 sugere conferir o registro original. Uma nota 100 nessa mesma prova pode ser perfeitamente válida. Corrigir um erro documentado e excluir uma observação válida são decisões diferentes.

3.4.2 Frequências para variáveis categóricas

Para `grupo`, solicite a tabela de frequências e um gráfico de barras. Cada atividade aparece seis vezes, correspondendo a $6/18 \times 100 \approx 33{,}3\%$ das pessoas. A documentação do jamovi distingue os gráficos e as tabelas disponíveis conforme o tipo de medida (The jamovi project, 2026g).

Identifique sempre o denominador de uma porcentagem. Se duas das 18 pessoas não responderam a uma pergunta, um percentual entre as 16 respostas válidas difere do percentual em relação às 18 pessoas incluídas no banco. Informe os ausentes e o número efetivamente analisado.

3.5 Como relatar a análise descritiva

Um relato possível para os dados fictícios é: “Foram analisadas 18 observações, sem valores ausentes nas notas posteriores. A média foi de 64,56 pontos, com desvio padrão amostral de 8,60. As médias por atividade foram 59,17, 64,67 e 69,83 pontos, respectivamente para Leitura, Vídeo e Oficina.”

Esse relato informa a variável, a unidade, a quantidade de observações e o significado da medida de dispersão. Acrescente um gráfico quando ele ajudar o leitor a compreender a distribuição. Antes de avançar, pratique: substitua uma nota por um valor extremo em uma cópia do arquivo, observe a mudança na média e na mediana e restaure o valor original. Guarde a versão usada em cada análise.

Capítulo 4

Testes de Hipóteses

No capítulo anterior, descrevemos as notas observadas. Agora vamos formular perguntas sobre médias populacionais e examinar como os dados se relacionam com essas perguntas. Um teste de hipóteses combina um modelo estatístico, uma hipótese nula e uma estatística de teste. Sua interpretação depende também de como as observações foram obtidas.

Vamos trabalhar com testes t de uma amostra, de duas amostras independentes e de medidas pareadas, avançando para testes de postos, planejamento amostral e multiplicidade. Usaremos novamente `exemplo_notas.csv`; todos os resultados numéricos apresentados neste capítulo são cálculos sobre esses dados fictícios.

4.1 Hipóteses, valor de p e decisões

4.1.1 Formulando uma pergunta antes da análise

Suponha que uma nota média de 60 pontos seja uma referência definida antes de observar os resultados. Podemos perguntar se a média populacional das notas posteriores difere desse valor. O teste bilateral corresponde a:

$$H_0 : \mu = 60, \qquad H_1 : \mu \neq 60.$$

O parâmetro μ representa a média na população de interesse; $\bar{x}$ representa a média calculada na amostra. Formular uma hipótese sobre μ não dispensa definir a população, a estratégia de amostragem e a variável medida.

O valor de p é calculado sob H_0 e as demais suposições do modelo: ele expressa a probabilidade de uma estatística de teste tão ou mais extrema que a observada, no sentido especificado pela hipótese alternativa (NIST/SEMATECH, 2026c). Antes da análise, escolhemos um nível de significância α; se usarmos $\alpha = 0{,}05$, um resultado com $p \leq 0{,}05$ leva à rejeição de H_0 segundo essa regra.

4.1.2 O que um teste não permite concluir

Um valor de p pequeno não informa a probabilidade de H_0 ser verdadeira, não mede o tamanho do efeito e não garante importância prática. Um valor de p grande também não demonstra igualdade. A declaração da Associação Americana de Estatística recomenda interpretar os resultados com o desenho do estudo, as estimativas e a incerteza, com transparência sobre as análises realizadas (Wasserstein; Lazar, 2016).

Por exemplo, uma diferença de 0,2 ponto pode ser detectável em uma amostra muito grande e ser pouco relevante para a decisão educacional. Em outra situação, uma diferença estimada de 10 pontos pode vir acompanhada de um intervalo muito amplo. Relatar somente "deu significativo" omite essas informações.

Dica de Conteúdo

Se $p > \alpha$, escreva que não foi encontrada evidência suficiente para rejeitar H_0 no teste realizado. Evite escrever que os grupos são iguais. Demonstrar equivalência exige uma pergunta, margens e procedimentos próprios.

4.1.3 Intervalo de confiança e tamanho de efeito

Um intervalo de confiança combina estimativa e precisão. Em termos frequentistas, um procedimento de IC95% cobre o parâmetro verdadeiro em 95% das repetições do processo de amostragem, se suas suposições forem atendidas. Não significa que 95% das observações individuais estejam dentro do intervalo da média (NIST/SEMATECH, 2026b).

Além da diferença em pontos, pode ser útil apresentar uma medida padronizada, como o d de Cohen, oferecida nos testes t do jamovi. Identifique o tipo de comparação e a definição da padronização; o desvio padrão usado em um teste pareado não precisa ser o mesmo de um teste independente. Interprete a magnitude no contexto da variável e da pergunta.

4.2 Teste t de uma amostra

O teste t de uma amostra compara uma média com um valor de referência. Com observações independentes, desvio padrão populacional desconhecido e uma distribuição para a qual a inferência t seja adequada, a estatística é:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \qquad gl = n - 1.$$

Para os dados de `depois`, temos $n = 18$, $\bar{x} \approx 64{,}556$, $s \approx 8{,}597$ e $\mu_0 = 60$. Portanto,

$$t \approx \frac{64{,}556 - 60}{8{,}597/\sqrt{18}} \approx 2{,}248.$$

4.2.1 Executando no jamovi

1. Desative os filtros e abra **Análises → Testes t → Teste t de uma amostra (One Sample T-Test)**.
2. Mova `depois` para a lista de variáveis dependentes e informe 60 em **Valor do teste (Test value)**.
3. Mantenha a alternativa bilateral, diferente do valor de referência.
4. Solicite descritivas, diferença média, intervalo de confiança de 95% e o gráfico Q-Q para examinar a distribuição.

A documentação oficial descreve as alternativas e as opções de intervalo para esse teste (The jamovi project, 2026o). Você deve encontrar aproximadamente $t(17) = 2{,}248$ e $p = 0{,}038$. A diferença estimada é 4,556 pontos, com IC95% de [0,280; 8,831]. Como o intervalo da saída se refere à **diferença em relação a 60**, somamos 60 a seus limites para obter o intervalo da média: [60,280; 68,831].

Um relato possível é: "No exemplo fictício, a média posterior foi de 64,56 pontos. A diferença em relação à referência de 60 foi estimada em 4,56 pontos, IC95% [0,28; 8,83], $t(17) = 2{,}25$, $p = 0{,}038$." A referência não representa, por si só, uma medida anterior das mesmas pessoas.

4.3 Teste de hipóteses unicaudal e bilateral

Uma alternativa unilateral especifica uma direção. Se a pergunta planejada for se a média é maior que 60, podemos escrever $H_0 : \mu \leq 60$ e $H_1 : \mu > 60$; o cálculo é feito na fronteira $\mu = 60$. Para uma alternativa de redução, as desigualdades são invertidas. No teste bilateral, desvios nas duas direções contam contra a hipótese nula.

A direção deve resultar da pergunta de pesquisa, antes de examinar os dados. Não troque para um teste unilateral apenas porque o valor de p bilateral ficou acima de 0,05. Se uma diferença na direção oposta também for relevante para a decisão, explique por que uma análise unilateral seria apropriada antes de usá-la.

No jamovi, escolha a hipótese alternativa no painel do teste e confira a nota da tabela. Em testes de dois grupos, a interpretação de "maior que" depende da ordem dos níveis; em testes pareados, depende da ordem das medidas. Sempre escreva a diferença que está sendo testada.

4.4 Duas amostras independentes: Student e Welch

Quando cada pessoa pertence a apenas um dos dois grupos comparados, a estrutura é independente. Nosso exemplo permite comparar Leitura e Vídeo, usando a nota `depois`. As notas anterior e posterior da mesma pessoa, por outro lado, não formam dois grupos independentes.

O teste t de Student com variância combinada supõe variâncias populacionais iguais. O teste de Welch dispensa essa igualdade e usa graus de liberdade aproximados. Em ambos, a independência vem do desenho do estudo. A análise deve considerar a forma das distribuições, o tamanho das amostras e possíveis valores influentes (NIST/SEMATECH, 2026h; The jamovi project, 2026i).

4.4.1 Configurando a comparação

1. Crie um filtro com `grupo != 'Oficina'`, mantendo apenas Leitura e Vídeo. Confira que restaram 12 observações.
2. Abra **Testes t → Teste t de amostras independentes (Independent Samples T-Test)**.
3. Atribua `depois` à variável dependente e `grupo` à variável de agrupamento.
4. Selecione **Welch**, descritivas, diferença média, IC95% e gráficos de diagnóstico. Confira a ordem dos níveis antes de interpretar o sinal.

Para a diferença **Leitura menos Vídeo**, a estimativa é −5,50 pontos. O teste bilateral de Welch produz aproximadamente $t = -1{,}287$, $gl = 9{,}902$ e $p = 0{,}227$, com IC95% $[-15{,}037; 4{,}037]$. Se a ordem for invertida, o sinal da diferença e de t também será invertido.

O intervalo é compatível com diferenças em ambos os sentidos. Com seis pessoas por grupo, esse exemplo não demonstra equivalência nem permite afirmar que as atividades são intercambiáveis. **Desative o filtro** antes de continuar para o teste pareado.

4.5 Amostras pareadas: antes e depois

No teste pareado, trabalhamos com uma diferença para cada pessoa. Definindo $d_i = \text{depois}_i - \text{antes}_i$, testamos se a média populacional dessas diferenças é zero:

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}}, \qquad gl = n - 1.$$

A unidade da análise é o par. A suposição de normalidade, quando usada para a inferência t exata, diz respeito às **diferenças**, e não à obrigação de as duas colunas apresentarem separadamente uma distribuição normal (The jamovi project, 2026r).

4.5.1 Configurando e interpretando

1. Com os 18 casos disponíveis, abra **Testes t → Teste t de amostras pareadas (Paired Samples T-Test)**.
2. Forme um par com `depois` como primeira medida e `antes` como segunda.
3. Solicite a diferença média, IC95%, descritivas e diagnóstico das diferenças.
4. Confira os identificadores e o número de pares completos. Nunca ordene uma das colunas separadamente.

Para `depois` menos `antes`, a diferença média é 12,889 pontos, com desvio padrão das diferenças de 5,697. O resultado é aproximadamente $t(17) = 9{,}598$, $p < 0{,}001$, IC95% [10,056; 15,722]. São 18 pares, não 36 observações independentes.

Esse resultado descreve uma mudança no exemplo fictício. Em um estudo real, uma comparação antes/depois sem controle adequado pode refletir outros fatores, como familiarização com a prova ou passagem do tempo. O teste, isoladamente, não estabelece a causa da mudança.

4.6 Pressupostos e alternativas

Antes de interpretar um teste, confira como as pessoas foram selecionadas, se existem medidas repetidas e como os ausentes foram tratados. Um teste de normalidade não verifica independência. Seu resultado também não deve funcionar como uma chave automática que escolhe toda a análise: em amostras pequenas ele pode ter pouca capacidade de detectar desvios, e em amostras grandes pode detectar diferenças pouco relevantes para a pergunta.

O jamovi oferece Mann–Whitney para amostras independentes e Wilcoxon de postos sinalizados para situações pareadas ou de uma amostra. Esses testes têm hipóteses e condições próprias. Mann–Whitney não é, de modo geral, simplesmente um teste de diferença entre medianas; interpretações dessa forma exigem condições adicionais sobre as distribuições. Wilcoxon de postos sinalizados também exige atenção à simetria das diferenças para uma interpretação como teste de localização.

Quando houver dúvida, volte à pergunta e examine gráficos e suposições. Registre a análise escolhida, as exclusões, o número de observações, a estimativa, seu intervalo e o valor de p. A conclusão deve responder à pergunta planejada, sem escolher apenas o resultado mais favorável entre várias tentativas.

4.7 Escolhendo a análise a partir do desenho

Vamos organizar a decisão antes de abrir o menu. Primeiro, escreva qual é a variável resposta e o que uma linha representa. Depois, identifique se as observações vêm de pessoas distintas ou se

a mesma pessoa aparece em mais de uma condição. Por fim, explicite a quantidade que queremos estimar: uma média, uma diferença média, uma proporção ou uma associação.

Tabela 4.1: Perguntas iniciais para orientar a análise

Pergunta	Estrutura	Ponto de partida
Média versus referência	Uma medida por pessoa	t de uma amostra
Duas médias	Dois grupos independentes	t independente; considerar Welch
Mudança média	Duas medidas da mesma pessoa	t pareado nas diferenças
Mais de duas médias	Grupos independentes	ANOVA de um fator
Evolução em três ocasiões	Medidas das mesmas pessoas	ANOVA de medidas repetidas
Percentual versus referência	Resposta binária	Teste binomial

A tabela não encerra a escolha. Por exemplo, pessoas agrupadas em escolas podem continuar dependentes mesmo que cada pessoa tenha uma única linha. Uma escala ordinal com poucas categorias também não deve ser tratada automaticamente como uma medida contínua. Nos capítulos seguintes, retomaremos o desenho para escolher modelos com fatores, covariáveis e respostas categóricas.

4.8 Mann–Whitney e Wilcoxon na prática

4.8.1 Dois grupos independentes

Para praticar Mann–Whitney, mantenha somente Leitura e Vídeo em `exemplo_notas.csv`, como na comparação de Welch. Abra o teste t de amostras independentes, atribua `depois` à resposta e `grupo` ao agrupamento e selecione a opção **Mann–Whitney U**. Acrescente as descritivas por grupo e examine a distribuição dos valores (The jamovi project, 2026i).

O procedimento usa a ordenação conjunta das observações. Valores iguais recebem postos médios. Sob a hipótese nula usual de distribuições iguais, os rótulos dos grupos são intercambiáveis entre observações independentes; a interpretação como deslocamento de localização pede condições adicionais. Se as formas e dispersões forem diferentes, um resultado pode refletir essas diferenças, sem uma interpretação exclusiva em termos de medianas.

Na leitura da saída, registre o tamanho de cada grupo, a estatística, a alternativa e o método de cálculo do valor de p. As convenções para a estatística de postos variam: uma soma de postos e um

U podem codificar a mesma ordenação com números diferentes. A documentação do R discute essa diferença e distingue a estimativa de localização da simples subtração de medianas (R Core Team, 2026f).

4.8.2 Duas medidas pareadas

Desative o filtro e abra o teste de amostras pareadas. Forme o par `depois` menos `antes` e selecione **Wilcoxon de postos sinalizados (Wilcoxon signed-rank)** (The jamovi project, 2026r). O procedimento ordena as magnitudes das diferenças não nulas e considera seus sinais; ele preserva a ligação entre as duas medidas de cada pessoa.

No nosso arquivo, todas as 18 diferenças são positivas. Sem diferenças nulas, os postos de 1 a 18 somam $18 \times 19/2 = 171$: toda a soma está do lado positivo. Esse cálculo ajuda a entender a estatística; não substitui a identificação da convenção e do método de inferência adotados na saída. Empates, zeros e aproximações podem afetar o cálculo. Para interpretar o procedimento como um teste de localização das diferenças, precisamos também considerar sua simetria (R Core Team, 2026f).

Um relato deve indicar que as medidas são pareadas, apresentar uma descrição das diferenças e identificar o teste. Não escolha entre t pareado e Wilcoxon apenas pelo menor valor de p. Defina a pergunta e a estratégia principal e, se fizer uma análise de sensibilidade, explique sua finalidade.

4.9 Erros, poder e planejamento amostral

O erro do tipo I consiste em rejeitar uma hipótese nula verdadeira. O erro do tipo II consiste em deixar de rejeitá-la diante de uma alternativa específica verdadeira. Chamamos de poder a probabilidade de rejeição nessa alternativa, $1 - \beta$. Não existe um único poder de um teste sem especificar o tamanho do efeito e as demais condições.

Considere um estudo futuro com dois grupos independentes, alocação igual e uma diferença de interesse de 5 pontos. Se o desvio padrão comum planejado for 10 pontos, a diferença padronizada será $d = 5/10 = 0{,}5$. Para um teste t bilateral com $\alpha = 0{,}05$ e poder de 80%, o cálculo convencional indica aproximadamente **64 pessoas por grupo**, antes de considerar perdas. A função oficial `power.t.test` do R permite reproduzir o planejamento informando diferença, desvio padrão, poder, nível e tipo de teste (R Core Team, 2026d).

Esse número depende das suposições. Não o reutilize para um estudo pareado, por conglomerados ou com outro desfecho. Documente de onde vieram a diferença relevante e o desvio padrão. Quando não há boa informação prévia, compare cenários plausíveis e inclua o tratamento de perdas no planejamento. Os seis casos por grupo da nossa base foram escolhidos para facilitar a prática; não representam uma recomendação de amostra.

Depois de coletar os dados, examine principalmente as estimativas e seus intervalos. Um resul-

tado impreciso continua impreciso, mesmo que receba uma explicação baseada em "baixo poder". Planejar a precisão antes da coleta é mais útil do que tentar justificar a conclusão após observar o valor de p.

4.10 Múltiplas perguntas e ajustes

Se fizermos 20 testes independentes, todos com hipóteses nulas verdadeiras e nível de 5%, a probabilidade de pelo menos uma rejeição será $1 - (1 - 0{,}05)^{20} \approx 64\%$. A conta pressupõe independência; o problema da multiplicidade, porém, também existe quando os testes são dependentes. Precisamos definir quais testes pertencem à mesma família de perguntas.

Bonferroni compara cada valor de p com α/m, ou multiplica cada valor por m, limitando o resultado a 1. Holm ordena os valores e aplica um ajuste sequencial que controla a probabilidade de pelo menos um erro do tipo I na família. Por exemplo, para três valores brutos 0,010, 0,030 e 0,040, os valores ajustados de Holm são 0,030, 0,060 e 0,060 (R Core Team, 2026a).

Procedimentos voltados à taxa de falsas descobertas, como Benjamini–Hochberg, têm outro objetivo de controle e condições próprias. Eles não significam que cada resultado rejeitado tenha, individualmente, uma probabilidade de 5% de ser falso. A documentação de `p.adjust` distingue essas famílias de procedimentos (R Core Team, 2026a). No jamovi, use as opções de ajuste oferecidas pela análise correspondente e informe o método; não suponha que uma escolha em um painel ajustará automaticamente todos os testes da sessão.

4.11 Vamos praticar: perguntas e comentários

Antes de consultar os comentários, escreva uma resposta curta para cada situação.

1. Uma turma faz a mesma avaliação em dois momentos. Podemos usar um teste independente porque existem duas colunas?
2. O teste de Welch produziu $p = 0{,}227$ para Leitura versus Vídeo. Isso demonstra equivalência?
3. Um teste de Mann–Whitney apresentou evidência de diferença. Podemos escrever automaticamente que as medianas populacionais diferem?
4. Em três testes planejados, os valores de p foram 0,010, 0,030 e 0,040. Quais rejeitamos a 5% usando Holm?

Comentários das respostas

1. Não. São medidas das mesmas pessoas; precisamos preservar os pares. Para uma pergunta sobre mudança média, o t pareado trabalha com as diferenças individuais.

2. Não. O IC95% da diferença, $[-15{,}037; 4{,}037]$, inclui valores em ambos os sentidos. Uma pergunta de equivalência exige margens justificadas e análise própria.

3. Não sem condições adicionais. Precisamos examinar o desenho e a forma das distribuições e identificar a quantidade que o teste permite interpretar.

4. Apenas a primeira hipótese, pois os valores ajustados são 0,030, 0,060 e 0,060. A família deve incluir os testes pertinentes, inclusive os que não tiveram resultados favoráveis.

Capítulo 5

Análise de Variância (ANOVA)

A análise de variância permite investigar diferenças entre médias de grupos a partir de um modelo para a resposta. Neste capítulo, vamos começar pela ANOVA de um fator, comparando as notas posteriores de Leitura, Vídeo e Oficina. Ela pode ser aplicada com dois ou mais níveis; é especialmente útil quando a pergunta envolve mais de dois grupos, pois não exige substituir a pergunta global por vários testes t separados (NIST/SEMATECH, 2026g).

Depois, vamos incluir dois fatores, medidas repetidas e uma covariável. Em cada etapa, a pergunta e a unidade observada orientarão a organização do banco e a interpretação.

5.1 Da pergunta ao modelo

No arquivo `exemplo_notas.csv`, cada pessoa pertence a apenas uma atividade. A nota `depois` é a variável resposta contínua e `grupo` é o fator nominal. Para três grupos, a hipótese nula é:

$$H_0 : \mu_{\text{Leitura}} = \mu_{\text{Video}} = \mu_{\text{Oficina}}.$$

A alternativa afirma que pelo menos uma média difere de outra; ela não afirma que todos os pares sejam diferentes.

A lógica da ANOVA clássica compara a variação entre médias de grupos com a variação que permanece dentro dos grupos:

$$F = \frac{QM_{\text{entre}}}{QM_{\text{dentro}}}.$$

Os quadrados médios são somas de quadrados divididas pelos respectivos graus de liberdade. Assim, uma variação **entre grupos** grande em relação à variação **dentro dos grupos** produz um valor de F maior. Grande dispersão dentro dos grupos, por si só, não favorece a detecção de diferenças entre médias.

5.1.1 Condições que precisamos examinar

A ANOVA clássica de grupos independentes usa um modelo com erros independentes, distribuição normal para a inferência exata e variância comum entre os grupos. Examine o desenho do estudo, os resíduos, os gráficos por grupo e possíveis valores influentes. A verificação não se resume a testar se a coluna inteira de notas é normal.

A ANOVA de Welch permite variâncias diferentes entre os grupos. Isso não corrige dependência entre observações nem torna a análise imune a valores extremos. Para medidas repetidas das mesmas pessoas, a estrutura do problema exige outro modelo; não empilhe notas anteriores e posteriores como se viessem de pessoas distintas.

5.2 ANOVA de um fator no jamovi

Desative os filtros usados no capítulo anterior e confira que o banco possui 18 pessoas, seis em cada grupo.

1. Acesse **Análises** → **ANOVA** → **ANOVA de um fator (One-Way ANOVA)**.
2. Mova `depois` para as variáveis dependentes e `grupo` para a variável de agrupamento.
3. Solicite descritivas e o gráfico por grupo. Confira os valores da tabela 3.1.
4. Escolha a versão clássica, identificada como **Fisher**, ou a versão **Welch**, de acordo com a análise planejada. O painel pode oferecer ambas; identifique qual resultado está relatando.
5. Examine o gráfico Q-Q dos resíduos e a avaliação de homogeneidade, quando solicitados.

As opções dessa análise, incluindo Welch e os procedimentos de comparação entre pares, constam na documentação oficial (The jamovi project, 2026p).

5.2.1 Conferindo o exemplo clássico

Nos dados fictícios, a soma de quadrados entre grupos é aproximadamente 341,444 e a soma de quadrados dentro dos grupos é 915. Com três grupos e 18 observações, os graus de liberdade são 2 e 15. Portanto,

$$F = \frac{341{,}444/2}{915/15} \approx 2{,}799.$$

O resultado clássico é $F(2,15) \approx 2{,}799$, $p \approx 0{,}093$. Com $\alpha = 0{,}05$, não rejeitamos a igualdade das médias nesse teste. As médias amostrais são distintas, mas a informação disponível não permite declarar uma diferença populacional segundo a regra escolhida.

Para a versão de Welch, você deve encontrar aproximadamente $F = 2{,}652$ e $p = 0{,}119$. Os graus de liberdade do denominador são aproximados e diferem dos da ANOVA clássica. Nenhum dos resultados demonstra que as três atividades sejam equivalentes.

5.3 Comparações múltiplas

O teste global não identifica quais pares diferem. Quando comparações entre pares fizerem parte do plano de análise, precisamos considerar o problema da multiplicidade: realizar muitos testes sem ajuste aumenta a possibilidade de obter ao menos uma rejeição indevida.

No painel de comparações posteriores, o jamovi oferece **Tukey** para comparações com suposição de variâncias iguais e **Games–Howell** quando essa igualdade não é assumida (The jamovi project, 2026p). Leia a diferença de médias e a direção da comparação, além do valor de p ajustado. Um intervalo que inclua zero, quando produzido com o mesmo procedimento e nível, indica a incerteza correspondente àquela comparação.

No nosso exemplo, uma comparação Leitura menos Oficina por Tukey produz diferença de aproximadamente $-10{,}67$ pontos e p ajustado de 0,077. Essa comparação está apresentada apenas para praticar a leitura da saída: não selecione o par com o menor valor de p e omita os demais. Contrastes definidos antes da coleta e explorações posteriores devem ser identificados no relatório.

5.4 Magnitude e relato do resultado

Para a ANOVA clássica de um fator, uma medida descritiva da magnitude é:

$$\eta^2 = \frac{SQ_{\text{entre}}}{SQ_{\text{total}}}.$$

No exemplo, $SQ_{\text{total}} = 341{,}444 + 915$ e $\eta^2 \approx 0{,}272$. Essa é uma razão calculada sobre a amostra e o modelo; ela não indica que o método de ensino causou 27,2% da variação das notas. Não transplante esse cálculo para a estatística de Welch como se fosse a mesma decomposição de somas de quadrados.

Um relato possível é: "Nas 18 observações fictícias, as médias posteriores foram 59,17, 64,67 e 69,83 pontos para Leitura, Vídeo e Oficina. A ANOVA clássica de um fator resultou em $F(2, 15) = 2{,}80$, $p = 0{,}093$. O exemplo não forneceu evidência suficiente para rejeitar a igualdade das médias ao nível de 5%." Em um trabalho real, acrescente os diagnósticos, as estimativas de interesse e a justificativa da análise escolhida.

Dica de Conteúdo

ANOVA de grupos independentes, ANOVA de medidas repetidas e modelos com mais de um fator respondem a estruturas diferentes. Antes de adicionar fatores ou medidas, desenhe quem foi observado, quantas vezes e em quais condições. A organização do banco deve acompanhar esse desenho.

5.5 Contrastes planejados e comparações posteriores

Vamos distinguir duas perguntas. “Quais pares de atividades apresentam diferenças?” conduz ao conjunto de comparações entre pares. “A média de Vídeo e Oficina difere da média de Leitura?” corresponde a um contraste específico. Para a segunda pergunta, podemos escrever:

$$C = -\mu_{\text{Leitura}} + \tfrac{1}{2}\mu_{\text{Video}} + \tfrac{1}{2}\mu_{\text{Oficina}}.$$

Os pesos somam zero. Nos dados da apostila, a estimativa é $-59{,}167 + (64{,}667 + 69{,}833)/2 \approx 8{,}083$ pontos. Aqui estamos comparando médias de grupos com pesos definidos, e não juntando arbitrariamente todas as pessoas de duas categorias em uma única categoria.

A escolha do contraste deve acompanhar a pergunta substantiva. Se houver várias perguntas, planeje o controle de multiplicidade; chamar uma análise de “planejada” não elimina automaticamente esse problema. No painel geral de **ANOVA**, o jamovi oferece contrastes e comparações posteriores; confira a ordem dos níveis e a definição do contraste selecionado antes de atribuir significado ao coeficiente (The jamovi project, 2026b).

5.6 ANOVA fatorial: duas características no mesmo modelo

No arquivo `exemplo_fatorial.csv`, vamos estudar uma nota `pontos` segundo dois fatores: `formato`, com níveis Texto e Vídeo, e `pratica`, com níveis Não e Sim. Há seis pessoas fictícias independentes por combinação, totalizando 24. Cada pessoa ocupa somente uma célula do desenho 2×2.

Tabela 5.1: Médias do exemplo fatorial, em pontos

Formato	Sem prática	Com prática	Diferença
Texto	60	64	4
Vídeo	65	79	14

O **efeito principal** de um fator resume uma comparação entre seus níveis no modelo. Já a **interação** pergunta se a diferença associada a um fator varia conforme o nível do outro. Neste exemplo, a diferença com prática menos sem prática é de 4 pontos no Texto e de 14 no Vídeo. A diferença entre essas diferenças é $14 - 4 = 10$ pontos.

Um modelo com os dois fatores e sua interação pode ser escrito como:

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}.$$

Os índices i e j identificam os níveis dos fatores, e k identifica pessoas distintas em uma célula. O termo de interação permite que os perfis das médias não sejam paralelos.




Figura 5.1: Interação no banco fictício: a diferença entre as condições de prática varia com o formato. As linhas ligam médias de pessoas diferentes; não são trajetórias individuais. Elaboração própria.

5.6.1 Configurando no jamovi

1. Abra `exemplo_fatorial.csv`. Configure `pontos` como contínua, `formato` e `pratica` como nominais, e `id` como identificador.
2. Acesse **Análises** → **ANOVA** → **ANOVA**. Use o painel geral, em vez do painel de um fator.
3. Coloque `pontos` na variável dependente e os dois fatores em **Fatores fixos (Fixed Factors)**.
4. Em **Modelo (Model)**, confira os termos `formato`, `pratica` e a interação `formato × pratica`.
5. Solicite descritivas, diagnósticos dos resíduos e η^2 parcial. Em **Médias marginais estimadas (Estimated Marginal Means)**, acrescente a combinação dos dois fatores e seu gráfico.

A documentação oficial apresenta os termos de modelo, os tipos de somas de quadrados e as opções de médias marginais (The jamovi project, 2026b). No desenho balanceado deste exemplo, as médias de cada célula coincidem com suas médias ajustadas no modelo completo. Essa coincidência não deve ser presumida em todo banco com tamanhos desiguais ou covariáveis.

5.6.2 Conferindo e interpretando a interação

A soma de quadrados residual é 280, com 20 graus de liberdade, portanto $QM_{\text{erro}} = 14$. A interação tem soma de quadrados 150 e um grau de liberdade:

$$F_{\text{interacao}} = \frac{150/1}{280/20} = 10{,}714, \qquad p \approx 0{,}0038.$$

O tamanho de efeito parcial é:

$$\eta_p^2 = \frac{SQ_{\text{interacao}}}{SQ_{\text{interacao}} + SQ_{\text{erro}}} = \frac{150}{150 + 280} \approx 0{,}349.$$

O denominador dessa medida é diferente do denominador de η^2 calculado sobre a soma de quadrados total. Identifique qual medida aparece no relato.

As diferenças amostrais de 4 e 14 pontos ajudam a explicar o resultado. Não basta escrever que "a prática melhora a nota" ignorando o formato. Também não podemos concluir uma interação apenas porque uma comparação separada foi significativa e outra não: a comparação entre os efeitos precisa ser testada diretamente. Quando forem de interesse, especifique os efeitos simples e o ajuste das comparações correspondentes.

Um relato possível é: "No exemplo fictício balanceado, o modelo incluiu formato, prática e sua interação. A interação apresentou $F(1, 20) = 10{,}71$, $p = 0{,}0038$, $\eta_p^2 = 0{,}349$. As diferenças com prática menos sem prática foram 4 pontos em Texto e 14 em Vídeo." Em dados reais, acrescente os intervalos das comparações, os diagnósticos e o desenho de obtenção dos dados.

5.7 ANOVA de medidas repetidas

Agora vamos mudar a unidade do problema. Em `exemplo_medidas_repetidas.csv`, as mesmas 12 pessoas possuem notas em três momentos: inicial, final e seguimento. Cada linha contém uma pessoa, e as três colunas são suas medidas. Esse é o **formato largo**, utilizado pelo painel de medidas repetidas do jamovi (The jamovi project, 2026u).

A pergunta inicial é se as médias populacionais são iguais ao longo dos três momentos. Nesta primeira análise, vamos considerar somente o fator intrassujeitos **Tempo**, sem incluir a coluna `grupo`. Temos 12 pessoas, e não 36 unidades independentes.

5.7.1 Organizando fatores e células

1. Acesse **Análises → ANOVA → ANOVA de medidas repetidas (Repeated Measures ANOVA)**.
2. Em **Fatores de medidas repetidas (Repeated Measures Factors)**, crie `Tempo`, com três níveis: Inicial, Final e Seguimento.
3. Nas **Células de medidas repetidas (Repeated Measures Cells)**, associe as colunas `inicial`, `final` e `seguimento`, nessa ordem.
4. Deixe vazio o campo de fatores entre sujeitos nesta etapa. Solicite descritivas, gráfico das médias, avaliação de esfericidade e correções de Greenhouse–Geisser e Huynh–Feldt.
5. Confira o número de pessoas com medidas completas. Observe como a exclusão de uma pessoa com dado ausente em uma ocasião pode afetar toda a análise.

Os campos de fatores, células e correções são descritos na referência oficial da análise (The jamovi project, 2026u). As médias do banco são aproximadamente 53,667, 59,833 e 62,333 pontos. São descrições por ocasião; a inferência precisa considerar a dependência dentro de cada pessoa.

5.7.2 Esfericidade e graus de liberdade

Para três ou mais níveis do fator intrassujeitos, a inferência univariada usual considera a **esfericidade**: as variâncias das diferenças entre cada par de ocasiões devem ser iguais. Neste exemplo, estamos falando das variâncias de Final menos Inicial, Seguimento menos Inicial e Seguimento menos Final. A condição não se resume à igualdade das variâncias de cada coluna isolada.

O teste de Mauchly investiga essa condição, mas um valor de p grande, especialmente com poucas pessoas, não a comprova. As correções de Greenhouse–Geisser e Huynh–Feldt ajustam os graus de liberdade por um fator ε. Com três ocasiões, um resultado que antes usava $gl_1 = 2$ e $gl_2 = 22$ passa a usar 2ε e 22ε. Na correção usual, o valor de F permanece igual e seu valor de p é recalculado com esses graus de liberdade (The jamovi project, 2026u).

Sem fator entre pessoas e **sem correção de esfericidade**, o cálculo do exemplo produz $F(2, 22) \approx 37{,}052$, $p < 0{,}001$. Esse número serve para conferir a configuração inicial. Não é uma recomendação de ignorar a esfericidade: no relato, identifique a correção escolhida, o ε, os graus de liberdade e o valor de p correspondentes.

Se a pergunta envolver quais momentos diferem, acrescente comparações pareadas com ajuste de multiplicidade. Uma diferença global entre momentos não garante diferença em todos os pares, nem identifica sozinha quando ocorreu a mudança.

5.8 ANOVA mista: tempo e grupos

A coluna grupo divide as 12 pessoas em Leitura e Prática, com seis em cada. Agora podemos formular outra pergunta: **o perfil de mudança ao longo do tempo difere entre os grupos?** O tempo é um fator intrassujeitos; o grupo é um fator entre sujeitos.

No mesmo painel de medidas repetidas, mantenha as três células de Tempo e adicione grupo em **Fatores entre sujeitos (Between Subjects Factors)**. Confira no modelo Tempo, grupo e Tempo × grupo e solicite o gráfico das médias por combinação. A documentação oficial apresenta essa configuração como ANOVA mista (The jamovi project, 2026n).

Leia os termos separadamente: Tempo resume a variação entre ocasiões no modelo; grupo resume a comparação entre grupos; a interação Tempo × grupo examina a diferença entre os perfis temporais. Comparar dois valores de p obtidos em análises independentes de cada grupo não substitui essa interação. Além disso, adicionar grupo muda o modelo e os termos de erro: não reutilize os graus de liberdade e o valor de p do exemplo de um único fator.

A expressão "mista" aqui identifica a combinação de fatores intra e entre sujeitos no desenho.

Modelos lineares mistos com estruturas de efeitos aleatórios e covariância oferecem outras possibilidades, especialmente em dados longitudinais mais complexos, mas exigem uma especificação adicional. A ANOVA tradicional de medidas repetidas não resolve automaticamente perdas, ocasiões irregulares ou agrupamentos em turmas.

5.9 ANCOVA: comparando grupos com uma covariável

Voltemos a `exemplo_notas.csv`. Podemos modelar a nota posterior segundo o grupo e a nota anterior. A nota anterior é uma **covariável contínua**; a pergunta passa a ser sobre diferenças médias entre grupos **condicionais ao valor dessa covariável no modelo**.

1. Abra **Análises** → **ANOVA** → **ANCOVA**.
2. Use `depois` como resposta, `grupo` como fator fixo e `antes` como covariável.
3. Confira no modelo os termos de grupo e nota anterior. Examine a relação entre nota anterior e posterior em cada grupo, os resíduos e o suporte dos valores da covariável.
4. Solicite médias marginais estimadas por grupo. Identifique o valor da covariável usado nessas estimativas; elas não são necessariamente as médias brutas dos grupos.

A documentação oficial descreve o painel de ANCOVA, seus termos de modelo e médias marginais (The jamovi project, 2026a). No modelo aditivo, a inclinação da covariável é comum aos grupos. Se a pergunta ou o diagnóstico indicar que a relação varia entre eles, considere o termo grupo × nota anterior e interprete as comparações em valores relevantes da covariável, em vez de resumir tudo em uma diferença única.

A covariável precisa fazer sentido no estudo. Ajustar por uma variável medida depois de uma intervenção pode mudar a pergunta e introduzir dificuldades de interpretação. Acrescentar a nota anterior também não corrige automaticamente seleção de participantes, erro de medida ou diferenças não observadas entre grupos. Com apenas seis pessoas por grupo, nosso exemplo serve para aprender a configuração e exige especial cuidado com a incerteza.

5.10 Kruskal–Wallis e Friedman

Para mais de dois grupos independentes, o jamovi oferece **ANOVA de um fator não paramétrica (One-Way ANOVA, Non-parametric)**, com o teste de Kruskal–Wallis. Abra `exemplo_notas.csv`, use `depois` como resposta e `grupo` como agrupamento (The jamovi project, 2026q). O teste usa postos conjuntos e exige independência entre as unidades; não é uma ANOVA de médias executada sobre qualquer dado que falhou em um teste de normalidade.

Sob a hipótese nula usual, os grupos têm a mesma distribuição. Uma interpretação exclusivamente como diferença de localização ou medianas precisa de condições adicionais sobre as formas das distribuições. Se solicitar comparações posteriores, identifique o procedimento e o ajuste efetivamente exibidos na saída. O teste global não informa quais pares diferem.

Para três ou mais condições pareadas, o painel de **ANOVA de medidas repetidas não paramétrica (Repeated Measures ANOVA, Non-parametric)** oferece Friedman. Use as colunas `inicial`, `final` e `seguimento`, nessa ordem, sem inserir o identificador como uma quarta medida (The jamovi project, 2026v).

Friedman organiza os postos **dentro de cada pessoa**. Nos 12 conjuntos completos do nosso banco, o cálculo resulta em $\chi^2(2) \approx 20{,}667$, com $p < 0{,}001$ pela aproximação qui-quadrado. Esse procedimento de um fator não incorpora a comparação entre os dois grupos como uma ANOVA mista. Se o interesse principal for a interação entre grupo e tempo, trocar toda a pergunta por Friedman perde essa parte do desenho.

5.11 Vamos praticar: perguntas e comentários

1. Na tabela 5.1, calcule a diferença com prática menos sem prática em cada formato e a diferença entre essas diferenças.
2. No banco longitudinal, três colunas e 12 linhas significam 36 pessoas independentes? Qual é a unidade que precisamos preservar?
3. Uma correção de Greenhouse–Geisser foi selecionada. Podemos relatar o valor de p corrigido com os graus de liberdade não corrigidos?
4. Após ajustar uma ANCOVA, as médias marginais precisam coincidir com as médias brutas?

Comentários das respostas

1. Texto: $64 - 60 = 4$; Vídeo: $79 - 65 = 14$; diferença entre diferenças: $14 - 4 = 10$ pontos. Esse contraste explica a interação do exemplo.
2. Não. São 12 pessoas, cada uma com três medidas. Precisamos preservar o conjunto de medidas da mesma pessoa.
3. Não. Informe o F, os graus de liberdade e o valor de p da mesma versão da inferência, além da correção empregada.
4. Não. São estimativas do modelo em uma configuração definida das covariáveis; a configuração precisa acompanhar sua interpretação.

Capítulo 6

Regressão Linear

A regressão linear estuda a relação entre uma resposta contínua e uma ou mais variáveis explicativas. Na regressão simples, usamos um preditor; na múltipla, usamos vários. Vamos começar pela relação entre horas de estudo e nota posterior no arquivo fictício `exemplo_notas.csv`.

A pergunta desta seção é: como a nota média se relaciona com as horas de estudo **no modelo ajustado**? Ela não é equivalente a perguntar quanto a nota de uma pessoa aumentaria se ela fosse obrigada a estudar uma hora a mais. A segunda pergunta envolve uma interpretação causal que a reta, isoladamente, não fornece.

6.1 Correlação e regressão

A correlação de Pearson resume a direção e a intensidade da associação linear entre duas variáveis. Ela é simétrica: trocar a ordem das variáveis não muda o coeficiente. Já a regressão distingue uma resposta de seus preditores e expressa uma relação nas unidades dessas variáveis.

O jamovi oferece Pearson, Spearman e Kendall na **Matriz de correlação (Correlation Matrix)**, no grupo de análises de **Regressão**. Solicite o número de casos e intervalos quando forem pertinentes (The jamovi project, 2026f). Spearman trabalha com postos e pode descrever associações monotônicas; não é simplesmente um botão que resolve qualquer dificuldade de distribuição ou de desenho.

Uma correlação de Pearson próxima de zero não exclui toda relação possível: duas variáveis podem ter uma associação curva e correlação linear pequena. Por isso, examine um gráfico de dispersão antes de resumir a relação em um único coeficiente.

6.2 O modelo de uma reta

Escrevemos o modelo simples como:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i.$$

Aqui, Y_i é a nota da pessoa i, X_i é o número de horas de estudo, β_0 é o intercepto e β_1 é a inclinação. O termo ε_i representa a parte da resposta não descrita pela média condicional modelada.

Depois do ajuste, usamos coeficientes estimados e obtemos uma previsão da média, $\widehat{Y_i} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1} X_i$. O resíduo é a diferença entre o observado e o ajustado: $e_i = Y_i - \widehat{Y_i}$. O método dos mínimos quadrados escolhe os coeficientes que minimizam a soma dos quadrados desses resíduos (NIST/SEMATECH, 2026d).

6.3 Ajustando a regressão no jamovi

1. Abra `exemplo_notas.csv` e desative os filtros. Confira que as colunas `horas` e `depois` estão como contínuas.
2. Acesse **Análises** → **Regressão** → **Regressão linear (Linear Regression)**.
3. Atribua `depois` à **Variável dependente (Dependent Variable)** e `horas` às **Covariáveis (Covariates)**. Mantenha o intercepto no modelo.
4. Solicite o intervalo de confiança dos coeficientes e examine as medidas de ajuste. Nos diagnósticos, peça o gráfico Q-Q dos resíduos e os gráficos de resíduos.

As opções de coeficientes, ajuste, resíduos e medidas de influência são documentadas pelo projeto jamovi (The jamovi project, 2026l). Os nomes de algumas opções podem aparecer em inglês mesmo quando outros menus estão traduzidos.

6.3.1 Conferindo a equação e as unidades

O ajuste aos 18 casos fictícios resulta aproximadamente em:

$$\widehat{\text{nota posterior}} = 49{,}764 + 5{,}221 \times \text{horas}.$$

No modelo simples, uma hora adicional está associada a um aumento de aproximadamente 5,22 pontos na nota média ajustada. O coeficiente tem unidade de pontos por hora. Para três horas, a previsão da média é aproximadamente 65,43 pontos.

O intercepto é a previsão quando `horas` vale zero. Como o banco contém apenas valores de uma a cinco horas, sua interpretação prática em zero exige extrapolação. Não confunda a existência de um intercepto na equação com evidência observada sobre pessoas que estudaram zero horas.




Figura 6.1: Regressão simples de nota posterior em horas de estudo. Pontos e reta calculados a partir do CSV da apostila; elaboração própria.

6.3.2 O que o R quadrado informa

Para esse ajuste com intercepto, $R^2 \approx 0{,}705$. Isso significa que a reta descreve cerca de 70,5% da soma de quadrados da variação observada das notas em torno da média amostral. Não significa que ela acerte 70,5% das pessoas nem que as horas tenham causado essa fração das notas.

Ao acrescentar preditores, o R^2 do ajuste por mínimos quadrados não diminui, mesmo quando a nova variável acrescenta pouco conhecimento. Por isso, examine também a pergunta, a incerteza dos coeficientes, o número de parâmetros, o R^2 ajustado e os diagnósticos. Um modelo mais complexo não é automaticamente mais útil.

6.4 Resíduos, pressupostos e limites

Nos gráficos de resíduos, procure padrões que contrariem o modelo: uma curva pode sugerir forma funcional inadequada; um formato de funil pode indicar variância que muda ao longo dos valores ajustados. O gráfico Q-Q ajuda a examinar a aproximação normal dos erros usada na inferência usual. Essa suposição não exige que o próprio preditor `horas` tenha distribuição normal.

A independência dos erros também precisa ser justificada pelo desenho. Notas repetidas da mesma pessoa, pessoas da mesma turma ou medições ao longo do tempo podem exigir uma estrutura que a regressão simples não contempla. As ferramentas de diagnóstico não substituem esse conhecimento sobre a coleta.

Observe possíveis casos influentes e confira os registros originais. Um ponto pode ser extremo em uma variável e não ter grande influência sobre a reta, ou pode mudar bastante o ajuste. Não exclua casos apenas para aumentar R^2 ou diminuir o valor de p.

6.5 Regressão múltipla: incluindo a nota anterior

Vamos continuar com as mesmas 18 pessoas e incluir `antes` junto com `horas`. A pergunta agora é como a nota posterior se relaciona com horas de estudo **para um mesmo valor de nota anterior no modelo**. Escrevemos:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \,\text{horas}_i + \beta_2 \,\text{antes}_i + \varepsilon_i.$$

A expressão "para um mesmo valor" descreve uma comparação condicional do modelo. Não significa que tenhamos observado duas versões da mesma pessoa, uma estudando mais e outra menos, nem que tenhamos controlado todas as diferenças relevantes entre participantes.

6.5.1 Configurando e conferindo os coeficientes

No painel de **Regressão linear**, mantenha `depois` na variável dependente e acrescente `antes` em **Covariáveis**, junto com `horas`. Confira os dois termos no modelo, mantenha o intercepto e solicite coeficientes não padronizados, IC95%, R^2 ajustado e diagnósticos (The jamovi project, 2026l).

A equação estimada é aproximadamente:

$$\widehat{Y} = 20{,}502916 + 3{,}443600\,\text{horas} + 0{,}663789\,\text{antes}.$$

Para uma pessoa com três horas e nota anterior 52, a média ajustada é aproximadamente $20{,}502916 + 3{,}443600 \times 3 + 0{,}663789 \times 52 \approx 65{,}35$ pontos, usando os coeficientes antes do arredondamento.

Tabela 6.1: Coeficientes do modelo múltiplo nos dados fictícios

Termo	Estimativa	Limite inferior	Limite superior
Intercepto	20,503	−26,608	67,614
Horas	3,444	0,103	6,784
Nota anterior	0,664	−0,398	1,725

Os limites são de IC95% com a inferência t usual e 15 graus de liberdade residuais. A inclinação de horas era 5,221 no modelo simples e passou a 3,444 no múltiplo. Não são estimativas da mesma comparação: a segunda considera a nota anterior incluída no modelo. O intervalo amplo também mostra que a inclinação não deve ser tratada como uma quantidade conhecida com precisão.

O intercepto corresponde a horas e nota anterior iguais a zero. Como essa combinação está fora do suporte observado, ele participa da equação sem ter uma interpretação substantiva imediata. Para facilitar a leitura, podemos criar `horas_c = horas - 3` e `antes_c = antes - 52` nas variáveis calculadas e ajustar o mesmo modelo aditivo. O novo intercepto será a previsão em três horas e nota anterior 52; as inclinações e os valores ajustados permanecem iguais.

6.5.2 R quadrado ajustado e comparação de modelos

O modelo múltiplo apresenta $R^2 \approx 0{,}736$ e $R^2_{\text{ajustado}} \approx 0{,}701$. Com q preditores numéricos linearmente independentes, além do intercepto, o ajuste usual é:

$$R^2_{\text{ajustado}} = 1 - (1 - R^2)\frac{n-1}{n-q-1}.$$

Se um fator precisar de vários coeficientes, cada coluna independente correspondente entra na contagem de parâmetros. Contar apenas os nomes das variáveis pode produzir um denominador incorreto.

Para examinar o acréscimo da nota anterior, crie dois blocos no painel de modelo: no primeiro, `horas`; no segundo, acrescente `antes`, mantendo horas. Solicite a comparação dos modelos (The jamovi project, 2026l). São modelos **aninhados**: o modelo menor é um caso particular do maior quando o coeficiente adicional vale zero.

Com os mesmos 18 casos em ambos, o acréscimo resulta em $F(1,15) \approx 1{,}777$, $p \approx 0{,}202$. O aumento de R^2 não basta para declarar ganho convincente segundo esse teste. Se existissem ausentes em `antes`, precisaríamos conferir se os modelos usaram a mesma amostra; comparar ajustes de pessoas diferentes pode misturar mudanças do modelo e mudanças do banco.

Uma variável pode ser mantida por sua função no desenho ou na pergunta, mesmo sem um valor de p pequeno. Evite escolher automaticamente todas as combinações possíveis e apresentar a melhor como se tivesse sido definida antes da análise. Com poucas observações, a escolha e a avaliação no mesmo banco favorecem resultados excessivamente otimistas.

6.6 Preditores categóricos e categorias de referência

A variável `grupo` tem três níveis e deve entrar em **Fatores**. Não a codifique como 1, 2 e 3 em **Covariáveis**: essa codificação imporia uma ordem e um espaçamento numérico que não fazem parte da definição das atividades.

Usando Leitura como referência e uma codificação indicadora, um modelo com horas e grupo tem a forma:

$$\widehat{Y} = b_0 + b_1\,\text{horas} + b_2 I(\text{Video}) + b_3 I(\text{Oficina}).$$

Cada indicador vale 1 quando a pessoa pertence à categoria e 0 caso contrário. Assim, b_2 compara Vídeo com Leitura em um mesmo valor de horas, sob o modelo aditivo. b_3 compara Oficina com Leitura. Não existe um coeficiente adicional para Leitura porque sua posição está representada pelo intercepto e pelas referências.

No jamovi, confira o campo de **Níveis de referência (Reference Levels)** e os rótulos dos contrastes na tabela (The jamovi project, 2026l). Alterar a referência muda os coeficientes e seus significados, mas não muda as previsões de um mesmo modelo com todas as categorias represen-

tadas. Se o interesse for Oficina versus Vídeo, formule essa comparação diretamente; não conclua diferença entre elas apenas por terem valores de p distintos em relação à Leitura.

6.6.1 Quando acrescentar uma interação

Um modelo somente aditivo supõe uma inclinação de horas comum aos grupos. Acrescentar horas × grupo permite inclinações diferentes. Nesse caso, o coeficiente de horas se refere à categoria de referência, e os coeficientes de interação descrevem diferenças de inclinação em relação a ela.

A centralização ajuda a escolher em qual valor de horas as diferenças entre grupos serão avaliadas: se usarmos horas menos 3, os termos de grupo se referem a três horas. Isso facilita a interpretação, mas não cria informações novas. Com seis pessoas por grupo, acrescentar várias interações produz estimativas incertas; use o desenho e a pergunta para justificar cada termo.

6.7 Colinearidade, influência e análise de sensibilidade

Quando preditores carregam informações muito parecidas, seus coeficientes condicionais podem ficar imprecisos. Uma ferramenta é o fator de inflação da variância:

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2},$$

em que R_j^2 vem de uma regressão do preditor j nos demais preditores, com intercepto. No modelo com horas e nota anterior, ambos os VIFs são aproximadamente 3,614. O número indica quanto a variância do coeficiente é inflada por essa relação, comparada à situação de ausência de colinearidade, mantendo as demais condições do cálculo.

Solicite **Estatísticas de colinearidade (Collinearity Statistics)** e a avaliação de influência, incluindo distância de Cook, no painel de regressão (The jamovi project, 2026l). Nenhum ponto de corte deve operar como ordem automática de exclusão. Uma variável necessária para definir a pergunta não deve ser retirada apenas para reduzir um VIF.

A alavancagem identifica posições pouco usuais no espaço dos preditores; um resíduo grande identifica afastamento da resposta em relação ao ajustado. A influência combina a posição e a capacidade de alterar o ajuste. Se encontrar uma observação influente, confira o registro, sua elegibilidade e sua relação com a população de interesse. Quando justificado, compare análises com e sem ela como sensibilidade e relate ambas. Não apague uma observação válida somente porque sua retirada produz significância.

6.8 Estimar uma média e prever uma pessoa

Retomemos o modelo **simples**, com apenas horas. Para três horas, a média ajustada é 65,426 pontos. Sob a inferência usual do modelo, o IC95% dessa média é aproximadamente [63,002; 67,849]. Já o intervalo de predição de 95% para uma **nova observação individual**, com três horas, é aproximadamente [54,938; 75,913].

O segundo intervalo é mais largo porque inclui a variação individual em torno da média. Na regressão simples, o erro padrão da média estimada em x_0 é:

$$s\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{\sum_i (x_i-\bar{x})^2}},$$

enquanto o erro padrão para uma nova observação acrescenta 1 dentro da raiz:

$$s\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{\sum_i (x_i-\bar{x})^2}}.$$

Aqui, s é o desvio padrão residual, estimado com $n-2$ graus de liberdade. Os limites usam o quantil t correspondente. A documentação oficial de `predict.lm` distingue intervalos de confiança e de predição (R Core Team, 2026e); os valores acima foram calculados sobre o CSV, sem pressupor a presença de um botão específico de intervalo individual na interface.

Esses intervalos dependem das condições do modelo e se referem a uma nova observação comparável às do estudo. Um ajuste bom no próprio banco não demonstra desempenho em novas pessoas. Para uma finalidade preditiva real, planeje avaliação fora dos dados usados para ajustar e escolher o modelo. Evite extrapolações e confira se as previsões respeitam os limites substantivos da variável, como uma nota entre 0 e 100.

6.9 Como relatar a regressão

Um relato do exemplo múltiplo pode começar assim: “Nas 18 observações fictícias, ajustou-se uma regressão linear da nota posterior segundo horas de estudo e nota anterior. A inclinação de horas foi 3,44 pontos por hora, IC95% [0,10; 6,78], condicional à nota anterior no modelo. O ajuste apresentou $R^2 = 0{,}736$ e R^2 ajustado de 0,701.” Acrescente o objetivo, os diagnósticos, o tratamento dos ausentes e os limites da interpretação.

Se forem usados fatores ou interações, informe as referências e o valor dos demais preditores para cada comparação. Para uma aplicação preditiva, apresente como o desempenho foi avaliado e qual incerteza acompanha uma previsão individual. A equação final precisa permitir ao leitor reconhecer qual modelo foi realmente ajustado.

6.10 Vamos praticar: perguntas e comentários

1. Use a equação múltipla para estimar a média com três horas e nota anterior 52. O resultado é uma nota garantida para uma pessoa?
2. Por que a inclinação de horas pode mudar de 5,221 para 3,444 quando acrescentamos a nota anterior?
3. Podemos lançar Leitura, Vídeo e Oficina como 1, 2 e 3 em uma covariável sem mudar a pergunta?
4. Qual intervalo é apropriado para expressar a incerteza de uma nova nota individual: o da média ou o de predição?

Comentários das respostas

1. Aproximadamente 65,35 pontos. É uma estimativa de média condicional, não uma garantia individual.
2. Os coeficientes descrevem comparações diferentes: marginal em relação à nota anterior no modelo simples e condicional a ela no múltiplo. A relação entre os preditores participa dessa mudança.
3. Não. Essa codificação impõe uma relação linear entre códigos numéricos. Para categorias sem essa estrutura, use Fatores e identifique a referência.
4. O intervalo de predição individual, que incorpora a dispersão das novas observações além da incerteza da média estimada.

Capítulo 7

Análise de Dados Categóricos

Variáveis categóricas organizam observações em grupos, como meio de transporte, atividade realizada ou resposta sim/não. Neste capítulo, vamos construir uma tabela de contingência, comparar porcentagens e examinar a associação entre duas variáveis nominais. Depois, avançaremos para proporções, respostas pareadas e regressão logística binária. O ponto de partida é saber se cada linha do banco representa uma pessoa, um par de medidas ou uma contagem agregada.

7.1 Tabela de contingência e denominadores

O arquivo `dados/exemplo_frequencias.csv` contém quatro linhas que resumem **100 observações fictícias independentes**. A coluna `frequencia` informa quantas observações pertencem a cada combinação de `grupo` e `resultado`.

Tabela 7.1: Contagens fictícias para praticar a análise de associação

Grupo	Sim	Não	Total
A	30	20	50
B	15	35	50
Total	45	55	100

Entre as 50 observações do grupo A, 30/50 = 60% têm resultado Sim. No grupo B, são 15/50 = 30%. Essas são **porcentagens por linha**. Já 30/45 ≈ 66,7% responde a outra pergunta: entre todos os resultados Sim, qual fração pertence ao grupo A? Essa é uma porcentagem por coluna. Indique o denominador em tabelas, figuras e texto.




Figura 7.1: Composição percentual dentro de cada grupo; cada barra representa 100% de sua linha. Elaboração própria.

7.2 Configurando a tabela no jamovi

1. Abra o CSV e configure `grupo` e `resultado` como nominais. A coluna `frequencia` contém contagens inteiras.
2. Acesse **Análises** → **Frequências (Frequencies)** → **Tabelas de contingência (Contingency Tables)** → **Amostras independentes (Independent Samples)**.
3. Atribua `grupo` a **Linhas (Rows)**, `resultado` a **Colunas (Columns)** e `frequencia` a **Contagens (Counts)**.
4. Solicite as contagens observadas, as esperadas e as porcentagens por linha. Confira que o total é 100.

A documentação oficial descreve o uso de uma coluna de contagens e as opções para porcentagens, qui-quadrado, Fisher e medidas de associação (The jamovi project, 2026d). Se cada linha do seu banco representar uma única pessoa, deixe **Contagens** vazio: não use o identificador da pessoa como peso.

Dica de Conteúdo

As quatro linhas do arquivo não são quatro participantes. Sem atribuir `frequencia` ao campo de contagens, você analisará combinações de categorias em vez das 100 observações resumidas. Sempre confira os totais antes de interpretar o teste.

7.3 Teste qui-quadrado de independência

A hipótese nula afirma que as duas variáveis são independentes na população modelada. Para cada célula, calculamos uma frequência esperada sob essa hipótese:

$$E_{ij} = \frac{(\text{total da linha } i)(\text{total da coluna } j)}{n}.$$

Na célula A/Sim, o valor esperado é $50 \times 45/100 = 22{,}5$. Na célula A/Não, é 27,5. Os mesmos valores esperados se repetem na linha B, porque os dois totais de linha são iguais.

A estatística de Pearson compara contagens observadas O_{ij} e esperadas E_{ij}:

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}, \qquad gl = (r-1)(c-1),$$

em que r e c são o número de linhas e colunas. Para nossa tabela 2×2, selecione o qui-quadrado de Pearson **sem correção de continuidade**. Você deve encontrar aproximadamente $\chi^2(1) = 9{,}091$ e $p = 0{,}00257$. Se selecionar a correção de continuidade, o resultado numérico será outro; identifique a opção usada.

No exemplo, os percentuais observados diferem e o teste é incompatível com a independência ao nível de 5%, sob as condições consideradas. O teste não estabelece que pertencer ao grupo A cause o resultado Sim.

7.3.1 Quando examinar Fisher e a estrutura do estudo

A aproximação qui-quadrado exige atenção às frequências **esperadas**, não apenas ao tamanho total ou à presença de uma contagem observada pequena. Em tabelas 2×2 com frequências esperadas muito baixas, considere o teste exato de Fisher e justifique o procedimento. Para a tabela da apostila, Fisher bilateral produz aproximadamente $p = 0{,}00464$; esse valor não precisa coincidir com o de Pearson.

Cada observação precisa contribuir de modo compatível com a hipótese de independência. Se a mesma pessoa responde antes e depois a uma pergunta binária, os registros são pareados. O teste de McNemar trata uma pergunta desse tipo; a tabela de grupos independentes discutida aqui não é uma substituição adequada.

7.4 Magnitude da associação

O valor de p não quantifica o tamanho da associação. Uma opção para tabelas nominais é o V de Cramér:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \min(r-1, c-1)}}.$$

No exemplo, $V = \sqrt{9{,}091/100} \approx 0{,}302$. A medida não indica a direção da associação; para compreendê-la, examine os percentuais da tabela. Sua importância depende também da pergunta e do contexto.

7.4.1 Razão de chances não é razão de probabilidades

Para um resultado com probabilidade p, a chance, ou *odds*, é $p/(1-p)$. No grupo A, a chance observada de Sim é $30/20 = 1{,}5$; no grupo B, é $15/35 \approx 0{,}429$. A razão de chances de A em relação

a B é:

$$OR = \frac{30/20}{15/35} = 3{,}5.$$

Isso não significa que a probabilidade de Sim seja 3,5 vezes maior. A razão entre as proporções observadas é 0,60/0,30 = 2. A interpretação como risco, prevalência ou outra medida depende do desenho e da forma de amostragem. Confirme também a ordem das categorias: inverter uma referência pode produzir a razão recíproca, 1/3,5.

7.5 Como relatar uma associação

Um relato possível é: "Nos dados fictícios, o resultado Sim ocorreu em 30 de 50 observações do grupo A (60%) e em 15 de 50 do grupo B (30%). O qui-quadrado de Pearson sem correção de continuidade resultou em $\chi^2(1) = 9{,}09$, $p = 0{,}0026$, com V de Cramér de 0,302." Em uma análise real, informe o tratamento dos ausentes, o desenho, os intervalos das medidas de interesse e os limites de interpretação.

Vamos continuar com perguntas sobre uma proporção, várias categorias e respostas pareadas. Depois, usaremos a regressão logística para relacionar uma resposta binária a um preditor. Em cada situação, o denominador e a estrutura das observações continuam orientando a análise.

7.6 Uma proporção: teste binomial e intervalo

Uma única variável com duas categorias produz uma pergunta diferente da associação entre duas variáveis. No arquivo `exemplo_binomial.csv`, há 80 pessoas fictícias independentes: 52 responderam Sim e 28, Não. Queremos estimar a proporção populacional de Sim, denotada por π, e compará-la com uma referência planejada de 0,50:

$$H_0 : \pi = 0{,}50, \qquad H_1 : \pi \neq 0{,}50.$$

A proporção amostral é $\widehat{\pi} = 52/80 = 0{,}65$, ou 65%. O modelo binomial pressupõe um número definido de observações independentes, com dois resultados possíveis e a mesma probabilidade de sucesso para as observações modeladas. Uma amostra com seleção complexa ou respostas repetidas precisa de atenção adicional; ter somente Sim e Não não garante essas condições.

7.6.1 Executando no jamovi

1. Abra `exemplo_binomial.csv`. Configure `resposta` como nominal e `id` como identificador.
2. Acesse **Análises → Frequências → Teste de proporções, 2 resultados (Proportion Test, 2 Outcomes)**. A tradução pode variar; confira a indicação de teste binomial.

3. Use `resposta` como variável. Cada linha já é uma pessoa; mantenha desmarcada a opção de dados em contagens.

4. Informe a proporção de teste 0,50, escolha a alternativa bilateral e solicite IC95%.

5. Na tabela, identifique a linha de **Sim**. A proporção da categoria Não é 0,35 e tem interpretação complementar.

As opções de hipótese, proporção de referência e intervalo constam na documentação oficial (The jamovi project, 2026s). Para Sim, o teste binomial exato bilateral fornece $p \approx 0{,}00968$. Um IC95% exato de Clopper–Pearson para a proporção é aproximadamente [0,535; 0,753]; esse método é documentado em `binom.test` do R (R Core Team, 2026b).

O relato pode informar: "No exemplo fictício, 52 de 80 respostas foram Sim, 65%, IC95% exato [53,5%; 75,3%]. O teste binomial bilateral contra 50% resultou em $p = 0{,}0097$." O intervalo informa a precisão da estimativa e não a porcentagem de pessoas cuja resposta está "correta".

7.7 Aderência: uma variável com várias categorias

No arquivo `exemplo_aderencia.csv`, uma variável tem três categorias: A, B e C, com contagens 30, 15 e 15. A pergunta é se as proporções populacionais correspondem a uma distribuição especificada antes da análise. Para três proporções iguais, esperamos 60/3 = 20 observações em cada categoria.

Abra **Frequências → Teste de proporções, N resultados (Proportion Test, N Outcomes)**. Coloque `categoria` na variável e `frequencia` no campo de contagens. Configure proporções esperadas iguais, equivalentes a razões 1 : 1 : 1, e solicite as frequências esperadas (The jamovi project, 2026t). Confira o total de 60; as três linhas não representam três pessoas.

Aplicando a soma das diferenças entre observado e esperado, temos:

$$\chi^2 = \frac{(30-20)^2}{20} + \frac{(15-20)^2}{20} + \frac{(15-20)^2}{20} = 7{,}5.$$

Com três categorias e proporções completamente especificadas, $gl = 3 - 1 = 2$ e $p \approx 0{,}0235$. Se parâmetros da distribuição esperada fossem estimados dos próprios dados, a referência de graus de liberdade precisaria considerar essa estimação; não se deve aplicar automaticamente o mesmo cálculo.

Compare as perguntas: no teste de aderência, existe **uma variável categórica** confrontada com proporções de referência. No teste de independência, existem **duas variáveis categóricas**, e os esperados são calculados a partir das margens da tabela. Usar o mesmo símbolo χ^2 não torna os desenhos intercambiáveis.

7.8 Respostas pareadas: o teste de McNemar

Suponha que as mesmas 60 pessoas respondam Sim ou Não em dois momentos. O arquivo `exemplo_mcnemar.csv` resume esses pares:

Tabela 7.2: Respostas pareadas fictícias antes e depois

Antes	Depois Sim	Depois Não	Total
Sim	28	4	32
Não	16	12	28
Total	44	16	60

Os pares concordantes, 28 e 12, mantiveram a resposta. Os discordantes, 4 e 16, mudaram em sentidos opostos. A pergunta de McNemar é sobre a igualdade das probabilidades marginais de Sim nos dois momentos; no modelo para os pares, isso corresponde à igualdade das probabilidades das duas mudanças discordantes.

7.8.1 Configurando a tabela pareada

Abra **Frequências → Tabelas de contingência → Amostras pareadas (Paired Samples)**. Atribua `antes` às linhas, `depois` às colunas e `frequencia` a contagens. Selecione McNemar e identifique se a correção de continuidade está ativada. A documentação oficial distingue as estatísticas corrigida, não corrigida e a opção exata (The jamovi project, 2026e).

Se $b = 4$ e $c = 16$ representam as contagens discordantes, a versão assintótica sem correção é:

$$\chi^2_{\text{McNemar}} = \frac{(b-c)^2}{b+c} = \frac{(4-16)^2}{20} = 7{,}2.$$

Com um grau de liberdade, $p \approx 0{,}00729$. Com a correção de continuidade usual, a estatística é $(|b-c|-1)^2/(b+c) = 6{,}05$, com $p \approx 0{,}01391$.

Condicionando nos 20 discordantes, o cálculo binomial exato bilateral testa a proporção 4/20 contra 0,50 e fornece $p \approx 0{,}01182$. A documentação do jamovi informa que a opção exata depende do pacote `exact2x2`; sua disponibilidade pode variar conforme a instalação (The jamovi project, 2026e). A conta binomial também pode ser conferida com `binom.test(4, 20, p = 0.5)` no R (R Core Team, 2026b).

Não escolha a versão pelo menor valor de p. Registre o procedimento planejado e considere o número de pares discordantes para avaliar a aproximação. Os valores diferentes ilustram métodos de inferência distintos para a mesma estrutura de dados.

7.8.2 Mudança em pontos percentuais

A proporção de Sim passou de 32/60 = 53,33% para 44/60 = 73,33%, uma diferença de **20 pontos percentuais**. A mudança relativa seria calculada com outro denominador; não a confunda com essa subtração.

Um relato pode apresentar os totais marginais, as duas direções de mudança e o método de McNemar escolhido. O total continua sendo 60 pessoas, com duas medidas cada. Aplicar um qui-quadrado de independência como se antes e depois fossem grupos distintos descarta o pareamento. Uma mudança observada, isoladamente, também não identifica o que a causou.

7.9 Medidas de associação e sua incerteza

Retomando a tabela de **grupos independentes** A e B, a diferença de proporções de Sim é 0,60 − 0,30 = 0,30, ou 30 pontos percentuais. A razão das proporções é 2, e a razão de chances é 3,5. As três medidas descrevem a comparação em escalas diferentes; escolha a que corresponde à pergunta e ao desenho.

Na opção de medidas comparativas da tabela de contingência, solicite a medida pertinente e seu intervalo, conferindo a orientação das categorias (The jamovi project, 2026d). Um IC95% de Wald na escala logarítmica para a OR da nossa tabela é aproximadamente [1,53; 8,01]. Seu cálculo usa:

$$EP\{\log(OR)\} = \sqrt{\frac{1}{30} + \frac{1}{20} + \frac{1}{15} + \frac{1}{35}}, \qquad IC = \exp\{\log(OR) \pm 1{,}96\, EP\}.$$

O intervalo amplo oferece uma informação que o valor de p sozinho não mostra. Outros métodos de intervalo podem produzir limites diferentes; identifique o método empregado. Com células nulas, essa fórmula não é diretamente utilizável, e acrescentar constantes sem explicação muda a análise.

Em tabelas maiores, percentuais e resíduos por célula podem ajudar a localizar padrões. Essa exploração envolve várias células e comparações: um resíduo grande não deve ser convertido automaticamente em uma descoberta independente sem considerar a multiplicidade. Mantenha a tabela completa disponível para o leitor e não selecione apenas a célula mais favorável.

7.10 Regressão logística binária

Agora vamos relacionar uma resposta binária a um preditor. No arquivo `exemplo_logistica.csv`, cada linha é uma pessoa fictícia, `horas` varia de uma a cinco e `concluiu` identifica a conclusão de uma tarefa: 1 para Sim e 0 para Não. Há 60 pessoas, 12 por duração, e ambas as respostas ocorrem em todas as durações.

A regressão logística binária modela a probabilidade π_i do evento `concluiu = 1`. Em vez de

ajustar uma reta diretamente à probabilidade, usamos o logaritmo da chance, ou logit:

$$\log\left(\frac{\pi_i}{1-\pi_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 \,\text{horas}_i.$$

A transformação inversa mantém a previsão entre 0 e 1:

$$\pi_i = \frac{1}{1+\exp\{-(\beta_0+\beta_1\,\text{horas}_i)\}}.$$

A família binomial com ligação logit é especificada na documentação oficial do R (R Core Team, 2026c). A forma da equação mostra por que um mesmo incremento no logit não representa um incremento constante de pontos percentuais.

7.10.1 Configurando evento e referência

1. Abra `exemplo_logistica.csv`. Configure `horas` como contínua e `concluiu` como nominal com exatamente dois níveis, 0 e 1.
2. Acesse **Análises** → **Regressão** → **Regressão logística** → **2 resultados (2 Outcomes, Binomial)**.
3. Use `concluiu` como variável dependente e `horas` em **Covariáveis**. Mantenha o intercepto.
4. Em **Níveis de referência**, use 0 como referência da resposta. Confira na nota da tabela que os coeficientes representam `1 versus 0`.
5. Solicite estimativas, razões de chances (**Odds ratio**) e seus IC95%. Use coeficientes não padronizados para conferir a equação a seguir.

O menu, as referências e as opções de coeficientes são definidos na especificação oficial da análise no repositório do projeto jamovi; a referência bibliográfica aponta para uma revisão identificada desse código (The jamovi project, 2026k). Se invertermos a referência da resposta, os sinais dos coeficientes e o sentido das razões de chances mudam. Por isso, comece a leitura pela definição do evento.

7.10.2 Coeficientes, chances e probabilidades

O ajuste por máxima verossimilhança resulta aproximadamente em:

$$\widehat{\text{logit}(\pi)} = -2{,}320861 + 0{,}773620\,\text{horas}.$$

Para uma hora adicional, a razão de chances é:

$$OR = \exp(0{,}773620) \approx 2{,}168, \qquad IC95\%_{\text{Wald}} \approx [1{,}384; 3{,}395].$$

No modelo, as chances de conclusão são multiplicadas por aproximadamente 2,17 a cada hora. Isso não significa que a probabilidade seja multiplicada por 2,17, nem que aumente sempre 117 pontos percentuais. Para três horas, o logit é aproximadamente zero e a probabilidade ajustada é 0,50. Para quatro, ela é aproximadamente 0,684: o aumento nesse trecho é de cerca de 18,4 pontos percentuais.




Figura 7.2: Regressão logística sobre os 60 casos fictícios. Cada ponto resume 12 pessoas na mesma duração; a curva vem do ajuste individual. Elaboração própria.

As probabilidades ajustadas de uma a cinco horas são aproximadamente 0,175, 0,316, 0,500, 0,684 e 0,825. A presença de ambas as respostas em cada duração evita separação completa neste exemplo simples. Em outros bancos, um preditor pode separar perfeitamente os resultados e levar a coeficientes muito grandes ou problemas de convergência. Não interprete automaticamente uma OR enorme como uma estimativa precisa.

7.10.3 Ajuste, classificação e limites

O painel pode apresentar desvio, AIC e medidas como o pseudo-R^2 de McFadden (The jamovi project, 2026k). Um pseudo-R^2 não é a mesma fração da soma de quadrados explicada pela regressão linear. Compare medidas entre modelos apenas quando suas definições, respostas e amostras forem compatíveis.

Transformar probabilidades em classificações exige escolher um limiar. Com limiar 0,50, uma pessoa com probabilidade 0,49 recebe uma categoria diferente de outra com 0,51, apesar da pequena diferença entre elas. Sensibilidade, especificidade e acurácia dependem desse limiar e da composição do banco. A área sob a curva ROC avalia discriminação ao longo de limiares; não demonstra, sozinha, que probabilidades previstas estejam bem calibradas.

Para avaliar calibração, precisamos confrontar as probabilidades previstas e as frequências observadas em uma avaliação adequada; a documentação de calibração probabilística do scikit-learn

apresenta essa distinção (The scikit-learn developers, 2026). Para uso preditivo real, também precisamos de dados de validação ou de um procedimento de reamostragem que considere a escolha do modelo. Os 60 casos construídos aqui servem ao ensino do ajuste, e não à validação de uma ferramenta para decidir sobre pessoas.

É possível incluir outros preditores contínuos em Covariáveis e categóricos em Fatores. Com múltiplos termos, cada OR é condicional aos demais termos do modelo e às referências escolhidas; com interações, a comparação depende também dos valores envolvidos. A relação linear exigida para um preditor contínuo é na escala do logit, e a independência das unidades precisa vir do desenho. Uma tabela binária não torna essas condições automáticas.

Um relato inicial pode ser: "No exemplo fictício, ajustou-se uma regressão logística binária para conclusão da tarefa, evento 1 e referência 0, em função de horas. A OR por hora foi 2,17, IC95% de Wald [1,38; 3,40], em 60 observações independentes." Em uma aplicação real, acrescente as condições de obtenção dos dados, os diagnósticos, os ausentes e a avaliação compatível com a finalidade do modelo.

7.11 Vamos praticar: perguntas e comentários

1. Em 52 respostas Sim de 80, qual é a proporção? Compare-a com uma referência de 50% sem confundir proporção e valor de p.
2. Uma variável com três categorias e proporções de referência iguais pede um teste de aderência ou uma tabela de independência entre duas variáveis?
3. No exemplo pareado, quantas pessoas mudaram de Não para Sim e quantas fizeram a mudança inversa? Por que só comparar os totais marginais não descreve todos os pares?
4. Uma OR de 2,17 por hora significa que a probabilidade aumenta 117 pontos percentuais?

Comentários das respostas

1. A proporção é 0,65, ou 65%. O teste binomial bilateral contra 0,50 fornece $p \approx 0{,}00968$; esse valor não é a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira.
2. Um teste de aderência, pois temos uma variável e uma distribuição de referência. Para duas variáveis cruzadas, a pergunta seria outra.
3. Dezesseis mudaram de Não para Sim e quatro de Sim para Não. Os totais marginais mostram o saldo, mas ocultam quantas pessoas mudaram em cada sentido; os pares discordantes sustentam McNemar.
4. Não. A OR multiplica as chances. No exemplo, passar de três para quatro horas muda a probabilidade ajustada de 50% para aproximadamente 68,4%, segundo o modelo.

Referências

JAMOVI. **The jamovi project**. [*S. l.: s. n.*], 2022. Computer Software. Disponível em: https://www.jamovi.org.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Box Plot**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/boxplot.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Confidence Limits for the Mean**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda352.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Critical values and p values**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section1/prc131.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Least Squares**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section4/pmd431.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Measures of Location**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda351.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Measures of Scale**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda356.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: One-Factor ANOVA**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda354.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

NIST/SEMATECH. **e-Handbook of Statistical Methods: Two-Sample t-Test for Equal Means**. Disponível em: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda353.htm. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: Adjust P-values for Multiple Comparisons**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/p.adjust.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: Exact Binomial Test**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/binom.test.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: Family Objects for Models**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/family.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: Power calculations for one and two sample t tests**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/power.t.test.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: Predict method for Linear Model Fits**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/predict.lm.html. Acesso em: 25 out. 2026.

R CORE TEAM. **stats: Wilcoxon Rank Sum and Signed Rank Tests**. Disponível em: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/wilcox.test.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **ANCOVA (ancova)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ancova.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **ANOVA (ANOVA)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ANOVA.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Combining jamovi and R**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/usermanual/um_6_jamovi_and_R.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Contingency Tables (contTables)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_contTables.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Contingency Tables (Paired Samples) (contTablesPaired)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_contTablesPaired.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Correlation Matrix (corrMatrix)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_corrMatrix.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Descriptives (descriptives)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_descriptives.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **First steps in jamovi**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/usermanual/um_2_first-steps.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Independent Samples T-Test (ttestIS)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ttestIS.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Install modules in jamovi**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/howto/howto_Install_modules.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **jmv: especificação da análise Binomial Logistic Regression**. Disponível em: https://github.com/jamovi/jmv/blob/7704a3a1d813882af1deeb5faca2583af5fb162d/jamovi/logregbin.a.yaml. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Linear Regression (linReg)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_linReg.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **List of Functions**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/data/data_5_list_of_functions.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Mixed ANOVA**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/analyses/jg_34_anova-mixed.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **One Sample T-Test (ttestOneS)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ttestOneS.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **One-Way ANOVA (anovaOneW)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_anovaOneW.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **One-Way ANOVA (Non-parametric) (anovaNP)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_anovaNP.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Paired Samples T-Test (ttestPS)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_ttestPS.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Proportion Test (2 Outcomes) (propTest2)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_propTest2.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Proportion Test (N Outcomes) (propTestN)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_propTestN.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Repeated Measures ANOVA (anovaRM)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_anovaRM.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Repeated Measures ANOVA (Non-parametric) (anovaRMNP)**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/jmv/jmv_anovaRMNP.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **The Spreadsheet**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/usermanual/um_4_spreadsheet.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE JAMOVI PROJECT. **Updating data**. Disponível em: https://docs.jamovi.org/usermanual/um_5_updating_data.html. Acesso em: 25 out. 2026.

THE SCIKIT-LEARN DEVELOPERS. **Probability calibration**. Disponível em: https://scikit-learn.org/stable/modules/calibration.html. Acesso em: 25 out. 2026.

TRIOLA, Mario F. **Introdução à Estatística**. 12ª. [*S. l.*]: LTC, 2017. ISBN 978-8521633747.

WASSERSTEIN, Ronald L.; LAZAR, Nicole A. The ASA's Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose. **The American Statistician**, v. 70, n. 2, p. 129–133, 2016. DOI: 10.1080/00031305.2016.1154108.