Synthesized solution for benchmark `00medstrai.c`

```
solution
 └── (Partial), cond b₁₄:  N > 0
       └──┤ Case¬b₁₄ :
          │ k₁ = (b₁₄·I₁₃·G₁₂ + ¬b₁₄·1)·E₁₁·D₁₀·(a₉·C₈·B₇ + ¬a₉·1)·A₆·M₅
          │ k₂ = L₂₇·G₂₄·E₂₃·D₂₂·C₂₁·B₂₀·A₁₉·M₁₈
          └── (Partial), cond a₉:  N < 0
                └──┤ Case a₉ :
                   │ k₁ = 1·1·E₁₁·D₁₀·(a₉·C₈·B₇ + ¬a₉·1)·A₆·M₅
                   │ k₂ = L₂₇·G₂₄·E₂₃·D₂₂·C₂₁·B₂₀·A₁₉·M₁₈
                   └── AComplete
                         └──┤ Axioms : {L = 1, P = 1}
                            │ k₁ = 1·1·E₁₁·D₁₀·1·C₈·B₇·A₆·M₅
                            │ k₂ = L₂₇·P₄₈·E₂₃·D₂₂·C₂₁·B₂₀·A₁₉·M₁₈
```

solution

(Partial), cond b_{14}: N > 0

$Case \neg b_{14}$:
$k_1 = (b_{14} \cdot I_{13} \cdot G_{12} + \neg b_{14} \cdot 1) \cdot E_{11} \cdot D_{10} \cdot (a_9 \cdot C_8 \cdot B_7 + \neg a_9 \cdot 1) \cdot A_6 \cdot M_5$
$k_2 = L_{27} \cdot G_{24} \cdot E_{23} \cdot D_{22} \cdot C_{21} \cdot B_{20} \cdot A_{19} \cdot M_{18}$

(Partial), cond a_9: N < 0

$Case\, a_9$:
$k_1 = 1 \cdot 1 \cdot E_{11} \cdot D_{10} \cdot (a_9 \cdot C_8 \cdot B_7 + \neg a_9 \cdot 1) \cdot A_6 \cdot M_5$
$k_2 = L_{27} \cdot G_{24} \cdot E_{23} \cdot D_{22} \cdot C_{21} \cdot B_{20} \cdot A_{19} \cdot M_{18}$

AComplete

$Axioms : \{L = 1, P = 1\}$
$k_1 = 1 \cdot 1 \cdot E_{11} \cdot D_{10} \cdot 1 \cdot C_8 \cdot B_7 \cdot A_6 \cdot M_5$
$k_2 = L_{27} \cdot P_{48} \cdot E_{23} \cdot D_{22} \cdot C_{21} \cdot B_{20} \cdot A_{19} \cdot M_{18}$

Remaining 1 solutions ommitted for brevity.