# Prescrições na Pediatria

Guia Prático

# SUMÁRIO



Antibióticos ..... 5
Analgésicos e antitérmicos ..... 8
Anti-inflamatórios ..... 9
Anti-histamínicos ..... 10
Antifúngicos ..... 12
Antiparasitários ..... 13
Laxantes ..... 15
Antidiarreico ..... 16
Antiemético ..... 17
Procinéticos ..... 18
Probióticos ..... 19
Soro de reidratação oral ..... 20
Vitaminas e Ferro ..... 21
Broncodilatadores ..... 22
Corticóides Sistêmcios e Inalatórios ..... 24
Antileucotrienos ..... 25
Diuréticos ..... 26
Anti-hipertensivos ..... 27




# SUMÁRIO


Digitais ..... 28
Anticonvulsionantes ..... 29
Pediculose ..... 30
Escabiose ..... 31
Tópicos - Corticóide ..... 32
Tópicos - Antifúngicos ..... 33
Tópicos - Queimaduras ..... 34
Tópicos - Antipruriginoso ..... 35
Tópicos - Hidratantes ..... 36
Tópicos - Antimicrobianos ..... 37
Colírios Lubrificantes ..... 38
Colírios Antimicrobianos ..... 39
Otites ..... 40
Candidíase Oral ..... 41
Aftas e Estomatites ..... 42
Corticóide Nasal ..... 43
Soro Fisiológico Nasal ..... 44



# ANTIBIÓTICOS

## USO ORAL

- **Amoxicilina (250 mg/5ml) _____ X frascos**

Administrar X mL de 8 em 8 h durante 10 dias.

*Cálculo de dose: 50 mg/Kg/dia ou 1 ml/kg/dia divididos em 3 doses*

- **Amoxicilina+Clavulanato de potássio (250 mg+62,5 mg/5ml)_____ X frascos**

Administrar X mL de 8 em 8 h durante 10 dias.

*Cálculo da dose: 50 mg/Kg/dia de Amoxicilina ou 1 ml/kg/dia divididos em 3 doses*

- **Sulfametoxazol + Trimetroprim (200 mg + 40 mg/5ml) _____ X frascos**

Administrar X mL de 12 em 12 h durante 10 dias.

*Cálculo da dose: 40 mg/Kg/dia de Sulfametoxazol ou 1 ml/kg/dia divididos em 2 doses*

- **Azitromicina (200 mg/5ml) _____ X frascos**


Administrar X mL de 24 em 24 h durante 5 dias.

*Cálculo da dose: 10 mg/Kg/dia ou 0,25 ml/kg/dia*

- **Claritromicina (250 mg/5ml)_____ X frascos**

Administrar X mL de 12 em 12 h durante 10 dias.

*Cálculo da dose: 15 mg/Kg/dia ou 0,3 ml/kg/dia divididos em 2 doses*



# ANTIBIÓTICOS

## USO ORAL

- **Eritromicina (250 mg/5ml)_____ X frascos**

Administrar X mL de 6 em 6 h durante l0 dias.

*Cálculo da dose: 30 a 50 mg/Kg/dia ou 0,6 a 1 ml/kg/dia divididos em 4 doses.*

- **Cefalexina (250 mg/5ml) _____ X frascos**

Administrar X mL de 6 em 6 h durante 7 dias.

*Cálculo da dose: 50 mg/Kg/dia ou 1 ml/kg/dia divididos em 4 doses.*

- **Cefadroxila (250 mg/5ml)_____ X frascos**


Administrar X mL de 12 em 12 h durante 10 dias.

*Cálculo da dose: 25 a 50 mg/Kg/dia ou 0,5 a 1 ml/kg/dia divididos em 2 doses.*

- **Cefaclor (250 mg/5ml)_____ X frascos**

Administrar X mL de 12 em 12 h durante 10 dias.

*Cálculo da dose: 25 a 50 mg/Kg/dia ou 0,5 a 1 ml/kg/dia divididos em 2 doses.*



# ANTIBIÓTICOS

## USO INTRAMUSCULAR

- **Penicilina Benzatina (1.200.000 UI)_____ X frascos**

Aplicar via intramuscular profunda na região glútea

*Se peso acima de 27 Kg -> Dose única: 1.200.000 UI*

*Se peso entre 10-27 Kg -> Dose única: 600.000 UI*

*Se peso menor de 10 Kg -> Dose única: 300.000 UI*

- **Ceftriaxona 1 g _____ X frascos**

Aplicar via intramuscular profunda de 24/24 h.

Dose: 50 a 100 mg/Kg/dia



# ANALGÉSICOS E ANTITÉRMICOS

## USO ORAL

- **Paracetamol (200 mg/ml) gotas _____ 1 frasco**

Administrar X gotas de 6 em 6 h se dor ou febre.

*Cálculo da dose: 10 a 15 mg/Kg/dose ou 1 a 1,5 gota/kg/dose*

*10mg/gota*

- **Dipirona (500 mg/ml) gotas_____ 1 frasco**

Administrar X gotas de 6 em 6 h se dor ou febre.

*Cálculo da dose: 15-20 mg/Kg/dose ou 0,6-0,8 gotas/kg/dose*

*25 mg/gota*

- **AAS 100mg _____ X comprimidos**

Administrar X comprimidos de atéb 6 em 6h se dor ou febre

*Cálculo da dose: 10mg/Kg/dose ou 1cp a cada 10Kg*

- **Buscopam (Escopolamina) gotas _____ 1 frasco**

Administrar X gotas de 6 em 6 h se dor

*Cálculo da dose: 0,5mg/Kg/dose ou 1 gota/Kg/dose*

# ANTI-INFLAMATÓRIOS

## USO ORAL

- **Ibuprofeno (100 mg/ml) gotas _____ 1 frasco**

Administrar X gotas de 6 em 6 h se dor ou febre.

*Cálculo da dose: 10 mg/Kg/dose ou 1 gota/Kg/dose*

*10mg/gota*

- **Cetoprofeno (1mg/mL) xarope _____ 1 frasco**

Administrar X mL de 8 em 8 h por X dias.

*Cálculo da dose: 0,5 mg - 1 mg/Kg/dose ou 0,5 mL -1 mL/Kg/dose*

- **Cetoprofeno (20mg/mL) gotas _____ 1 frasco**

Administrar X gotas de 8 em 8 h por X dias

*Cálculo da dose: 0,5 - 1 mg/Kg/dose ou 0,5 -1 gota/Kg/dose*

*1mg/gota*



# ANTI-HISTAMÍNICOS

## USO ORAL

- **Hidroxizina (10 mg/5ml) xarope _____ 1 frasco**

Administrar X mL de 8 em 8 h durante X dias.

*Cálculo da dose: 1-2 mg/Kg/dia ou 0,5 -1 mL/kg/dia*

*Administrar em crianças com mais de 6kg*

- **Dexclorfeniramina (2 mg/5 ml) xarope _____ 1 frasco**

Administrar X mL de 8 em 8 h durante X dias.

*Cálculo da dose: 0,15 mg/Kg/dia ou 0,4 mL/kg/dia*

- **Loratadina (1 mg/ml) xarope _____ 1 frasco**

Administrar X mL de 24 em 24 h durante X dias.

*Cálculo da Dose: 2 a 5 anos = 5 mL; Mais de 6 anos = 10 mL*

*Somente para crianças acima de 2 anos*

- **Desloratadina (0,5 mg/ml) xarope _____ 1 frasco**

Administrar X mL à noite. Dose única diária

*Cálculo da Dose:*

*- 6-11 meses: 2mL*

*- 1-5 anos: 2,5mL*

*- 6-11 anos: 5mL*

*- Mais de 12 anos: 10mL*



# ANTI-HISTAMÍNICOS

## USO ORAL

- **Desloratadina (1,25 mg/ml) gotas _____ 1 frasco**

Administrar X gotas à noite. Dose única diária

*Cálculo da Dose:*

*- 6-11 meses: 16 gotas*

*- 1-5 anos: 20 gotas*

*- 6-11 anos: 40 gotas*

- **Fexofenadina (6 mg/ml) (ALLEGRA) suspensão oral_____ 1 frasco**

Administrar X mL de 12 em 12h durante X dias

*Cálculo da Dose: 2-11 anos: 30mg ou 5mL por dose.*

# ANTIFÚNGICOS

## USO ORAL

- **Cetoconazol 200 mg _____ X comprimidos**

Administrar X comprimidos após a refeição por X dias.

*Cálculo da dose: 5 mg/Kg/dia*

- **Itraconazol 100 mg _____ X cápsulas**

Administrar X cápsulas após a refeição por X dias.

*Cálculo da dose: 5 mg/Kg/dia*

- **Fluconazol 100mg _____ X cápsulas**

Administrar X cápsulas após a refeição por X dias.

*Cálculo da dose: 5 mg/Kg/dia*

# ANTIPARASITÁRIOS

## USO ORAL

- **Albendazol (400 mg/10ml)_____ X frascos**

Administrar 10 mL após a refeição durante X dias.

*Para crianças acima de 2 anos.*

*Dose habitual: 400 mg (10mL) por 1 dia*

*Strongiloidíase: 3 dias*

*Repetir novo esquema após 15 dias -> Objetivo: tratar os parasitas com ciclo cardiopulmonar (Strongyloides, Necator, Asacaris e Ancylostoma)*

*Giardíase e Teníase: 5 dias consecutivos, sem necessidade de segundo esquema.*

- **Mebendazol (100 mg/5ml)_____ 2 frascos**

Administrar 5 mL após o almoço e jantar durante 3 dias.

*Dose padrão: 100 mg (5mL)/dose 2x ao dia por 3 dias*

*Dose dobrada: 200 mg (10mL)/dose 2x ao dia por 3 dias (Teníase)*

*Repetir novo esquema após 15 dias -> Objetivo: tratar os parasitas com ciclo cardiopulmonar (Strongyloides, Necator, Asacaris e Ancylostoma)*

- **Tiabendazol (250 mg/5ml)_____ 1 frasco**

Administrar X mL após o almoço e jantar por 3 dias.

*Cálculo da dose: 25 mg/Kg/dia ou 0,25 mL/kg/dose*

*Repetir o esquema em 15 dias.*

# ANTIPARASITÁRIOS

## USO ORAL

- **Ivermectina 6 mg_____ X comprimidos**

Administrar X comprimidos em dose única.

*Cálculo da dose 0,2 mg/kg ou ½ (meio) comprimido para cada 15 Kg de peso.*

*Novo ciclo após 2 a 3 semanas: tratar os parasitas com ciclo cardiopulmonar: Necator, Ancylostoma, Strongyloides, Asacaris.*


*Pediculose ou Escabiose o esquema deve ser repetido em 7 dias.*

- **Metronidazol 200 mg/5ml_____ 1 frasco**

*Administrar X mL de 12 em 12 h durante X dias.*

*Giardíase: 20 mg/Kg/dia ou 0,25 mL/kg/dose durante 7 dias*

*Amebíase: 30 mg/Kg/dia ou 0,4 mL/kg/dose durante 10 dias*



# LAXANTES

## USO ORAL

- **Polietilenoglicol (PM 4000) 20 g/sachê _____ X sachês**

Administrar 1 sachê 1x ao dia diluído em 50mL de água.

*Cálculo da dose:*

*- Desimpactação: 2mg/Kg*

*- Manutenção: 0,5 a 1 g/Kg/dia*

- **Lactulose 6(67 mg/mL) xarope _____ 1 frasco**

*Administrar X mL por dia.*

*Frequência pode ser ajustada conforme a resposta.*

*Cálculo da dose:*

*- Lactantes: 2,5-5,0 mL por dia*

*- 1-5 anos: 5-10mL por dia*

*- Maiores de 6 anos: 15mL por dia*



# ANTIDIARREICO

**USO ORAL**

- **Racecadotrila 10mg (Tiorfan) _____ X sachês**

Administrar X sachês de até 8 em 8 h

*Cálculo da dose:*

*- 3-9 meses: 10mg 8/8h*

*- 9-3 anos: 20mg 8/8h*

*- 3-8 anos: 30mg 8/8h*



# ANTIÉMETICOS

## USO ORAL

- **Dimenidrato + Piridoxina (25mg/mL) (Dramin B6) _____ 1 frasco**

Administrar X gotas de 8 em 8h se náuseas ou vômitos.

*Cálculo da dose: maiores de 2 anos: 1 gota/Kg a cada 8h*


- **Ondansetrona 4mg (Vonau) _____ 1 caixa**

Administrar 1 comprimido de até 8 em 8 h se náuseas ou vômitos.

Cálculo da dose:

- 2-11 anos: 4mg

- Peso maior que 30Kg: 8 mg



# PROCINÉTICOS

## USO ORAL

- **Domperidona (1 mg/ml)_____ 1 frasco**

Administrar X mL de 12 em 12 h

*Cálculo da  dose: 0,25 mg/Kg/dose ou 0,25 mL/kg/dose*

- **Bromoprida (4 mg/ml)_____ 1 frasco**

Administrar X gotas de 8 em 8 h

*Cálculo da dose: 0,5 a 1 mg/Kg/dia 8/8 horas ou 1 gota /kg/dose)*



# PROBIÓTICOS

## USO ORAL

- **Saccharomyces boulardi (Floratil) _____ X envelopes**


Administrar 1 envelope diluído em água de até 12/12h

- **Saccharomyces cerevisae (Florax) _____ X envelopes**

Administrar 1 envelope diluído em água de até 12/12h

- **Lactobacillus reuteri (Colikids) gotas _____ 1 frasco**

Administrar 5 gotas 1x ao dia



# SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL

**USO ORAL**

- **Soro de reidratação oral (Pedialyte) _____ X envelopes**

Diluir 1 envelope em 1000ml de água e ofertar X mL várias vezes ao dia e após cada episódio de vômito ou evacuação líquida.

*Cálculo da dose: 10mL/Kg*



# VITAMINAS E FERRO

## USO ORAL

- **Sulfato Ferroso 25mg/mL - gotas _____ 1 frasco**

Administrar X gotas 1 vez ao dia juntamente com suco.

1 gota = 1 mg de Fe elementar


*Dose de profilaxia = 1 gota/Kg/dia*

*Dose de tratamento = 4-6mg/Kg/dia de Fe elementar*

- **Protovit plus - gotas _____ 1 frasco**

Até 6 anos de idade: 6 gotas/dia

Acima de 6 anos de idade: 12 gotas/dia



# BRONCODILATADORES

## USO INALATÓRIO

- **Salbutamol (100 mcg/jato) Aerolim_____ 1 frasco**

Inalar X jatos de 4 em 4 h em caso de falta de ar, chieira ou tosse persistente

*Manutenção: 3 a 4 jatos/dose*

- **Fenoterol (100 mcg/jato) Berotec _____ 1 frasco**

Inalar X jatos de 4 em 4 h em caso de falta de ar, chieira ou tosse persistente

*Manutenção: 3 a 4 jatos/dose*

- **Salmeterol (25 mcg/jato) Serevent_____ 1 frasco**


Inalar 2 jatos de 12 em 12 h

*- Para crianças acima de 5 anos*

- **Formoterol (12 mcg/jato) Fluir_____ 1 frasco**

Inalar 1 cápsula de 12 em 12 h

*- Para crianças acima de 5 anos*



# BRONCODILATADORES

## MICRONEBULIZAÇÃO

- **Fenoterol (5mg/mL) Berotec: _____ 1 frasco**

Dilui X gotas em 3mL de soro fisiológico e inalar de 4/4h em caso de chieira, falta de ar ou tosse persistente.

*Cálculo da dose: 0,6 gota/Kg - máximo de 10 gotas*



# CORTICÓIDES

## USO ORAL

- **Prednisolona (3 mg/ml)_____ 1 frasco**

Administrar X mL pela manhã, durante 5 dias.

*Cálculo da dose: 1 mg/Kg/dia*

- **Prednisona 20 mg_____ 1 caixa**


*Administrar X comprimidos pela manhã por X dias*

*Cálculo da dose: 1-2 mg/Kg/dia*

- **Dexametasona (0,5 mg/ 5mL)_____ 1 frasco**

*Administrar X mL de 12 em 12 h por X dias.*

*Cálculo da dose: 0,1-0,2 mg/Kg/dia = 1-2 mL/kg/dia*



# ANTILEUCOTRIENOS

## USO ORAL

- **Montelucaste 4mg (Singulair baby®) _____ 1 caixa**


Administrar 1 sachê diariamente, misturado em 1 colher de alimento. Dose para crianças de 6 meses-5 anos

- **Montelucaste (4, 5, ou 10 mg) (Singulair®) _____ 1 caixa**

2-5 anos de idade: 4mg/dia

6-14 anos: 5mg/dia

Maiores de 14 anos: 10mg/dia



# DIURÉTICOS

## USO ORAL

- **Furosemida (10mg/mL) Xarope _____ 1 frasco**

Administrar X mL 1x ao dia

*Cálculo da dose: 1-2 mg/Kg/dia*

- **Espironolactona (10mg/mL) Xarope _____ 1 frasco**


Administrar X mL 1x ao dia

*Cálculo da dose: 2-3 mg/Kg/dia*

- **Hidroclorotiazida (10mg/mL) Xarope _____ 1 frasco**

Administrar X mL 1x ao dia

*Cálculo da dose: 2-3 mg/Kg/dia*



# ANTI-HIPERTENSIVOS

## USO ORAL

- **Captopril (10mg/mL) Xarope _____ 1 frasco**

Administrar X mL de 8 em 8 h

*Cálculo da dose: 1-2mg/Kg/dia*

- **Carvedilol (5mg/mL) Xarope _____ 1 frasco**


*Administrar X mL de 12 em 12 h*

*Cálculo da dose: 0,1-0,2 mg/Kg/dia*

- **Anlodipino (5mg/mL) Xarope _____ 1 frasco**

Administrar X mL 1x ao dia

*Cálculo da dose: 0,1-0,5 mg/Kg/dia*



# DIGITAIS

## USO ORAL

- **Digoxina (0,05 mg/ml) Elixir_____ 1 frasco**

Dar X ml de 12 em 12 h.

*Cálculo da dose: 0,01 mg/Kg/dia ou 0,2 mL/Kg/dia - dividido em 2 tomadas.*



# ANTICONVULSIVANTES

## USO ORAL

- **Carbamazepina (100mg/5mL)_____ 1 frasco**

Administrar X mL de 12 em 12 h

*Cálculo da dose: 10-30 mg/Kg/dia ou 0,5 a 1,5 mL/Kg/dia*

- **Oxcarbazepina (300mg/5mL)_____ 1 frasco**

Administrar X mL de 12 em 12 h

*Cálculo da dose: 10-30 mg/Kg/dia ou 0,2-0,5 mL/Kg/dia*

- **Fenobarbital (40 mg/ml) _____ 1 frasco**

*Administrar X gotas à noite.*

*Cálculo da dose: 3-5 mg/Kg/dia ou 3-5 gotas/Kg/dia*

*1mg/gota*

- **Ácido Valpróico (250mg/5mL)_____ 1 frasco**

*Administrar X mL de 12 em 12 h.*

*Cálculo da dose: 15-60 mg/Kg/dia ou 0,3-1,2 mL/Kg/dia*



# PEDICULOSE

## USO LOCAL

- **Permetrina 1% (Shampoo) _____ 1 frasco**

Aplicar nos cabelos secos e deixar em contato por 10 min. Em seguida, enxaguar bem e secar. Não lavar o cabelo pelas próximas 24 h após a aplicação do produto. Repetir todo o esquema após 1 semana.

- **Deltametrina 0,2mg/mL (Shampoo) _____ 1 frasco**

Aplicar nos cabelos e no couro cabeludo, de preferência durante o banho, fazendo ligeiras fricções com a ponta dos dedos. Deixar nas áreas atingidas durante 5 minutos. Enxaguar bem. Usar durante 4 dias consecutivos. O produto deve ser reaplicado após 7 dias, para evitar uma possível reinfestação por permanência de ovos.



# ESCABIOSE

## USO LOCAL

- **Permetrina a 5% _____ 1 frasco**

Aplicar o produto em todo o corpo abaixo do pescoço, à noite. Nas manhãs seguintes, retirar o produto no banho. Repetir o processo após 1 semana

- **Deltametrina (Escabin) _____ 1 frasco**

Aplicar o produto em todo o corpo abaixo do pescoço, à noite. Na noite seguinte, retirar o produto no banho. Repetir o processo após 1 semana



# TÓPICOS - CORTICÓIDE

## USO LOCAL

- **Dexametasona 1%_____ 1 tubo**

Aplicar nas áreas acometidas de 12 em 12 h até resolução completa das lesões.

- **Hidrocortisona 1%_____ 1 tubo**

Aplicar nas áreas acometidas de 12 em 12 h até resolução completa das lesões.

# TÓPICOS - ANTIFÚNGICOS

## USO LOCAL

- **Cetoconazol 2%_____ 1 tubo**

Aplicar nas áreas acometidas de 8 em 8h até resolução completa das lesões.

- **Clotrimazol 2%_____ 1 tubo**

Aplicar nas áreas acometidas de 8 em 8h até resolução completa das lesões.

- **Ciclopirox olamina _____ 1 tubo**

Aplicar nas áreas acometidas de 8 em 8h até resolução completa das lesões.

- **Cetoconazol + Betametasona (Candicort) _____ 1 tubo**

Aplicar nas áreas acometidas de 12 em 12 h até melhora completa das lesões.

# TÓPICOS - QUEIMADURAS

## USO LOCAL

- **Sulfadiazina de prata 1% _____ 1 tubo**

Aplicar na região acometida de 12 em 12 h até melhora do quadro.



# TÓPICOS - ANTIPRURIGINOSO

## USO LOCAL

- **Ducilamina (Calamina + Bisabolol) _____ 1 frasco**

Aplicar na pele limpa de 8 em 8 h

- **Pasta d'água mentolada _____ 1 frasco**

Aplicar na pele de 8 em 8 h

# TÓPICOS - HIDRATANTES

## USO LOCAL

- **Creme de uréia a 3%** _____ **150 g**

Aplicar em todo o corpo logo após o banho.

- **Creme de uréia a 3% + óleo de amêndoas** _____ **150 g**

Aplicar em todo o corpo logo após o banho.

- **Cetaphil** _____ **150 g**

Aplicar em todo o corpo logo após o banho.

- **Sabonete glicerinado**_____ **150 g**

Aplicar em todo o corpo durante o banho



# TÓPICOS - ANTIMICROBIANOS

## USO LOCAL

- **Nebacetin (Neomicina + Bacitracina) _____ 1 tubo**

Aplicar nas áreas afetadas de 8 em 8 h até resolução das lesões

- **Mupirocina _____ 1 tubo**

Aplicar nas áreas afetadas de 8 em 8 h até resolução das lesões

- **Gentamicina + Betametasona (TROK G / Diprogenta) _____ 1 tubo**

Aplicar nas áreas afetadas de 12 em 12h até resolução das lesões

- **Neomicina + Betametasona + Cetoconazol (TROK N) _____ 1 tubo**

Aplicar nas áreas afetadas de 12 em 12h até resolução das lesões

- **Permanganato de potássio 100mg _____ X comprimidos**

Diluir em 5L de água morna 1cp de 100mg e aplicar nas áreas afetadas de 12 em 12 h até melhora do quadro.



# COLÍRIOS LUBRIFICANTES

## USO OCULAR

- **Lacrifilm (Carmelose sódica) _____ 1 frasco**

Pingar 1 gota no olho afetado sempre que necessário

- **Lacrima plus (Dextrana + Hipromelose)_____ 1 frasco**

Pingar 1 gota no olho afetado sempre que necessário

# COLÍRIOS ANTIMICROBIANOS

## USO OCULAR

- **Tobramicina (Tobrex)_____ 1 frasco**

Pingar 1 gota em cada olho de 4/4 h, após limpeza ocular com soro fisiológico por 7 dias

- **Ciprofloxacino (Ciloxan)_____ 1 frasco**

Pingar 1 gota em cada olho de 4/4h por 7 dias

- **Ofloxacino (Oflox)_____ 1 frasco**

Pingar 1 gota em cada olho de 4/4h por 7 dias

# OTITES

## USO LOCAL

- **Ciprofloxacino + Hidrocortisona (Otociriax) _____ 1 frasco**

*Pingar 3 gotas no ouvido acometido de 6 em 6 h por 7 dias*

- **Ciprofloxacina (Ciloxan) _____ 1 frasco**

*Aplicar 3 gotas no ouvido acometido de 6 em 6 h por 7 dias*

- **Otosylase (Fluocinolona + Polimixina B + Neomicina + Lidocaína_____ 1 frasco**

Aplicar 3 gotas no ouvido acometido de 6 em 6 h por 7 dias

- **Cerumim (Trolamina + Hidroxiquinolina)_____ 1 frasco**

Aplicar 3 gotas no ouvido acometido de 8 em 8 h por 5 dias



# CANDIDÍASE ORAL

## USO ORAL

- **Nistatina 100.000 UI/mL_____ 1 frasco**

Aplicar 2 conta-gotas cheios (2ml) na boca de 6 em 6 h, durante 10 dias.

Distribuir em cada canto da boca e sobre a língua.

Cada *conta-gotas cheio possui 1 mL;*

*Cada 1 mL tem 100.000 ui de nistatina.*

# AFTAS E ESTOMATITES

## USO ORAL

- **Hexamidina (1mg/mL)+Tetracaína (0,5mg/mL) (Hexomedine®) _____ 1 frasco**

Aplicar na boca até 6 vezes ao dia, antes de comer

- **Periogard (Cloro-hexidina 0,2%) _____ 1 frasco**

Bochecar 10ml da solução e cuspir. Não engolir.

- **Omcilon A® (Triancinolona orabase) _____ 1 tubo**

Aplicar nas lesões bucais de 12 em 12 h

- **Aftine _____ 1 frasco**

Pingar duas gotas no local da afecção, 3 a 6 vezes ao dia.



# CORTICÓIDE NASAL

## USO NASAL

- **Budesonida 32mcg/jato (Busonid / Noex) _____ 1 frasco**

Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 h por 10 dias.

- **Fluticasona 50 mcg/jato (Flixonase / Avamys) _____ 1 frasco**

Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 h por 10 dias.

- **Beclometasona 50 mcg/jato (Clenil) _____ 1 frasco**

Aplicar 2 jatos em cada narina de 12 em 12 h por 10 dias.



# SORO FISIOLÓGICO NASAL

**USO NASAL**

- **Cloreto de sódio a 0,9% (Sorine / Rinosoro)** _____ **1 frasco**

Aplicar 1-3mL (2 jatos) em cada narina quantas vezes forem necessárias durante o dia.