

Revisão P2
Divane Marcon

Erickson G. Müller



25 de Junho de 2024

1 Conteúdos

1. Derivadas
2. Velocidade e Aceleração
3. Integrais Definidas e Indefinidas
4. Teorema Fundamental do Cálculo
5. Cálculo de Áreas

2 Derivadas

A derivada é o coeficiente angular da reta tangente à curva $f(x)$ num determinado ponto.



A curva tangente no ponto P é calculada à medida que o ponto Q se aproxima do ponto P correndo sobre a curva.

$$\lim_{Q \rightarrow P} f(x) = P'x + b$$

Exemplo:

Encontre a inclinação da reta tangente à curva $y = x^2 - 2x + 1$ no ponto (x_1, y_1) .

Se $f(x) = x^2 - 2x + 1$, então $f(x) = x_1^2 - 2x_1 + 1$;

$$\begin{aligned} f(x_1 + \Delta x) &= (x_1 + \Delta x)^2 - 2(x_1 + \Delta x) + 1 \\ &= x_1^2 + 2x_1 \cdot \Delta x + \Delta x^2 - 2x_1 - 2\Delta x + 1 \end{aligned}$$

Usando limites...

$$\begin{aligned} m(x_1) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x_1^2 + 2x_1 \cdot \Delta x + \Delta x^2 - 2x_1 - 2\Delta x + 1 - (x_1^2 - 2x_1 + 1)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x_1 \cdot \Delta x + \Delta x^2 - 2\Delta x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x \cdot (2x_1 + \Delta x - 2)}{\Delta x} = 2x_1 - 2 \end{aligned}$$

Por meio dessa derivação, provamos a propriedade de que $f'(x) = n \cdot x^{n-1}$.

Para entender melhor, irei desenhar um gráfico com as curvas $x^2 - 2x + 1$ e $(2x - 2).x + b$, para $x = 3$:


Ou seja, o $2x + b$ passa a ser o a da nova reta a ser descoberta, deste modo, se quisermos que a reta passe no ponto $(3, 4)$, aplicaremos na fórmula da reta $y = ax + b$.

$$4 = (2.3 - 2).3 + b$$

$$a = 4$$

$$b = -8$$

$$f'(x) = 4x - 8$$



2.1 Propriedades

2.2 Derivada de uma Função num Ponto

A derivada da função $f(x)$ no ponto x_1 , denotada por $f'(x_1)$, é definida pelo limite:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

ou

$$f'(x) = \lim_{x_f \rightarrow x_0} \frac{f(x_f) - f(x_0)}{x_f - x_0}$$

Exemplo:

Encontre a equação da reta tangente à curva $y = \sqrt{x}$ que seja paralela à reta $8.x - 4.y + 1 = 0$.

Por serem paralelas, seus coeficientes angulares são iguais.

Por esse motivo vamos encontrar a inclinação da reta tangente à curva $y = \sqrt{x}$ num ponto (x_1, y_1) . Temos:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x_1 + \Delta x} - \sqrt{x_1}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x_1 + \Delta x} - \sqrt{x_1}}{\Delta x} \cdot \frac{(\sqrt{x_1 + \Delta x} + \sqrt{x_1})}{(\sqrt{x_1 + \Delta x} + \sqrt{x_1})} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x_1 + \Delta x}^2 - \sqrt{x_1}^2}{\Delta x \cdot (\sqrt{x_1 + \Delta x} + \sqrt{x_1})} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x_1 + \Delta x - x_1}{\Delta x \cdot (\sqrt{x_1 + \Delta x} + \sqrt{x_1})} \\ f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x_1 + \Delta x} + \sqrt{x_1}} \\ f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{x_1}} \end{aligned}$$

Essa é a derivada de $f(x) = \sqrt{x}$, como queremos encontrar a reta tangente que seja paralela à reta $8.x - 4.y + 1 = 0$, precisamos igualar a derivada de $f(x)$ ao coeficiente angular da segunda reta. **Pois a derivada de uma curva é o coeficiente angular da reta tangente à curva em determinado ponto.**

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\sqrt{x_1}} &= \frac{8}{4} \\ \sqrt{x_1} &= \frac{1}{4} \\ x_1 &= \frac{1}{16} \\ y_1 &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Esse é o ponto da reta tangente. Podemos agora aplicar à fórmula da função de segundo grau:


$$\begin{aligned} \frac{1}{4} &= 2 \cdot \frac{1}{16} + b \\ b &= \frac{2}{8} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8} \\ y &= 2.x + \frac{1}{8} \\ 16.x - 8.y + 1 &= 0 \end{aligned}$$

Exemplo:

No último exemplo, encontramos a derivada usando uma reta paralela à reta

a qual buscamos, para isso a derivada da função deve ser igual ao coeficiente angular da reta paralela. Agora vamos ver um exemplo de como encontrar uma reta tangente que seja perpendicular a uma outra reta.

O nome dessa reta perpendicular é reta normal e ela apresenta ângulo reto no ponto da reta tangente.



Acima temos a equação para a reta normal à curva $y = x^2$ no ponto $(2, 4)$.

Duas retas $f(x)$ e $g(x)$ são perpendiculares se o **produto dos coeficientes angulares das duas retas for igual a -1**.

2.3 Velocidade e Aceleração

Existem dois tipos de cálculo para encontrar uma velocidade ou aceleração, a velocidade ou aceleração instantâneas e a velocidade e aceleração intervalares. A intervalar é calculada fazendo a média da diferença entre as distâncias ou as velocidades em um determinado intervalo de tempo $(\frac{s(t+\Delta t) - s(t)}{\Delta t})$. Para calcularmos a velocidade em determinado momento, precisamos aplicar o limite das velocidades médias quando Δt se aproxima de 0.

$$v(\Delta t) = \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}$$

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t} = s'(t)$$

Para calcular a aceleração, em vez da velocidade, apenas se substituem na fórmula as variáveis distância(s) pelas variáveis velocidade(v). Assim como a velocidade é calculada pela variação de distância, a aceleração é calculada pela variação de velocidade.

- 2.4 Regra da Cadeia
- 2.5 Derivada das Funções Elementares
- 2.6 Derivada das Funções Trigonométricas
- 3 Integrais
 - 3.1 Integrais Definidas
 - 3.2 Integrais Indefinidas
 - 3.3 Teorema Fundamental do Cálculo
- 4 Cálculo de Áreas