

Tema IV: Determinantes

Sea $A \in M(2, \mathbb{R})$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ la función determinante, D , se define por:

$$D: M(2, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A \mapsto D(A) = ad - bc$$

Notaciones: $D(A) = \det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

Ejemplo: sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(B) = -1 \cdot 0 - 5 \cdot 0 = 0$$

Propiedades para una matriz 2x2:

a) D es lineal en cada fila:

$$\begin{vmatrix} x_1 + \alpha y_1 & x_2 + \alpha y_2 \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ c & d \end{vmatrix} + \alpha \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ c & d \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ x_1 + \alpha y_1 & x_2 + \alpha y_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} + \alpha \begin{vmatrix} a & b \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}$$

b) D es alternada. Es decir, si dos filas adyacentes (0 columnas) son iguales, entonces $|A| = 0$:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ a & b \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} x & x \\ y & y \end{vmatrix} = 0$$

c) $D(I_2) = 1$

Determinante de una matriz de orden n (cofactores)

Sea $D: M(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, se define por:

- a) Para $n=1$; $D(a) = a$
- b) Para $n>1$ y para cualquier fila i :

$$D(A) = (-1)^{i+1} a_{i1} D(A_{i1}) + (-1)^{i+2} a_{i2} D(A_{i2}) + \cdots + (-1)^{i+n} a_{in} D(A_{in})$$

Donde A_{ij} es la submatriz que se obtiene de A al eliminar la fila i y la columna j .

Ejemplo: aplicar lo anterior para calcular $\det(A)$ si $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

$$\text{Recuerde que: } A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{matrix} \text{fila1} \\ \text{fila2} \\ \text{fila3} \end{matrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{fila1} \rightarrow |A| &= (-1)^{1+1} \cdot 3 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot -2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 3 \cdot -2 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{fila2} \rightarrow |A| &= (-1)^{2+1} \cdot 1 \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{2+2} \cdot 0 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{2+3} \cdot 1 \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= -1 \cdot -4 + 0 \cdot 2 + -1 \cdot 4 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{fila3} \rightarrow |A| &= (-1)^{3+1} \cdot -1 \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+2} \cdot 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3} \cdot 0 \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= -1 \cdot -2 + -2 \cdot 1 + 0 \cdot 2 = 0 \end{aligned}$$

Nota: se pueden generalizar las tres propiedades anteriores de determinantes 2x2.

1) D es lineal en cada fila:

$$D \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_{r-1} \\ \alpha x + y \\ A_{r+1} \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} = \alpha D \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_{r-1} \\ x \\ A_{r+1} \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_{r-1} \\ y \\ A_{r+1} \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix}$$

2) D es alternada. Es decir, si las filas adyacentes (o columnas) son iguales, entonces D vale cero.

3) $D(I_n) = 1$

Teorema:

Si $A \in M(n, \mathbb{R})$ y los vectores filas A_1, A_2, \dots, A_n son las filas de A, entonces:

1) $D(A) = 0$ si alguna fila de A es nula.

2) $D(\alpha A) = \alpha^n D(A) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}.$

3) D cambia de signo si dos filas de k, r se intercambian:

$$D \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_k \\ \vdots \\ A_r \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} = -D \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_r \\ \vdots \\ A_k \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix}$$

4) $D(A) = 0$ si dos filas (o columnas) de A son iguales.

- 5) La operación elemental $\alpha f_k + f_r$ no altera el valor del determinante. Es decir, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ se tiene:

$$D \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_k \\ \vdots \\ A_r \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_k \\ \vdots \\ A_r + \alpha A_k \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix}$$

Teorema:

Sí $A, B \in M(n, \mathbb{R})$, entonces:

- 1) $D(A) \neq 0 \Leftrightarrow A$ es invertible.
- 2) $D(A) = 0 \Leftrightarrow A$ no es invertible.
- 3) $D(A) = D(A^t) \quad \forall A, B \in M(n, \mathbb{R})$.
- 4) $D(AB) = D(A) \cdot D(B) \quad \forall A, B \in M(n, \mathbb{R})$.
- 5) Si A es invertible $D(A^{-1}) = \frac{1}{D(A)}$

Ejemplo: usando solo las propiedades de los determinantes deduzca que

$$\begin{vmatrix} a & b \\ b+c & a+c \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} a & b \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ b+c & a+c \end{vmatrix} \stackrel{f_1+f_2}{=} \begin{vmatrix} a & b \\ a+b+c & a+b+c \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} a & b \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Ejemplo: calcule el $\det(A)$, utilizando las propiedades de los determinantes

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} \stackrel{f_1 \leftrightarrow f_2}{=} - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} \stackrel{-2f_1+f_2}{=} - \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & -4 & 7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 7 \end{vmatrix} = -(-7+12) = -5$$

Ejemplo: demuestre que $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{vmatrix} = (y-x)(z-x)(z-y)$

$$\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{vmatrix} \stackrel{\substack{-f_1+f_2 \\ -f_1+f_3}}{=} \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & y-x & y^2-x^2 \\ 0 & z-x & z^2-x^2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} y-x & y^2-x^2 \\ z-x & z^2-x^2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} y-x & (y+x)(y-x) \\ z-x & (z+x)(z-x) \end{vmatrix}$$

$$= (y-x)(z-x) \begin{vmatrix} 1 & y+x \\ 1 & z+x \end{vmatrix}$$

$$= (y-x)(z-x)(z+x-y-x)$$

$$= (y-x)(z-x)(z-y)$$

Teorema:

Sea $A \in M(n, \mathbb{R})$ una matriz triangular (superior o inferior), entonces el determinante de A es igual, al producto de los elementos de la diagonal.

Ejemplo: sea $A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & -9 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

$$|A| = 1 \cdot 2 \cdot (-1) \cdot 4 = -8$$

Regla de Cramer**Teorema:**

Si $A \in M(n, \mathbb{R})$ y $D(A) \neq 0$, entonces el sistema $Ax = b$ donde $b \in \mathbb{R}^n$, tiene solución única

$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^t$ dada por $x_i = \frac{D(A_1, \dots, A_{i-1}, b, A_{i+1}, \dots, A_n)}{D(A)}$, $i = 1, \dots, n$. Expresión en la

cual A_1, A_2, \dots, A_n son las columnas de A.

$$2x + y + z = 0$$

Ejemplo: resolver el sistema $x - y + 5z = 0$

$$y - z = 4$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \stackrel{-2f_2+f_1}{=} \begin{vmatrix} 0 & 3 & -9 \\ 1 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & -9 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -(-3+9) = -6$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 5 \\ 4 & 1 & -1 \end{vmatrix}}{-6} = \frac{-1}{6} \cdot 4 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = \frac{-1}{6} \cdot 4 \cdot 6 = -4$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & -1 \end{vmatrix}}{-6} = \frac{-1}{6} \cdot -4 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = \frac{-1}{6} \cdot -4 \cdot 9 = 6$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}}{-6} = \frac{-1}{6} \cdot 4 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = \frac{-1}{6} \cdot 4 \cdot -3 = 2$$

$$\Rightarrow S : \{(-4, 6, 2)\}$$

Matriz adjunta y matrices inversas

La matriz adjunta de la matriz cuadrada $A \in M(n, \mathbb{R})$ es:

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} C_{11}(A) & C_{21}(A) & \cdots & C_{n1}(A) \\ C_{12}(A) & C_{22}(A) & \cdots & C_{n2}(A) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ C_{1n}(A) & C_{2n}(A) & \cdots & C_{nn}(A) \end{pmatrix}$$

Donde $C_{ij}(A)$ es el cofactor de A.

Ejemplo: sea $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, calcule la $\text{Adj}(A)$

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 8 & -3 \\ -2 & -11 & 3 \\ 1 & 10 & -3 \end{pmatrix}$$

Proposición:

Si $A \in M(n, \mathbb{R})$ y $\det(A) \neq 0$, entonces, $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$.

Ejemplo: calcule la inversa de $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & 8 & -3 \\ -2 & -11 & 3 \\ 1 & 10 & -3 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} \underset{\substack{f_2+f_1 \\ -3f_2+f_3}}{=} \begin{vmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A) = \frac{-1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 8 & -3 \\ -2 & -11 & 3 \\ 1 & 10 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-2}{3} & \frac{-8}{3} & 1 \\ \frac{2}{3} & \frac{11}{3} & -1 \\ \frac{-1}{3} & \frac{-10}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

Referencias bibliográficas

Anton, H. (2004) *Introducción al Álgebra Lineal*. (5^{ta} edición). Limusa: México.

Arce, C., Castillo, W., González, J. (2004). *Álgebra Lineal*. (3^{ra} edición). Editorial UCR: Costa Rica.

Barrantes, H. (2012). *Elementos de Álgebra Lineal*. EUNED: Costa Rica.

Grossman, S., Flores, J. (2012). *Álgebra Lineal*. (7^{ma} edición). Mc-GrawHill: México.

Sánchez, Jesús. (2020). *Álgebra lineal fundamental: teoría y ejercicios*. Editorial UCR: Costa Rica.

Sánchez, Jesús. (2020). *MA1004 álgebra lineal: Exámenes resueltos*. En revisión.