

Tema VIII: Ortogonalidades y Proyecciones**Conjuntos ortogonales:**

Un conjunto $T = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ de vectores, no nulos, en \mathbb{R}^n es ortogonal si $u_i \cdot u_j = 0$, para cualquier pareja de índices i, j en $\{1, 2, \dots, k\}$; siempre que $i \neq j$.

Ejemplo: el conjunto $T = \{u_1, u_2, u_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ es un conjunto ortogonal.

$$u_1 \cdot u_2 = 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 = 0$$

$$u_1 \cdot u_3 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-4) + (-1) \cdot 1 = 0$$

$$u_2 \cdot u_3 = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-4) + 2 \cdot 1 = 0$$

Teorema: Si un conjunto $B = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ de vectores no nulos de \mathbb{R}^n es ortogonal entonces es li.

Corolario: Sea $B = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ un conjunto no nulo de vectores ortogonales, de un subespacio S de dimensión k, entonces B es una base de S.

Bases ortonormales:

Sea $S \subseteq \mathbb{R}^n$ un subespacio vectorial de dimensión k. Una base $B = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ de S es ortonormal si:

$$a) \quad v_i \cdot v_j = 0 \quad \forall i, j = 1, \dots, k \quad i \neq j$$

$$b) \quad \|v_i\| = 1 \quad \forall i = 1, \dots, k$$

Es decir, si es un conjunto ortogonal de vectores unitarios de S.

Ejemplo: el conjunto $T = \{v_1, v_2, v_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right\}$

$$v_1 \cdot v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 0 + 0 \cdot 1 + \frac{-1}{\sqrt{2}} \cdot 0 = 0 \quad \|v_1\| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 0^2 + \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^2} = 1$$

$$v_1 \cdot v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 \cdot 0 + \frac{-1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 0 \quad \|v_2\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1$$

$$v_2 \cdot v_3 = 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 0 \quad \|v_3\| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + 0^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = 1$$

Teorema:

Sea S un subespacio de \mathbb{R}^n , $B = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ una base ortonormal de S y B la matriz cuyas columnas son los vectores v_1, v_2, \dots, v_k , entonces:

a) $B^t \cdot B = I_k$

b) $[v]_B = (v \cdot v_1, v \cdot v_2, \dots, v \cdot v_k)^t \quad \forall v \in S$

En particular si $k = n$, entonces B es una matriz ortogonal.

Ejemplo: del ejemplo anterior $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ y $B^t = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

Se tiene que: $B^t \cdot B = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Las coordenadas de $x = (1, 2, 3)^t$ en la base B son: $[v]_B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^t$

$$\alpha_1 = x \cdot v_1 = (1, 2, 3)^t \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^t = \frac{-2}{\sqrt{2}}$$

$$\alpha_2 = x \cdot v_2 = (1, 2, 3)^t \cdot (0, 1, 0)^t = 2$$

$$\alpha_3 = x \cdot v_3 = (1, 2, 3)^t \cdot \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^t = \frac{2}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow [v]_B = \left(\frac{-2}{\sqrt{2}}, 2, \frac{2}{\sqrt{2}}\right)^t$$

Subespacios ortogonales:

Dos subespacios S y T de \mathbb{R}^n son ortogonales sí $x \cdot y = 0 \quad \forall x \in S \text{ y } \forall y \in T$. Si S y T son ortogonales se escribe $S \perp T$.

Ejemplo: los subespacios $S = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 / 2x - 3y + z = 0\}$ y $T = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 / (x, y, z)^t = t(2, -3, 1), t \in \mathbb{R}\}$ son ortogonales.

$$x = (x_1, x_2, x_3)^t \in S \Rightarrow 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \quad y = (y_1, y_2, y_3)^t \in T \Rightarrow (y_1, y_2, y_3)^t = t(2, -3, 1) = (2t, -3t, t)$$

$$x \cdot y = (x_1, x_2, x_3)^t \cdot (2t, -3t, t)$$

$$= 2tx_1 - 3tx_2 + tx_3$$

$$= t(2x_1 - 3x_2 + x_3)$$

$$= t \cdot 0$$

$$= 0 \Rightarrow S \perp T$$

Teorema:

Si S y T son subespacios ortogonales de \mathbb{R}^n entonces $S \cap T = \{0_n\}$.

Teorema:

Sean $B_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$, $B_2 = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ bases de S y T, subespacios de \mathbb{R}^n , entonces $S \perp T \Leftrightarrow u_i \perp v_j \quad \forall i = 1, \dots, k, \quad j = 1, \dots, r$.

Teorema:

Si S es un subespacio de \mathbb{R}^n entonces el conjunto $S^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n / x \perp y, \quad \forall y \in S\}$.

Complemento ortogonal de: S y S^\perp

Sea S un subespacio vectorial de \mathbb{R}^n , se llama complemento ortogonal de S al subespacio de todos los vectores de \mathbb{R}^n que son ortogonales a cualquier vector de S $S^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n / x \perp y, \quad \forall y \in S\}$.

Observación importante: si $S = \text{cl}\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ es un subespacio de \mathbb{R}^n , entonces:

$$\begin{aligned} S^\perp &= \{x \in \mathbb{R}^n / x \perp y, \quad \forall y \in S\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^n / x \perp v_i, \quad \forall i = 1, \dots, k\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^n / v_i \cdot x = 0, \quad \forall i = 1, \dots, k\} \\ &= \{x \in \mathbb{R}^n / Ax = 0_k\} \end{aligned}$$

Donde A es la matriz $k \times n$ cuyas filas son los vectores $v_1^t, v_2^t, \dots, v_k^t$


Ejemplo: sea $S = \text{cl}\{(1, 2, 3)^t\}$ la recta que pasa por el origen con vector director $(1, 2, 3)^t$, entonces el complemento ortogonal es el plano $S^\perp = \{x \in \mathbb{R}^3 / x + 2y + 3z = 0\}$.

Proyección ortogonal sobre un subespacio

Teorema:

Si $W \subseteq \mathbb{R}^n$ es un subespacio de \mathbb{R}^n , $\forall x \in \mathbb{R}^n$ existe un único vector $u \in W$ tal que:

- 1) $(x - u) \perp w \quad \forall w \in W$
- 2) $\|x - u\| \leq \|x - w\| \quad \forall w \in W$



Definición: sea $W \subseteq \mathbb{R}^n$ un subespacio y $x \in \mathbb{R}^n$ se llama vector proyección ortogonal de x sobre el subespacio W, o simplemente proyección ortogonal de x sobre W al único vector, tal que $(x - u) \perp w \quad \forall w \in W$ y se escribe $u = \text{Pr oy}_W^x$. El vector $x - u$ se le denomina componente ortogonal de x ortogonal a W.

Teorema:

Si $W \subseteq \mathbb{R}^n$ es un subespacio de \mathbb{R}^n y $B = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ una base ortogonal de W, entonces:

- 1) $\text{Pr oy}_W^x = (x \cdot v_1)v_1 + (x \cdot v_2)v_2 + \dots + (x \cdot v_k)v_k$
- 2) $\text{Pr oy}_W^x = BB^t x$

Donde B es la matriz cuyas columnas son los vectores de la base B.

Ejemplo: sea $S = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4)^t \in \mathbb{R}^4 / x_3 = 0 \right\}$. Determine Proy_S^x y la componente de x ortogonal a S .

$$\forall x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t \in \mathbb{R}^4; \quad u = (x_1, x_2, 0, x_4)^t \in S$$

$$\text{Calculamos: } x - u = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t - (x_1, x_2, 0, x_4)^t = (0, 0, x_3, 0)^t$$

$$\text{Proy}_S^x = x - (x_1, x_2, 0, x_4)^t = (x_1, x_2, 0, x_4)^t$$

La componente de x ortogonal a S : $x - u = (0, 0, x_3, 0)^t$

Ejemplo: si $B = \{v_1, v_2, v_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right\}$, es una base ortonormal de S .

$$\text{Proy}_S^x = (x \cdot v_1)v_1 + (x \cdot v_2)v_2 + (x \cdot v_3)v_3$$

$$= \begin{bmatrix} (x_1, x_2, x_3, x_4)^t \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} + (x_1, x_2, x_3, x_4)^t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (x_1, x_2, x_3, x_4)^t \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \end{bmatrix}$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} x_1 - \frac{1}{\sqrt{2}} x_4 \right) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} x_1 + \frac{1}{\sqrt{2}} x_4 \right) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \left(\frac{x_1 - x_4}{\sqrt{2}} \right) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \left(\frac{x_1 + x_4}{\sqrt{2}} \right) \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{x_1 - x_4 + x_1 + x_4}{2} \\ x_2 \\ 0 \\ \frac{-x_1 + x_4 + x_1 + x_4}{2} \end{pmatrix}$$

$$= (x_1, x_2, 0, x_4)^t$$

Construcción de bases ortonormales:

Si $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ es una base cualquiera de un subespacio vectorial S_k de \mathbb{R}^n , es posible mediante un proceso recursivo construir una nueva base $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ de S_k ortonormal tal que cada $v_i \in S_i = c\ell\{u_1, u_2, \dots, u_i\}$ $i = 1, \dots, k$

Ortonormalización de Gram-Schmidt

Paso 1: defina $v_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}$, $S_1 = c\ell\{v_1\}$

además $\{v_1\}$ es una base ortonormal de S_1

Paso 2: defina $v_2 = \frac{u_2 - \text{Pr oy}_{S_1}^{u_2}}{\|u_2 - \text{Pr oy}_{S_1}^{u_2}\|}$,

además $v_2 \in S_2 = c\ell\{v_1, v_2\}$, $v_2 \perp S_1$ y $\{v_1, v_2\}$ es una base ortonormal de S_2

Paso 3: defina $v_3 = \frac{u_3 - \text{Pr oy}_{S_2}^{u_3}}{\|u_3 - \text{Pr oy}_{S_2}^{u_3}\|}$,

además $v_3 \in S_3 = c\ell\{v_1, v_2, v_3\}$, $v_3 \perp S_2$ y $\{v_1, v_2, v_3\}$ es una base ortonormal de S_3

\vdots

Paso k: defina $v_k = \frac{u_k - \text{Pr oy}_{S_{k-1}}^{u_k}}{\|u_k - \text{Pr oy}_{S_{k-1}}^{u_k}\|}$,

además $v_k \in S_k = c\ell\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$, $v_k \perp S_{k-1}$ y $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ es una base ortonormal de S_k

Ejemplo: aplique el proceso de GH para transformar la base constituida por los vectores $u_1 = (1,1,1)$, $u_2 = (0,1,1)$ y $u_3 = (0,0,1)$ en una base ortonormal.

$$P_1 : v_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{(1,1,1)}{\|(1,1,1)\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \quad S_1 = c\ell\left\{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right\}$$

$$P_2 : u_2 - \text{Pr oy}_{S_1}^{u_2} = u_2 - (u_2 \cdot v_1)v_1$$

$$(u_2 \cdot v_1)v_1 = \left[(0,1,1) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right] \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$u_2 - \text{Pr oy}_{S_1}^{u_2} = (0,1,1) - \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \quad \text{además } \left\|\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)\right\| = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$v_2 = \frac{\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)}{\frac{\sqrt{6}}{3}} = \frac{3}{\sqrt{6}} \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) = \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) \quad \text{con } S_2 = c\ell\{v_1, v_2\}$$

$$P_3 : u_3 - \text{Pr oy}_{S_2}^{u_3} = u_3 - \left[(u_3 \cdot v_1)v_1 + (u_3 \cdot v_2)v_2\right]$$

$$u_3 \cdot v_1 = (0,0,1) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$u_3 \cdot v_2 = (0,0,1) \cdot \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$\text{Pr oy}_{S_2}^{u_3} = (u_3 \cdot v_1)v_1 + (u_3 \cdot v_2)v_2$$

$$\text{Pr oy}_{S_2}^{u_3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{\sqrt{6}} \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right) = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$u_3 - \text{Pr oy}_{S_2}^{u_3} = (0,0,1) - \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad \text{además } \left\|\left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\right\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$v_3 = \frac{\left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2} \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{2}} \left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$B = \left\{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right), \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right\}$$