

Calculus HW2

Date: Mar 13

Made by Eric

Let $f(x) = \frac{1}{-x}$, $g(x) = \sin^2(x)$ be two function from \mathbb{R}^+ to \mathbb{R}

$$f'(x) = \frac{1}{x^2}$$

$$g'(x) = -2\sin(x)\cos(x) = -\sin(2x)$$

$$\frac{\sin^2(x)}{x^2} = f'(x)g(x)$$

$$f(x)g(x) = \frac{\sin^2(x)}{-x}$$

$$f(x)g'(x) = \frac{\sin(2x)}{x}$$

Because $\forall x \in \mathbb{R}^+$, $f(x)$, $g(x)$, $f'(x)$, $g'(x)$ all exists, so $\forall x \in \mathbb{R}^+$, $\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) = [\frac{d}{dx}f(x)]g(x) + [\frac{d}{dx}g(x)]f(x)$

That is $\forall x \in \mathbb{R}^+$, $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

Then $\forall n_2, n_1 \in \mathbb{R}^+$, $\int_{n_1}^{n_2} [f(x)g(x)]' dx = \int_{n_1}^{n_2} f'(x)g(x) dx + \int_{n_1}^{n_2} f(x)g'(x) dx$

Because $f(x)g(x) = \frac{\sin^2(x)}{-x}$ is differentiable on \mathbb{R}^+ , so $\forall n_2, n_2 \in \mathbb{R}^+$, $\int_{n_1}^{n_2} [f(x)g(x)]' dx = f(x)g(x)|_{n_1}^{n_2}$

Change the order and put in the actual function we have:

$$\forall n_2, n_1 \in \mathbb{R}^+, \int_{n_1}^{n_2} [f(x)g(x)]' dx = \int_{n_1}^{n_2} f'(x)g(x) dx + \int_{n_1}^{n_2} f(x)g'(x) dx$$

$$\forall n_2, n_1 \in \mathbb{R}^+, \int_{n_1}^{n_2} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx = \frac{\sin^2(x)}{-x} \Big|_{n_1}^{n_2} - \int_{n_1}^{n_2} \frac{\sin(2x)}{x} dx$$

$$\lim_{n_1 \rightarrow 0, n_2 \rightarrow \infty} \int_{n_1}^{n_2} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx = \lim_{n_1 \rightarrow 0, n_2 \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(x)}{-x} \Big|_{n_1}^{n_2} - \int_{n_1}^{n_2} \frac{\sin(2x)}{x} dx$$

We only have to prove $\lim_{n_1 \rightarrow 0, n_2 \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(x)}{-x} \Big|_{n_1}^{n_2}$ and $\lim_{n_1 \rightarrow 0, n_2 \rightarrow \infty} \int_{n_1}^{n_2} \frac{\sin(2x)}{x} dx$ exist, by directly calculating their value, then we have our result.

$$\lim_{n_1 \rightarrow 0, n_2 \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(x)}{-x} \Big|_{n_1}^{n_2} = \lim_{n_2 \rightarrow \infty} \frac{\sin^2(x)}{-x} \Big|_5^{n_2} + \lim_{n_1 \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x)}{-x} \Big|_{n_1}^5 = 0 - \frac{\sin^2(x)}{-x} \Big|_5 + \frac{\sin^2(x)}{-x} \Big|_5 - 0 \text{ (notice : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1)$$

$$\text{And } \lim_{n_1 \rightarrow 0, n_2 \rightarrow \infty} \int_{n_1}^{n_2} \frac{\sin(2x)}{x} dx = 2 \int_{n_1}^{n_2} \frac{\sin(2x)}{2x} dx = 2 \int_{n_1}^{n_2} L(2x) dx, \text{ where } L(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

You should be capable of finishing the trivial part by your self.