

MATERIAL PARA PACIENTES

Pánico

Guía, herramientas y registro

¿Qué vas a encontrar acá?

Psicoeducación

Qué es una crisis, ansiedad de estado y de rasgo, el miedo al miedo, qué hacer antes, durante y después, y técnicas con respaldo científico.

Autorregistro

Mi círculo del pánico, registros de crisis, práctica de sensaciones y un resumen semanal.

¿Cómo completarlo?

1. Abrilo en tu celular con una app que permita completar formularios PDF (por ejemplo, Adobe Acrobat Reader).
2. Leé la guía con calma. Podés volver a ella cuando lo necesites, también en medio de una crisis.
3. Después de una crisis, completá un registro lo antes posible. Sólo tocá las opciones y escribí lo necesario.
4. Al terminar la semana, completá el resumen y guardá los cambios.

Envialo y lo trabajamos juntos

Guardá el archivo y envialo por WhatsApp al **341 660-1847** antes de la próxima sesión. Ahí lo vamos a revisar juntos.

¿Para qué sirve?

- Te ayuda a entender qué pasa en tu cuerpo y en tu mente durante una crisis.
- Explica por qué el miedo a la próxima crisis mantiene el problema.
- Ofrece qué hacer antes, durante y después de una crisis.
- Aporta material de trabajo para los dos en la próxima sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

¿Qué es una crisis de pánico?

Es una **oleada repentina de miedo intenso** que llega a su pico en pocos minutos, acompañada de sensaciones físicas fuertes. Puede aparecer en una situación concreta o "de la nada", incluso en reposo.


Lo que se puede sentir

Marcá lo que sentiste alguna vez.

- ☐ Corazón acelerado
- ☐ Falta de aire
- ☐ Mareo
- ☐ Opresión en el pecho
- ☐ Temblor
- ☐ Sudor
- ☐ Náuseas
- ☐ Hormigueo
- ☐ Calor o escalofríos
- ☐ Irrealidad
- ☐ Miedo a perder el control
- ☐ Miedo a morir

Una crisis es como una ola

Sube rápido, llega a un pico y baja sola, aunque no hagas nada para frenarla.



Muy desagradable, pero no peligrosa

Las sensaciones son la respuesta de alarma del cuerpo (la misma que se activa ante un peligro real). Asustan mucho, pero no dañan el corazón ni hacen perder la razón.

Una consulta médica, una vez

Es útil que un/a médico/a descarte otras causas al principio. Una vez descartadas, no hace falta repetir estudios en cada crisis.

i Muchas personas tienen una crisis de pánico alguna vez en la vida. Tener una no significa tener un trastorno de pánico.

Ansiedad de estado y de rasgo

El psicólogo **Charles Spielberger** propuso distinguir dos formas de ansiedad. Entenderlas ayuda a ubicar qué es una crisis y qué se trabaja a largo plazo.

Ansiedad de estado

Lo que siento ahora

Es la ansiedad **del momento**: aparece ante una situación, sube y baja. Una crisis de pánico es un pico muy alto de ansiedad de estado.

POR EJEMPLO

Antes de un examen, en una entrevista o durante una crisis.

Ansiedad de rasgo


Cómo tiendo a ser

Es la **tendencia estable** a reaccionar con ansiedad ante muchas situaciones. Funciona como un "nivel base" más alto o más bajo.

POR EJEMPLO

Una persona que suele preocuparse y vivir las cosas como amenazas.

Dos personas frente al mismo día



Rasgo bajo: los picos son menores y bajan rápido

Rasgo alto: parte de más arriba y los picos son mayores

¿Por qué importa?

- Las herramientas para la crisis bajan la **ansiedad de estado**: ayudan a atravesar el pico.
- El trabajo en terapia apunta también al **rasgo**: cómo interpretás las sensaciones y las situaciones.
- El rasgo no es un destino: con práctica, el "nivel base" también puede bajar.
- Una persona con rasgo alto no está "condenada" a tener crisis: aprende a leer sus sensaciones de otra manera.

¿CÓMO CREÉS QUE ES TU ANSIEDAD DE RASGO?


Baja | Media | Alta | No sé

Spielberger, C. D. (1972). *Anxiety: Current trends in theory and research.* New York: Academic Press.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

El círculo del pánico

Según el modelo cognitivo de **David M. Clark**, la crisis se dispara cuando una sensación del cuerpo se interpreta como un peligro inminente. Esa interpretación aumenta la ansiedad, y la ansiedad, las sensaciones.



Lo que pienso y lo que realmente pasa

Corazón acelerado	*“Me da un infarto.”*	La adrenalina acelera el corazón, como al correr. Un corazón sano lo tolera sin problema.
Falta de aire	*“Me ahogo.”*	Al respirar rápido entra más aire del necesario. La sensación de ahogo viene de eso.
Mareo	*“Me voy a desmayar.”*	En el pánico la presión suele subir; desmayarse es muy poco frecuente.
Irrealidad	*“Me estoy volviendo loco/a.”*	Es un efecto pasajero de la ansiedad intensa. No lleva a la locura.

Clark, D. M. (1986). A cognitive approach to panic. *Behaviour Research and Therapy*, *24*(4), 461-470.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

El miedo al miedo

Después de una crisis, muchas personas empiezan a **temer la próxima**. Ese miedo anticipatorio es, muchas veces, lo que más limita la vida diaria.

1

Anticipo

Pienso en la próxima crisis antes de salir, de dormir o de viajar. Vivo en alerta.

2

Vigilo mi cuerpo

Estoy atento/a a cada latido o mareo. Cualquier sensación chica parece el inicio de una crisis.

3

Evito

Dejo de ir a lugares donde sería difícil escapar o pedir ayuda: colectivos, supermercados, filas, cines.

Conductas de seguridad

Son cosas que hacemos “por las dudas” para evitar una crisis o sentirnos protegidos/as. Dan tranquilidad en el momento, pero **impiden comprobar** que la crisis pasa sola y que lo temido no ocurre.

- **Ir siempre acompañado/a**
- **Llevar agua o una pastilla**
- **Sentarme cerca de la salida**
- **Tomarme el pulso**
- **Evitar el café o el ejercicio**
- **Distraerme todo el tiempo**
- **Tener el celular en la mano**

La salida va en sentido contrario

Marcá lo que te animás a probar esta semana.

- [ ] Acercarme de a poco a algo que evito, en lugar de alejarme.
- [ ] Dejar una conducta de seguridad.
- [ ] Permitir que las sensaciones aparezcan, sin pelear con ellas.
- [ ] Recordar que cada vez que lo hago, mi cerebro aprende que puede tolerarlo.

i Si la evitación crece mucho, puede aparecer la **agorafobia**. Se trabaja con buenos resultados en terapia.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

¿Qué puedo hacer en una crisis?

Lo que hacés antes, durante y después cambia cómo la vivís y, sobre todo, qué aprende tu cerebro para la próxima.

Antes

Prepararte

- Conocé tu círculo del pánico (página 4).
- Practicá la respiración lenta cuando estás tranquilo/a.
- Dormí lo suficiente y moderá la cafeína.
- Tené a mano tu tarjeta de frases (abajo).

Durante

Atravesar la ola

- **Nombrala:** “Es una crisis de pánico. Es ansiedad. Pasa.”
- **No huyas** si podés: quedate donde estás y esperá que baje.
- **No pelees** con las sensaciones: dejalas subir y bajar.
- **Respirá lento**, con la exhalación más larga que la inhalación.
- **Anclate:** nombrá 5 cosas que ves, 4 que tocás, 3 que oís.

Después

Aprender de ella

- No te juzgues: hiciste lo que pudiste.
- Completá el registro de crisis.
- Volvé a la actividad o al lugar en cuanto puedas.
- Recordá que pasó sola, como siempre.

MI TARJETA PARA LA CRISIS

“Es ansiedad. Es incómodo, pero no peligroso.”

“Ya pasé por esto y siempre bajó.”

“No tengo que hacer nada para que pase: sólo esperar.”

“Mi cuerpo está en alarma, pero estoy a salvo.”

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Técnicas con respaldo científico

La **terapia cognitivo-conductual** es el tratamiento psicológico con más evidencia para el pánico y se recomienda como primera opción. Estas son sus herramientas principales.

Psicoeducación

Entender qué es el pánico y por qué las sensaciones no son peligrosas ya reduce el miedo.

Reestructuración cognitiva

Revisar las interpretaciones catastróficas y ponerlas a prueba con los hechos.

Exposición interoceptiva

Provocar a propósito sensaciones parecidas a las de una crisis (girar, respirar por una pajita) para perderles el miedo. Se empieza en sesión.

Exposición en vivo, gradual

Volver de a poco a los lugares que se evitan, de menor a mayor dificultad, sin conductas de seguridad.

Dejar las conductas de seguridad

Soltar lo que se hace “por las dudas” para comprobar que no hace falta.

Respiración lenta y actividad física

La respiración lenta ayuda a bajar la activación (no como escape). El ejercicio regular reduce la ansiedad general.

i Las exposiciones se planifican en sesión, de forma gradual y después de un control médico. En algunos casos también se indica medicación.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

PARTE 2 · AUTORREGISTRO

Mi círculo del pánico

Esta hoja te ayuda a reconocer tu forma particular de vivir las crisis. Completala una vez, al empezar.

1 Sensaciones que más noto

Podés marcar varias.

- ☐ Corazón acelerado
- ☐ Falta de aire
- ☐ Mareo
- ☐ Opresión en el pecho
- ☐ Temblor
- ☐ Sudor
- ☐ Náuseas
- ☐ Hormigueo
- ☐ Irrealidad

2 Lo que temo que pase

Podés marcar varias.

- ☐ Infarto
- ☐ Ahogarme
- ☐ Desmayarme
- ☐ Volverme loco/a
- ☐ Perder el control
- ☐ Hacer el ridículo

3 Lugares o situaciones que evito

Podés marcar varias.

- ☐ Transporte público
- ☐ Supermercados
- ☐ Lugares cerrados
- ☐ Multitudes
- ☐ Salir solo/a
- ☐ Manejar
- ☐ Hacer ejercicio
- ☐ Estar lejos de casa
- ☐ Filas o esperas

4 Mis conductas de seguridad

Podés marcar varias.

- ☐ Ir acompañado/a
- ☐ Llevar agua o pastilla
- ☐ Cerca de la salida
- ☐ Tomarme el pulso
- ☐ Distraerme
- ☐ Celular en la mano

5 Otra cosa que quiera contar

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Registro de crisis · 1

Completalo lo antes posible después de una crisis. No hay respuestas correctas: anotá lo que pasó, sin juzgarte.

FECHA Y HORA _____ ¿DÓNDE? _____

1 ¿Cómo apareció?

- ○ La esperaba
- ○ De la nada
- ○ No sé

2 Sensaciones

Podés marcar varias.

- ☐ Corazón
- ☐ Falta de aire
- ☐ Mareo
- ☐ Pecho
- ☐ Temblor
- ☐ Irrealidad

3 ¿Qué pensé que iba a pasar?

4 Intensidad en el peor momento (0 a 10)

○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

5 ¿Cuánto duró?

- ○ Menos de 10 min
- ○ 10 a 30 min
- ○ Más de 30 min

6 ¿Qué hice?

Podés marcar varias.

- ☐ Me quedé y esperé
- ☐ Me fui del lugar
- ☐ Respiré lento
- ☐ Usé mi tarjeta
- ☐ Pedí ayuda
- ☐ Fui a la guardia

7 ¿Qué aprendí?

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Registro de crisis · 2

Completalo lo antes posible después de una crisis. No hay respuestas correctas: anotá lo que pasó, sin juzgarte.

FECHA Y HORA _____ ¿DÓNDE? _____

1 ¿Cómo apareció?

- ○ La esperaba
- ○ De la nada
- ○ No sé

2 Sensaciones

Podés marcar varias.

- ☐ Corazón
- ☐ Falta de aire
- ☐ Mareo
- ☐ Pecho
- ☐ Temblor
- ☐ Irrealidad

3 ¿Qué pensé que iba a pasar?

4 Intensidad en el peor momento (0 a 10)

○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

5 ¿Cuánto duró?

- ○ Menos de 10 min
- ○ 10 a 30 min
- ○ Más de 30 min

6 ¿Qué hice?

Podés marcar varias.

- ☐ Me quedé y esperé
- ☐ Me fui del lugar
- ☐ Respiré lento
- ☐ Usé mi tarjeta
- ☐ Pedí ayuda
- ☐ Fui a la guardia

7 ¿Qué aprendí?

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Práctica de sensaciones

Ejercicios de **exposición interoceptiva**. Hacelos sólo después de practicarlos en sesión y con el visto bueno médico. Anotá qué tan intensas fueron las sensaciones y cuánto se parecieron a una crisis.

EJERCICIO	TIEMPO	INTENSIDAD 0 a 10	PARECIDO 0 a 10	HECHO
Girar en una silla	1 min			☐
Respirar por una pajita fina	2 min			☐
Correr en el lugar	1 min			☐
Respirar rápido y profundo	1 min			☐
Sacudir la cabeza de lado a lado	30 s			☐
Contener la respiración	30 s			☐

Cómo practicar

- Empezá por el ejercicio con menor intensidad.
- Durante el ejercicio, no intentes frenar las sensaciones: observalas.
- Al terminar, esperá a que bajen solas, sin conductas de seguridad.
- Repetí el mismo ejercicio varios días, hasta que dé poco miedo, y recién ahí pasá al siguiente.

1 ¿Qué noté al repetirlos?

i No los hagas si tenés una condición médica cardíaca o respiratoria, embarazo o epilepsia, salvo indicación médica.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

PARTE 2 · AUTORREGISTRO

Resumen de la semana

Al terminar la semana, completá este resumen para revisarlo juntos.

SEMANA DEL _____ AL _____

1 ¿Cuántas crisis tuve?

- ○ Ninguna
- ○ 1
- ○ 2 o 3
- ○ 4 o más

2 Miedo a tener una crisis, en promedio (0 a 10)

○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

3 ¿Evité lugares o situaciones?

- ○ Nada
- ○ Un poco
- ○ Bastante
- ○ Mucho

4 ¿Qué me ayudó?

Podés marcar varias.

- ☐ Nombrar la crisis
- ☐ Quedarme
- ☐ Respiración lenta
- ☐ Mi tarjeta
- ☐ Práctica de sensaciones
- ☐ Ejercicio físico

5 Un logro de la semana

Algo que hice a pesar del miedo.

6 Para charlar en la próxima sesión

Una crisis sube, llega a un pico y baja. Vos podés atravesarla. Envialo antes de la próxima sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com