




DFT och FFT

Erik Bäckman

March 15, 2024



$$\hat{f}(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i2\pi ut} dt$$

$$f = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_N \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} \hat{f}_1 \\ \hat{f}_2 \\ \vdots \\ \hat{f}_N \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} F_k &= \sum_{n=0}^{N-1} f_n e^{(-i2\pi nk)/N} \\ &= A_k + B_k i \end{aligned}$$

$$N = 4$$

$$\begin{aligned} F_k &= \sum_{n=0}^3 f_n e^{(-i2\pi nk)/4} \\ &= f_0 w_4^{0k} + f_1 w_4^{1k} + f_2 w_4^{2k} + f_3 w_4^{3k} \end{aligned}$$

$$w_N = e^{-i2\pi/N}$$

$$N = 4$$

$$\begin{aligned} F_k &= \sum_{n=0}^3 f_n e^{(-i2\pi nk)/4} \\ &= f_0 w_4^{0k} + f_1 w_4^{1k} + f_2 w_4^{2k} + f_3 w_4^{3k} \end{aligned}$$

$$w_N = e^{-i2\pi/N}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{f}_0 \\ \hat{f}_1 \\ \hat{f}_2 \\ \hat{f}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_4^0 & w_4^0 & w_4^0 & w_4^0 \\ w_4^0 & w_4^1 & w_4^2 & w_4^4 \\ w_4^0 & w_4^2 & w_4^4 & w_4^6 \\ w_4^0 & w_4^3 & w_4^6 & w_4^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix}$$

$$F = Wf$$

$$W = \begin{bmatrix} w_N^0 & w_N^0 & w_N^0 & \dots & w_N^0 \\ w_N^0 & w_N^1 & w_N^2 & \dots & w_N^{N-1} \\ w_N^0 & w_N^2 & w_N^4 & \dots & w_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_N^0 & w_N^{N-1} & w_N^{2(N-1)} & \dots & w_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix}$$

$$F = Wf, f = W^{-1}F$$

$$F_2 = f_0 e^{-i2\pi(2)0} + f_1 e^{-i2\pi(2)1} + \dots + f_{N-1} e^{-i2\pi(2)(N-1)}$$

$N - 1$ komplexa additioner och N komplexa multiplikationer för F_k Totalt N^2 komplexa multiplikationer. $O(N^2)$

$$F_k = \sum_{n=0}^{N-1} f_n \cdot e^{-2\pi i k n / N}$$

$$F_k = \sum_{n=0}^{N-1} f_n \cdot e^{-2\pi i k n / N}$$

$$w_N = e^{\frac{-i2\pi}{N}}$$

$$F_k = \sum_{n=0}^{N-1} f_n \cdot e^{-2\pi i k n / N}$$

$$w_N = e^{\frac{-i2\pi}{N}}$$

$$F_k = \sum_{n=0}^{N-1} f_n \cdot w_N^{nk}$$

En N-punkt F_k DFT är N-periodisk

$$F_k = \sum_{n=0}^{N-1} f_n \cdot w_N^{nk}$$

$$\begin{aligned} F_{k+N} &= \sum_{n=0}^{N-1} f_n \cdot w_N^{n(k+N)} = \sum_{n=0}^{N-1} f_n \cdot w_N^{nk} w_N^{nN} = \sum_{n=0}^{N-1} f_n \cdot w_N^{nk} e^{(\frac{-i2\pi}{N})nN} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} f_n \cdot w_N^{nk} e^{(-i2\pi)n} = \sum_{n=0}^{N-1} f_n \cdot w_N^{nk} = F_k \end{aligned}$$

Två $N/2$ -punkt sekvenser med jämna och udda index

$$g_k = \{f_0, f_2, f_4, \dots, f_{N-2}\}, \quad h_k = \{f_1, f_3, f_5, \dots, f_{N-1}\}$$

$$\begin{aligned} F_k &= \sum_{n=0}^{N/2-1} f_{2n} w_N^{2nk} + \sum_{n=0}^{N/2-1} f_{2n+1} w_N^{(2n+1)k} \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} f_{2n} w_N^{2nk} + \sum_{n=0}^{N/2-1} f_{2n+1} w_N^{2nk} \cdot w_N^k \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} f_{2n} w_N^{2nk} + w_N^k \sum_{n=0}^{N/2-1} f_{2n+1} w_N^{2nk} \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} f_{2n} w_{N/2}^{nk} + w_N^k \sum_{n=0}^{N/2-1} f_{2n+1} w_{N/2}^{nk} \\ &= G_k + w_N^k H_k \end{aligned}$$

$$F_k = G_k + W_N^k H_k$$

G_k och H_k är $N/2$ -punkt DFTs och därmed $N/2$ periodiska så

$G_{k+N/2} = G_k$ och $H_{k+N/2} = H_k$.

Dessutom har vi

$$w_N^{k+N/2} = w_N^k w_N^{N/2} = e^{-i2\pi} w_N^k = -w_N^k$$

Så att

$$F_k = G_k + w_N^k H_k$$

$$F_{k+N/2} = G_k - w_N^k H_k$$

Varje steg kräver

- $N/2$ komplexa multiplikationer
- N komplexa additioner

Komplexitet: $O(N \log_2 N)$

FFT: Implementation

```
function fft(f)
    N = length(f)
    if N == 1 return f end
    N_half = Int(N/2)
    w = exp(-2*im/N)
    G = fft(f[1:2:end])
    H = fft(f[2:2:end])
    F = zeros(Complex{Float64}, N)
    wk = 1;
    for k in 1:N_half
        wHk = wk*H[k]
        F[k] = G[k] + wHk
        F[k + N_half] = G[k] - wHk
        wk = wk*w
    end
    return F
end
```

$$f_k = F_k^{-1} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F_n e^{\frac{i2\pi}{N} nk}$$

$$f_k = F_k^{-1} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F_n e^{\frac{i2\pi}{N} nk}$$

$$F(\bar{F})_k = \sum_{n=0}^{N-1} \bar{F}_n e^{\frac{-i2\pi}{N} nk}$$

$$f_k = F_k^{-1} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F_n e^{\frac{i2\pi}{N} nk}$$

$$F(\bar{F})_k = \sum_{n=0}^{N-1} \bar{F}_n e^{\frac{-i2\pi}{N} nk}$$

$$(\overline{F(\bar{F})})_k = \sum_{n=0}^{N-1} F_n e^{\frac{i2\pi}{N} nk}$$

$$f_k = F_k^{-1} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F_n e^{\frac{i2\pi}{N} nk}$$

$$F(\bar{F})_k = \sum_{n=0}^{N-1} \bar{F}_n e^{\frac{-i2\pi}{N} nk}$$

$$(\overline{F(\bar{F})})_k = \sum_{n=0}^{N-1} F_n e^{\frac{i2\pi}{N} nk}$$

$$\frac{1}{N} (\overline{F(\bar{F})})_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} F_n e^{\frac{i2\pi}{N} nk} = f_k$$

Invers DFT: Implementation

```
function ifft(a)
    a = conj.(a)
    a = fft(a)
    a = conj.(a)
    a = a./length(a)
end
```