

Linjär Algebra

Föreläsning 12

Erik Sjöström

December 1, 2015

1 Homogena ekvationssystem

Exempel 1.1.

Låt $\mathbf{A} \cdot = \emptyset$ ges av:

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

En lösning är förstås:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Den lösningen kallas för den triviala lösning.

Finns det fler lösningar? Vi gausseliminerar:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 0 \end{array} \right] \cdot -\frac{8}{3} \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{8}{3} & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 0 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} = R_3 \\ = R_2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{8}{3} & -2 & 0 \end{array} \right] \cdot \begin{array}{l} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{8/3} \end{array} \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{4} & 0 \end{array} \right]$$

Låt $x_4 = t$, (x_4 är en fri variabel)

Vi får:

$$\begin{cases} x_3 = \frac{3}{4} \cdot t \\ x_2 = \frac{3}{4} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot t = \frac{5}{4} \cdot t \\ x_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot t = \frac{1}{4} \cdot t \end{cases}$$

Vi får alltså svaret:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/4 \\ 5/4 \\ 3/4 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot t$$

Dvs: En linje i \mathbb{R}^4 genom origo.

Den homogena ekvationen $\mathbf{A} \cdot \vec{x} = \vec{b}$ har icke-trivial lösning omm reducering av totalmatrisen $\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & \vec{b} \end{array} \right]$ till trappstegsform ger minst en fri kolumn.

Sats 1.1.

Antag att ekvationen $\mathbf{A} \cdot \vec{x} = \vec{b}$ har en lösning \vec{x}_p (partikulärlösning). Då gäller att alla lösningar till $\mathbf{A} \cdot \vec{x} = \vec{b}$ kan skrivas som:

$$\vec{x} = \vec{x}_p + \vec{x}_h$$

Där \vec{x}_h är lösningen till den homogena ekvationen:

$$\mathbf{A} \cdot \vec{x} = \vec{0}$$

Exempel 1.2.

Vi ser på $\mathbf{A} \cdot \vec{x} = \vec{b}$ där:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \end{bmatrix} \qquad \vec{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Radreducering ger:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \end{array} \right] +R_2 \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 8 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \end{array} \right] \cdot \frac{1}{2} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \end{array} \right]$$

x_3 är en fri variabel. Låt $x_3 = t$, $t \in \mathbb{R}$. Vi får:


$$\begin{cases} x_1 = 8 + 7t \\ x_2 = 4 + 4t \\ x_3 = t \end{cases} \quad \text{dvs} \quad \vec{x} = \overbrace{\begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}}^{\vec{x}_p} + \overbrace{\begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}}^{\vec{x}_h} \cdot t$$

Obs: Vi har:

$$\mathbf{A} \cdot \vec{x}_p = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} \cdot \vec{x}_h = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot t = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot t = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Gemoetrisk tolkning: Två plan som skär:



$\vec{x}_p = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$ är bara en av punkterna på linjen, nämligen den då $t = 0$.

$\vec{x} = \vec{x}_p + \vec{x}_h$ är linjen i \mathbb{R}^3 förskjuten $\begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$ från origo.


2 Överbestämda Ekvationssystem

Definition 2.1. Ett överbestämt ekvationssystem:

- Fler ekvationer än obekanta.
- *Typexempel:* Man har en mängd (mät)data som ska anpassas till någon funktion.

Exempel 2.1.

t	1	2	3	4	5	tid
t	3	5	8	10	13	$uppmätt\ data$



Mätdata blir nästan en linje, så man vill anpassa en rät linje:

$$y = k \cdot t + m$$

till mätdata. Då vill man att:

$$\begin{cases} 3 = k \cdot 1 + m \\ 5 = k \cdot 2 + m \\ 8 = k \cdot 3 + m \\ 10 = k \cdot 4 + m \\ 13 = k \cdot 5 + m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \\ 10 \\ 13 \end{bmatrix}$$

Vi har alltså 5 ekvationer och 2 obekanta.

Det finns ingen exakt lösning eftersom punkterna ligger exakt på en linje.

- Vi vill hitta en lösning som blir så bra som möjligt i minsta kvadratmetodens mening

Titta på $\mathbf{A} \cdot \vec{x} = \vec{b}$ där:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

kan skrivas som en linjärkombination:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot x_1 + \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} \cdot x_2 = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$


Definition 2.2. *Kolumnrummet till en matris \mathbf{A} är mängden av alla linjärkombinationer av kolumnerna i \mathbf{A} .*

- För ekvationen $\mathbf{A} \cdot \vec{x} = \vec{b}$ gäller att den har en lösning bara om \vec{b} kan skrivas som en linjärkombination av kolumnerna i \mathbf{A} .
- Kolumnrummet utgör ett plan, t.ex. alla linjärkombinationer av:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

utgör ett plan i \mathbb{R}^3



Om \vec{b} inte ligger i planet så saknas lösning till:

$$\mathbf{A} \cdot \vec{x} = \vec{b}$$

Grundidén för minsta kvadratmetoden är att projicera högerledsekvationen \vec{b} ortogonalt på kolumnrummet för \mathbf{A} och sedan lösa ekvationen:

$$\mathbf{A} \cdot \vec{x} = \vec{b}_\pi$$

där \vec{b}_π är ortogonala projektionen.

På så vis fås en lösning \vec{x}_0 där avståndet:

$$||\underbrace{\mathbf{A} \cdot \vec{x}_0}_{b_\pi} - \vec{b}|| \leq ||\underbrace{\mathbf{A} \cdot \vec{x}}_{\text{En punkt}} - \vec{b}||$$

Låt:

$$\vec{r} = \mathbf{A} \cdot \vec{x}_0 - \vec{b}$$

\vec{r} är ortogonal mot kolumnerna i \mathbf{A} . Dvs:

$$\mathbf{A}^T \cdot \vec{r} = \vec{0}$$

Dvs:

$$\vec{0} = \mathbf{A}^T \cdot \vec{r} = \mathbf{A}^T \cdot (\mathbf{A} \cdot \vec{x}_0 - \vec{b}) = \mathbf{A}^T \cdot \mathbf{A} \cdot \vec{x}_0 - \mathbf{A}^T \cdot \vec{b} \Leftrightarrow \mathbf{A}^T \cdot \mathbf{A} \cdot \vec{x} = \mathbf{A}^T \cdot \vec{b}$$

Med andra ord: \vec{x}_0 är lösningen till:

$$\mathbf{A}^T \cdot \mathbf{A} \cdot \vec{x} = \mathbf{A}^T \cdot \vec{b}$$

Anmärkning 1.

Detta kallas för normalekvationen.

Exempel 2.1. (forts)

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 55 & 15 \\ 15 & 5 \end{bmatrix}$$

Vi får normalekvationerna:

$$\mathbf{A}^T \cdot \mathbf{A} \cdot \vec{x} = \mathbf{A}^T \cdot \vec{b} = \begin{bmatrix} 55 & 15 \\ 15 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} k \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 142 \\ 39 \end{bmatrix}$$

Med lösningen:

$$\begin{cases} k = \frac{5}{2} \\ m = \frac{3}{10} \end{cases}$$

Dvs vi får linjen:

$$y = k \cdot t + m = \frac{5}{2} \cdot t + \frac{3}{10}$$