

UiO : Department of Physics
University of Oslo

Regression analysis and resampling methods

**Erik Skaar
Sondre Torp
Mikael Kiste**



Contents

1	Introduction	2
2	Theory	2
2.1	Standard	2
2.2	Ridge	2
2.3	Lasso	2
2.4	k-fold and bootstrap	2
3	Method	2
4	Result & Discussion	2
5	Conclusion	2
6	Appendix	2

Abstract

[1]

1 Introduction

2 Theory

2.1 Standard

$$\beta = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$$

2.2 Ridge

$$\beta = (\mathbf{X}^T \mathbf{X} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$$

2.3 Lasso

$$\beta = \operatorname{argmin}_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^N \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j \right)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j|^q \right\}$$

2.4 k-fold and bootstrap

3 Method

4 Result & Discussion

5 Conclusion

References

- [1] Morten Hjorth-Jensen. *Computational Physics*. Lecture notes. 2015. URL: <https://github.com/CompPhysics/ComputationalPhysics/blob/master/doc/Lectures/lectures2015.pdf>.

6 Appendix