


Aula 9

Soluções da equação de Schrödinger: partícula numa caixa infinita



Dada uma função de energia potencial $V(x)$ que representa um certo sistema, queremos usar uma equação de Schrödinger independente de tempo, para:

- determinar os possíveis níveis de energia
- determinar as funções de onda $\psi(x)$ correspondentes.

A equação de Schrödinger para o potencial nulo

Mostraremos que, para uma **partícula livre** de massa m movendo-se em uma dimensão, a função

$$\psi(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}$$

é uma solução para a equação de Schrödinger independente do tempo para quaisquer valores das constantes A e B .

Não há forças agindo sobre uma partícula livre. Como a força sobre uma partícula é dada por $F = -dV(x)/dx$, temos que para uma partícula livre $V(x)=\text{constante}$. Neste exemplo adotaremos $V(x)=0$.

Portanto, a equação de Schrödinger independente do tempo fica:

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \cancel{V(x)\psi(x)} = E\psi(x)$$

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x)$$

Derivamos $\psi(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}$ para checar se se verifica a equação:

$$\frac{d\psi(x)}{dx} = ikAe^{ikx} - ikBe^{-ikx}$$
$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -k^2 Ae^{ikx} - k^2 Be^{-ikx}$$

Substituindo na Eq. de Schrödinger, temos:

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x)$$
$$\frac{-\hbar^2}{2m} (-k^2 Ae^{ikx} - k^2 Be^{-ikx}) = E (Ae^{ikx} + Be^{-ikx})$$
$$\frac{\hbar^2 k^2}{2m} \psi(x) = E\psi(x)$$

Como temos $V(x)=0$, a energia total é:

$$E = p^2/(2m) + V(x) = p^2/(2m)$$

Usando a relação de De Broglie, $p=\hbar k$, temos:

$$E = p^2/(2m) = \hbar^2 k^2/(2m)$$

Substituindo na equação do slide anterior obtemos:

$$E \psi(x) = E \psi(x)$$

Logo, a função $\psi(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}$ é uma solução para a equação de Schrödinger independente do tempo para quaisquer valores das constantes A e B.

Revisão de equações diferenciais ordinárias

Teorema 1: Seja a equação diferencial:

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} + \alpha^2 f(x) = 0$$

onde $f(x)$ é uma função real ou complexa, e α é uma constante real, i.e. α^2 é um número real positivo.

No curso de EDO, se demonstra que a solução dessa equação é:

$$f(x) = Ae^{i\alpha x} + Be^{-i\alpha x}$$

onde A e B são constantes arbitrárias.

Temos uma combinação linear de **exponenciais complexas**.

Teorema 2: Seja a equação diferencial:

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} - \alpha^2 f(x) = 0$$

onde α é uma constante real.

A solução dessa equação é:

$$f(x) = Ae^{\alpha x} + Be^{-\alpha x}$$


onde A e B são constantes arbitrárias.


Temos uma combinação linear de **exponenciais reais**.

Partícula em uma caixa infinita

Vamos resolver a equação Schrödinger independente de tempo para um potencial $V(x)$ com forma de poço quadrado infinito. Este problema é às vezes chamado de "partícula em uma caixa".

Podemos construir uma "caixa" para um elétron usando dois eletrodos e duas grades dentro de um tubo contendo vácuo.






Colocamos dois eletrodos C conectados a um potencial V . Ao lado de cada um, colocamos grades G conectadas a terra.





Não há força sobre o elétron colocado entre as grades.



Nas regiões entre cada C e G há um campo elétrico cuja força depende da magnitude de V .

Esse dispositivo pode manter o elétron confinado entre as duas grades.




As paredes podem ser feitas arbitrariamente altas e íngremes, aumentando o potencial V e reduzindo a separação entre C e G.

No limite, a função de energia potencial $V(x)$ tende ao potencial de um poço quadrado infinito.

Para este problema, a energia potencial é da forma:

$$\begin{aligned} V(x) &= 0 & \text{para } 0 < x < L \\ V(x) &= \infty & \text{para } x < 0 \text{ e } x > L \end{aligned}$$



O potencial $V(x)$ é bastante artificial, mas vale a pena estudá-lo cuidadosamente por vários motivos:

- (1) não precisa de matemática difícil.
- (2) o problema está intimamente relacionado com o problema da corda vibrante na física clássica;
- (3) esse potencial é uma aproximação relativamente boa para algumas situações reais, por exemplo, o movimento de um elétron livre dentro de um metal.

Como a energia potencial é infinita fora do poço, a função de onda deve ser zero nessa região (lembramos que a densidade de probabilidade da posição da partícula é proporcional a $|\psi|^2$).

Logo, precisamos resolver a equação de Schrödinger independente do tempo apenas na região dentro do poço, $0 < x < L$.

Como $V(x)=0$, a equação de Schrödinger fica:

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0$$

A função de onda deve ser contínua, $\psi(x)$ deve ser zero em $x=0$ e $x=L$, logo:

$$\psi(0) = 0$$

$$\psi(L) = 0$$

Estas são as duas condições de contorno da equação diferencial acima, no caso de uma caixa infinita.

A solução da equação diferencial do slide anterior é:

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$$

onde $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$.

Agora, só falta determinar os valores das constantes A e B que permitem que sejam verificadas as condições de contorno $\psi(0) = 0$ e $\psi(L) = 0$.

Primeiro usamos a condição $\psi(0) = 0$:

$$\psi(0) = Ae^{ik0} + Be^{-ik0} = A + B = 0 \quad \Rightarrow \quad A = -B$$

Usando a condição $A = -B$, podemos re-escrever a solução de nosso problema:

$$\begin{aligned}\psi(x) &= Ae^{ikx} - Ae^{-ikx} \\ &= A [\cos(kx) + i \sin(kx)] - A [\cos(kx) - i \sin(kx)] \\ &= 2iA \sin(kx)\end{aligned}$$

Agora usamos a condição $\psi(L) = 0$:

$$\psi(L) = 2iA \sin(kL) = 0$$

Para que a condição acima seja verificada, poderíamos adotar $A=0$. Mas isso nos levaria à solução nula $\psi(x)=0$, que não representa o problema de uma partícula numa caixa infinita.

Devemos, portanto, adotar $\sin(kL)=0$:

$$\sin(kL) = 0 \quad \Rightarrow \quad kL = n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Substituindo k em função da energia:

$$kL = n\pi \quad \Rightarrow \quad \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} L = n\pi$$
$$E = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \quad n = 1, 2, \dots$$

Discussão:


1. As condições de contorno levaram à quantização da energia! E não pode adotar qualquer valor!
2. O valor $n=0$ não foi considerado pois $E=0$ significa que a equação de Schrödinger fica $-\hbar^2/(2m) d^2\psi/dx^2 = 0 \Rightarrow \psi(x) = A + Bx$. Para verificar as condições de contorno $\psi(0) = 0$ e $\psi(L) = 0$, deveríamos ter $A=B=0$, o que nos levaria à solução nula $\psi(x) = 0$.

3. Podemos escrever E da seguinte maneira:

$$E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} = n^2 E_1$$

onde E_1 é a menor energia permitida (energia do ponto zero):

$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$$



A constante A , que aparece na função de onda, pode ser determinada a partir da condição de normalização:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x)\psi(x)dx = 1$$
$$\int_0^L 2(-i)A_n \sin(kx) \times 2iA_n \sin(kx)dx = 1$$

Agora definimos $C_n = 2iA_n$, e usamos $k = n\pi/L$. Logo:

$$\int_0^L |C_n|^2 \sin^2(n\pi x/L)dx = 1$$

Podemos calcular essa integral usando a identidade trigonométrica $\sin^2\theta = (1-\cos 2\theta)/2$; o resultado é $|C_n|^2 \times L/2$. Portanto,







$$|C_n|^2 \times \frac{L}{2} = 1 \quad \Rightarrow \quad C_n = \sqrt{\frac{2}{L}}$$

Então as funções de onda normalizadas para uma partícula em uma caixa são:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

O número n recebe o nome de **número quântico**. Ele identifica a função de onda e a energia correspondente.

Funções de onda $\psi_n(x)$ e densidades de probabilidade $|\psi_n(x)|^2$ para $n=1, 2, 3$. Para $x < 0$ e $x > L$ temos $\psi_n(x)=0$.



Até agora, obtivemos a solução da equação de Schrödinger independente do tempo.

Sabemos (ver aula anterior) que se $\psi(x)$ é a função de onda para um estado definido de energia E , a função de onda dependente do tempo é:

$$\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-iEt/\hbar} .$$

Portanto, as funções de onda dependentes do tempo para um estado estacionário, para uma partícula em uma caixa, são:


$$\Psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-iE_n t/\hbar} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Partículas na "caixa" de um polímero

Poliacetileno faz parte de uma classe de moléculas orgânicas de cadeia longa que conduzem eletricidade ao longo de seu comprimento.

A molécula é constituída por um grande número de unidades (C_2H_2), chamadas monômeros (apenas três monômeros são mostrados aqui).

Os elétrons podem se mover livremente ao longo do comprimento da molécula, mas não perpendicularmente ao comprimento, de modo que a molécula é como uma "caixa" unidimensional de elétrons.




Elétrons são confinados ao comprimento L da molécula (como partículas em uma caixa).

O comprimento L da molécula depende do número de monômeros.

A experiência mostra que os níveis de energia permitidos estão bem de acordo com a Equação:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \quad n = 1, 2, \dots$$

Quanto maior for o número de monômeros e quanto maior for o comprimento L , mais baixos serão os níveis de energia e menor o espaçamento entre esses níveis.



Exemplo 1: Encontre os dois primeiros níveis de energia para um elétron confinado a uma caixa unidimensional com $5,0 \times 10^{-10}$ m de diâmetro (cerca do diâmetro de um átomo).

Solução: Usando $n=1$ e $n=2$ temos:

$$E_1 = \frac{h^2}{8mL^2} = \frac{(6,626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})^2}{8(9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}) (5,0 \times 10^{-10} \text{ m})^2}$$
$$= 2,4 \times 10^{-19} \text{ J} = 1,5 \text{ eV}$$

$$E_2 = \frac{2^2 h^2}{8mL^2} = 4E_1 = 9,6 \times 10^{-19} \text{ J} = 6,0 \text{ eV}$$

Exemplo 2: Um elétron que se move em um fio de metal fino é uma aproximação razoável de uma partícula em um poço infinito unidimensional.

O potencial dentro do fio é constante em média, mas aumenta acentuadamente em cada extremidade.

Suponha que o elétron esteja em um fio de 1,0 cm de comprimento.

- (a) Calcule a energia do estado fundamental para o elétron.
- (b) Se a energia do elétron for igual à energia cinética média das moléculas em um gás a $T=300$ K, cerca de 0.03 eV, qual é o número quântico n do elétron?

Solução:

(a) A energia do estado fundamental é

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} \\ &= \frac{\pi^2 (1.055 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})^2}{(2)(9.11 \times 10^{-31} \text{ kg})(10^{-2} \text{ m})^2} \\ &= 6.03 \times 10^{-34} \text{ J} = 3.80 \times 10^{-15} \text{ eV} \end{aligned}$$

O valor de E_1 obtido acima está bem abaixo do limite de mensurabilidade. Também, é menor do que a incerteza na energia de um elétron confinado em 1 cm.

(b) usamos $E_n = n^2 E_1$, logo: $n^2 = \frac{E_n}{E_1}$

$$\begin{aligned} n &= \sqrt{\frac{E_n}{E_1}} = \sqrt{\frac{0.03 \text{ eV}}{3.80 \times 10^{-15} \text{ eV}}} \\ &= 2.81 \times 10^6 \end{aligned}$$

Exemplo 3: Calculando probabilidades. Suponha que o elétron do exemplo anterior possa ser "visto" enquanto estiver em seu estado fundamental.

- (a) Qual seria a probabilidade de encontrá-lo em algum lugar na região $0 < x < L/4$?
- (b) Qual seria a probabilidade de encontrá-lo numa região muito estreita, de largura $\Delta x = 0.01L$ centrada em $x = 5L/8$?

Solução:

- (a) A função de onda para o nível com $n=1$ é:

$$\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{\pi x}{L}$$

A probabilidade de que o elétron seja encontrado na região especificada é a integral entre 0 e $L/4$ da densidade de probabilidade $P(x)=|\psi(x)|^2$:


$$P(0, L/4) = \int_0^{L/4} P_1(x) dx = \int_0^{L/4} \frac{2}{L} \sin^2\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx$$

Para calcular a integral, fazemos $u=\pi x/L$ e $dx=Ldu/\pi$:

$$\int_0^{\pi/4} \frac{2}{\pi} \sin^2 u du = \frac{2}{\pi} \left(\frac{u}{2} - \frac{\sin 2u}{4} \right) \Big|_0^{\pi/4} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \right) = 0.091$$

Assim, se procuramos a partícula em um grande número de buscas idênticas, a elétron será encontrado na região $0 < x < 0.25$ cm cerca de 9% do tempo.

A probabilidade é ilustrada pela área sombreada do lado esquerdo na Figura:



A figura mostra a densidade de probabilidade $P(x)=|\psi(x)|^2$ em função de x para uma partícula no estado fundamental de um poço de potencial quadrado infinito.

(b) Como a região $\Delta x=0.01L$ é muito pequena comparada com comprimento L , não é necessário integrar, mas podemos procurar a probabilidade como:

$$P = P(x) \Delta x = \frac{2}{L} \sin^2 \frac{\pi x}{L} \Delta x$$

Substituindo $\Delta x = 0.01L$ e $x = 5L/8$, obtemos

$$\begin{aligned} P &= \frac{2}{L} \sin^2 \frac{\pi(5L/8)}{L} (0.01L) \\ &= \frac{2}{L} (0.854) (0.01L) = 0.017 \end{aligned}$$

Isto significa que a probabilidade de encontrar o elétron dentro da região especificada é aproximadamente 1.7 %.

Exemplo 4:

- (a) Encontre a energia no estado fundamental de um elétron confinado em uma caixa unidimensional de comprimento $L=0.1\text{nm}$. (Esta caixa é aproximadamente do tamanho de um átomo.)
- (b) Faça um diagrama dos níveis de energia e encontre os comprimentos de onda dos fótons emitidos para todas as transições começando no estado com $n=3$ ou menor, e terminando no estado fundamental.

Solução:

- (a) A energia do estado fundamental é:

$$E_1 = \frac{1^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} = \frac{(hc)^2}{8mc^2 L^2}$$

Substituído $hc = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$ e $mc^2 = 0.511\text{MeV}$, temos:

$$E_1 = \frac{(1240 \text{ eV} \cdot \text{nm})^2}{8(5.11 \times 10^5 \text{ eV})(0.1 \text{ nm})^2} = 37.6 \text{ eV}$$


(b) As energias nesse sistema são dadas por:

$$E_n = n^2 E_1 = n^2 (37.6 \text{ eV})$$

portanto:

$$E_2 = 4 \cdot (37.6 \text{ eV}) = 150.4 \text{ eV},$$

$$E_3 = 9 \cdot (37.6 \text{ eV}) = 338.4 \text{ eV}.$$



As energias das transições são:

$$\Delta E_{3 \rightarrow 2} = 338.4 \text{ eV} - 150.4 \text{ eV} = 188.0 \text{ eV}$$

$$\Delta E_{3 \rightarrow 1} = 338.4 \text{ eV} - 37.6 \text{ eV} = 300.8 \text{ eV}$$

$$\Delta E_{2 \rightarrow 1} = 150.4 \text{ eV} - 37.6 \text{ eV} = 112.8 \text{ eV}$$

Os comprimentos de onda dos fótons emitidos nessas transições são:

$$\lambda_{3 \rightarrow 2} = \frac{hc}{\Delta E_{3 \rightarrow 2}} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{188.0 \text{ eV}} = 6.60 \text{ nm}$$

$$\lambda_{3 \rightarrow 1} = \frac{hc}{\Delta E_{3 \rightarrow 1}} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{300.8 \text{ eV}} = 4.12 \text{ nm}$$

$$\lambda_{2 \rightarrow 1} = \frac{hc}{\Delta E_{2 \rightarrow 1}} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{112.8 \text{ eV}} = 11.0 \text{ nm}$$