

---

**Algebră liniară, Aplicații liniare**

1. Fie  $L : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$  o aplicație liniară ce are relativ la bazele canonice din cele două spații matricea:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Să se determine expresia analitică a aplicației liniare  $L$ , adică ”regula” după care asociază la orice vector  $v = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \in \mathbb{R}^4$  un unic vector  $w = (y_1, y_2, y_3)^T \in \mathbb{R}^3$ . Să se afle  $L(v)$ , dacă  $v = (-1, 1, 0, 3)^T \in \mathbb{R}^4$ .

2. Fie  $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$  o bază arbitrară în  $\mathbb{R}^3$ , relativ la care un operator liniar  $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  are matricea:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Tinând seama de definiția matricii aplicației liniare să se deducă fără a efectua nici un calcul, care este exprimarea vectorului  $L(v_2)$  în baza  $\mathcal{B}$ .

3. Fie  $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$  baza canonică în  $\mathbb{R}^2$  și  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  un operator liniar. Știind că  $T(e_1) = (-1, 6)^T$ ,  $T(e_2) = (2, 5)^T$ , să se determine expresia analitică a lui  $T$  și să se calculeze apoi  $w = T(v)$ , unde  $v = (2, -3)^T$ .

4. Aplicația liniară  $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  are relativ la bazele canonice din  $\mathbb{R}^2$  și  $\mathbb{R}^3$  expresia analitică următoare:

$$L(x_1, x_2) = (-2x_1 + 3x_2, 7x_1 - 4x_2, x_1 + 2x_2)$$

Să se determine matricea aplicației liniare relativ la bazele canonice.

5. Să se determine matricea relativ la baza canonică din  $\mathbb{R}^3$  a proiecției ortogonale,  $P : \mathbb{R}^3 \rightarrow S$ , pe subspațiul  $S$  de ecuație  $-2x + y + z = 0$ .

Indicație: Găsiți mai întâi o bază oarecare în  $S$ , apoi o bază ortonormată,  $\overline{\mathcal{B}} = (u_1, u_2)$  și în final matricea proiecției ortogonale.

6. Deduceți expresia analitică a proiecției ortogonale a lui  $\mathbb{R}^2$  pe un subspațiu  $S$  de dimensiune unu, în care o bază oarecare este  $\overline{\mathcal{B}} = (w = (a, b)^T)$ . Apoi expresia analitică a proiecției ortogonale a lui  $\mathbb{R}^3$  pe un subspațiu de dimensiune 1, generat de vectorul  $t = (a, b, c)^T$ .

Indicație. Construiți ”o bază ortonormată” în subspațiul de dimensiune 1 și aplicați apoi modalitatea de determinare a matricii proiecției ortogonale pe un subspațiu al lui  $\mathbb{R}^2$ , respectiv,  $\mathbb{R}^3$ .

7. Spațiul  $\mathbb{R}^3$  este raportat la reperul ortonormat drept  $\mathcal{R} = (O; (e_1, e_2, e_3))$  de axe ortogonale. Să se scrie matricea rotației  $R_{\pi/3}^y$  în jurul lui  $Oy$  și apoi să se determine care sunt coordonatele punctului  $M'$  știind că vectorul său de poziție este  $\overrightarrow{OM'} = R_{\pi/3}^y(\overrightarrow{OM})$  și  $M(-1, 2, 3)$ .

8. Matricea rotației plane de unghi  $\theta$  în baza canonică este

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Fie  $\mathcal{B}' = (u_1, u_2)$  o altă bază ortonormată din  $\mathbb{R}^2$ , astfel încât măsura  $\widehat{(e_1, u_1)} = \alpha$ . Să se determine matricea rotației în această bază când:

a) Baza  $\mathcal{B}'$  este o bază dreaptă (vezi cursul 6 pentru matricea de trecere de la baza canonică la  $\mathcal{B}'$ ).

b) Baza  $\mathcal{B}'$  este o bază strâmbă (vezi tot cursul 6).

Vă surprinde rezultatul?

După ce ați rezolvat această problemă concluzionați care ar fi matricea rotației plane de unghi  $\theta$  pe care ar trebui s-o aplicați unei imagini din canvas-ul html5 sau a unei imagini digitale raportate la un sistem stâng, pentru a o roti cu unghiul  $\theta$ .

Cine dorește un bonus îmi transmite o imagine a rezolvării sau dacă știți și voi LaTeX, atunci editați în LaTeX.

9. a) Urmărind construcția teoretică din curs să se construiască expresia analitică în baza canonică a rotației în spațiul  $\mathbb{R}^3$  în jurul axei de direcție  $v = (1, 1, 2)^T$ , cu unghiul  $\theta = \pi/6$ .

**Opțional:** b) Să se scrie codul C/C++ al funcției care calculează matricea relativ la baza canonică a unei rotații de unghi  $\theta$  în jurul axei de direcție  $v \neq \theta$ .

Prototipul funcției în C ar putea fi (dar NU e obligatoriu să folosiți pointeri dacă nu știți sa-i manipulați):

```
double **rotatie_arbitrara(double theta, double *v);
```