

Algebră liniară, Tema 3

Aceasta tema conține probleme de reducere la forma scară sau forma scară redusă, care se efectuează prin calcul manual sau acolo unde este precizat rulând programul C inclus, `redscara.c`

`redscara.c` calculează și afișează forma scară și forma scară redusă a unei matrici, citită dintr-un fișier, `matrice.txt`, care are pe prima linie numărul, m , de linii și numărul n de coloane iar pe liniile următoare liniile matricii.

Exemplu:

```
4 5
2 -1 3 4 0
3 1.5 -5 -1 7
6 0 -2.3 1.8 10.4
2 1 3 -2 9
```

Pentru a analiza un sistem de ecuații introduceți în fișier matricea prelungită.

1. Să se reducă la forma scară matricea prelungită, \overline{A} , a sistemului următor, scris în formă matricială, $Ax = b$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Evidențiați pivoții din forma scară S_A și respectiv $S_{\overline{A}}$. Este sistemul compatibil? Dacă da, scrieți determinantul principal asociat sistemului $S_A x = u$, unde u este ultima coloană din $S_{\overline{A}}$ și găsiți mulțimea soluțiilor sistemului.

2. Se dă sistemul:

$$\begin{aligned} 2x - 3y &= 3 \\ 4x - 5y + z &= 7 \\ 2x - y - 3z &= 5 \end{aligned}$$

Să se reducă matricea prelungită la forma scară, să se deducă apoi dacă sistemul este compatibil determinat sau nu și dacă da, să se determine soluția unică folosind metoda substituției inverse.

3. Să se determine mulțimea soluțiilor sistemului:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -6 \\ 2 & 5 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

folosind reducerea la forma scară.

4. Forma scară a matricii prelungite a sistemului $Ax = b$ are ultima linie nenulă de forma $[0 \ 0 \ \dots \ 0|c]$, cu $c \neq 0$. Cum este sistemul $Ax = b$, compatibil sau incompatibil?

5. Matricea prelungită a unui sistem linear de 4 ecuații cu 4 necunoscute are forma scară redusă:

$$\begin{aligned} a) S_A &= \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right], & b) S_A &= \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ c) S_A &= \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Să se precizeze care sistem este compatibil determinat, compatibil nedeterminat și respectiv incompatibil, argumentând fiecare caz în parte.

6. Folosind `redscara.c` calculați forma scară (redușă) a matricii prelungite a sistemului de mai jos, o copiați apoi pe caiet și deduceți dacă sistemul este compatibil sau nu. În caz de compatibilitate rezolvați sistemul.

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & -2 & -1 \\ 5 & -2 & 1 & -3 & 3 \\ 2 & -1 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 10 \\ 5 \end{bmatrix}$$

7. Folosind `redscara.c` introduceți matricea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2/3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

și anume introduceți initial $2/3 \approx 0.66$ apoi adăugați progresiv câte o zecimală în plus. De la a câta zecimală rangul dedus din forma scară este cel corect, dedus prin calcul manual?

8. Folosind transformări elementare pe linie să se arate că matricea

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \\ 3 & 7 & 9 \end{bmatrix}$$

este inversabilă și să i se determine inversa.

9. Determinați mulțimea soluțiilor sistemului liniar și omogen:

$$\begin{aligned} x_3 + x_4 &= 0 \\ -2x_1 - 4x_2 + x_3 &= 0 \\ -x_3 + x_4 &= 0 \end{aligned}$$

reducând matricea sistemului la forma scară, S_A , și rezolvând sistemul echivalent $S_A x = 0$.

Verificați-vă cunoștințele!!!

Precizați dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau false:

10. Două sisteme de ecuații liniare $Ax = b$, $A'x = b'$, cu $A, A' \in \mathbb{R}^{m \times n}$ sunt echivalente dacă au aceleași necunoscute.

11. Două sisteme de ecuații liniare $Ax = b$, $A'x = b'$, cu $A, A' \in \mathbb{R}^{m \times n}$ sunt echivalente dacă au aceeași mulțime a soluțiilor.

12. Forma scară S_A a unei matrici A este unică, adică oricare două persoane care calculează forma scară și nu greșesc la calcule obțin aceeași matrice S_A .

13. Un sistem liniar și omogen de n ecuații cu n necunoscute, $Ax = 0$, având matricea A inversabilă, admite o unică soluție.

14. Dacă matricea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ este inversabilă atunci și forma scară, S_A , este inversabilă.

15. Dacă a_{ij} este pivot în forma scară, S_A , a matricii $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ atunci elementele a_{kj} , $k \neq i$, sunt toate nenule.