

A) Abundance
B) Per−capita biomass
C) Trophic organization
Haemulidae (3.67)
Batrachoididae (3.73)
Acanthuridae (2.41)
Synodontidae (4.25)
Opistognathidae (3.7)
Bregmacerotidae (3.16)
Labridae (2.93)
Pomacentridae (2.72)
Dorosomatidae (3.3)
Bythitidae (3.5)
Gerreidae (3.32)
Atherinidae (3.18)
Apogonidae (3.42)
Engraulidae (3.24)
Gobiidae (3.11)
0
20
40
60
Percent abundance (%)
Density
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.01
0.10
1.00
10.00
100.00
Biomass (g)
Mean trophic level
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Abundance (%)
20
40
60
Serranidae (3.83)
Scorpaenidae (3.81)
Myctophidae (3.18)
Mullidae (3.7)
Dorosomatidae (3.3)
Chaunacidae (4.08)
Batrachoididae (3.73)
Bothidae (3.78)
Opistognathidae (3.7)
Congridae (3.87)
Ophidiidae (3.72)
Apogonidae (3.42)
Paralichthyidae (3.84)
Engraulidae (3.24)
Haemulidae (3.67)
Bregmacerotidae (3.16)
Gobiidae (3.11)
0
20
40
60
Percent abundance (%)
Density
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.01
0.10
1.00
10.00
100.00
Biomass (g)
Mean trophic level
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Abundance (%)
10
20
30