

2017 年全国统一高考地理试卷（新课标II）

一、选择题：本大题 11 小题，每题 4 分，共 44 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。


19 世纪 50 年代，淮河自洪泽湖向南经长江入海；黄河结束夺淮历史，改从山东入海。1968 年，南京长江大桥建成通车；自 1999 年，江苏境内又陆续建成了多座长江大桥。江苏习惯上以长江为界分为苏南和苏北两部分（如图）。据此完成 1 - 3 题。

1. 目前，在洪泽湖以东地区，秦岭 - 淮河线（ ）



- A. 无划分指标依据
 - B. 与自然河道一致
 - C. 无对应的自然标志
 - D. 两侧地理差异显著
2. 习惯上苏南、苏北的划分突出体现了长江对两岸地区（ ）
- A. 自然地理分异的影响
 - B. 人文地理分异的影响
 - C. 互相联系的促进作用
 - D. 相互联系阻隔作用
3. 进入 21 世纪，促使苏南、苏北经济合作更加广泛的主导因素是（ ）
- A. 市场
 - B. 技术
 - C. 资金
 - D. 交通

汽车轮胎性能测试需在不同路面上进行。芬兰伊瓦洛（位置见图）吸引了多家轮胎企业在此建设轮胎测试场，最佳测试期为每年 11 月至次年 4 月。据此完成 4~5 题。



4. 推测该地轮胎测试场供轮胎测试的路面是 ()
- A. 冰雪路面 B. 湿滑路面 C. 松软路面 D. 干燥路面
5. 在最佳测试期内, 该地轮胎测试场 ()
- A. 每天太阳从东南方升起 B. 有些日子只能夜间进行测试
- C. 经常遭受东方寒潮侵袭 D. 白昼时长最大差值小于 12 时


热带沙漠中的尼罗河泛滥区孕育了古埃及农耕文明. 尼罗河在每年 6~10 月泛滥, 从上游带来的类似肥沃土壤的沉积物, 与上游来水和周边区域的植物资源, 都对农耕文明的形成意义重大. 据此完成 6~8 题.

6. 热带地区原始的耕种方式多为刀耕火种. 古埃及人在刀耕火种方式出现之前, 能够在沉积物上直接耕种, 是因为尼罗河泛滥区 ()
- A. 用水便利 B. 土壤肥沃 C. 地势平坦 D. 植被缺失
7. 尼罗河下游泛滥区沉积物主要来源地的降水特点为 ()
- A. 降水季节性强, 年降水量大
- B. 降水季节性强, 年降水量小
- C. 降水季节分配均匀, 年降水量大
- D. 降水季节分配均匀, 年降水量小
8. 古埃及人从周边区域引入植物用于种植, 引入植物的生长期必须与尼罗河泛滥区的耕种期一致. 由此判断这些植物最可能来自于 ()
- A. 热带雨林气候区 B. 地中海气候区
- C. 热带草原气候区 D. 热带季风气候区

洪积扇是河流、沟谷的洪水流出山口进入平坦地区后, 因坡度骤减, 水流搬运能力降低, 碎屑物质堆积而形成的扇形堆积体. 如图示意贺兰山东麓洪积扇的

- 二、非选择题：共 56 分。第 13~14 题为必考题，每个试题考试都必须作答。第 15~16 题为选考题，考试根据要求作答（一）必考题：共 46 分

- 第3 页|共7 页




- (1) 说明 20 世纪 90 年代山西省焦化企业规模小、数量多的存在条件。
- (2) 分析 20 世纪 90 年代山西省焦化产业生产过程中污染严重的原因。
- (3) 指出 20 世纪 90 年代山西省焦化产业运输过程中存在的污染问题。
- (4) 推测山西省建立大型焦化产业园区后，在生产过程和运输过程中，对减少环境污染可采取的措施。

13. (22 分) 阅读图文资料，完成下列要求。

白令海峡(如图)宽 35~86 千米，平均水深 42 米，最大水深 52 米，海峡两侧为山地。在第四纪冰期全盛时，亚欧大陆与美洲大陆相连，印第安人祖先由此进入美洲。冰后期，温度上升，海平面升高，白令海峡形成，亚欧大陆与美洲大陆间联系受到阻碍。即使在冬季白令海峡封冻时，人们仍难以徒

步跨越。



- (1) 分析目前在封冻时，人们难以徒步跨越白令海峡的自然原因。
- (2) 推测冰期全盛时印第安人祖先从亚欧大陆进入美洲大陆的季节，并说明理由。
- (3) 有人提议在白令海峡建设跨海大桥，但由于建桥成本高等原因，未获支持。分析在白令海峡建设跨海大桥成本高的原因。

14. (10 分) [地理 - - 选修 3: 旅游地理]

茶花古道是以茶、马为主要商品，以马帮为主要运输方式的古代商道。该商道分布在滇、川、藏等地区，沿途穿越高山、峡谷、密林。暑期一群旅游爱好者计划沿茶马古道，开展徒步古道游，体验马帮文化。

从文化体验角度，指出他们应做的前期准备。

15. [地理 - - 选修 6: 环境保护]

我国南方红壤丘陵地区因受人为干扰, 地表植被遭到破坏, 土壤侵蚀严重, 出现“红色荒漠”(如图). 为治理这一环境问题, 20 世纪 80 年代, 当地采用人工种植松树和自然恢复等方式造林育林, 形成了不同的植被景观。

分析自然恢复的次生林比人工松林防水土流失效果更好的原因。



图 8

