


2020 年全国统一高考地理试卷（新课标 I）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 4 小题，共 44 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

治沟造地是陕西省延安市对黄土高原的丘陵沟壑区，在传统打坝淤地的基础上，集耕地营造、坝系修复、生态建设和新农村发展为一体的“田水路林村”综合整治模式，实现了乡村生产、生活、生态协调发展（如图）。据此完成 1~3 题。



1. 与传统的打坝淤地工程相比，治沟造地更加关注（ ）

- A. 增加耕地面积
- B. 防治水土流失
- C. 改善人居环境
- D. 提高作物产量

【分析】读图可知，治沟造地对流域内水土资源进行合理调配和优化利用，治沟、打坝、整滩，注重生产、生活、生态这三方面。

【解答】解：读图可见，与以往单纯的打坝淤地相比，既有综合的拦洪拦沙生态效益，又能够实现快速造田，可以让群众在短期内受益，因此更注重当地人居环境的改善，C 对。

故选：C。

【点评】本题属于基础题，考查的内容是水土流失的知识点，需要结合图中治理的方法进行综合分析判断。

2. 治沟造地对当地生产条件的改善主要体现在（ ）

A. 优化农业结构

B. 方便田间耕作

C. 健全公共服务

D. 提高耕地肥力

【分析】治沟造地是陕西省延安市对黄土高原的丘陵沟壑区，在传统打坝淤地的基础上，集耕地营造、坝系修复、生态建设和新农村发展为一体的“田水路林村”综合整治模式，实现了乡村生产、生活、生态协调发展，是新农村发展的楷模，符合可持续发展的要求。

【解答】解：治沟造地对当地生产条件的改善主要体现在“沟道覆土造地”、“支渠排水灌溉”、“防洪坝系建设”等措施上，一方面沟道覆土后，沟谷变宽、沟道土地更加平整；另一方面，打坝修渠使沟道内径流减少，流水侵蚀减弱，泥沙淤积增多，也使沟谷更宽更平整。经过整治，当地的土地变得面积更大、更平整，有利于大规模机械化等更加集约高效的利用，所以方便田间耕作是对当地生产条件的改善，B 项正确；

优化农业结构、健全公共服务不属于生产条件的改善，A、C 排除；

治沟造地的诸多措施增加了土地面积、减轻了水土流失、改善了土壤墒情，打坝淤地工程形成的耕地肥力较高，而治沟造地是在打坝淤地的基础上进行的，并未明显提高耕地肥力，D 排除。

故选：B。

【点评】本题以黄土高原地区的治沟造地为载体，考查考生从图文中获取信息结合知识储备分析解答地理问题，试题的设计巧妙，体现新时代的要求。

3. 推测开展治沟造地的地方（ ）

①居住用地紧张 ②生态环境脆弱 ③坡耕地比例大 ④农业生产精耕细作

A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

【分析】治沟造地是陕西省延安市对黄土高原的丘陵沟壑区，在传统打坝淤地的基础上，集耕地营造、坝系修复、生态建设和新农村发展为一体的“田水路林村”综合整治模式，实现了乡村生产、生活、生态协调发展，符合可持续发展的要求。


【解答】解：根据图中信息提示：复垦空废宅基地和易地移民搬迁，说明该地居住用地不紧张，但生态环境脆弱，需要易地移民搬迁，坡面退耕还林，治沟造地，说明坡耕地比例大，农业生产精耕细作图中没有体现出来，所以选 C。

故选：C。


【点评】本题以黄土高原地区的治沟造地为载体，考查考生从图文中获取信息结合已有的知识储备分析解答地理问题，难度中等。

为获得冬季防风、夏季通风的效果，我国东北平原的某城市对一居住区进行了相应的建

筑布局规划，规划建筑物为高层（7 层以上）和多层（7 层或以下）。如图示意在该居住区内规划的两个居住片区、道路、出入口及当地盛行风向。据此完成 4~6 题。



4. 下列建筑布局中，适合居住片区 II 的是（ ）



- A. ① B. ② C. ③ D. ④

【分析】城市功能区的特点：住宅区是城市中最广泛的功能区。工业区现在一般分布外围，沿交通干线分布。商业区大多成团状和条状，并且分布于交通便捷的地区。城市功能区之间并没有明显的界线，往往你中有我，我中有你。在大城市中，还会形成文化区、行政区等。

【解答】解：由材料知建筑布局是“为获得冬季防风、夏季通风的效果”，由指向标知，该地夏季盛行西南风，冬季盛行东北风（东北平原为季风气候区，冬季偏北风，夏季偏南风），根据图示，只有②图可以达到此效果。

故选：B。

【点评】本题难度较小，主要考查了城市功能分区的形成，获取题干中信息即可。

5. 相对居住片区 II，居住片区 I 的建筑布局宜（ ）

- ①建筑密度大 ②建筑密度小 ③以高层建筑为主 ④以多层建筑为主
- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

【分析】城市功能区的特点：住宅区是城市中最广泛的功能区。工业区现在一般分布外围，沿交通干线分布。商业区大多成团状和条状，并且分布于交通便捷的地区。城市功

能区之间并没有明显的界线，往往你中有我，我中有你。在大城市中，还会形成文化区、行政区等。

【解答】解：首先根据“冬季防风、夏季通风”的目的，片区Ⅰ应规划为高层（阻挡冬季风），片区Ⅱ应为多层（有利于片区Ⅰ夏季通风）。结合生活常识，高层比多层建筑密度大。答案为A。

故选：A。

【点评】本题难度较小，主要考查了城市功能分区的形成，获取题干中信息即可。

6. 该居住区出入口的设计主要是为了避开（ ）

A. 春季盛行风 B. 夏季盛行风 C. 秋季盛行风 D. 冬季盛行风


【分析】城市功能区的特点：住宅区是城市中最广泛的功能区；工业区一般分布外围，沿交通干线分布。商业区大多成团状和条状，并且分布于市中心或者交通便捷的地区。城市功能区之间并没有明显的界线，往往你中有我，我中有你。在大城市中，还会形成文化区、行政区等。

【解答】解：我国东北平原冬季风寒冷干燥、风力强盛，夏季风温和湿润。读图，根据风频玫瑰图可以判断，该地盛行西南风和东北风，图示出入口夏季风都可以获得冬季风不可得到，故该居住区出入口的设计主要是为了避开冬季盛行风，D正确。

故选：D。

【点评】本题难度较小，主要考查了城市功能分区的形成，获取题干中信息即可。

利用大型挖泥船将海底岩石搅碎，并将碎石和泥沙一起吹填造地，成为在海中建设人工岛的主要方式。如图示意人工岛地下淡水分布。据此完成7~8题。



7. 参照如图，在造岛物质满足水渗透的前提下，人工岛形成并保持相对稳定的地下淡水区的条件是（ ）

①降水充沛且季节分配均匀

②降水充沛且季节集中

③人工岛足够长

④人工岛足够宽

A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

【分析】根据图可知，岛内的淡/咸水界限，岛内地下淡水受岛屿周边海洋水的影响。

【解答】解：在造岛物质满足水渗透的前提下，降水充沛且季节分配均匀，雨水得到充分稳定的下渗，有利于岛内地下淡水区稳定，所以①对；

如果降水季节变化大就会导致淡/咸水界限变化大，岛内地下淡水区空间变化大，所以②错；

人工岛足够宽也有利于人工岛形成并保持相对稳定的地下淡水区，所以④对③错。

故选：B。

【点评】该题需要充分理解图中信息，明白图中人工岛的地下淡水区的面积及其变化特点。从而才能把握这组试题的命题思路和答题方向。

8. 人工岛的地下淡水一般不作为日常生产生活水源，主要因为其（ ）

A. 取水难度大

B. 开采周期长

C. 水质较差

D. 储量较少

【分析】人工岛就是指在比较浅的海域，通过人工手段建造出来的岛屿，人工岛处于海上，下面就是大海，地下淡水资源少，所以岛上淡水只能靠降雨蓄水。

【解答】解：人工岛的地下淡水一般不作为日常生产生活水源，主要因为人工岛在海上，咸水多，淡水储量少，D 正确；

既然能建设人工岛说明技术水平高，取地下淡水难度不大，开采周期短，AB 错；

地下淡水的水质比较好，尤其是深层地下水水质更好，所以 C 错；

故选：D。

【点评】本题难度小，属于基础题，考查水资源开发的相关知识。解题的关键是从材料中获取信息，需要考生结合区域实际分析即可。

岳桦林带是长白山海拔最高的森林带。岳桦林带气候寒冷，生长季短，只有其下部的岳桦才结实（种子）。岳桦结实的海拔上限称为岳桦结实线，岳桦林分布上限即长白山林线。监测表明，20 世纪 90 年代以来，长白山北坡气候持续变暖，岳桦结实线基本稳定；林线的海拔快速提升了 70~80 米，但近年趋于稳定。据此完成 9~11 题。

9. 目前，长白山北坡林线附近的岳桦多为（ ）

A. 幼树

B. 中龄结实树

C. 老树

D. 各树龄组混生

【分析】据材料信息“岳桦结实的海拔上限称为岳桦结实线，岳桦林分布上限即长白山林线”据全球气候变暖趋势，可推测长白山北坡林线上升，不是种子的发育形成的。

【解答】解：据材料信息“岳桦林线的海拔快速提升了70~80米”，其上升的森林部分是由于大树底下长出的幼苗而形成。

故选：A。

【点评】该题考查对材料信息的理解和生活常识的掌握。据所学知识分析，选项信息也可。

10. 推测20世纪90年代以来，长白山北坡岳桦林带（ ）

A. 冬季升温幅度小，生长季稳定

B. 冬季升温幅度大，生长季延长

C. 冬季升温幅度大，生长季稳定

D. 冬季升温幅度小，生长季延长

【分析】由于人们焚烧化石燃料释放出大量的二氧化碳等温室气体，且森林破坏导致植被固定二氧化碳的能力丧失，使大气中温室气体的含量增多，这些温室气体能强烈吸收地面辐射中的长波辐射，导致地球温度上升，全球变暖。

【解答】解：读材料“20世纪90年代以来，长白山北坡气候持续变暖，岳桦结实线基本稳定；林线的海拔快速提升了70~80米”可知，由于气候变暖导致长白山北坡冬季温度上升幅度大，岳桦林生长稳定，C正确。

故选：C。

【点评】本题以长白山岳桦林材料为背景，考查了20世纪90年代以来长白山北坡岳桦林带的变化，读材料分析解决问题。

11. 在气候变暖背景下，长白山北坡林线近年却趋于稳定，原因可能是（ ）

A. 降水稳定

B. 水土流失量稳定

C. 土壤肥力稳定

D. 岳桦结实线稳定

【分析】结合地理知识可知，林线一般指森林线，是山地森林上限连续不断的森林分布界线。超过此界线，被适应高寒、风大的高山灌丛和草甸所替代。

【解答】解：结合分析可知，林线升高说明当地的气温升高，但近年林线趋于稳定，说明该地的气候变化较小。降水、水土流失、土壤肥力的改变对当地气温影响不大，ABC错；

岳桦结实线分布的上限为长白山林线，因此其稳定导致林线趋于稳定，D 对；

故选：D。

【点评】 本题属于基础题，考查的内容是全球气候变化对当地植被的影响，需要结合林线的概念进行分析。

二、非选择题：共 56 分。第 12~13 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 13~14 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 46 分。

12.（22 分）阅读图文材料，完成下列要求。

葡萄喜光，耐旱。如图为某坡度较大的地方采用顺坡垄方式种植葡萄的景观。该地位于 52°N 附近，气候湿润。



- （1）当地采用顺坡垄种植葡萄，据此分析该地区的降水特点。
- （2）指出该地种植葡萄宜选择的坡向，并分析与梯田相比，顺坡垄利用光照的优势。
- （3）说明温带半干旱地区坡地耕作不宜采用顺坡垄的理由。

【分析】（1）根据材料，该地位于 52°N 附近，气候湿润，说明是温带海洋性气候。

（2）根据材料，葡萄喜光，耐旱，结合区域实际分析即可。

（3）根据温带半干旱地区的气候特征结合顺坡垄的条件分析即可。

【解答】解：（1）顺坡垄种植葡萄不便于灌溉，说明该地区的降水量比较大，降水比较均匀，季节差异小，基本不需要灌溉；而且降水强度小，暴雨等发生次数少。

（2）因为葡萄喜光，耐旱，所以该地种植葡萄宜选择南坡即向阳坡。与梯田相比，顺坡垄接受太阳照射的面积更大。

（3）温带半干旱地区降水量少，而且降水集中多暴雨，需要大面积的灌溉，在坡地上的

顺坡垄不能保水保土。

故答案为：

（1）顺坡垄不利于保水保土（灌溉不便）。因为，该地区降水应具有以下特点：降水频率高，强度小（少暴雨或每次降雨量较小），降水量季节分配较均匀。


（2）葡萄喜光。种植葡萄宜选择向阳坡（南坡）；该地区纬度高，正午太阳高度小。与梯田相比，顺坡垄接受阳光照射的角度较大，植株和垄接受光照的面积较大。

（3）温带半干旱地区偶有暴雨，种植作物需要灌溉，而坡地顺坡垄不利于保水保土。

【点评】 本题难度适中，属于能力题，考查影响农业的区位因素，解题的关键是从材料中获取信息，需要考生结合区域实际分析即可。

13.（24 分）阅读图文材料，完成下列要求。

形成玄武岩的岩浆流动性好，喷出冷凝后，形成平坦的地形单元。如图所示，某海拔 500 米左右的玄武岩台地上，有较多海拔 700 米左右的玄武岩平顶山，及少量海拔 900 米左右的玄武岩尖顶山。调查发现，构成台地、平顶山、尖顶山的玄武岩分别形成于不同喷发时期。



（1）指出玄武岩台地形成以来因流水侵蚀而发生的变化。

（2）根据侵蚀程度，指出构成台地、平顶山、尖顶山的玄武岩形成的先后次序，并说明判断理由。

（3）说明玄武岩台地上有平顶山、尖顶山分布的原因。

【分析】（1）抓材料中的关键，某海拔 500 米左右的玄武岩台地上，有较多海拔 700 米左右的玄武岩平顶山，及少量海拔 900 米左右的玄武岩尖顶山，结合流水侵蚀作用分析即可。

（2）岩石暴露时间越长，形成时间越早，地貌侵蚀程度越严重。

（3）玄武岩台地上有平顶山、尖顶山分布主要跟岩浆喷发、冷凝之后被侵蚀有关。

【解答】解：（1）由材料可知，玄武岩形成平坦的地形单元，但在 500 米左右的玄武岩台地上，有较多海拔 700 米左右的玄武岩平顶山，及少量海拔 900 米左右的玄武岩尖顶山，说明最初的平坦台地被流水侵蚀、切割，起伏加大，且由台地变成平顶山变成了尖

顶山，说明面积变小。

(2) 由材料可知，玄武岩最初形成的是平坦的地形单元，后经流水的侵蚀、切割，形成尖顶山、平顶山和台地，地貌侵蚀程度越严重，说明岩石暴露时间越长，形成时间越早，尖顶山已经没有台地的特征，构成尖顶山的玄武岩形成时间最早；台地受侵蚀轻，构成台地的玄武岩形成时间最晚；平顶山保留台地的部分特征，构成平顶山的玄武岩形成时间较晚。

(3) 据以上分析可知，通过保留的部分可以判断台地、平顶山、尖顶山形成的早晚，平顶山、尖顶山是较早形成的，早中期喷出的岩浆冷凝成玄武岩台地后，大部分被侵蚀，残留的部分为山体。台地形成的时间较晚，也就是最新（晚）一期喷出的岩浆未能完全覆盖残留山体，冷凝成玄武岩台地，故其上仍保留了原有山体。

故答案为：

(1) 台地被流水侵蚀、切割，起伏加大，面积变小。

(2) 形成先后次序：构成尖顶山的玄武岩，构成平顶山的玄武岩、构成台地的玄武岩。
理由：地貌侵蚀程度越严重，说明岩石暴露时间越长，形成时间越早。台地受侵蚀轻，构成台地的玄武岩形成时间最晚；平顶山保留台地的部分特征，构成平顶山的玄武岩形成时间较晚；尖顶山已经没有台地的特征，构成尖顶山的玄武岩形成时间最早。

(3) 早中期喷出的岩浆冷凝成玄武岩台地后，大部分被侵蚀，残留的部分为山体。最新（晚）一期喷出的岩浆未能完全覆盖残留山体，冷凝成玄武岩台地，其上仍保留了原有山体。

【点评】 本题主要考查岩石圈的物质循环和地貌形成的相关知识，抓住“形成玄武岩的岩浆流动性好，喷出冷凝后，形成平坦的地形单元”这句话是解题的关键，考查学生通过阅读地质剖面图，获取所在地经历的地质事件信息的能力，进而重建当地在内、外力作用下的环境演变过程。

（二）选考题：共 10 分。请考生从 2 道地理题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。[地理--选修 3：旅游地理]（10 分）

14.（10 分）景泰蓝制作是北京市地方传统技艺，已入选国家非物质文化遗产名录。近年来，北京市某企业依托其景泰蓝艺术博物馆、景泰蓝制作技艺互动体验中心以及工厂店，在夏秋季节每周五、周六 17 时至 22 时，举办“景泰蓝文化体验之夜”活动，吸引众多的市民与游客前来观光和互动。

简述举办“景泰蓝文化体验之夜”活动的旅游价值。

【分析】主要从对旅游资源、旅游业、文化传承以及经济效益等方面分析即可。

【解答】解：旅游资源，通过举办“景泰蓝文化体验之夜”活动，丰富了旅游资源，提高了景泰蓝的知名度，提高了旅游资源的游览价值和经济价值；旅游业，带动景泰蓝旅游业的发展，增加了旅游收入；文化传承上，增强了市民对景泰蓝文化的了解，有利于传统文化的保护和传承；经济效益上，增加了游客的游览时间，带动相关产业如餐饮、酒店等的发展，带动就业等。


故答案为：

通过延长旅游活动时间，充分挖掘旅游项目与旅游产品的经济价值，增加旅游业收入；带动交通、餐饮、购物等相关产业的发展，提供更多的就业岗位；丰富市民与游客的夜间文化生活；增强市民与游客对景泰蓝技艺的了解，有利于（非物质文化遗产）景泰蓝技艺的保护、传承与发展。

【点评】本题难度适中，属于能力题，考查举办“景泰蓝文化体验之夜”活动的旅游价值，解题的关键是从材料中获取信息，需要考生结合区域实际分析即可。

[地理--选修 6：环境保护]（10 分）

15. 高原鼠兔多穴居于植被低矮的高山草甸地区，因啃食植物曾被看作是引起高山草甸退化的有害动物而被大量灭杀。土壤全氮含量是衡量土壤肥力的重要指标。通常土壤肥力越高，植被生长越好，生态系统抗退化能力越强。如图示意青藏高原某典型区域高原鼠兔有效洞口（有鼠兔活动）密度与土壤全氮含量的关系。



分析高原鼠兔密度对高山草甸退化的影响，并提出防控高原鼠兔的策略。

【分析】根据“有效洞口密度和土壤氮含量关系图”分析即可，由此提出解决措施。

【解答】解：根据上图可知，土壤氮含量随着高原鼠兔的密度先增加后减少；说明高原鼠兔密度过小，会降低土壤氮含量，土壤肥力较低；如果高原鼠兔过多，会导致高山草甸上的洞口过多，会降低土壤氮含量，降低土壤肥力，导致土地退化；只有将高原鼠兔控制在合理的密度内，土壤的氮含量会提高，土壤的肥力会增强。

所以需要将高原鼠兔控制在合理的范围内，不能盲目灭杀，也不能任其自由发展。

故答案为：

合适的高原鼠兔密度，能够维系土壤肥力，促进高山草甸生长，使之不易退化；密度过大时，大量啃食植被，土壤肥力下降，引起高山草甸退化；密度过小时，高原鼠兔对维持高山草甸的氮循环贡献小，土壤肥力较低，高山草甸易退化。把高原鼠兔数量（密度）控制在合适范围之内，而不是全面灭杀。

【点评】本题难度适中，属于能力题，考查高原鼠兔密度对高原草甸退化的影响及控制策略，解题的关键是从材料中获取信息，需要考生结合区域实际分析即可。