

① La $f, g, h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ vere sikt ved
I $f(x, y) := xy + x + 2y^2$

II $g(x, y) := e^{-2xy} - 4$

III $h(x, y, z) := \arctan(x) \cdot \cos(y) - 3z \sin(x)$

IV $p(x, y, z) := \ln(x+y^3) - (x^2y + y^2) \cdot \ln(2z^2)$

I $\frac{\partial f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} (y+1) = \underline{\underline{0}}$

$$\frac{\partial f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} (x+4y) = \underline{\underline{4}}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (y+1) = \underline{\underline{1}}$$

II $\frac{\partial g}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} (-2ye^{-2xy}) = \underline{\underline{4y^2e^{-2xy}}}$

$$\frac{\partial g}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} (-2xe^{-2xy}) = \underline{\underline{4x^2e^{-2xy}}}$$

$$\frac{\partial g}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (-2ye^{-2xy}) = \underline{\underline{4xye^{-2xy}}}$$

$$\text{III } \frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\cos(y)}{1+x^2} - 3xz \cos(x)$$

$$\frac{\partial h}{\partial y} = -\arctan(x) \cdot \sin(y)$$

$$\frac{\partial h}{\partial z} = -3 \sin(x)$$

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\cos(y)}{1+x^2} - 3xz \cos(x) \right) = -\frac{\sin(y)}{1+x^2}$$

$$\text{IV } \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{1}{x+y^3} - 2xy \ln(2z^2)$$

$$\frac{\partial p}{\partial y} = \frac{1}{x+y^3} \cdot 3y^2 - (x^2 + 2y) \ln(2z^2)$$

$$= \frac{3y^2}{x+y^3} - (x^2 + 2y) \ln(2z^2)$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\frac{1}{x+y^3} \cdot 4z \cdot (x^2y + y^2) = -2 \cdot \frac{x^2y + y^2}{z}$$

$$\frac{\partial^3 v}{\partial x \partial y \partial z} = \frac{\partial^2}{\partial y \partial z} \left(\frac{1}{x+y^3} - 2xy \ln(2z^2) \right)$$

Teorem sier at $\frac{\partial^3 i}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 i}{\partial z \partial y}$. Deriverer altså nå først nå z , for å få lettere utregning.

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial y} \left(-2xy \cdot \frac{1}{zz^2} \cdot 4z \right):$$

$$= \frac{\partial}{\partial y} \left(-4 \cdot \frac{xy}{z} \right) = \underline{\underline{-\frac{4x}{z}}}$$

② Gitt $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n = \{(3, 2), (4, 6), (5, 12)\}$
der $y_i = f(x_i)$

af Lagrange:

$$\text{Vet at } f(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x) = \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{q_i(x_i)} q_i(x)$$

$$\text{Der } q_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x - x_j)$$

Vi er gitt y_i -ene, og må da finne $q_i(x_i)$ og $q_i(x)$.

$$q_0(x) = (x - x_1)(x - x_2) = \underline{(x - 4)(x - 5)}$$

$$q_0(x_0) = (3 - 4)(3 - 5) = (-1) \cdot (-2) = \underline{2}$$

$$q_1(x) = (x - x_0)(x - x_2) = \underline{(x - 3)(x - 5)}$$

$$q_1(x_1) = (4 - 3)(4 - 5) = 1 \cdot (-1) = \underline{-1}$$

$$q_2(x) = (x - x_0)(x - x_1) = \underline{(x - 3)(x - 4)}$$

$$q_2(x_2) = (5 - 3)(5 - 4) = \underline{2}$$

Da er $f(x)$:

$$f(x) = \sum_{i=0}^2 \frac{y_i}{q_i(x_i)} \cdot q_i(x) :$$

$$= \frac{2}{2} (x - 4)(x - 5) - \frac{6}{1} (x - 3)(x - 5) + \frac{12}{2} (x - 3)(x - 4)$$

$$= x^2 - 9x + 20 - 6x^2 + 48x - 90 + 6x^2 - 42x + 72$$

$$\underline{\underline{x^2 - 3x + 2}}$$

Newton:

$$\text{Drukker at } f(x) = \sum_{i=0}^n c_i w_i(x),$$

$$\text{der } w_i(x) = \prod_{k=0, k \neq i}^{i-1} (x - x_k).$$

Vi må altså finde c_0, c_1 og c_2

$$y_0 = f(x_0) = \sum_{i=0}^n c_i w_i(x_0) = \underline{c_0 = 2}$$

$$y_1 = f(x_1) = \sum_{i=0}^n c_i w_i(x_1) = c_0 + c_1(x_1 - x_0)$$

$$\Rightarrow c_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{6 - 2}{4 - 3} = \underline{4}$$

$$y_2 = f(x_2) = \sum_{i=0}^n c_i w_i(x_2) = c_0 + c_1(x_2 - x_0) + c_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)$$

$$\Rightarrow c_2 = \frac{y_2 - y_0 - \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x_2 - x_0)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

For min egen del vil jeg gå fra udtrykket over til

$$c_2 = \frac{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} - \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

$$\frac{y_2 - y_0 - \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x_2 - x_0)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{y_2 - y_0 - y_1 \frac{x_2 - x_0}{x_1 - x_0} + y_0 \frac{x_2 - x_0}{x_1 - x_0}}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

$$= \frac{y_2 + y_0 \left(\frac{x_2 - x_0}{x_1 - x_0} - 1 \right) - y_1 \frac{x_2 - x_0}{x_1 - x_0}}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

$$\frac{x_2 - x_0}{x_1 - x_0} - 1 = \frac{x_2 - x_0 - x_1 + x_0}{x_1 - x_0} = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_0}$$

Da er $\frac{x_2 - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_0} + 1$

$$\Rightarrow \frac{y_2 + y_0 \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_0} - y_1 \cdot \frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_0} - y_1}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

$$= \frac{y_2 - y_1 - \left(\frac{x_2 - x_1}{x_1 - x_0} \right) (y_1 - y_0)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

$$c_2 = \frac{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} - \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

Da har vi at

$$C_2 = \frac{\frac{12-6}{5-4} - \frac{6-2}{4-3}}{5-3} = \frac{6-4}{2} = \underline{1}$$

Vi kan så lage polynomiet

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=0}^2 C_i w_i(x) = 2 + 4 \cdot (x-3) + (x-3)(x-4) \\ &= 2 + 4x - 12 + x^2 - 7x + 12 \\ &= \underline{\underline{x^2 - 3x + 2}} \end{aligned}$$

som stemmer med det vi
fant da vi brukte
Lagrange-metoden

Metoden viser også at at for
 $n+1$ verdier y_0, y_1, \dots, y_n så er

$$\underline{C_k = [y_0, y_1, \dots, y_k] = \frac{[y_0, \dots, y_k] - [y_0, \dots, y_{k-1}]}{x_k - x_0}}$$

b) Siden Newtons ide bruger foregående verdier for å regne ut neste (rekursivt) bruker vi denne metoden når vi legger til et datapunkt.

La $f(6) = 26$, dvs $x_3 = 6$ og $y_3 = 26$

Da er

$$C_3 = [y_0, y_1, y_2, y_3] = \frac{[y_1, y_2, y_3] - [y_0, y_1, y_2]}{x_3 - x_0}$$

$$\text{Vi har } C_2 = [y_0, y_1, y_2] = 1$$

$$\begin{aligned} [y_1, y_2, y_3] &= \frac{[y_2, y_3] - [y_1, y_2]}{x_3 - x_1} = \frac{\frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}{x_3 - x_1} \\ &= \frac{\frac{26 - 12}{6 - 5} - \frac{12 - 6}{5 - 4}}{6 - 4} = \frac{14 - 6}{2} = \underline{4} \end{aligned}$$

$$\text{Da er } C_3 = \frac{4 - 1}{6 - 3} = \frac{3}{3} = \underline{1}$$

$$\text{Så trenger vi } C_3 W_3(x) = W_3(x)$$

$$= (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) = (x - 3)(x - 4)(x - 5)$$

$$= (x^2 - 7x + 12)(x - 5) = x^3 - 12x^2 + 47x - 60$$

og så legger vi dette sammen med resultatet vårt fra a:

$$f(x) = x^3 - 12x^2 + 47x - 60 + x^2 - 3x + 2 = \underline{\underline{x^3 + 11x^2 + 44x - 58}}$$

- ③ Gjør oppgaven i jupyter. Bourke
en kunnslige litt lite effektiv
måte å regne divided difference,
men det fungerer.

④ a) Velst af

$X_i = \frac{b-a}{2} \tilde{x}_i + \frac{a+b}{2}$, der \tilde{x}_i er Chebyshev-noderne $\tilde{x}_i \in [-1, 1]$

Samtidig er

$$\tilde{x}_i = \cos\left(\frac{(2i+1)\pi}{2(n+1)}\right), \quad i=0, 1, \dots, n$$

Vi finder de noderne på $[-1, 1]$:

$$\tilde{x}_0 = \cos\left(\frac{\pi}{10}\right) \approx 0,951$$

$$\tilde{x}_1 = \cos\left(\frac{3\pi}{10}\right) \approx 0,588$$

$$\tilde{x}_2 = \cos\left(\frac{5\pi}{10}\right) \approx 0$$

$$\tilde{x}_3 = \cos\left(\frac{7\pi}{10}\right) \approx -0,588$$

$$\tilde{x}_4 = \cos\left(\frac{9\pi}{10}\right) \approx -0,951$$

Vi kan derefter finde noderne på $[2, 5]$

$$X_0 = \frac{5-2}{2} \cdot 0,951 + \frac{5+2}{2} = \underline{4,927}$$

$$X_1 = \frac{3}{2} \cdot 0,588 + \frac{7}{2} = \underline{4,382}$$

$$X_2 = \underline{3,500}$$

$$X_3 = \frac{3}{2} \cdot (-0,588) + \frac{7}{2} = \underline{2,618}$$

$$X_4 = \frac{3}{2} \cdot (-0,951) + \frac{7}{2} = \underline{2,074}$$

Chebyshev-noderne er altså

$$\{ \underline{4,927, 4,382, 3,500, 2,618, 2,074} \}$$

$$b) f(x) = 2x^2 - 6x + 9$$

$$f(x_0) = 2 \cdot 4,927^2 - 6 \cdot 4,927 + 9 = 13,12$$

$$f(x_1) = 2 \cdot 4,382^2 - 6 \cdot 4,382 + 9 = 3,758$$

$$f(x_2) = 2 \cdot 3,500^2 - 6 \cdot 3,500 + 9 = 1,189$$

$$f(x_3) = 2 \cdot 2,616^2 - 6 \cdot 2,616 + 9 = 1,106$$

$$f(x_4) = 2 \cdot 2,074^2 - 6 \cdot 2,074 + 9 = 1,812$$

Interpolerer oppg. b og c i punkter, samt plukke forskjellen (d)

c) Siden vi har funnet 5 Chebyshev noder, antar jeg vi skal interpolere f på de 5 likefordelte nodene, ikke 4 som det står i oppg.-teksten.

$$\bar{x}_i = a + i \cdot \frac{b-a}{n-1} = 2 + i \cdot \frac{5-2}{5} = 2 + i \cdot \frac{3}{5}$$

$$\bar{x}_0 = 2 + 0 \cdot 0,75 = 2$$

$$\bar{x}_1 = 2 + 1 \cdot 0,75 = 2,75$$

$$\bar{x}_2 = 2 + 2 \cdot 0,75 = 3,50$$

$$\bar{x}_3 = 2 + 3 \cdot 0,75 = 4,25$$

$$\bar{x}_4 = 2 + 4 \cdot 0,75 = 5$$

$$f(\bar{x}_0) = 2^{2^2 - 6 \cdot 2 + 4} = 2,000$$

$$f(\bar{x}_1) = f(2,75) = 1,044$$

$$f(\bar{x}_2) = f(3,500) = 1,169$$

$$f(\bar{x}_3) = f(4,25) = 2,454$$

$$f(\bar{x}_4) = f(5) = 16,00$$

d) Gjores i nyttan sammen med
renten av oppg. 4