

- 1 DI QUANTO E', CIRCA, LA PERDITA GIORNALIERA DI FERRO NELL'UOMO E NELLA DONNA:
- X A 0,5-1 MG
 - B 1-3 MG
 - C 3-5 MG
 - D 5-7 MG
 - E 7-10 MG

- 2 DELLE SEGUENTI FORME NEOPLASTICHE QUALE PUO' CONSIDERARSI BENIGNA:
- A MESOTELIOMA
 - B EPITELIOMA
 - C MELANOMA
 - D RETICOLOSARCOMA
 - X E PAPILLOMA

- 3 DA COSA E' COSTITUITA LA PERCENTUALE PIU' ELEVATA DI IMMUNOGLOBULINE CIRCOLANTI:
- A IG A
 - B IG D
 - X C IG G
 - D IG E
 - E IG M

- 4 IL TSH E' UN ORMONE DI NATURA:

- A PROTEICA
- B GLICOPOTEICA
- C STEROIDEA
- D GLICIDICA
- X E POLIPEPTIDICA

- 5 QUAL E' IL TUMORE PIU' FREQUENTEMENTE ASSOCIATO A PRODUZIONE ECTOPICA DI ACTH:
- A IL CARCINOMA DELLA MAMMELLA
 - B IL CARCINOMA DELLO STOMACO
 - X C IL CARCINOMA POLMONARE
 - D IL CARCINOMA DEL COLON
 - E IL CARCINOMA DEL PANCREAS

- 6 DI COSA E' PATOGNOMONICA LA IPERAMMONIEMIA:
- A CITRULLINEMIA
 - B FENILCHETONURIA
 - C TIROSINEMIA
 - X D ARGININO-SUCCINICO-ACIDURIA
 - E CISTINURIA

- 7 COSA STA AD INDICARE IL TERMINE "LEPTOCITA":
- A VARIAZIONE DI FORMA DELL'ERITROCITA
 - B VARIAZIONE DEL GRADO DI EMOGLOBINIZZAZIONE
 - C VARIAZIONE DEL VOLUME
 - D VARIAZIONE DI GRANDEZZA
 - X E NESSUNA DELLE PRECEDENTI

- 8 IL TSH PRESENTA ANALOGIE STRUTTURALI CON QUALE DEI SEGUENTI ORMONI:
- X A LH
 - B PROGESTERONE
 - C INSULINA
 - D PROLATTINA
 - E GASTRINA

- 9 LA CALCEMIA DIMINUISCE IN:
- A IPERVITAMINOSI D
 - B ATROFIA OSSEA
 - C MIELOMA MULTIPLO
 - X D NEFROSI
 - E IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO

- 10 A COSA E' DOVUTO L'AUMENTO FISIOLÓGICO DELLA VESICOLA IN GRAVIDANZA:
- A AD UNA DIMINUZIONE DELLE GAMMA GLOBULINE
 - B ALL'AUMENTO DELL'ALBUMINA
 - X C ALL'AUMENTO DEL FIBRINOGENO PLASMATICO
 - D ALL'AUMENTO DELLA TRANSFERRINA
 - E ALL'AUMENTO DELLA PROLATTINA

- 11 QUALE DELLE SEGUENTI FRAZIONI LIPOPROTEICHE CONTIENE LA PIU' ELEVATA PERCENTUALE DI COLESTEROLO:
- A CHILOMICRONI
 - X B LDL
 - C VLDL
 - D HDL
 - E VLDL+HDL

- 12 COSA E' IL TEST DI COOMBS:
- A UN TEST DI FUNZIONALITA' RESPIRATORIA
 - X B UN TEST IMMUNOEMATOLOGICO
 - C UN TEST RADIOIMMUNOLOGICO
 - D UN TEST DI FUNZIONALITA' EPATICA
 - E UN TEST DI FUNZIONALITA' CARDIACA

- 13 PER LA RICERCA DEL CORPO DI BARR QUALE DEI SEGUENTI MATERIALI BIOLOGICI VIENE UTILIZZATO:
- A LIQUIDO SEMINALE
 - B SIERO
 - C LIQUIDO CEFALO-RACHIDIANO
 - D PLASMA
 - X E CELLULE DELLA MUCOSA BUCCALE

- 14 COSA SONO I CORPI DI HEINZ:
- A REPERTO CHIMICO-CLINICO
 - B REPERTO ANATOMO-PATOLOGICO
 - X C REPERTO EMATOCHIMICO
 - D REPERTO ISTOCHEMICO
 - E NESSUNO DEI PRECEDENTI

- 15 QUAL E' IL VALORE NORMALE DEL VOLUME CORPUSCOLARE MEDIO ERITROCITARIO:
A 70-80 MICRON CUBI
X B 85-95 MICRON CUBI
C 95-110 MICRON CUBI
D 110-120 MICRON CUBI
E 120-150 MICRON CUBI
- 16 NEL NUCLEO DI SPERMA O OVULO UMANO QUANTI CROMOSOMI SONO PRESENTI:
A 46
B 40
C 30
X D 23
E 18
- 17 LA PRESENZA DI UNA DOPPIA DOSE DI MATERIALE GENETICO SI RISCONTRA IN CASO DI:
A DELEZIONE
B TRASLOCAZIONE
X C ISOCROMOSOMA
D FRAME-SHIFT
E INVERSIONE
- 18 AD ELEVATA FREQUENZA DI DELEZIONI CROMOSOMICHE SI ACCOMPAGNA LA:
X A LEUCEMIA GRANULOCITICA CRONICA
B LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA
C SINDROME DI LESH-NYAN
D SINDROME DI DOWN
E SINDROME DI KLINEFELTER
- 19 IL NUMERO DI CROMOSOMI NELLA MADRE DEL BAMBINO AFFETTO DA MONGOLISMO DA TRASLOCAZIONE E':
A 46
B 64
C 21
D 23
X E 45
- 20 LA PROBABILITA' CHE, DOPO LA NASCITA DI UN INDIVIDUO AFFETTO DA MONGOLISMO SPORADICO, SE NE VERIFICHI UNA SECONDA ANALOGA E':
X A 1:40 - 1:80
B 1:80 - 1:250
C 1:250 - 1:600
D 1:600 - 1:1.000
E 1:1000 - 1:2.500
- 21 NELLA SINDROME DI TURNER SI RISCONTRA IL CARIO TIPO:
A XY
B XX
X C XO
D YO
E XXY
- 22 IN UN FENOTIPO MASCHIO L'INSIEME DEI SEGUENTI SEGNI CLINICI: ASPEMIA, GINECOMASTIA, IPERPLASIA DELLE CELLULE DI LEYDIG, AUMENTO DELL'ESCREZIONE DI FSH, A QUALE DELLE SOTTOELENCATE SINDROMI CORRISPONDE:
A SINDROME DI DOWN
B SINDROME DEL CRI-DU-CHAT
X C SINDROME DI KLINEFELTER
D SINDROME DI TURNER
E SINDROME DI ZOLLINGER-ELLISON
- 23 FATTORE DELLA COAGULAZIONE CHE NON FA PARTE DEL SISTEMA ESTRINSECO:
A FATTORE V
X B FATTORE VIII
C FATTORE VII
D FATTORE VI
E FATTORE IV
- 24 IL DEFICIT DI UNO DEI SEGUENTI FATTORI DELLA COAGULAZIONE NON PROLUNGA IL TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE:
A FATTORE IV
X B FATTORE VII
C FATTORE VI
D FATTORE V
E FATTORE VIII
- 25 QUALE E' LA TIREOPATIA NELLA QUALE SI RISCONTRANO PIU' FREQUENTEMENTE ANTICORPI ANTITIROIDEI:
A LA MALATTIA DI BASEDOW
B IL MIXEDEMA PRIMITIVO
C IL CARCINOMA TIROIDEO
D L'IPOTIROIDISMO CONGENITO
X E LA TIROIDITE DI HASHIMOTO
- 26 IL CROMOSOMA PHILADELPHIA (PH 1) SI RISCONTRA IN:
A LEUCEMIA LINFOBLASTICA CRONICA
X B LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA
C SINDROME DI MARFAN
D MALATTIA DI HUNTER
E OMOCISTINURIA

- 27 LA REAZIONE DI RIVALTA E' POSITIVA IN UN ESSUDATO PER LA PRESENZA NELLO STESSO DI:
A PROTEINE
B LIPIDI
X C MUCOPOLISACCARIDI
D NUCLEOTIDI CICLICI
E PROSTAGLANDINE
- 28 NELL'ANEMIA SIDEROPENICA NON SI RISCONTRA:
A RIDUZIONE DEL CONTENUTO CORPUSCOLARE MEDIO DI HB
B RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE CORPUSCOLARE MEDIA DI HB
C RIDUZIONE DEL VOLUME CORPUSCOLARE MEDIO DI HB
X D RIDUZIONE DELLA CAPACITA' TOTALE DI LEGARE FE (TRANSFERRINEMIA TOTALE)
E TUTTE LE PRECEDENTI
- 29 IN QUALE INFEZIONE LE ZANZARE NON SONO VETTORI:
A FEBBRE GIALLA
B MALARIA
X C FEBBRE DI TSUTSUGAMUSHI
D DENGUE
E ENCEFALITE DI S. LOUIS
- 30 SI RISCONTRA GLICOSURIA IN:
A FASE PRE-DIABETICA
B DIABETE LATENTE
C DIABETE ASINTOMATICO
X D DIABETE CONCLAMATO
E IN NESSUNA DELLE PRECEDENTI
- 31 COSA E' ASSENTE NELL'EMOFILIA B:
A IL FATTORE VII
B IL FATTORE VIII
X C IL FATTORE IX
D IL FATTORE X
E IL FATTORE XII
- 32 COSA E' ASSENTE NELL'EMOFILIA A:
A IL FATTORE V
B IL FATTORE VI
C IL FATTORE VII
X D IL FATTORE VIII
E IL FATTORE IX
- 33 DEI SEGUENTI FATTORI PIASTRINICI QUALE CORRISPONDE AL FATTORE PLASMATICO V ADSORBITO:
X A FATTORE 1
B FATTORE 2
C FATTORE 3
D FATTORE 4
E NESSUNO DEI PRECEDENTI
- 34 QUALE E' APPROSSIMATIVAMENTE IL CICLO VITALE MEDIO DELLE PIASTRINE:
A ALCUNI MESI
X B OTTO GIORNI
C VENTI GIORNI
D TRENTA GIORNI
E SESSANTA GIORNI
- 35 QUALE E' IL MECCANISMO D'AZIONE DELL'EPARINA:
X A NEUTRALIZZAZIONE DELLA TROMBINA E DEL FATTORE X ATTIVATO
B EFFETTO PROTEOLITICO SUL FIBRINOGENO
C CONVERSIONE DEL FIBRINOGENO IN MICROFIBRINA
D PROVOCARE IPOFIBRINOGENEMIA
E NESSUNA DELLE AZIONI PRECEDENTI
- 36 DEI SEGUENTI PROCESSI DELLA COAGULAZIONE QUALE RI CHIEDE LA PRESENZA DEL CALCIO:
A ATTIVAZIONE FATTORE III
B ATTIVAZIONE FATTORE IV
C ATTIVAZIONE FATTORE VIII
X D ATTIVAZIONE FATTORE IX
E ATTIVAZIONE FATTORE XI
- 37 IL DEFICIT DI UNO DEI SEGUENTI FATTORI DELLA COAGULAZIONE NON PROLUNGA IL TEMPO DI PROTROMBINA:
A FATTORE IV
B FATTORE V
C FATTORE VI
D FATTORE VII
X E FATTORE VIII
- 38 FATTORE DELLA COAGULAZIONE CHE NON FA PARTE DEL SISTEMA INTRINSECO:
A FATTORE V
B FATTORE VI
X C FATTORE VII
D FATTORE VIII
E FATTORE IX
- 39 QUALI SONO I LIVELLI NORMALI DI IGG NEL SIERO:
A 5-10 MG/100ML
B 80-100 MG/100ML
C 100-400 MG/100ML
X D 800-1400 MG/100ML
E 2-3 G/100ML
- 40 QUALI SONO I LIVELLI NORMALI DI IGA NEL SIERO:
A 5-10 MG/100ML
B 80-200 MG/100ML
X C 100-400 MG/100ML
D 800-1400 MG/100ML
E 2-3 G/100ML

- 41 QUALI SONO I LIVELLI NORMALI DI IGM NEL SIERO:
A 5-10 MG/100ML
X B 80-200 MG/100ML
C 100-400 MG/100ML
D 800-1400 MG/100ML
E 2-3 G/100ML
- 42 FRA LE SEGUENTI IMMUNOGLOBULINE QUALE NON FISSA IL COMPLEMENTO (VIA CLASSICA):
A IGM
B IGG1
C IGG2
D IGG3
X E IGG4
- 43 FRA LE SEGUENTI IMMUNOGLOBULINE QUALE HA LA MAGGIOR CAPACITA' DI FISSARE IL COMPLEMENTO (VIA CLASSICA):
X A IGM
B IGG
C IGA
D IGD
E IGE
- 44 QUALE CLASSE DI IMMUNOGLOBULINE E' RESPONSABILE DELLE REAZIONI ALLERGICHE DI TIPO I (ANAFILATICO):
A IGM
B IGG
C IGA
D IGD
X E IGE
- 45 IL FATTORE REUMATOIDE E':
A UN ANTICORPO ANTI-NUCLEO
B UN ANTICORPO ANTI-ERITROCITI
C UN ANTICORPO ANTI-MEMBRANA SINOVIALE
D UN ANTICORPO ANTI-STREPTOCOCCO
X E UN ANTICORPO ANTI-IMMUNOGLOBULINE
- 46 PER CRIOGLOBULINA SI INTENDE:
A UNA GLOBULINA CHE PRECIPITA A CALDO
X B UNA GLOBULINA CHE PRECIPITA A FREDDO
C UNA GLOBULINA PRESENTE NELLE URINE
D UNA GLOBULINA TERMO-LABILE
E UNA GLOBULINA TERMO-STABILE
- 47 COSA E' LA PROTEINA BENCE-JONES:
A UNA BETA2-MICROGLOBULINA
X B UN MONOMERO O UN DIMERO DI CATENE LEGGERE DELLE IG
C UN MONOMERO O UN DIMERO DI CATENE PESANTI DELLE IG
D UN FATTORE DEL COMPLEMENTO
E UN AUTO-ANTICORPO
- 48 QUAL E' LA CARATTERISTICA PATOGNOMONICA DEL MIELOMA MULTIPLO (PRESENTE NEL 100% DEI CASI):
A PRESENZA DI PROTEINA DI BENCE-JONES NELLE URINE
B PRESENZA DI UN COMPONENTE MONOCLONALE NEL SANGUE
C LESIONI OSTEOLITICHE
X D INFILTRAZIONE DI PLASMACELLULE NEL MIDOLLO OSSEO
E PRESENZA DI NUMEROSE PLASMACELLULE NEL SANGUE
- 49 A COSA E' SPESSO ASSOCIATO UN AUMENTO POLICLONALE DELLE IG:
A MIELOMA MULTIPLO
B MACROGLOBULINEMIA DI WALDENSTROM
X C MALATTIE EPATICHE CRONICHE
D IPERTIROIDISMO
E LEUCEMIE LINFATICHE CRONICHE
- 50 DA COSA SONO FORMATE LE ROSETTE E:
A LINFOCITI B
X B LINFOCITI T
C MACROFAGI
D GRANULOCITI
E PLASMACELLULE
- 51 QUALE DI QUESTI METODI PERMETTE DI EFFETTUARE ANALISI QUANTITATIVE DI PROTEINE SOLUBILI:
A IMMUNOELETTROFORESI
B IMMUNODIFFUSIONE SEMPLICE
C IMMUNODIFFUSIONE DOPPIA
X D IMMUNODIFFUSIONE RADIALE
E IMMUNOFLUORESCENZA
- 52 COMPORTAMENTO DELLA PROTEINA DI BENCE-JONES NELLE MALATTIE DELLE CATENE PESANTI:
A SI RITROVA QUASI SEMPRE LA PROTEINA DI BENCE-JONES
X B NON SI RITROVA QUASI MAI LA PROTEINA DI BENCE-JONES
C LA PROTEINA DI BENCE-JONES E' PRESENTE NEL SIERO MA NON NELLE URINE
D LA PROTEINA DI BENCE-JONES E' PRESENTE NELLE URINE MA NON NEL SIERO
E LA PRESENZA DI PROTEINA DI BENCE-JONES VARIA DA CASO A CASO
- 53 QUAL E' LA CLASSE PREDOMINANTE DI IG NEL COLOSTRO
A IGM
B IGG
X C IGA
D IGD
E IGE

- 54 SONO OSSERVATI ANTICORPI ANTI-NUCLEO NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI DI:
A ARTRITE REUMATOIDE
B LEUCEMIA LINFATICA CRONICA
X C LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
D MIELOMA MULTIPLO
E TIROIDITE DI HASHIMOTO
- 55 COSA E' LA BETA2-MICROGLOBULINA:
A UNA CATENA DELLE IG
B UN FATTORE DEL COMPLEMENTO
C UN FATTORE DELLA COAGULAZIONE
X D UNA CATENA DEGLI ANTIGENI DI ISTOCOMPATIBILITA'
E UN PEPTIDE VASOATTIVO
- 56 A QUALE CLASSE DI ANTICORPI E' DOVUTA L'ERITROBLASTOSI FETALE:
A IGM
B IGA
X C IGG
D IGD
E IGE
- 57 A COSA E' DOVUTO IL LEGAME ANTIGENE-ANTICORPO:
A LEGAMI IDROGENO
B FORZE DI VAN DER WAALS
C FORZE ELETTROSTATICHE
X D TUTTE QUESTE FORZE
E NESSUNA DI QUESTE FORZE
- 58 DOVE SI RITROVANO ESSENZIALMENTE LE MAST-CELLULE:
A SANGUE
B MIDOLLO OSSEO
X C TESSUTO CONNETTIVO SOTTOCUTANEO E SOTTOMUCOSO
D TESSUTO NERVOSO
E LINFIA
- 59 DELLA PARETE CELLULARE DI QUALE MICRORGANISMO E' COSTITUENTE ESSENZIALE IL PEPTIDOGLICANO:
A MICOPLASMI
X B STREPTOCOCCI
C CLAMIDIE
D UREAPLASMA UREALITICUM
E RICKETTSIAE
- 60 DI QUALE MICRORGANISMO IL LIPOPOLISACCARIDE (LPS) RAPPRESENTA L'ENDOTOSSINA:
A STAPHYLOCOCCUS AUREUS
B STREPTOCOCCUS PYOGENES
X C SALMONELLA TYPHI
D NEISSERIA GONORRHOEAE
E MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
- 61 DELLA PARETE DI QUALE MICRORGANISMO L'ACIDO MICOLICO E' COMPONENTE ESSENZIALE:
X A MICOBATTERI
B SALMONELLA
C PSEUDOMONAS
D VIBRIONI
E STREPTOCOCCI
- 62 SONO MICRORGANISMI GRAM-POSITIVI, COCCOIDI, BETA-EMOLITICI, BACITRACINA-POSITIVI:
X A STREPTOCOCCUS PYOGENES
B STAPHYLOCOCCUS AUREUS
C NEISSERIA MENINGITIDIS
D ESCHERICHIA COLI
E HAEMOPHYLUS INFLUENZAE
- 63 LA TOSSINA DEL CORINAE BACTERIUM DIPHTERIAE E' :
A CODIFICATA DA UN PLASMIDE
B PRESENTE IN TUTTI I CEPPI DI CORINEBATTERI
C UN'ENDOTOSSINA
X D UN ENZIMA DI ADP-RIBOSILAZIONE DEL EF-2
E AGISCE A LIVELLO DELLE SINAPSI NEUROMUSCOLARI
- 64 CARATTERIZZA LA TOSSINA DEL VIBRIONE DEL COLERA UN'ENDOTOSSINA
A CODIFICATA DA UN PLASMIDE
B CODIFICATA DA UN FAGO
C REGOLATA DA CONVERSIONE LISOGENICA
X D CHE E' ATTIVA SULLA SUBUNITA' REGOLATRICE DELL'ADENILATO CICLASI
E CHE E' ATTIVA SULLA ATPASI
- 65 DOVE AGISCE L'ACIDO NALIDIXICO:
A SULLA SINTESI PROTEICA
X B SULLA REPLICAZIONE DEL DNA
C SULLA RNA POLIMERASI
D SULLA PARETE CELLULARE
E SUI RIBOSOMI
- 66 CHE BACILLO E' L'ESCHERICHIA COLI:
A GRAM-POSITIVO
B SPORIGENO
X C MOBILE
D CHE NON FERMENTA IL LATTOSIO
E CITOCROMO-OSSIDASI POSITIVO
- 67 CHE MICRORGANISMO E' LA NEISSERIA GONORRHOEAE:
A GRAM-POSITIVO
B MOBILE
C SPORIGENO
X D DI FORMA COCCOIDE
E NON PRESENTA NESSUNO DI QUESTI CARATTERI

- 68 COSA E' LA REAZIONE SIEROLOGICA DI VIDAL:
A UNA REAZIONE DI AGGLUTINAZIONE
B SERVE A DETERMINARE IL TITOLO DEGLI ANTICORPI ANTI-ANTIGENE O DELLE SALMONELLE
C SERVE A DETERMINARE IL TITOLO DEGLI ANTICORPI ANTI ANTIGENE H DELLE SALMONELLE
D E' POSITIVA DOPO LA SECONDA SETTIMANA DALL'INFEZIONE
X E HA TUTTE QUESTE CARATTERISTICHE
- 69 DOVE SI TROVA L'ANTIGENE VI (VIRULENZA DELLE SALMONELLE)
A LOCALIZZATO SUI FLAGELLI
X B LOCALIZZATO SULLA CAPSULA
C PRESENTE SOLO NELLE SALMONELLE IN FASE S
D LOCALIZZATO SULLA PARETE CELLULARE
E LOCALIZZATO SULLA MEMBRANA PLASMATICA
- 70 CHE MICRORGANISMI SONO LE SPIROCHETE:
A IMMOBILI
B GRAM-NEGATIVI
C MOBILI PER MEZZO DI FLAGELLI
X D MOBILI PER MEZZO DI FILAMENTI ASSILI
E SPORIGENI
- 71 L'INTOSSICAZIONE DI CLOSTRIDIUM BOTILINUM SI TRASMETTE ALL'UOMO:
A PER CONTAGIO INTERUMANO
B PER VIA RESPIRATORIA
X C PER INGESTIONE DI CIBI INFETTI
D PER CONTAGIO DA ANIMALI
E PER PUNTURE DA INSETTI VETTORI
- 72 COSA SONO LE CLAMIDIE:
A VIRUS A DNA
B VIRUS AD RNA
X C BATTERI PARASSITI ENDOCELLULARI
D MICETI
E MICRORGANISMI SPIRILLARI
- 73 CHE MICRORGANISMI SONO I MICOPLASMI:
A SPORIGENI
B GRAM-POSITIVI
X C PRIVI DI PARETE CELLULARE RIGIDA
D MOBILI
E SENSIBILI ALLE PENICILLINE
- 74 COSA E' LA CANDIDA ALBICANS:
A UN PROTOZOO
B UN BACILLO
C UN VIRUS A DNA
D UN MICRORGANISMO GRAM-NEGATIVO
X E UN MICETE TALVOLTA PATOGENO PER L'UOMO
- 75 CHE MICRORGANISMO E' LA PSEUDOMONAS AERUGINOSA:
X A PATOGENO OPPORTUNISTA
B GRAM-POSITIVO
C PRODUTTORE DI ESOTOSSINE
D IMMOBILE
E NON PATOGENO
- 76 COME E' IL TERRENO DI COLTURA AGAR-MCCONKEY:
X A DI ISOLAMENTO PRIMARIO PER ENTEROBATTERI
B SELETTIVO PER SALMONELLA
C SELETTIVO PER PSEUDOMAS
D DI ISOLAMENTO PRIMARIO PER STREPTOCOCCI
E CONTIENE SANGUE AL 5%
- 77 CARATTERIZZA LA STREPTOLISINA-O:
A E' UN ESoenzima DEGLI STREPTOCOCCI
X B UN' ESOTOSSINA DEGLI STREPTOCOCCI
C E' UN ANTIGENE DELLO STAPHYLOCOCCUS AUREUS
D AGISCE LITICAMENTE SUI GLOBULI BIANCHI
E E' UNA PROTEINA OSSIGENO-STABILE
- 78 CARATTERIZZA LA CONIUGAZIONE BATTERICA:
A E' UN MECCANISMO DI RICOMBINAZIONE GENETICA
B AVVIENE TRAMITE LA FORMAZIONE DI PILI
C E' UNIDIREZIONALE
D E' UN PROCESSO MOLTO FREQUENTE TRA GLI ENTEROBATTERI
X E POSSIEDE TUTTE LE CARATTERISTICHE SUDDETTE
- 79 CARATTERIZZA LA TRASDUZIONE BATTERICA:
A E' UN MECCANISMO DI RICOMBINAZIONE GENETICA
B AVVIENE PER MEZZO DI FAGI TEMPERATI
C E' SPECIALIZZATA
D E' GENERALIZZATA
X E POSSIEDE TUTTE LE SUDDETTE CARATTERISTICHE
- 80 CHE MICRORGANISMO E' IL CLOSTRIDIO DEL TETANO:
A SPORIGENO
B PRODUTTORE DI ESOTOSSINE
C GRAM-POSITIVO
D ANAEROBIO
X E CHE POSSIEDE TUTTE LE SUDDETTE CARATTERISTICHE
- 81 CHE MICRORGANISMO E' IL MICOBATTERIO DELLA TUBERCOLOSI:
A MOBILE
B SPORIGENO
C GRAM-NEGATIVO
X D ACIDO-ALCOOL RESISTENTE
E PRODUTTORE DI ESOTOSSINE

- 82 L'INTERFERONE INIBISCE LA MOLTIPLICAZIONE VIRALE MEDIANTE:
A STIMOLAZIONE DELLA RISPOSTA IMMUNE CELLULO-MEDIATA
B STIMOLAZIONE DELLA RISPOSTA IMMUNE UMORALE
C AZIONE ANTIVIRALE DIRETTA PER INIBIZIONE DEL MRNA
X D INDUZIONE NELLE CELLULE NON INFETTE DELLA SINTESI DI UNA PROTEINA CHE PREVIENE L'ASSEMBLAGGIO DI NUOVE PARTICELLE VIRALI
E ALTERAZIONE DELLA MEMBRANA CELLULARE CHE IMPEDISCE LA PENETRAZIONE DEL VIRUS NELLE CELLULE
- 83 IL TEST DI INIBIZIONE DELL'EMOAGGLUTINAZIONE E' UTILIZZATO PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI:
A ANTICITOMEGALOVIRUS
B ANTI-HERPES SIMPLEX
C ANTI VIRUS RESPIRATORIO-SINCIZIALE
D ANTI VARICELLA
X E ANTI VIRUS INFLUENZALE
- 84 DI QUESTI VIRUS QUALE, INFETTANDO UNA DONNA GRAVIDA DURANTE IL PRIMO TRIMESTRE DI GRAVIDANZA, PROVOCA LA MORTE O GRAVI ANORMALITA' AL FETO:
A MORBILLO
X B ROSOLIA
C PAROTITE
D VARICELLA
E RESPIRATORIO SINCINZIALE
- 85 QUAL E' SOLITAMENTE L'ANIMALE OSPITE PER L'ECHINOCOCCUS GRANULOSUS:
X A IL CANE
B IL GATTO
C IL RATTO
D IL MAIALE
E IL CAVALLO
- 86 L'AGENTE EZIOLOGICO PIU' COMUNE DELLA POLMONITE ATIPICA PRIMARIA E':
A DIPLOCOCCUS PNEUMONIAE
B STREPTOCOCCUS VIRIDANS
X C MYCOPLASMA PNEUMONIAE
D KLEBSIELLA PNEUMONIAE
E STAPHYLOCOCCUS AUREUS
- 87 SI RINVENGONO NELLA EMOCROMATOSI PRIMITIVA ACCUMULI DI FERRO, IN FORMA GRANULARE, NELLE CELLULE:
A DEL FEGATO
B DEL PANCREAS
C DEL FEGATO E DEL PANCREAS
D DEL RENE E DELLE GHIANDOLE SURRENALI
X E DI TUTTI GLI ORGANI SOPRA INDICATI
- 88 NEL SANGUE IL FERRO E' VEICOLATO DALLA TRANSFERINA CHE E':
A UNA ALFA1 GLOBULINA
B UNA ALFA2 GLOBULINA
X C UNA BETA GLOBULINA
D UNA GAMMA GLOBULINA
E NON E' UNA PROTEINA
- 89 QUALI SONO NORMALMENTE I LIVELLI EMATICI DELLA CERULOPLASMINA, PROTEINA DEPUTATA AL TRASPORTO DEL RAME:
A 50-150 MCG/DL DI PLASMA
B 1-5 MG/DL DI PLASMA
X C 20-40 MG/DL DI PLASMA
D 0,3-0,7 G/DL DI PLASMA
E 1-3 G/DL DI PLASMA
- 90 DELLE SEGUENTI QUALE NON E' TIPICA DELL'IPERALDO STERONISMO PRIMARIO:
A IPOPOTASSIEMIA
B ALCALOSI
X C IPERGAMMAGLOBULINEMIA
D DIMINUZIONE QUOZIENTE NA+/K+ IN SALIVA E SUDORE
E AUMENTO QUOZIENTE K+ URINARIO/K+ PLASMATICO
- 91 DI COSA PUO' ESSERE INDICE UNA IPOGLICEMIA A DIGIUNO (SOTTO I 40-50 MG/OL):
A ASMA ALLERGICO
B CALCOLOSI RENALE
X C IPOPITUITARISMO
D FEOCROMOCITOMA
E ASCESSO POLMONARE
- 92 SI HA GLICOSURIA, IN ASSENZA DI ALTERAZIONI RENALI, QUANDO IL LIVELLO DEL GLUCOSIO NEL PLASMA E' SUPERIORE A:
A 100-110 MG/DL
X B 180-200 MG/DL
C 250-300 MG/DL
D 300-350 MG/DL
E 500-550 MG/DL
- 93 NELLA FENILCHETONURIA AUMENTA L'ESCREZIONE URINARIA DI:
X A FENILALANINA, AC. FENILATTICO, AC. FENILPIRUVICO
B FENILALANINA, TIROSINA
C TIROSINA, AC. FENILATTICO, AC.FENILPIRUVICO
D SOLO FENILALANINA
E SOLO AC. FENILATTICO E FENILPIRUVICO

- 94 IL COMPENSO RENALE, NELL'ACIDOSI METABOLICA, AVVIENE, TRA L'ALTRO, ATTRAVERSO:
A L'AUMENTO DELLA ESCREZIONE DEI BICARBONATI
B UNA CONTRAZIONE DELLA DIURESI
C UNA DIMINUIZIONE NELLA ESCREZIONE DI FOSFATI ACIDI
D L'AUMENTO DEL PESO SPECIFICO DELLE URINE
X E L'AUMENTO DELLA ESCREZIONE DI CLORURO DI AMMONIO
- 95 NELLE ALCALOSI METABOLICHE SI VERIFICA:
A RIDUZIONE DEL PH DEL SANGUE
X B DEPRESSIONE DEL CENTRO DEL RESPIRO
C EMOCONCENTRAZIONE
D IPERVENTILAZIONE
E AUMENTO DEL RIASSORBIMENTO RENALE DEI BICARBONATI
- 96 QUALE DELLE SEGUENTI CONDIZIONI NON E' CAUSA DI DEPLEZIONE DI POTASSIO:
A IPERALDOSTERONISMO
B DIARREA
C TERAPIA DIURETICA
D SINDROME DI CUSHING
X E INSUFFICIENZA SURRENALICA
- 97 QUALE TRA LE GLICOPROTEINE QUI DI SEGUITO ELENCAATE E' PRESENTE NEL PLASMA IN MAGGIORE CONCENTRAZIONE:
A ALFA1 GLICOPROTEINA ACIDA
B CERULOPLASMINA
C PREALBUMINA
D APTOGLOBINE
X E TRANSFERRINA
- 98 COSA E' ASSENTE NEL PLASMA NEL MORBO DI WILSON O DEGENERAZIONE EPATOLENTICOLARE:
A IL FIBRINOGENO
B LA TRANSFERRINA
C LA PROTEINA C REATTIVA
X D LA CERULOPLASMINA
E IL FATTORE REUMATOIDE
- 99 LA CONCENTRAZIONE DEL FERRO PLASMATICO E' NORMALMENTE COMPRESA TRA:
A 10-25 MCG/DL
B 20-60 MCG/DL
X C 50-160 MCG/DL
D 210-330 MCG/DL
E 500-850 MCG/DL
- 100 UN PROCESSO EMOLITICO PUO' CAUSARE AUMENTO DEI LIVELLI PLASMATICI DI:
A BILIRUBINEMIA DIRETTA
X B BILIRUBINEMIA INDIRETTA
C AMBEDUE
D NESSUNA DELLE DUE
E DIPENDE DALLA FUNZIONALITA' EPATICA
- 101 QUALE ENZIMA E' CARENTE NELLA ANEMIA EMOLITICA DETTA FAVISMO:
X A GLUCOSIO-6-FOSFATO DEIDROGENASI
B PIRUVATO CHINASI
C TRIOSO-FOSFATO-ISOMERASI
D GLUCOSIO-6-FOSFATO ISOMERASI
E GLICERALDEIDE-3-FOSFATO DEIDROGENASI
- 102 COSA SI VERIFICA NELLO SCOMPENSO CARDIACO:
A AUMENTATA ESCREZIONE URINARIA DEL NA+
B RIDOTTA INCREZIONE DI ALDOSTERONE
X C AUMENTATA INCREZIONE DI ORMONE ANTIDIURETICO
D AUMENTO DELLA CONCENTRAZIONE PLASMATICA DELL'APTOGLOBINA
E POLIURIA PALLIDA
- 103 DA COSA E' COSTITUITO LA MAGGIOR PARTE DELL'AZOTO TOTALE URINARIO:
X A UREA
B AMMONIACA
C AC. URICO
D CREATININA
E AMINOACIDI
- 104 QUANDO SI RISCONTRA NELLE URINE L'ACIDO IPPURICO:
A MAI
X B NORMALMENTE
C NELL'INSUFFICIENZA RENALE
D NELLE GLOMERULONEFRITI
E SOLO DOPO PROVA DI CLEARANCE DELL'ACIDO PARA-AMINOIPPURICO (PAI)
- 105 NELLE URINE IN CONDIZIONI NORMALI NON SI RISCONTRA MAI:
A ERITROCITI
B LEUCOCITI
C CELLULE EPITELIALI DI SFALDAMENTO
D CILINDRI IALINI
X E CILINDRI CEREI

- 106 L'IPERBILIRUBINEMIA NELLA SINDROME DI CLIGER-NAJJAR E' DOVUTA A:
A EMOLISI EXTRAVASCOLARE
B DIFETTO DI CAPTAZIONE DELL'EPATOCITA
X C DIFETTO DI CONIUGAZIONE DELL'EPATOCITA
D DIFETTO DI ESCREZIONE DELL'EPATOCITA
E CALCOLO NEL DOTTO CISTICO
- 107 SI MANIFESTA CIANOSI QUANDO LA CONCENTRAZIONE DI EMOGLOBINA NON OSSIGENATA SUPERA:
A 1 G/DL DI SANGUE
B 3 G/DL DI SANGUE
X C 5 G/DL DI SANGUE
D 7 G/DL DI SANGUE
E 9 G/DL DI SANGUE
- 108 LA STRUTTURA PROTEICA QUATERNARIA E' TIPICA:
A DELLE PROTEINE CON PESO MOLECOLARE TRA 10.000 E 20.000
X B DELLE PROTEINE COMPOSTE DA PIU' CATENE POLIPEPTIDI CHE
C DELLE SOLFOPROTEINE
D DELLE PROTEINE CONIUGATE
E DEGLI OLIGOPEPTIDI
- 109 A COSA E' UGUALE LA COSTANTE DI MICHAELIS MENTEN (KM) DI UN ENZIMA:
A ALLA CONCENTRAZIONE DEL SUBSTRATO ALLA QUALE LA VELOCITA' DI REAZIONE E' MASSIMA
B ALLA VELOCITA' MASSIMA CUI PUO' PROCEDERE LA REAZIONE
C AL RECIPROCO DELLA VELOCITA' MASSIMA DI REAZIONE
D ALLA CONCENTRAZIONE DI INIBITORE CHE DIMEZZA LA VELOCITA' MASSIMA
X E ALLA CONCENTRAZIONE DEL SUBSTRATO ALLA QUALE LA VELOCITA' DI REAZIONE E' META' DI QUELLA MASSIMA
- 110 L'AFFERMAZIONE ESATTA E':
A IL PH NON HA ALCUN EFFETTO SULL'ATTIVITA' ENZIMATICA
B L'ATTIVITA' ENZIMATICA AUMENTA ALL'AUMENTARE DEL PH
C L'ATTIVITA' ENZIMATICA DIMINUISCE ALL'AUMENTARE DEL PH
X D GENERALMENTE ESISTE PER CIASCUN ENZIMA UN PH AL QUALE L'ATTIVITA' E' MASSIMA
E LA MASSIMA ATTIVITA' ENZIMATICA SI HA AL PH FISIOLOGICO DI 7.4
- 111 DA COSA SONO COSTITUITI PREVALENTEMENTE I CHILOMICRONI:
X A TRIGLICERIDI
B FOSFOGLICERIDI
C COLESTEROLO
D PROTEINE
E ACIDI GRASSI NON ESTERIFICATI
- 112 QUALE E' IL POLISACCARIDE DI RISERVA PRESENTE NEI TESSUTI ANIMALI:
A L'ALFA-AMILOSO
B L'AMILOPECTINA
X C IL GLICOGENO
D I DESTRANI
E I MANNANI
- 113 NON E' MAI PRESENTE NEL DNA:
A GUANINA
X B URACILE
C CITOSINA
D TIMINA
E ADENINA
- 114 IL NAD (NICOTINAMIDE ADENIN DINUCLEOTIDE NAD) PRESENTA PICCHI DI ASSORBIMENTO:
X A A 260 E 340 NM
B SOLO A 340 NM
C SOLO A 260 NM
D A 340 E 405 NM
E A 260 E 405 NM
- 115 QUALE DEI SEGUENTI COMPOSTI E' UN CORPO E' CHETONICO:
A ALFA-CHETOGLUTARATO
B SUCCINATO
C FUMARATO
X D BETA-IDROSSIBUTIRRATO
E CARNITINA
- 116 IL PIRIDOSSALFOSFATO, DERIVATO DELLA VITAMINA B6, E' COENZIMA NELLE REAZIONI DI:
A DEAMINAZIONE
B DECARBOSSILAZIONE
X C TRANSAMINAZIONE
D OSSIDORIDUZIONE
E ISOMERIZZAZIONE
- 117 COSA SONO I VERTEBRATI TERRESTRI, E QUINDI L'UOMO:
X A UREOTELICI
B AMMONIOTELICI
C URICOTELICI
D TUTTI E TRE
E NESSUNO DEI TRE

- 118 GLI ACIDI BILIARI SONO DERIVATI:
A DELLE LECITINE
B DELLE ALFA1-GLICOPROTEINE
C DELL'ERGOSTEROLO
X D DEL COLESTEROLO
E DELL'AC. OSSALACETICO
- 119 I VERTEBRATI SUPERIORI SONO IN GRADO DI EFFETTURE LA BIOSINTESI:
A DI TUTTI GLI AMINOACIDI
B DI NESSUN AMINOACIDO
X C DI ALCUNI AMINOACIDI
D DEGLI AMINOACIDI GLICOGENICI
E DEGLI AMINOACIDI CHETOGENICI
- 120 QUANTO E', APPROSSIMATIVAMENTE, LA CONCENTRAZIONE INTRACELLULARE DI K+, MANTENUTA DALLA POMPA NA+/K+:
A 10-30 MMOLI
B 30-60 MMOLI
C 60-100 MMOLI
X D 100-150 MMOLI
E 150-300 MMOLI
- 121 QUANTO E', APPROSSIMATIVAMENTE, IL FABBISOGNO MEDIO GIORNALIERO DI CALCIO PER UN ADULTO:.
A 50 MCG/DIE
B 130 MG/DIE
X C 0,8 G/DIE
D 5,5 G/DIE
E 30 G/DIE
- 122 QUANTO E', APPROSSIMATIVAMENTE, IL FABBISOGNO GIORNALIERO DI VITAMINA B12 PER UN ADULTO:
X A 5 MCG/DIE
B 2 MG/DIE
C 18 MG/DIE
D 40 MG/DIE
E 130 MG/DIE
- 123 QUANTO E', APPROSSIMATIVAMENTE, IL FABBISOGNO GIORNALIERO DI PROTEINE PER UN ADULTO:
A 10-15 G/DIE
X B 55-65 G/DIE
C 80-130 G/DIE
D 200-270 G/DIE
E 300-400 G/DIE
- 124 L'INSULINA NON AUMENTA L'ASSUNZIONE DI GLUCOSIO IN QUALE DEI SEGUENTI TESSUTI O ORGANI:
A MUSCOLI SCHELETRICI
B MUSCOLO CARDIACO
C MUSCOLI LISCI
D FEGATO
X E MUCOSA INTESTINALE
- 125 DELLE SEGUENTI SOSTANZE QUALE NON STIMOLA, BENSI' INIBISCE, LA SECREZIONE DELL'INSULINA:
A GLUCOSIO
X B MANNOEPTULOSIO
C LEUCINA
D GLUCAGONE
E ARGININA
- 126 LA MAGGIOR DIFFERENZA TRA PLASMA E LIQUIDO CEREBRO SPINALE CONSISTE NELLA CONCENTRAZIONE DI:
A NA+
B CL-
C HCO3-
D CREATININA
X E COLESTEROLO
- 127 QUAL E' LA CONCENTRAZIONE PROTEICA NORMALE DEL LIQUIDO CEREBROSPINALE:
X A 0,02 G/DL
B 0,2 G/DL
C 1,5 G/DL
D 3,0 G/DL
E 6,0 G/DL
- 128 QUAL E' LA DIFFERENZA MEDIA TRA LA PCO2 ARTERIOSA E QUELLA VENOSA:
A 2 MM HG
X B 6 MM HG
C 20 MM HG
D 35 MM HG
E 50 MM HG
- 129 QUAL E' IL VALORE DEL PK DEL SISTEMA TAMPONE ACIDO CARBONICO-BICARBONATO:
A 3,7
X B 6,1
C 7,4
D 7,7
E 9,2
- 130 SOSTANZA CHE NON VIENE RIASSORBITA DAI TUBULI RENALI E':
A LA CREATINA
B IL GLUCOSIO
C L'ACIDO URICO
X D L'ACIDO 5-IDROSSIINDOLACETICO
E I CORPI CHETONICI

- 131 COSA FANNO I DIURETICI INIBITORI DELLA ANIDRASI CARBONICA (AD ES. L'ACETAZOLAMMIDE):
 A AUMENTANO LA SECREZIONE DI H+
 B RIDUCONO L'ESCREZIONE DI NA+
 X C AUMENTANO L'ESCREZIONE DI K+
 D RIDUCONO L'ESCREZIONE DI K+ E H+
 E RIDUCONO L'ESCREZIONE DI NA+ E H+
- 132 IN CONDIZIONI NORMALI IL RAPPORTO $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ E' PARI A:
 A 2
 B 7
 C 15
 X D 20
 E 35
- 133 DI COSA PUO' ESSERE CAUSA LA DEPLEZIONE DI K+:
 X A ALCALOSI METABOLICA
 B ACIDOSI METABOLICA
 C ALCALOSI RESPIRATORIA
 D ACIDOSI RESPIRATORIA
 E NESSUNO DEI DISTURBI ELENCATI
- 134 COSA E' IL FATTORE REUMATOIDE, EVIDENZIATO DALLA REAZIONE DI WAALER-ROSE:
 A UNA IGG
 X B UNA IGM
 C UNA IGA
 D UNA IGD
 E UNA IGE
- 135 IN CONDIZIONI NORMALI IL VOLUME DEL FILTRATO GLOMERULARE (VFG) E' CIRCA:
 A 2 ML/MIN
 B 15 ML/MIN
 C 30 ML/MIN
 X D 120 ML/MIN
 E 500-700 ML/MIN
- 136 IN CORSO DI GROMERULONEFRITE ACUTA SI VERIFICANO:
 X A EMATURIA, DENSITA' URINARIA ELEVATA, OLIGURIA
 B EMATURIA, DENSITA' URINARIA BASSA, OLIGURIA
 C PROTEINURIA, DENSITA' URINARIA BASSA, POLIURIA
 D PROTEINURIA, DENSITA' URINARIA ELEVATA, POLIURIA
 E EMATURIA, DENSITA' URINARIA BASSA, POLIURIA
- 137 DA COSA SONO RAPPRESENTATE PRINCIPALMENTE NELLA SINDROME NEFROSICA, LE PROTEINE PRESENTI NELLE URINE
 A APTOGLOBINA
 B GAMMA-GLOBULINE
 C TRANSFERRINA
 D ALFA2 MACROGLOBULINA
 X E ALBUMINA
- 138 QUALI CARATTERISTICHE PRESENTA IL QUADRO PROTEICO ELETTROFORETICO NELLA SINDROME NEFROSICA:
 A IPOPROTEINEMIA CON AUMENTO RELATIVO DELLE GAMMA-GLOBULINE
 X B IPOPROTEINEMIA CON AUMENTO RELATIVO DELLE ALFA2 E BETA-GLOBULINE
 C IPOPROTEINEMIA CON AUMENTO RELATIVO DELL'ALBUMINA
 D IPERPROTEINEMIA CON IPER-GAMMA-GLOBULINEMIA
 E IPERPROTEINEMIA CON IPER-ALBUMINEMIA
- 139 IN CORSO DI INSUFFICIENZA RENALE ACUTA NON SI RISCONTRA:
 A MICROEMATURIA
 B IPERAZOTEMIA
 C IPOSDIEMIA
 D IPERPOTASSIEMIA
 X E IPERCALCEMIA
- 140 DI SOLITO NELL'INSUFFICIENZA RENALE ACUTA SI VERIFICA:
 A IPÓSOLFATEMIA
 X B IPERFOSFATEMIA
 C IPERCALCEMIA
 D IPOPOTASSIEMIA
 E IPOMAGNESIEMIA
- 141 NON SI VERIFICA NELLA SINDROME DI DE TONI-DEBRE'-FANCONI:
 A GLICOSURIA
 B FOSFATURIA
 C AMINOACIDURIA
 X D CREATINURIA
 E ACIDOSI
- 142 QUALE E' LA FORMULA PER IL CALCOLO DELLA "CLEARANCE OSMOLARE" :
 A $\text{COSM} = \text{V}/\text{POSM} \times \text{UOSM}$
 B $\text{COSM} = \text{POSM}/\text{UOSM} \times \text{V}$
 X C $\text{COSM} = \text{UOSM}/\text{POSM} \times \text{V}$
 D $\text{COSM} = \text{POSM}/\text{V} \times \text{UOSM}$
 E $\text{COSM} = \text{UOSM}/\text{V} \times \text{POSM}$
 UOSM = OSMOLARITA' URINARIA; POSM = OSMOLARITA' PLASMATICA; V = VOLUME URINARIO/MIN
- 143 TRA LE SEGUENTI NON E' CAUSA DI DEPLEZIONE DI K+:
 X A INSUFFICIENZA RENALE ACUTA
 B DIARREA
 C USO PROLUNGATO DI RESINE A SCAMBIO IONICO
 D ABUSO DI DIURETICI
 E MORBO DI CUSHING

144 TRA LE SEGUENTI NON E' CAUSA DI IPERKALIEMIA:
 X A MORBO DI CONN
 B INSUFFICIENZA RENALE
 C INSUFFICIENZA SURRENALICA
 D IPOALDOSTERONISMO PRIMARIO
 E SINDROME ADRENO-GENITALE

145 IN CONDIZIONI BASALI DI DIGIUNO, IN 24 ORE LO STO
 MACO DI UN INDIVIDUO NORMALE, SECERNE:
 A 0,3-0,5 LITRI DI SUCCO GASTRICO
 B 0,5-1,0 LITRI DI SUCCO GASTRICO
 X C 1,0-1,5 LITRI DI SUCCO GASTRICO
 D 1,5-3,0 LITRI DI SUCCO GASTRICO
 E 3,0-5,0 LITRI DI SUCCO GASTRICO

146 NON E' INCLUSA TRA LE FUNZIONI DEGLI ACIDI BILIARI
 A L'EMULSIONE DEI GRASSI ALIMENTARI
 B LA STIMOLAZIONE DELLA SECREZIONE ESOCRINA DEL
 PANCREAS
 C L'ATTIVAZIONE DELLA LIPASI PANCREATICA
 D L'ASSORBIMENTO DELLE VITAMINE LIPOSOLUBILI
 X E LA STIMOLAZIONE DELLA SECREZIONE DI PEPSINA

147 DEI SEGUENTI ORMONI QUALE NON STIMOLA LA GLICOGENO
 LISI EPATICA:
 X A INSULINA
 B ADRENALINA
 C GLUCAGONE
 D GH (GROWTH HORMON)
 E TIROXINA

148 DOVE AVVIENE PRINCIPALMENTE LA SINTESI DEI
 FOSFOLIPIDI:
 A NEL MUSCOLO
 X B NEL FEGATO
 C NEL MIOCARDIO
 D NEL PANCREAS
 E NEL RENE

149 IN CASO DI EPATITE VERIALE, NON RISULTA AUMENTATA
 L'ATTIVITA' SIERICA DELLA:
 A ALDOLASI
 B TRANSAMINASI
 C FOSFATASI ALCALINA
 D ORNITINCARBAMILTRANSFERASI
 X E PSEUDO COLINESTERASI

150 DI SOLITO NELLE PANCREATITI ACUTE NON SI RISCONTRA
 A IPERGLICEMIA
 X B IPOALBUMINEMIA
 C IPOCALCEMIA
 D AUMENTO DELL'ANTITROMBINA III
 E IPERAMILASEMIA

151 NELLE URINE NORMALI NON SONO PRESENTI, CRISTALLI
 DI:
 A URATI AMORFI
 B OSSALATO DI CALCIO
 C BIURATO DI AMMONIO
 D CARBONATO DI CALCIO
 X E CISTINA

152 E' POSSIBILE RITROVARE NELLE URINE DI UN INDIVIDUO
 NORMALE CON LA CONTA DI ADDIS:
 A FINO A 1000 ERITROCITI/24 ORE
 B FINO A 10.000 ERITROCITI/24 ORE
 C FINO A 100.000 ERITROCITI/24 ORE
 X D FINO A 1.000.000 ERITROCITI/24 ORE
 E FINO A 10.000.000 ERITROCITI/24 ORE

153 IN CASO DI DISTROFIA MUSCOLARE PROGRESSIVA NON RI-
 SULTA AUMENTATA L'ATTIVITA' SIERICA
 A DELL'ALDOLASI
 X B DELL'ACETIL COLINESTERASI
 C DELLA LATTICO DEIDROGENASI
 D DELLA GLUTAMMICO OSSALACETICO TRANSAMINASI
 E DELLA CREATIN FOSFOCHINASI

154 NON RISULTA AUMENTATA NELL'INFARTO DEL MIOCARDIO
 L'ATTIVITA' NEL SIERO :
 A DELLA LATTICO DEIDROGENASI
 B DELLA MIOGLOBINA
 C DELLA GLUTAMMICO OSSALACETICO TRANSAMINASI
 D DELLA CREATIN FOSFOCHINASI
 X E DELLA FOSFATASI ALCALINA

155 NEI CONFRONTI DEL SANGUE ARTERIOSO, IL SANGUE VENO
 SO, PRESENTA UNA CONCENTRAZIONE DI GLUCOSIO:
 A MAGGIORE
 X B MINORE
 C UGUALE
 D DIPENDE DALLA CONCENTRAZIONE DEL SODIO
 E DIPENDE DAL CONTENUTO PROTEICO

156 DOVE HANNO LUOGO LE REAZIONI DEL CICLO DI KREBS:
 A NEL CITOPLASMA
 X B NEI MITOCONDRI
 C NEI RIBOSOMI
 D NEL NUCLEO
 E NEL RETICOLO ENDOPLASMICO

157 DOVE HA LUOGO LA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA:
 A NEL CITOPLASMA
 X B NEI MITOCONDRI
 C NEI RIBOSOMI
 D NEL NUCLEO
 E NEL RETICOLO ENDOPLASMICO

- 158 DA COSA E' DETERMINATO IL POTENZIALE DI AZIONE DI UNA CELLULA NERVOSA:
X A FUORIUSCITA DI K+ E INGRESSO DI NA+
B FUORIUSCITA DI NA+ E INGRESSO DI K+
C FUORIUSCITA DI K+ E INGRESSO DI CA++
D FUORIUSCITA DI NA+ E INGRESSO DI CA++
E FUORIUSCITA DI CA++ E INGRESSO DI NA+
- 159 COSA E' CARENTE IN CASO DI PELLAGRA:
A VIT. B1 (TIAMINA)
B VIT. B2 (RIBOFLAVINA)
X C VIT. B3 (AC. NICOTINICO)
D VIT. B6 (PIRIDOSSINA)
E VIT. B12 (CIANOCOBALAMINA)
- 160 IN MAGGIOR PARTE LA CO2 PRODOTTA DAI TESSUTI PERIFERICI VIENE TRASPORTATA NEL SANGUE:
A SOTTO FORMA DI CO2 IN SOLUZIONE
B LEGATA AI GRUPPI AMINICI DELL'EMOGLOBINA
X C SOTTO FORMA DI BICARBONATO
D LEGATA AL GRUPPO EME DELL'EMOGLOBINA
E SOTTO FORMA DI UREA
- 161 NON SONO PRESENTI NELLA CELLULA ANIMALE:
A LISOSOMI
B CENTRIOLI
C CORPI DI GOLGI
D CIGLIA E FLAGELLI
X E PLASTIDI
- 162 QUALE NON E' CAUSA DI IPERFOSFATEMIA:
A IPOPARATIROIDISMO
B PSEUDO-IPOPARATIROIDISMO
C INSUFFICIENZA RENALE
D SOVRADOSAGGIO DI VIT. D
X E OSTEOMALACIA
- 163 TRA LE SEGUENTI NON E' CAUSA DI IPOMAGNESIEMIA:
A SINDROMI DA MALASSORBIMENTO
B DIARREA
C IPERALDOSTERONISMO
D TRATTAMENTO INSULINICO DEL COMA DIABETICO
X E MORBO DI ADDISON
- 164 TRA I SEGUENTI DIFETTI GENETICI DI PROTEINE PLASMATICHE QUALE E' CLINICAMENTE ASINTOMATICO:
X A BISALBUMINEMIA
B DIFETTO GENETICO DI ALFA1-ANTITRIPSINA
C DIFETTO GENETICO DI CERULOPLASMINA
D DIFETTO GENETICO DI ALFA1/LIPOPROTEINE
E DIFETTO GENETICO DI BETA-LIPOPROTEINE
- 165 SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI FREDERICKSON SI HANNO I VALORI PIU' ELEVATI DI TRIGLICERIDI SIERICI, NEI TIPI:
A I E II
X B I E V
C II E III
D II E IV
E II E V
- 166 QUALE E' L'ISOENZIMA DELLA LATTICO DEIDROGENASI LA CUI ATTIVITA' SIERICA AUMENTA IN MAGGIOR MISURA IN CASO DI INFARTO DEL MIOCARDIO:
X A LDH 1
B LDH 2
C LDH 3
D LDH 4
E LDH 5
- 167 IN QUALI ORGANI E' PRESENTE LA LEUCIN-AMINO-PEPTIDASI (LAP):
A FEGATO
B RENE E FEGATO
C PANCREAS E FEGATO
D IN NESSUNO DEGLI ORGANI INDICATI
X E IN TUTTI GLI ORGANI INDICATI
- 168 NON RISULTA AUMENTATA LA FOSFATASI ALCALINA SIERICA IN CORSO DI:
A RACHITISMO
X B OSTEOPOROSI
C MALATTIA DI PAGET
D ACROMEGALIA
E METASTASI OSSEE CARCINOMATOSE
- 169 NELLA BETA-TALASSEMIA SI VERIFICA:
A DIMINUZIONE DI HBA E HBA2, AUMENTO DI HBF
X B DIMINUZIONE DI HBA, AUMENTO DI HBA2 E DI HBF
C DIMINUZIONE DI HBA E HBF, AUMENTO DI HBA2
D AUMENTO DI HBA, DIMINUZIONE DI HBA2 E HBF
E DIMINUZIONE DI HBA, HBA2 E HBF
- 170 NEL LIQUIDO CEFALORACHIDIANO DI UN INDIVIDUO NORMALE E' LA PRESENZA DI:
X A 2-10 LEUCOCITI / ML
B 10-150 LEUCOCITI / ML
C 50-300 LEUCOCITI / ML
D FINO A 1000 LEUCOCITI / ML
E FINO A 10.000 LEUCOCITI / ML

- 171 IL TASSO EMATICO DI ACIDO URICO E' AUMENTATO:
A NELLA OSTEOPOROSI
B NELLA POLIARTRITE CRONICA EVOLUTIVA
C NEL REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO
D NELLA SINDROME DI DE TONI-DEBRE'-FANCONI
X E NELLA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA
- 172 IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI LA CONCENTRAZIONE EMATICA DELL'APTOGLOBINA E' SICURAMENTE DIMINUITA:
X A ANEMIE E ITTERI EMOLITICI CRIPTOGENETICI (ACQUISITI)
B REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO
C LEUCEMIA MIELOIDE
D SCLEROSI A PLACCHE
E TUBERCOLOSI
- 173 IN QUALE DI QUESTE MALATTIE E' PIU' PROBABILE RISCONTRARE UNA IPERAMILASEMIA:
A CIRROSI EPATICA
X B PANCREATITE ACUTA EMORRAGICA
C CARCINOMA DELLA PROSTATA
D ULCERA GASTRICA
E COLECISTITE ACUTA
- 174 IN QUALE DELLE SEGUENTI CONDIZIONI E' PIU' PROBABILE RISCONTRARE UNA NOTEVOLE PRESENZA DI ACIDI GRASSI NELLE FECI:
X A SPRUE:
B MALATTIA DI CROHN
C SINDROME DEL GASTRORESECATO
D COLITE ULCEROSA
E CIRROSI EPATICA
- 175 LA DEGENERAZIONE EPATO-LENTICOLARE O MALATTIA DI WILSON E' CARATTERIZZATA DA DIMINUZIONE O ASSENZA:
A DI ALFA-1 ANTITRIPSINA
B DI APTOGLOBINA
C DI CDP-COLINA
X D DI CERULOPLASMINA
E DI TRANSFERRINA
- 176 IN QUALE DI QUESTE CONDIZIONI, OLTRE L'IPOPARATIROIDISMO, SI RISCONTRA IPOCALCEMIA SENZA AUMENTO DEL CALCIO IONIZZATO NEL SANGUE:
A OSTEOMALACIA
B CARCINOMA PROSTATICO
C OSTEOPOROSI
D MALATTIA OSSEA O OSTEITE FIBRO-CISTICA DI REKLINGHAUSEN
X E RACHITISMO RENALE
- 177 QUALE TRA QUESTE CONDIZIONI MORBOSE E' CARATTERIZZATA DA AUMENTO DEL CALCIO IONIZZATO EMATICO:
A IPOPARATIROIDISMO
B GLOMERULONEFRITE
X C OSTEOMALACIA
D ACROMEGALIA
E MIXEDEMA
- 178 QUALE TRA QUESTE CONDIZIONI MORBOSE E' CARATTERIZZATA DA AUMENTO DEL CALCIO IONIZZATO EMATICO:
A ECLAMPSIA
B ALCALOSI METABOLICA
X C OSTEOPOROSI
D NEFROPATIE TUBULARI
E TETANIA INFANTILE
- 179 QUALE TRA QUESTE CONDIZIONI MORBOSE E' CARATTERIZZATA DA AUMENTO DEL CALCIO IONIZZATO EMATICO:
X A MALATTIA OSSEA O OSTEITE FIBRO-CISTICA DI RECKLIN GHAUSEN
B EPILESSIA
C MALATTIA CELIACA
D PANCREATITE ACUTA EMORRAGICA
E TETANIA INFANTILE
- 180 IN QUALE DI QUESTE MALATTIE SI RISCONTRA IPOCALCEMIA E DIMINUZIONE DEL TASSO EMATICO DEL CALCIO IONIZZATO
A MALATTIA CELIACA
B MALATTIA DI SIMMONDS-SHEEHAN
C OSTEOPOROSI
D ACROMEGALIA
X E IPOPARATIROIDISMO
- 181 IN UNA DELLE SEGUENTI MALATTIE VI E' AUMENTO DEL TASSO EMATICO DI CAROTENE:
A CIRROSI EPATICA
B MALATTIA CELIACA
X C IPOPARATIROIDISMO
D XEROFTALMIA
E CALCOLOSI BILIARE
- 182 IN QUALE DELLE SEGUENTI SITUAZIONI PATOLOGICHE SONO PRESENTI EMAZIE A BERSAGLIO:
A CLOROSI
B ANEMIA DI BIERMER
X C TALASSEMIA
D ANEMIA POSTEMORRAGICA
E ANEMIA EMOLITICA COSTITUZIONALE

- 183 E' AUMENTATO IL TASSO DI CLORO PLASMATICO:
X A NELLA DISIDRATAZIONE DA DEFICIENZA D'ACQUA
B NEL MORBO DI ADDISON
C NEL COLERA
D NEL COMA DIABETICO
E NELLA SINDROME NEFROSICA
- 184 SI RISCONTRA EMOGLOBINA S NEI GLOBULI ROSSI:
A DEL FAVISMO
B DELLA TALASSEMIA
C DELLA SFEROOCITOSI
D DELLA ERITROMIELOSI
X E DELLA DREPANOCITOSI
- 185 SI RISCONTRA EMOGLOBINA A2, CON TASSO SUPERIORE AL 4%, NEI GLOBULI ROSSI DI SOGETTI AFFETTI DA:
A POLICITEMIA FAMILIARE
B ELLITTOCITOSI COSTITUZIONALE
X C TALASSEMIA
D MALATTIA DI MINKOWSKI-CHAUFFARD
E SFEROOCITOSI
- 186 L'IPERSIDEREMIA E' CARATTERISTICA DI QUALE DELLE SEGUENTI MALATTIE:
A ANEMIA POSTEMORRAGICA
X B ANEMIA ACRESTICA DI WILKINSON
C CLOROSI
D ANEMIA SECONDARIA A CARCINOMA EPATICO
E ANEMIA PERNICIOSIFORME FAMILIARE
- 187 IN UNA DELLE SEGUENTI MALATTIE L'IPOFOSFATASEMIA ALCALINA E' FREQUENTE:
X A IPOTIROIDISMO
B OSTEOPOROSI
C MORBO DI PAGET
D RACHITISMO
E CARCINOMA PROSTATICO
- 188 DI UNA DELLE SEGUENTI MALATTIE E' PRESENTE IPOPOTASSIEMIA:
A DIABETE
B FEOCROMOCITOMA
C CIRROSI EPATICA
D CARENZA NUTRITIVA
X E VOMITO INCOERCIBILE
- 189 LA FASE PRECOCE TRANSITORIA DI PERMEABILIZZAZIONE VASALE NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI E' MEDIATA DA:
A COMPLEMENTO
B FATTORE DI HAGEMAN
C ANAFILOTOSSINA
X D ISTAMINA
E SIEROALBUMINA
- 190 IN UNO DEI SEGUENTI STATI MORBOSI E' RISCONTRABILE IPERPOTASSIEMIA:
A CIRROSI EPATICA
X B MALATTIA DI WALDENSTROM
C NEFROSI LIPOIDEA
D ANCHILOSTOMIASI
E KWASHIORKOR
- 191 IN UNO DEI SEGUENTI STATI MORBOSI E' RISCONTRABILE IPOPROTIDEMIA:
X A SHOCK INIZIALE DA USTIONI
B MENINGITE TUBERCOLARE
C VOMITO INCOERCIBILE
D COMA DIABETICO
E GLOMERULONEFRITE
- 192 IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI MORBOSE LA NATREMIA E' PIU' FREQUENTEMENTE AUMENTATA:
A KWASHIORKOR
X B DISIDRATAZIONE DA DEFICIENZA D'ACQUA
C OCCLUSIONE INTESTINALE
D COMA DIABETICO
E POTOMANIA
- 193 UNA DELLE SEGUENTI MALATTIE E' CARATTERIZZATA DA IPONATREMIA:
X A MORBO DI ADDISON
B MORBO DI CUSHING
C SINDROME DI CONN
D VIRILISMO SURRENALICO
E INTOSSICAZIONE DA DIURETICI TIAZIDICI
- 194 IL SOGGETTO NORMALE NELLA CURVA DA CARICO SEMPLICE DI GLUCOSIO "PER OS" RAGGIUNGE I VALORI MASSIMI GLICEMICI (50-100% RISPETTO AL VALORE INIZIALE):
A DA 0 A 30' DAL CARICO
B A DISTANZA DI 90' DAL CARICO
C A DISTANZA DI 120' DAL CARICO
D A DISTANZA DI OLTRE 80' DAL CARICO
X E A DISTANZA DI 30' E NON OLTRE 60' DAL CARICO
- 195 VERSO DOVE MIGRA UN AMINOACIDO CON PUNTO ISOELETTRICO UGUALE A 8, SOTTOPOSTO A UN CAMPO ELETTRICO (ELETTROFORESI) IN UNA SOLUZIONE A PH 5:
A L'ANODO
B SI EQUIPARTISCE TRA I DUE ELETTRODI
X C IL CATODO
D RIMANE FERMO
E SI COMPORTA DIVERSAMENTE A SECONDO DELLA DIFFERENZA DI POTENZIALE

- 196 COME E' LA VELOCITA' DI UNA REAZIONE DEL PRIMO ORDINE:
A COSTANTE NEL TEMPO
B AUMENTA CON IL PROCEDERE DELLA REAZIONE
X C MASSIMA NELL'ISTANTE INIZIALE
D MINIMA NELL'ISTANTE INIZIALE
E E'INDIPENDENTE DALLA CONCENTRAZIONE DEI REAGENTI
- 197 SI PUO' OTTENERE UN CHETONE PER:
X A BLANDA OSSIDAZIONE DI ALCOLI SECONDARI
B BLANDA OSSIDAZIONE DI ACIDI CARBOSSILICI
C BLANDA OSSIDAZIONE DEGLI ALCOLI TERZIARI
D BLANDA OSSIDAZIONE DI ALCOLI PRIMARI
E BLANDA OSSIDAZIONE DI ALDEIDI
- 198 DEI SEGUENTI COMPOSTI QUALE PUO' ESIBIRE ISOMERIA CIS-TRANS:
A ACIDO 2-CHETOBUTANOICO
B ACIDO 2-OSSIBUTANOICO
X C ACIDO 2-BUTENOICO
D ACIDO 3-METIL-2 BUTANOICO
E ACIDO 3-BUTINOICO
- 199 L'ELEMENTO FOSFORO SI PRESENTA IN MOLTE FORME MOLECOLARI, UNA DELLE QUALI E' P4. QUAL E' L'OSSIDAZIONE DEL FOSFORO IN QUESTA MOLECOLA?
X A 0
B +4
C -4
D +1
E +2
- 200 UNA SOLUZIONE E' FISIOLOGICA QUANDO:
A IL SOLUTO E'UN ELETTROLITA
B HA LO STESSO PH DEL SANGUE
C IL SOLUTO E'UN NON ELETTROLITA
X D HA LO STESSO PH E LA STESSA PRESSIONE OSMOTICA DEL SANGUE
E CONTIENE TUTTI I COSTITUENTI DEL PLASMA NORMALE
- 201 CON QUALE NOME E' CONOSCIUTA LA MIGRAZIONE DI PARTICELLE COLLOIDALI SOTTO L'INFLUENZA DEL CAMPO ELETTRICO:
A IONOFRESI
X B ELETTROFORESI
C EFFETTO TYNDALL
D ELETTROLISI
E MOTO BROWNIANO
- 202 L'ANODO IN UNA CELLA ELETTROLITICA E'
A L'ELETTRODO DOVE SI SCARICANO GLI IONI POSITIVI
B L'ELETTRODO DOVE HA LUOGO UNA RIDUZIONE
X C L'ELETTRODO DOVE AVVIENE UNA OSSIDAZIONE
D L'ELETTRODO CHE FORMA ANIONI
E NESSUNA DI QUESTE
- 203 COSA FORMA LA REAZIONE TRA UN'ALDEIDE ED UN ALCOOL
A UN ETERE
B UN ESTERE
X C UN SEMIACETALE
D UN CHETONE
E UN OSSIMA
- 204 COSA SONO GLI ISOMERI CIS-TRANS:
A ENANTIOMORFI
B CONTENGONO DUE ATOMI DI CARBONIO LEGATI AD UN TRIPLO LEGAME
X C CONTENGONO 2 ATOMI DI CARBONIO LEGATI DA UN DOPIO LEGAME
D CONTENGONO UN ATOMO DI CARBONIO ASIMMETRICO
E CONTENGONO SOLO LEGAMI SEMPLICI
- 205 QUANTO E' UNA MOLE DI ACIDO CLORIDRICO:
A 100 G DI ACIDO CLORIDRICO
B 1 LT DI ACIDO CLORIDRICO A T.P.S.
X C UN NUMERO DI AVOGADRO DI MOLECOLE DI ACIDO CLORIDRICO
D 1 MOLECOLA DI ACIDO CLORIDRICO
E 1 G DI HCL
- 206 QUAL E' IL PH DI UNA SOLUZIONE ACIDA:
A PH=7
B PH>7
C PH>10
D PH TRA 7 E 8
X E PH<7
- 207 QUANTO E' L'UNITA' DI MASSA ATOMICA:
A LA DODICESIMA PARTE DELL'ATOMO DI CARBONIO
B LA CENTESIMA PARTE DELL'ATOMO DI CARBONIO
X C LA DODICESIMA PARTE DELLA MASSA DELL'ISOTOPO 12 DEL CARBONIO
D LA CENTESIMA PARTE DEL GRAMMO
E LA SEDICESIMA PARTE DI UN ATOMO DI OSSIGENO
- 208 LA TEMPERATURA DURANTE IL CONGELAMENTO DI UNA SOSTANZA PURA:
A AUMENTA
B DIMINUISCE
C CAMBIA
X D RIMANE COSTANTE
E VARIA A SECONDO DELLA TEMPERATURA ESTERNA

- 209 COSA SI FORMA QUANDO TRA DUE ATOMI SONO CONDIVISI IN MODO UGUALE DUE ELETTRONI:
 A UN LEGAME IDROGENO
 B UN LEGAME IONICO
 X C UN LEGAME COVALENTE
 D UN LEGAME DI TIPO VAN DER WAALS
 E UN LEGAME DIPOLO-DIPOLO
- 210 QUANDO SI RIDUCE UN ELEMENTO:
 A AUMENTO IL SUO NUMERO DI OSSIDAZIONE
 X B AUMENTA IL SUO NUMERO DI ELETTRONI
 C DIMINUISCE IL SUO NUMERO DI ELETTRONI
 D DIMINUISCE DI VOLUME
 E EMETTE RADIAZIONI BETA
- 211 GLI ELEMENTI DELLO STESSO GRUPPO NEL SISTEMA PERIODICO DEGLI ELEMENTI HANNO:
 A PROPRIETA' FISICHE SIMILI
 X B PROPRIETA' CHIMICHE SIMILI
 C LO STESSO NUMERO DI NEUTRONI
 D LO STESSO NUMERO DI PROTONI
 E SEMPRE LO STESSO NUMERO DI OSSIDAZIONE
- 212 QUALI SONO LE PARTICELLE SUBATOMICHE CONTENUTE NEL NUCLEO DELL'ATOMO:
 A SOLO NEUTRONI
 B NEUTRONI ED ELETTRONI
 C PROTONI, ELETTRONI E NEUTRONI
 D PROTONI ED ELETTRONI
 X E PROTONI E NEUTRONI
- 213 L'ARIA E' UN MISCUGLIO DI GAS COSTITUITO DA:
 A CIRCA IL 70% DI AZOTO ED IL 30% DI IDROGENO
 B CIRCA IL 50% DI AZOTO E IL 50% DI OSSIGENO
 X C CIRCA IL 78% DI AZOTO E IL 22% DI OSSIGENO
 D CIRCA IL 40% DI IDROGENO ED IL 60% DI OSSIGENO
 E CIRCA L'80% DI OSSIGENO E IL 20% DI AZOTO
- 214 QUAL E' IL NUMERO DI OSSIDAZIONE DELL'OSSIGENO NELL'ACQUA:
 A 0
 B +2
 X C -2
 D -4
 E -1
- 215 DI COSA MANCA LA CELLULA PROCARIOTA:
 A RIBOSOMI
 B STRUTTURE PER LA SINTESI DI ATP
 X C MEMBRANA NUCLEARE
 D DNA
 E RNA
- 216 COSA SONO I LISOSOMI:
 A VESCICOLE CONTENENTI PRODOTTI DI RIFIUTO
 X B VESCICOLE CONTENENTI ENZIMI
 C VESCICOLE CONTENENTI COMPOSTI COLORATI
 D VESCICOLE CONTENENTI DNA
 E VESCICOLE CONTENENTI LIPIDI DI RISERVA
- 217 COSA SONO I PLASMIDI:
 A PARASSITI CHE PROVOCANO LA MALARIA
 X B DNA EXTRACROMOSOMIALE
 C VIRUS
 D ORGANULI DELLA CELLULA VEGETALE
 E CORPUSCOLI IN CUI SI ATTUA SINTESI DI COMPOSTI AD ALTA ENERGIA
- 218 DOVE AVVIENE IL CICLO DI KREBS:
 A NEL CITOPLASMA
 B SUL RETICOLO ENDOPLASMATICO RUGOSO
 X C NELLA MATRICE MITOCONDRIALE
 D NEL RIBOSOMA
 E NEL LISOSOMA
- 219 LA TRADUZIONE COMINCIA CON:
 A L'ATTACCO DELLA RNA-POLIMERASI AL PROMOTORE
 X B L'ATTACCO DELLA SUBUNITA' MINORE DEL RIBOSOMA ALL'MRNA
 C L'ATTACCO DELLA PEPTIDIL-SINTETASI PER FORMARE IL LEGAME PEPTIDICO
 D L'ATTACCO DELLA SUBUNITA' MAGGIORE DEL RIBOSOMA ALL'MRNA
 E LA SINTESI DELLE PROTEINE
- 220 DA COSA E' FORMATA L'EMOGLOBINA UMANA ADULTA:
 A 2 CATENE BETA E 3 CATENE ALFA
 X B 2 CATENE BETA E 2 CATENE ALFA
 C 1 CATENA BETA E 1 CATENA ALFA
 D 2 CATENE BETA E 2 CATENE GAMMA
 E 4 CATENE BETA
- 221 COME SONO I FIGLI NATI DA UN INCROCIO TRA UNA DONNA RH+RH+ CON UN UOMO RH-RH- :
 A AFFETTI DA ERITROBLASTOSI
 X B NORMALI
 C NESSUN FIGLIO
 D AFFETTI DA ERITROBLASTOSI E NORMALI
 E TALASSEMICI
- 222 COSA PRESENTA UNA FEMMINA XO NEL NUCLEO DI CELLULE EPITELIALI SFALDATE ESAMINATE PREVIA COLORAZIONE
 A 1 CORPO DI BARR
 B 2 CORPI DI BARR
 X C NESSUNO CORPO DI BARR
 D 3 CORPI DI BARR
 E UN NUMERO VARIABILE DI CORPI DI BARR

- 223 QUANTI SONO I SITI ATTIVI DEI TRNA:
A 1,
B 2
C 3
D 5
X E 4
- 224 POSSONO NASCERE DA UN INCROCIO TRA UN INDIVIDUO DI GRUPPO SANGUIGNO A ED UNO DI GRUPPO SANGUIGNO 0:
A FIGLI AB
X A NEL NUCLEO E IN ALTRI ORGANULI CELLULARI
B SOLO NEL CITOPLASMA
C SOLO FIGLI GRUPPO 0
D SOLO FIGLI GRUPPO A
X E FIGLI A E 0
- 225 IL DNA NELLA CELLULA EUCARIOTICA E'PRESENTE:
X A NEL NUCLEO E IN ALTRI ORGANULI CELLULARI
B SOLO NEL CITOPLASMA
C SOLO NEL NUCLEO
D NEI LISOSOMI
E SOLO NEL MITOCONDRIO
- 226 DOVE SI TROVA IL MITOCONDRIO:
A NEL NUCLEO
X B NEL CITOPLASMA
C NELLA MEMBRANA CELLULARE
D FUORI DELLA CELLULA
E SOLO NEI PROCARIOTI
- 227 GLI ISOTOPI SONO DUE O PIU' SPECIE ATOMICHE CHE:
A HANNO UGUALE NUMERO DI MASSA ATOMICO E DIVERSO NUMERO ATOMICO
X B HANNO UGUALE NUMERO ATOMICO E DIVERSO NUMERO DI MASSA ATOMICA
C APPARTENGONO ALLO STESSO GRUPPO DEL SISTEMA PERIODICO
D HANNO UGUALE PESO ATOMICO
E HANNO UGUALE PESO MOLECOLARE
- 228 QUALE RAPPORTO INDICA LA FRAZIONE MOLARE:
A MOLI DI SOLVENTE E GRAMMI DI SOLUZIONE
B MOLI DI SOLUTO E MOLI DI SOLVENTE
X C MOLI DI SOLUTO E MOLI DI SOLUZIONE
D MOLI DI SOLVENTE E GRAMMI DI SOLUTO
E GRAMMI DI SOLVENTE E MOLI DI SOLUTO
- 229 COSA HA UNA SOLUZIONE ACQUOSA DI ACETATO DI SODIO:
A HA UN PH=7
B HA UN PH=14
C HA PH=4,75
X D HA UN PH>7
E HA UN PH<7
- 230 IN QUALE DELLE SEGUENTI FUNZIONI IL FERRO HA IMPORTANZA FONDAMENTALE:
A NEL MANTENERE NORMALE L'EQUILIBRIO DELL'ACQUA E DEGLI ELETTROLITI
B NELL'ACCRESIMENTO DEI TESSUTI EPITELIALI
C NELLO STIMOLARE L'ACCRESIMENTO DEL TESSUTO OSSEO
X D NEI SISTEMI DI OSSIDO-RIDUZIONE
E NELLO SVILUPPO DEI CARATTERI SESSUALI
- 231 QUALE CARATTERISTICA CHIMICA DEL COLLAGENE VIENE SFRUTTATA IN CHIMICA CLINICA QUANDO ESSO E'INTERESSATO DA UN NOXA PATOGENA CHE NE AUMENTA IL CATABOLISMO:
A LA STRUTTURA A ELICA
B IL SUO ALTO CONTENUTO IN GLICINA
X C LA PRESENZA DI IDROSSIPROLINA
D IL SUO ALTO CONTENUTO IN AMINOACIDI AROMATICI
E LA PRESENZA DI PONTI DISOLFURO
- 232 NORMALMENTE IL CALCIO DEL SIERO E':
X A DA 9 A 11 MG%
B DA 6 A 8 MG%
C DA 12 A 15 MG%
D DA 18 A 20 MG%
E DA 150 A 200 MCG%
- 233 DA COSA E' CARATTERIZZATA LA STRUTTURA PRIMARIA DELLE PROTEINE, CHE VIENE SFRUTTATA PER LA LORO DE TERMINAZIONE CON LA REAZIONE DEL BIURETO:
A L'ALFA ELICA
B UNA SEQUENZA SPECIFICA DI GRUPPI ALFA AMINICI
X C UNA SEQUENZA SPECIFICA DI AMINOACIDI LEGATI DA LEGAMI PEPTIDICI
D LA PRESENZA DI LEGAMI GLICOSIDICI
E NESSUNA DI QUESTE CONDIZIONI
- 234 QUAL E' L'ORMONE CHE ABBASSA I LIVELLI SIERICI DEL CALCIO:
X A LA CALCITONINA
B IL PARATORMONE
C IL CORTISONE
D IL TSH
E L'MSH
- 235 I LIQUIDI, CON IL DIMINUIRE DELLA PRESSIONE COLLOID-OSMOTICA DEL PLASMA, PASSANO DA:
A GLI SPAZI EXTRACELLULARI AGLI SPAZI INTRACELLULARI
B GLI SPAZI INTRACELLULARI AGLI SPAZI EXTRACELLULARI
X C DAL SANGUE AGLI SPAZI INTERSTIZIALI
D DAGLI SPAZI INTERSTIZIALI AL SANGUE
E NESSUNA DELLE CONDIZIONI INDICATE

- 236 IN CHE MODO I SALI BILIARI FAVORISCONO LA DIGESTIONE E L'ASSORBIMENTO DEI GRASSI:
 A TRASFORMANDO TUTTI GLI ACIDI GRASSI IN SAPONI
 B NEUTRALIZZANDO GLI ACIDI PROVENIENTI DALLO STOMACO
 C MANTENENDO IL PH OTTIMALE PER L'ATTIVITA' DELLA LI PASI
 D TRASFORMANDO DIRETTAMENTE I TRIGLICERIDI IN ACIDI GRASSI
 X E FORMANDO CON GLI ACIDI GRASSI ED I TRIGLICERIDI DEI COMPLESSI SOLUBILI IN ACQUA
- 237 COSA SI PUO' AVERE NELL'IPOTIROIDISMO:
 A T4 AUMENTATA, T3 DIMINUITA, TSH NORMALE
 B T4 NORMALE, T3 AUMENTATA, TSH NORMALE
 C T4 NORMALE, T3 NORMALE, TSH NORMALE
 X D T4 RIDOTTA, T3 RIDOTTA, TSH AUMENTATO
 E NESSUNA DELLE CONDIZIONI INDICATE
- 238 NOTEVOLMENTE DIMINUITI SONO I VALORI SIERICI DELLA PSEUDOCOLINESTERASI:
 A NELLA PANCREATITE ACUTA
 B NELLA EPATITE ACUTA
 X C NELLA CIRROSI EPATICA IN FASE ASCITICA
 D NELLA MUCOVISCIDOSI
 E NELLA INTOSSICAZIONE DA DIGITALE
- 239 SECONDO FREDRICKSON UN ELEVATO VALORE DEI TRIGLICERIDI NEL SIERO (OLTRE 400 MG%) E' UNA DELLE CARATTERISTICHE DEL:
 A FENOTIPO II A
 B FENOTIPO IIB
 C FENOTIPO I
 D FENOTIPO III
 X E FENOTIPO V
- 240 POSSONO ESSERE NOTEVOLMENTE AUMENTATI I VALORI DELLA LIPASI E DELL'AMILASI DEL SIERO:
 A NELLA TIROIDITE ACUTA
 B NELLA PANCREATITE CRONICA
 X C NELLA PANCREATITE ACUTA
 D NELLA EPATITE ACUTA
 E NELLA APPENDICITE ACUTA
- 241 IN QUALE CASO LA BILIRUBINA NON CONIUGATA DEL SIERO E' AUMENTATA:
 A NELL'ITTERO EMOLITICO COSTITUZIONALE
 B NELLA SINDROME DI GILBERT
 C NEL FAVISMO
 D NELLA EPATITE ACUTA
 X E IN TUTTE LE CONDIZIONI SU ESPOSTE
- 242 IN QUALE CONDIZIONI IL FERRO SIERICO E' AUMENTATO:
 A NELL'ANEMIA FERROPRIVA SIDEROPENICA
 X B NELLA BETA TALASSEMIA MAJOR
 C NELLA PANCREATITE ACUTA
 D NELLA SPRUE
 E IN TUTTE LE CONDIZIONI SU ESPOSTE
- 243 IN QUALE CONDIZIONI IL COLESTEROLO E I FOSFOLIPIDI PLASMATICI SONO AUMENTATI:
 A NELLA CIRROSI EPATICA
 X B NELLA CIRROSI BILIARE
 C NELLA TIREOTOSSICOSI
 D NELLA MUCOVISCIDOSI
 E NELLA MALATTIA DI CROHN
- 244 IN QUALE CONDIZIONI L'ALFA 2 MACROGLOBULINA E' NOTEVOLMENTE AUMENTATA NEL PLASMA:
 X A NELLA SINDROME NEFROSICA
 B NEL MORBO DI ADDISON
 C NELLA TIREOTOSSICOSI
 D NELLA SINDROME CELIACA
 E NELLA MACROGLOBULINEMIA DI WALDENSTROM
- 245 IN QUALE CONDIZIONI LE FRAZIONI C3C E C4 DEL COMPLEMENTO SONO DIMINuite NEL PLASMA:
 A SINDROME NEFROSICA A LESIONI GLOMERULARI MINIME
 B NEL LUPUS ERMATOSI SISTEMICO
 C NELLA GLOMERULONEFRITE SUB-ACUTA MALIGNA
 D NELL'EPATITE ACUTA
 X E IN TUTTE LE CONDIZIONI SU ESPOSTE
- 246 IN QUALE AFFEZIONE I VALORI SIERICI DEL SODIO E DEL POTASSIO SONO AUMENTATI:
 X A NELLA GLOMERULONEFRITE ACUTA
 B NELL'EPATITE CRONICA AGGRESSIVA
 C NELL'ITTERO EMOLITICO COSTITUZIONALE
 D NELLA GOTTA
 E IN SOGGETTI A DIETA PREVALENTEMENTE VEGETALE
- 247 IN QUALE AFFEZIONE LA CERULOPLASMINA SIERICA E' NOTEVOLMENTE RIDOTTA:
 A EPATITE ACUTA
 B CIRROSI EPATICA
 X C MORBO DI WILSON
 D SINDROME DI DUBIN-JONSON
 E SINDROME DI GILBERT
- 248 DI CHE NATURA E' L'INSULINA:
 A STEROIDEA
 B AMINOACIDICA
 X C PROTEICA
 D LIPO-POLISACCARIDICA
 E GLICIDICA

- 249 COSA PROVOCA IL GLUCAGONE:
X A GLICOGENOLISI EPATICA
B GLICOGENOLISI MUSCOLARE
C GLICOLISI
D ATTIVAZIONE DELLA SINTESI DEGLI ACIDI GRASSI
E GLICOGENO SINTESI EPATICA
- 250 L'ESTRADIOLO E' UNO STEROIDE A :
X A 18 ATOMI DI C
B 19 ATOMI DI C
C 21 ATOMI DI C
D 27 ATOMI DI C
E 17 ATOMI DI C
- 251 I FENOLSTEROIDI SONO DERIVATI:
A DEI PROGESTINICI
B DEI GLUCOCORTICOIDI
X C DEGLI ESTROGENI
D DEI MINERALCORTICOIDI
E DEGLI ANDROGENI
- 252 DA COSA DIPENDONO LE EMOGLOBINOPATIE:
A DA UN DIFETTO GENETICAMENTE DETERMINATO DELLA STRUTTURA DELL'EME
X B DA UN DIFETTO DELLA STRUTTURA DELLA GLOBINA
C DA UNA MODIFICAZIONE DEI LEGAMI EME-GLOBINE
D DELLA PRESENZA DI UNO IONE DIVERSO DAL Fe^{2+} NELLA MOLECOLA PROTEICA
E DA UN DIMINUITO NUMERO DI GRUPPI EME
- 253 DA COSA SONO FORMATI I PROTEOGLICANI:
A UNA PICCOLA CATENA PROTEICA E BREVI RESIDUI OLIGO SACCARIDICI
X B UNA CATENA PROTEICA E LUNGHE CATENE DI GLUCOSAMINO GLICANI
C UNA CATENA PROTEICA E RESIDUI DI ACIDO SIALICO
D UNA CATENA PROTEICA E RESIDUI DI FUCOSIO
E UNA CATENA PROTEICA E RESIDUI LIPIDICI
- 254 LE REAZIONI DI TRANSAMINAZIONE SONO CATALIZZATE DA ENZIMI CHE HANNO COME COENZIMA:
A L'ACIDO PIRUVICO
B IL NAD
C IL FAD
D LA BIOTINA
X E IL PIRIDOSSAL 5-FOSFATO
- 255 QUALE E' IL RAPPORTO P:O NELLA CATENA RESPIRATORIA ACCOPPIATA ALLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA A PARTI RE DA: $NADH + H^+$:
X A 3
B 2
C 0
D 1
E 6
- 256 METABOLITA TERMINALE DELL'AZOTO AMMINICO DEGLI AMINO ACIDI E' L'UREA:
A NEGLI UCCELLI
X B NEI MAMMIFERI
C NEI PESCI
D IN TUTTE LE SPECIE ANIMALI
E NEI VEGETALI SOLTANTO
- 257 SI FORMA VITAMINA C NEGLI ORGANISMI CHE SONO IN GRADO DI SINTETIZZARLA:
X A DALL'ACIDO GLICURONICO
B DALL'ACIDO-CHETOGLUTARICO
C DALL'ACETIL-COA
D DAL COLESTEROLO
E DALL'ESTRADIOLO
- 258 COME SI ATTUA L'IDROSSILAZIONE DELLA PROLINA AD IDROSSIPOLINA:
A A CARICO DELLA PROLINA LIBERA
X B A CARICO DEI RESIDUI DI PROLINA INCORPORATI IN STRUTTURE POLIPEPTIDICHE
C A CARICO DELLA PROLINA GLICOSILATA
D A CARICO DEL PROLIL- TRNA
E A CARICO DEL PROLIL-MRNA
- 259 NELLE CODE LE CATENE DEL COLLAGENO PRESENTANO LEGAMI COVALENTI ALFA-ALFA, ALFA-ALFA PRIMO E BETA. IN QUESTI LEGAMI INTERVENGONO:
X A RESIDUI DI LISINA
B RESIDUI DI ISTIDINA
C RESIDUI DI GLICINA
D RESIDUI DI TRIPTOFANO
E RESIDUI DI CISTEINA
- 260 LA FOSFODIESTERASI E' UN ENZIMA CHE SCINDE LEGAMI DELL'ESTERE FOSFORICO:
X A DELL'AMP CICLICO
B DELL'ADP
C DELL'ATP
D DELL'AMP
E DEL GTP

- 261 COSA INTERVIENE DIRETTAMENTE NEL PROCESSO DELLA VISIONE AL BUIO:
X A IL RETINOLO
B IL RETINENE
C LA VITAMINA D
D LA VITAMINA E
E IL CAROTENE
- 262 QUAL E' LA FORMA ATTIVA DELLA VITAMINA D3:
A IL COLECALCIFEROLO COME TALE
B L'1-IDROSSI-COLECALCIFEROLO
X C L'1-25 DIIDROSSI COLECALCIFEROLO
D IL 25-IDROSSI-COLECALCIFEROLO
E IL 24-25 IDROSSI COLECALCIFEROLO
- 263 L'ASSUNZIONE DI NEUROTRASMETTITORI DA PARTE DEI GRANULI DELLE TERMINAZIONI NERVOSE E':
X A ENDOERGONICA
B ESOERGONICA
C SENZA VARIAZIONI DI ENERGIA LIBERA
D CON VARIAZIONI DI ENERGIA LIBERA DIFFERENTE SECONDO IL NEUROTRASMETTITORE
E IRREVERSIBILE
- 264 COSA E' CARENTE NELLA GLICOGENOSI DI TIPO I:
A FOSFOGLICOMUTASI
B GLICOGENO-SINTETASI
X C GLUCOSIO 6-FOSFATASI
D ESOSO-FOSFATO-ISOMERASI
E ENZIMA DERAMIFICANTE
- 265 FONDAMENTALMENTE NELLE SFINGOMIELINOSI L'ACCUMULO DI SFINGOMIELINE DIPENDE:
A DA AUMENTO DELLA SINTESI
X B DA RIDOTTA SCISSIONE
C DA ALTERAZIONI QUALITATIVE DEGLI SFINGOLIPIDI
D DA TUTTI E TRE I PROCESSI
E DA NESSUNO DEI PROCESSI INDICATI
- 266 CHE COENZIMA HANNO GLI ENZIMI CHE CATALIZZANO LA DECARBOSSILAZIONE DEGLI AMINOACIDI CON FORMAZIONE DI AMINE BIOGENE:
A LA BIOTINA
X B IL PIRIDOSSAL 5 FOSFATO
C IL NAD
D IL FAD
E L'ACIDO FOLICO
- 267 CHE COENZIMA HANNO GLI ENZIMI CHE CATALIZZANO IL TRASPORTO DI UNITA' MONOCARBONIOSE CON ESCLUSIONE DELLA CO2:
X A FOLATI
B BIOTINA
C PIRIDOSSAL 5 FOSFATO
D TIAMINA PIROFOSFATO
E COENZIMA A
- 268 DA COSA DIPENDE IL FENOMENO DI IRRANCIDIMENTO DEGLI ACIDI GRASSI INSATURI:
X A OSSIDAZIONE DEI DOPPI LEGAMI
B RIDUZIONE DI DOPPI LEGAMI
C ALOGENAZIONE DEI DOPPI LEGAMI
D POLIMERIZZAZIONE DEGLI ACIDI GRASSI
E FORMAZIONE DI ALDEIDE ACRILICA
- 269 COME SI OTTIENE IL FENOMENO DI INDURIMENTO DEI GRASSI:
A PER OSSIDAZIONE DEL DOPPIO LEGAME
X B PER RIDUZIONE DI DOPPI LEGAMI
C PER IDROLISI DEI TRIGLICERIDI
D PER SAPONIFICAZIONE DEGLI ACIDI GRASSI
E A BASSE TEMPERATURE
- 270 DA COSA SONO FORMATE LE IMMUNOGLOBULINE:
X A CATENE PESANTI E CATENE LEGGERE
B CATENE PESANTI
C DUE CATENE ALFA E 2 CATENE BETA
D CATENE LEGGERE
E NESSUNA DELLE STRUTTURE INDICATE
- 271 QUALE FUNZIONE HANNO LE REGIONI "VARIABILI" DELLE CATENE IMMUNOGLOBULINICHE:
A LEGARSI ALLE MEMBRANE LINFOCITARIE
X B LEGARSI ALL'ANTIGENE
C LEGARE IL COMPLEMENTO
D FORMARE PONTI DI SOLFURO INTERCATENA
E TUTTE LE FUNZIONI INDICATE
- 272 QUALE ENZIMA E' COINVOLTO NELLA CHIUSURA DELL'ANELLO DEL DNA CIRCOLARE:
A LA DNA-POLIMERASI I
B LA DNA-POLIMERASI II
X C LA DNA LIGASI
D LA DNA POLIMERASI-RNA DIPENDENTE
E TUTTI GLI ENZIMI CITATI
- 273 QUALE GRUPPO PROSTETICO HA L'ACIL-CARRIER-PROTEIN:
A IL COENZIMA A
B IL MALONIL-COENZIMA
C LA CARNITINA
X D LA 4 FOSFO-PANTETEINA
E IL NAD

- 274 COSA E' IL COLESTEROLO-HDL:
A E'UN DERIVATO ESTERIFICATO DEL COLESTEROLO
B E'IL COLESTEROLO LEGATO ALLE PRE BETA LIPOPROTEINE
X C E'IL COLESTEROLO LEGATO ALLE ALFA-LIPOPROTEINE
D E'IL COLESTEROLO LEGATO ALLE BETA-LIPOPROTEINE
E E'IL COLESTEROLO LEGATO A TUTTE LE FRAZIONI INDICA
TE
- 275 COSA DETERMINA LA PRESENZA DI CO2 NEL SANGUE VENOSO
A AUMENTO DELL'AFFINITA'DELL'HB PER L'O2
X B DIMINUZIONE DELL'AFFINITA'DELL'HB PER L'O2
C NESSUN EFFETTO SULL'AFFINITA' DELL' HB PER L'O2
D AUMENTO DELLA SINTESI DI 2-3 DPG
INTRAERITROCITARIO
E ALCALOSI METABOLICA
- 276 COSA COMPORTA LA MUTAZIONE RESPONSABILE DELL'ANEMIA
"FALCIFORME":
X A MODIFICAZIONE DELLE CATENE BETA DELL'HB
B MODIFICAZIONE DELLE CATENE ALFA DELL'HB
C MODIFICAZIONE DELLE CATENE ALFA, BETA DELL'HB
D MODIFICAZIONE STRUTTURALE DEL GRUPPO EME
E MODIFICAZIONE DELLE CATENE DELTA DELL'HB
- 277 DA COSA DIPENDE LA MOBILITA' ELETTROFORETICA DI UNA
PROTEINA IN FASE LIQUIDA:
A SOLO DALLA CARICA
B SOLO DALLA MASSA
X C DA ENTRAMBI I FATTORI
D DALLA CONCENTRAZIONE PROTEICA
E DA NESSUNO DEI FATTORI INDICATI
- 278 DA COSA DIPENDE LA SEPARAZIONE CROMATOGRAFICA SUL
GEL DI DESTRANO:
A DALLA SEQUENZA DEGLI AMINOACIDI
B DALLA CARICA DELLA PROTEINA
X C DALLA MASSA DELLA PROTEINA
D DA ENTRAMBI I FATTORI
E DA NESSUNO DI QUESTI FATTORI
- 279 CON COSA PUO' ESSERE EFFETTUATA LA DETERMINAZIONE
DI UN ISOTOPO:
A CON UN CONTATORE DI RADIAZIONI
X B CON UNO SPETTROMETRO DI MASSA
C CON UNO SPETTROFLUORIMETRO
D CON NESSUNO DEGLI STRUMENTI INDICATI
E CON TUTTI GLI STRUMENTI INDICATI
- 280 DI COSA E' ESPRESSIONE LA PRESENZA DI
SAPONI NELLE FECI:
A ASSENZA O RIDUZIONE DI ATTIVITA'LIPASICA
X B ASSENZA DI SECREZIONE BILIARE IN PRESENZA DI ATTI
VITA' LIPASICA
C DI AMBEDUE QUESTE CONDIZIONI
D DI ALTERAZIONE DELLA FLORA BATTERICA INTESTINALE
E DI INGESTIONE DI OLIO DI VASELINA
- 281 QUALE AZIONE ESPLICA L'INSULINA SUL METABOLISMO
EPATICO DEL GLICOGENO:
X A ATTIVA LA GLICOGENO SINTESI
B RIDUCE LA GLICOGENO SINTESI
C ATTIVA LA GLICOGENOLISI
D NON HA NESSUNO EFFETTO
E PUO' AVERE TUTTI GLI EFFETTI A SECONDO DELLE CONDI
ZIONI NUTRITIVE
- 282 LA FRUTTOCHINASI CATALIZZA, A PARTIRE DA FRUTTOSIO,
LA SINTESI DI:
A FRUTTOSIO 6-FOSFATO
B FRUTTOSIO 1-6 DIFOSFATO
X C FRUTTOSIO 1-FOSFATO
D FRUTTOSIO 1-PIROFOSFATO
E FRUTTOSIO 6-FOSFATO-1-PIROFOSFATO
- 283 AL MICROSCOPIO I CRISTALLI URINARI DI OSSALATO DI
CALCIO SI PRESENTANO CON ASPETTO:
A AGHIFORME
X B A BUSTA DI LETTERA
C PULVERULENTO
D A BOTTE
E A CROCE DI SANT'ANDREA
- 284 DA COSA E' TRASMESSO IL TRIPANOSOMA GAMBIENSE:
X A MUSCIDI
B ACARI
C PULCI
D ZECCHIE
E GRAFFIO DI GATTO
- 285 COSA AUMENTA IN CIRCOLO NELL'ITTERO EMOLITICO:
A BILIRUBINA DIRETTA
X B BILIRUBINA INDIRETTA
C BILIVERDINA
D COLEGLOBINA
E PSEUDO-EMOGLOBINA

- 286 LA SEQUENZA CORRETTA DI MATURAZIONE DEGLI ERITROCITI E':
 A ERITROBLASTO, PROERITROBLASTO, ERITROCITA BASOFILO, POLICROMATOFILO, ORTOCROMATICO
 X B PROERITROBLASTO, ERITROBLASTO, ERITROCITA BASOFILO, POLICROMATOFILO, ORTOCROMATICO
 C PROERITROBLASTO, ERITROBLASTO, POLICROMATOFILO, BASOFILO, ORTOCROMATICO
 D PROERITROBLASTO, ERITROBLASTO, ORTOCROMATICO, BASOFILO
 E NESSUNA DELLE SEQUENZE INDICATE
- 287 ALL'ESAME MICROSCOPICO DI UNA SECREZIONE URETRALE LA NEISSERIA GONHORREAE SI PRESENTA:
 A STREPTOCOCCO G+ EXTRACELLULARE
 B DIPLOCOCCO G+ EXTRACELLULARE
 C DIPLOCOCCO G- EXTRACELLULARE
 D DIPLOCOCCO G+ INTRACELLULARE
 X E DIPLOCOCCO G- INTRACELLULARE
- 288 COSA SONO LE RICKETTSIE:
 A EUCARIOTI
 B VIRUS
 C PROTOZOI
 D IFOMICETI
 X E PROCARIOTI INTRACELLULARI
- 289 COME SI SUSSEGUONO I COMPONENTI DELLA CATENA RESPIRATORIA:
 X A ORDINATI IN FUNZIONE DEL VALORE CRESCENTE DI POTENZIALE REDOX
 B ORDINATI IN FUNZIONE DEL VALORE DECRESCENTE DI POTENZIALE REDOX
 C ORDINATI IN FUNZIONE DEL PESO MOLECOLARE
 D SENZA UN ORDINE DEFINITO
 E IN FUNZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI O₂
- 290 NELLE DEIDROGENASI QUALE DEI SEGUENTI COENZIMI NON TROVIAMO:
 A FMN
 B NAD+
 C NADP+
 D FAD
 X E BIOTINA
- 291 LA COSTANTE DI MICHAELIS (KM):
 A E' NUMERICAMENTE UGUALE A QUELLA CONCENTRAZIONE DI SUBSTRATO CHE DA' LA VELOCITA' MASSIMA (V_{MAX})
 X B HA UN VALORE CARATTERISTICO PER OGNI TIPO DI ENZIMA E SUBSTRATO, ED E' INDIPENDENTE DALLA CONCENTRAZIONE DELL'ENZIMA
 C E' UNA MISURA DELL'EQUILIBRIO TRA LE MOLECOLE ATTIVE ED INATTIVE DELL'ENZIMA
 D E' IDENTICA PER TUTTI GLI ISOENZIMI DI UN ENZIMA
 E INDICA SEMPRE L'AFFINITA' DELL'ENZIMA PER IL SUBSTRATO
- 292 QUALE DELLE SEGUENTI ATTIVITA' ENZIMATICHE NEL SIERO E' AUMENTATA IN CORSO DI PANCREATITE ACUTA
 A FOSFATASI ALCALINA
 X B AMILASI
 C LATTICODEIDROGENASI TIPO I
 D FOSFATASI ACIDA
 E CPK
- 293 NEL SIERO DI UN PAZIENTE AFFETTO DA CARCINOMA DELLA PROSTATA, QUALE DELLE SEGUENTI ATTIVITA' ENZIMATICHE E' AUMENTATA:
 A GOT
 B FOSFATASI ALCALINA
 C AMILASI
 D LATTICODEIDROGENASI TIPO I
 X E FOSFATASI ACIDA
- 294 NEL SIERO DI UN PAZIENTE AFFETTO DA EPATITE VIRALE QUALE DELLE SEGUENTI ATTIVITA' E' AUMENTATA:
 A FOSFATASI ALCALINA
 B AMILASI
 X C GLUTAMMICO PIRUVICO TRANSAMINASI
 D FOSFATASI ACIDA
 E MONO AMINO OSSIDASI
- 295 NEL SIERO DI UN PAZIENTE AFFETTO DA ITTERO OSTRUTTIVO, QUALE DELLE SEGUENTI ATTIVITA' ENZIMATICHE E' AUMENTATA:
 A GLUTAMMICO PIRUVICO TRANSAMINASI
 X B FOSFATASI ALCALINA
 C AMILASI
 D LATTICODEIDROGENASI DI TIPO I
 E CPK

- 296 GLI ISOENZIMI DELLA LATTICO DEIDROGENASI
A VARIANO DA MONOMERI A TETRAMERI
B DIFFERISCONO SOLO IN UN SINGOLO AMINOACIDO
X C ESISTONO IN 5 FORME DIPENDENTI DALLA COMBINAZIONE DEI MONOMERI H E M
D SONO FORME ENZIMATICHE CHE DIFFERISCONO PER L'ATTIVITA' MA NON PER LA MOBILITA'ELETTROFORETICA
E SONO TRIMERI
- 297 NELLE REAZIONI DI CARBOSSILAZIONE QUALE DEI SEGUENTI COFATTORI E' ESSENZIALE:
A NAD
B CTP
C ACIDO LIPOICO
D TIAMINA PIROSFATO
X E BIOTINA
- 298 QUAL E' L'ENZIMA SALIVARE CHE IDROLIZZA L'AMIDO:
A PEPSINA
B BETA-AMILASI
C LISOZIMA
D MALTASI
X E ALFA-AMILASI
- 299 COSA SI VERIFICA NELL'INIBIZIONE COMPETITIVA:
A L'APPARENTE KM E'IMMUTATO
B LA VELOCITA' MASSIMA E'DIMINUITA
X C LA VELOCITA' MASSIMA E'IMMODIFICATA
D LA VELOCITA' MASSIMA E'INDIPENDENTE DALLE CONCENTRAZIONI DI SUBSTRATO
E NON SI VERIFICA NESSUNA DELLE CONDIZIONI INDICATE
- 300 QUAL E' IL SUBSTRATO SPECIFICO DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA:
X A ADP
B ATP
C GTP
D NADP+
E O2
- 301 E'LOCALIZZATO NEI MITOCONDRI L'ENZIMA:
A ALFA-BETA ACIL-COA DEIDROGENASI
B CITOCROMO OSSIDASI
C SUCCINICO DEIDROGENASI
D DIIDROLIPOILDEIDROGENASI
X E TUTTI QUESTI
- 302 PER COSA PUO' ESSERE USATA L'ENERGIA LIBERA IMMAGAZZINATA NELL'ATP:
A SINTESI CHIMICHE
B LAVORO OSMOTICO E MECCANICO
C REAZIONE ENDOERGONICHE
D LAVORO ELETTRICO
X E TUTTE LE PRECEDENTI
- 303 COSA SONO GLI INDICATORI ACIDO BASE:
A ECCEZIONI ALL'EQUAZIONE DI HENDERSON-HASSELBACH
B ACIDI FORTI CON UN CATIONE INCOLORE
C INCOLORI NELLA FORMA IONIZZATA
D INCOLORI NELLA FORMA NON IONIZZATA
X E ACIDI DEBOLI
- 304 COSA IMPLICA IL DISACCOPIAMENTO DELLA FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA:
A L'ABOLIZIONE DELL'ATTIVITA'ATPASICA DEI MITOCONDRI
B I MITOCONDRI CESSANO DI OSSIDARE SUCCINATO
X C CESSA LA FORMAZIONE DI ATP MA LA RESPIRAZIONE CONTINUA
D CONTINUA LA FORMAZIONE DI ATP MA LA RESPIRAZIONE CESSA
E NESSUNA DELLE CONDIZIONI INDICATE
- 305 CIRCA IL CICLO DEGLI ACIDI TRICARBOSSILICI QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E'ERRATA?
A HA SEDE MITOCONDRIALE
B CARBOIDRATI, GRASSI, AMINOACIDI POSSONO ESSERE OSSIDATI DAL CICLO
C L'ACETATO PUO'ENTRARE NEL CICLO SOLO COME ACETIL-COA
D SOLO DUE DEI TRE ATOMI DI CARBONIO DEL PIRUVATO SONO RIMOSSI COME CO2 IN UN GIRO DEL CICLO
X E IL CICLO AVVIENE SOLO IN ANAEROBIOSI
- 306 COSA E' IL FRUTTOSIO:
A ALDOESOSO
B ALDOPENTOSO
X C CHETOESOSO
D DISACCARIDE
E UN POLISACCARIDE VEGETALE
- 307 COME DEVE ESSERE UN COMPOSTO AFFINCHE' ABBAIA ATTIVITA' OTTICA:
A LEVOGIRO
B COLORATO
C UN CARBOIDRATO
D SIMMETRICO
X E ASIMMETRICO
- 308 L'ASSEGNAZIONE DI UNO ZUCCHERO ALLA SERIE "D" E' BASATA SULLA SUA ANALOGIA CON:
X A D-GLICERALDEIDE
B ACIDO D-TARTARICO
C ALFA-D-GLUCOSIO
D D-RIBOSIO
E CON QUALSIASI COMPOSTO DESTROGIRO

- 309 MEDIANTE TRANSAMINAZIONE QUALE AMINOACIDO FORMA ACIDO ALFA-CHETOISOCAPROICO?
 A ISOLEUCINA
 X B LEUCINA
 C TREONINA
 D LISINA
 E PROLINA
- 310 IL MANNOSIO ED IL GLUCOSIO SONO EPIMERI. QUESTO SI GNIFICA CHE:
 A SONO UNO DELLA SERIE D E UNO DELLA SERIE L
 B UNO E'UN ALDOSE, L'ALTRO UN CHETOSO
 C UNO E'UN PIRANOSO, L'ALTRO UN FURANOSO
 D RUOTANO LA LUCE POLARIZZATA IN OPPOSITE DIREZIONI
 X E DIFFERISCONO SOLO NELLA CONFIGURAZIONE DI UN ATOMO DI CARBONIO ASIMMETRICO
- 311 COSA SI RICAVAL DALL'IDROLISI DEL SACCAROSIO:
 A 2 MOLECOLE DI FRUTTOSIO
 B 2 MOLECOLE DI GLUCOSIO
 C GALATTOSIO E GLUCOSIO
 D MALTOSIO E GLUCOSIO
 X E FRUTTOSIO E GLUCOSIO
- 312 DI COSA SONO AMBEDUE I POLIMERI L'AMIDO E IL GLICOGENO:
 A GLUCOSIO-6 FOSFATO
 B FRUTTOSIO
 C GLUCOSIO-1-FOSFATO
 D MANNOSIO
 X E ALFA-GLUCOSIO
- 313 COSA AVVIENE NELLA GLICOLISI ANAEROBICA:
 A UNA MOLECOLA DI GLUCOSIO E'DIVISA DIRETTAMENTE IN 2 MOLECOLE DI A.LATTICO
 X B C'E'UN GUADAGNO NETTO DI 2 MOLECOLE DI ATP PER MOLECOLA DI GLUCOSIO CONVERTITA A LATTATO
 C LA TAPPA INIZIALE E'UTILIZZAZIONE DI ATP NELLA REAZIONE CATALIZZATA DALLA GLUCOSIO-6-FOSFATASI
 D L'ALDOLASI CATALIZZA L'ISOMERIZZAZIONE REVERSIBILE DEGLI ESOSI FOSFATO
 E MANCA LA TAPPA ENOLASICA
- 314 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E'SBAGLIATA:
 A LA FOSFORILASI MUSCOLARE HA UN PESO MOLECOLARE DOPIO DI QUELLO DELLA FOSFORILASI MUSCOLARE B
 X B LA FOSFORILASI MUSCOLARE B E'UN'UNICA FORMA ATTIVA DELL'ENZIMA
 C LA FOSFORILASI MUSCOLARE B E'SPECIFICAMENTE ATTIVA DA UNA PROTEINCHINASI
 D LA SINTESI DI AMP CICLICO NEL MUSCOLO E'ACCELERATA DALL'EPINEFRINA
 E LA FOSFORILASI A E'UN TETRAMERO

- 315 QUALE ENZIMA NON PARTECIPA ALLA GLICOLISI
 A ALDOLASI
 X B ALFA-GLICEROFOSFATO-DEIDROGENASI
 C ENOLASI
 D PIRUVATOCHINASI
 E TRIOSOFOSFATOISOMERASI
- 316 COSA RICHIEDE LA DECARBOSSILAZIONE OSSIDATIVA DEL PIRUVATO:
 X A COENZIMA A, TPP, LIPOATO OSSIDATO, MG++, NAD, FAD
 B NADP+, COO₂, FAD, CITOCROMI C, A, A₃
 C CITOCROMI E FERROPROTEINE
 D PIRIDOSSALFOSFATO, BIOTINA, TPP, COO₂
 E ATP
- 317 LA PENTOSURIA IDIOPATICA E' CARATTERIZZATA DA
 A ESCREZIONE DI RIBOSIO 1-P
 B ESCREZIONE DI ARABINOSIO
 C ESCREZIONE DI UNO ZUCCHERO NON RIDUCENTE
 D GRAVE DANNO EPATICO
 X E ESCREZIONE DI L-XILULOSIO
- 318 L'ACIDO N-ACETILNEURAMINICO E'SINTETIZZATO DA N-ACETILMANNOSAMMINA-6-FOSFATO E:
 A ACIDO UDP-GLUCURONICO
 X B FOSFOENOLPIRUVATO
 C ACIDO GLUCURONICO
 D N-ACETILGALATTOSAMMINA
 E ACIDO LATTICO
- 319 QUAL E' L'IMMEDIATO PRECURSORE METABOLICO DELL'ACETOACETATO:
 A MALONIL-COA
 B ACETOACETIL-COA
 C ACETOACETIL-COA+ACETATO
 D SUCCINIL-COA
 X E BETA-IDROSSIBETAMETILGLUTARILCOA
- 320 DIVENTA ASIMMETRICO UN ATOMO DI CARBONIO QUANDO:
 A VI E'UN PAIO DI SOSTITUENTI UGUALI E UN PAIO DI DIVERSI
 X B VI SONO QUATTRO DIVERSI SOSTITUENTI
 C VI E'UN DOPPIO LEGAME
 D VI SONO TRE SOSTITUENTI DIVERSI DISPOSTI ASIMMETRICAMENTE
 E VI E'UN TRIPLO LEGAME
- 321 DEI SEGUENTI POLISACCARIDI QUALE NON E'UN POLIMERO DEL GLUCOSIO?
 A AMILOSI
 X B INULINA
 C GLICOGENO
 D AMILOPECTINA
 E CELLULOSA

- 322 L'ADRENALINA E LA NOR-ADRENALINA SONO SINTETIZZATE A PARTIRE DA:
A LEUCINA
B TIRAMINA
C TRIPTOFANO
D PROLINA
X E FENILALANINA
- 323 DI GRANDE IMPORTANZA NEL METABOLISMO CELLULARE E' LO SHUNT DEI PENTOSI PERCHE' PRODUCE:
A VIT.C
B NADH
C ACETIL-COA
D ADP
X E NADPH
- 324 GLI ACIDI BILIARI NELLA BILE DEI MAMMIFERI SONO GENERALMENTE:
A IN FORMA LIBERA
B IN FORMA DI COLESTEROLO
X C CONIUGATI A GLICINA E TAURINA
D CONIUGATI AD ACIDO BETA-GLICURONICO
E CONIUGATI CON SOLFATO
- 325 DEI SEGUENTI COMPOSTI QUALE NON E' UN FOSFOLIPIDE?
X A CEREBROSIDE
B PLASMALOGENO
C SFINGOMIELINA
D LECITINA
E CEFALINA
- 326 COME SONO GLI ACIDI GRASSI LIBERI NEL SANGUE:
A LEGATI PREVALENTEMENTE A BETA-LIPOPROTEINE
B IMMAGAZZINATI NEI DEPOSITI DI GRASSI
X C LEGATI SOPRATTUTTO ALL'ALBUMINA SIERICA
D INDIPENDENTI DALLA SECREZIONE DI ADRENALINA
E LEGATI AD HDL
- 327 QUAL E' L'INTERMEDIO ESSENZIALE DAL QUALE DERIVANO GLI ACIDI GRASSI:
A SUCCINIL-COA
B MEVALONATO
X C MALONIL-S-COA
D IDROSSIMETILGLUTARIL-COA
E PROPIONIL-COA
- 328 QUALE DELLE SEGUENTI SOSTANZE NON E' UN INTERMEDIO NELLA BIOSINTESI DEL COLESTEROLO?
A ACETOACETIL-COA
B MEVALONATO
X C CDP-DIACILGLICEROLO
D SQUALENE
E GERANIL-PIROFOSFATO
- 329 LA FRAZIONE DI LIPOPROTEINE SIERICHE CON IL PIU' ALTO CONTENUTO DI COLESTEROLO NELL'UOMO E':
A ALFA-LIPOPROTEINE
X B BETA-LIPOPROTEINE
C CHILOMICROMI
D ALBUMINA
E PRE BETA LIPOPROTEINE
- 330 QUAL E' IL COMPOSTO CHE FAVORISCE IL TRASFERIMENTO DELL'ACETATO DAL CITOSOL NEI MITOCONDRI:
A ACETIL-COA
X B CARNITINA
C TPP
D ACIDO TETRAIDROFOLICO
E GLUTATIONE
- 331 LA CHETOSI E' IN PARTE ATTRIBUIBILE A:
A DIMINUZIONE DEL METABOLISMO DEI GRASSI
X B SOVRAPRODUZIONE DELL'ACETIL-COA
C SOTTOPRODUZIONE DI ACETIL-COA
D ECCESSIVA UTILIZZAZIONE DI GLUCOSIO
E ECCESSIVA SINTESI DI TRIGLICERIDI
- 332 L'ACIDO FOSFATIDICO NEI FOSFOLIPIDI DEL TIPO DELLA CEFALINA E' LEGATO A:
A SFINGOSINA
X B ETANOLAMMINA
C INOSITOLO
D BETAINA
E COLINA
- 333 COSA SONO GLI ISTONI:
X A PROTEINE RICCHE IN LISINA E IN ARGININA
B LEGATI COVALENTEMENTE AL DNA
C HANNO UN PESO MOLECOLARE RELATIVAMENTE ALTO (200.000 E PIU')
D PROTEINE IDENTICHE ALLE PROTAMINE
E PROTEINE RICCHE IN TRIPTOFANO
- 334 DELLE SEGUENTI TAPPE DELLA GLICOLISI NON E' LIBERAMENTE REVERSIBILE QUELLA CATALIZZATA DA:
X A FOSFOFRUTTOCHINASI
B ENOLASI
C TRIOSOFOSFATOISOMERASI
D ESOSOFOSFATOISOMERASI
E LATTICO DEIDROGENASI
- 335 PER LA BIOSINTESI DEI TRIGLICERIDI NEGLI ADIPOCITI QUALE DEI SEGUENTI ENZIMI E' ESSENZIALE:
A TRIGLICERIDE-LIPASI
B GLUCOSIO-6-FOSFATO-DEIDROGENASI
X C ALFA-GLICEROFOSFATO-DEIDROGENASI
D LIPOPROTEIN-LIPASI
E ALFA-BETA ACIL-COA DEIDROGENASI

- 336 QUAL E' UN GANGLIOSIDE:
 A UN GLICEROFOSFOLIPIDE
 X B UNO SFINGOLIPIDE CONTENENTE UN OLIGOSACCARIDE
 C UN FOSFATIDILGALATTOSIO
 D UN FOSFATIDILGLUCOSIO
 E UNA GLICOPROTEINA
- 337 LA MIOSINA POSSIEDE:
 A UN SITO PER CAMP
 B DUE SITI PER CAMP
 C UN SITO PER L'UTP
 D DUE SITI DOTATI DI ATTIVITA' FOSFODIESTERASICA
 X E DUE SITI DOTATI DI ATTIVITA' ATPASICA
- 338 IN COSA E' IMPLICATA LA RIBONUCLEASI S:
 A NEL PROCESSO DI REPLICAZIONE DEL DNA EUCARIOTICO
 B NELLA TRASCRIZIONE
 C NELLA SINTESI DI TRNA
 D NELLA TRADUZIONE
 X E NEL METABOLISMO DELL'MRNA
- 339 COME E' REGOLATO A FEED-BACK IL LIVELLO EMATICO DI T3:
 A CON AZIONE DIRETTA SULLA TIROIDE
 B CON AZIONE A LIVELLO DELL'ADENOIPOFISI
 C CON AZIONE A LIVELLO IPOTALAMICO
 D CON NESSUNO DEI MECCANISMI INDICATI
 X E CON TUTTI I PRECEDENTI MECCANISMI
- 340 IL PRECURSORE FISILOGICO DELLE PROSTAGLANDINE E':
 A ACIDO LINOLEICO
 B ACIDO LIGNOCERICO
 C ACIDO STEARICO
 X D ACIDO ARACHIDONICO
 E ACIDO LINOLENICO
- 341 36G DI H2O (PM 18) RISPETTO A 58,5G DI NACL (PM 58,5) CONTENGONO:
 A NUMERO DI MOLECOLE META' DI QUELLE DI NACL
 B LO STESSO NUMERO DI MOLECOLE DI DI NACL
 X C NUMERO DOPPIO DI MOLECOLE DI NACL
 D 1/3 DELLE MOLECOLE DI NACL
 E 1/4 DELLE MOLECOLE DI NACL
- 342 56 G DI CAO (PM 56) RISPETTO A 58,5G DI NACL (PM 58,5) CONTERRANNO:
 A NUMERO DI MOLECOLE META' DI QUELLE DI NACL
 X B LO STESSO NUMERO DI MOLECOLE DI NACL
 C NUMERO DOPPIO DI MOLECOLE DI NACL
 D 1/3 DELLE MOLECOLE DI NACL
 E 1/6 DELLE MOLECOLE DI NACL
- 343 160 G DI BR2 (PM 160) CONTENGONO UN NUMERO DI ATOMI:
 A META' DI QUELLI CONTENUTI IN 80G DI CA (PA 40)
 B UGUALE A QUELLI CONTENUTI IN 80G DI CA
 X C DOPPIO DI QUELLI CONTENUTI IN 80G DI CA
 D 1/3 DI QUELLI CONTENUTI IN 80G DI CA
 E 1/5 DI QUELLI CONTENUTI IN 80G DI CA
- 344 L'ALBUMINA HA UN PESO MOLECOLARE DI 64500; 6,02X10 ALLA 23 MOLECOLE DI ALBUMINA SONO CONTENUTE IN:
 X A 64,5 KG DI ALBUMINA
 B 64,5 G DI ALBUMINA
 C 645 G DI ALBUMINA
 D 32,25 KG DI ALBUMINA
 E 18,00 KG DI ALBUMINA
- 345 6,02 X 10 23 MOLECOLE DI GLUCAGONE SONO CONTENUTE IN 3,5 KG DI PEPTIDE; QUAL'E' IL PESO MOLECOLARE DEL GLUCAGONE:
 A 35
 B 350
 X C 3500
 D 35000
 E 350000
- 346 LA TBG E':
 X A UNA PROTEINA CHE TRASPORTA T4
 B UN ORMONE
 C UN FATTORE IPOTALAMICO
 D UNO STEROIDE
 E UN PEPTIDE
- 347 CONSIDERANDO PER H2CO3 (PM 62) LA DISSOCIAZIONE $H_2CO_3 = 2H^+ + CO_3^{2-}$, UNA SOLUZIONE CONTENENTE 62 G/L SARA':
 A 0,1 M
 B 0,5 M
 C 1 N
 X D 2 N
 E 3 N
- 348 CONSIDERANDO L'EQUILIBRIO $H_2CO_3 = H^+ + HCO_3^-$ UNA SOLUZIONE DI H2CO3 (PM 62) CONTENENTE 62 G/L SARA'
 A 0,1 M
 X B 1 N
 C 2 N
 D 0,5 M
 E 10 M

349 LA FORMULA DEL MONOIDROGENOFOSFATO DI SODIO E':

- A NAH_2PO_4
- B NA_3PO_4
- X C NA_2HPO_4
- D $\text{NA}_2(\text{HPO}_4)_2$
- E $\text{NA}_3(\text{HPO}_4)_3$

350 L'ACIDO ORTOFOSFOROSO HA FORMULA H_3PO_3 ; QUALE DEI SEGUENTI SALI NON ESISTE:

- A NAH_2PO_3
- B CAHPO_3
- X C NA_3PO_3
- D $\text{CA}(\text{H}_2\text{PO}_3)_2$
- E NESSUNO DI QUESTI

351 QUALE DELLE SEGUENTI ESPRESSIONI RAPPRESENTA CORRETTAMENTE LA RELAZIONE TRA VOLUME E TEMPERATURA A PRESSIONE COSTANTE:

- A $V = V (1 + KT)$
- B $VT = V T / (1 + KT)$
- C $V T = V O / KT$
- X D $V T = V O (1 + KT)$
- E NESSUNA DI QUESTE

352 QUALE DELLE SEGUENTI ESPRESSIONI CONSENTE DI CALCOLARE LA P DI 1800G DI OSSIGENO (PM 18) IN UNA BOMBOLA DA 30 LITRI A 25 GRADI CENTIGRADI:

- X A $P = \text{NRT}/V$
- B $P = \text{TV}/\text{NR}$
- C $P = \text{NV}/\text{RT}$
- D $P = \text{RV}/\text{NT}$
- E NESSUNA DI QUESTE

353 QUAL E' LA PRESSIONE ESERCITATA DA 22,4 LITRI DI O_2 ALLA TEMPERATURA DI 273 GRADI K:

- A 22 ATM
- X B 1 ATM
- C 10 ATM
- D 0,5 ATM
- E 0,1 ATM

354 QUALE DELLE SEGUENTI ESPRESSIONI CONSENTE DI CALCOLARE LE PRESSIONI PARZIALI (P) DEI SINGOLI GAS IN UNA MISCELA COSTITUITA DA: N_2 79%, O_2 21%, CO_2 0,04%

- A $P = P \text{ NT}/\text{NX}$
- X B $P = P \text{ NX}/\text{NT}$
- C $P = \text{NX RT}/V$
- D $P = \text{PRT}/3$
- E NESSUNA DI QUESTE

355 IL PH DI UNA SOLUZIONE DI $\text{HCL } 10^{-7}$ M SARA':

- A 7,0
- B 8,0
- X C 6,7
- D 6,0
- E 5,0

356 IL PH DI UNA SOLUZIONE DI $\text{NAOH } 10^{-7}$ M SARA':

- A 7,0
- B 8,0
- X C 7,3
- D 6,0
- E 5,5

357 QUAL E' IL PH DI UNA SOLUZIONE DI $\text{NACL } 0,1$ N:

- A PH 6
- B PH 2
- C PH 1
- X D PH 7
- E PH 8

358 IL PH DEL SANGUE E' REGOLATO DALL'EQUILIBRIO $\text{H}_2\text{CO}_3 = \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$. NELL'ACIDOSI RESPIRATORIA SCOMPENSATA SI HA:

- A AUMENTO DELLO IONE BICARBONATO
- X B AUMENTO DELL'ACIDO CARBONICO
- C AUMENTO DELL'ACIDO CARBONICO E DELLO IONE BICARBONATO
- D DIMINUZIONE DELLO IONE BICARBONATO
- E NESSUNA DELLE PRECEDENTI AFFERMAZIONI E' CORRETTA

359 IL VALORE NORMALE DEL PH DEL SANGUE E' 7,4; IN CASO DI ALCALOSI COMPENSATA IL PH DEL SANGUE:

- A AUMENTA NOTEVOLMENTE
- B DIMINUISCE NOTEVOLMENTE
- X C RIMANE INVARIATO
- D AUMENTA DI POCO
- E DIMINUISCE DI POCO

360 UNA SOLUZIONE 5×10^{-2} M DI NAHCO_3 AVRA' UN PH:

- A UGUALE A 6
- B UGUALE A 7
- X C MAGGIORE DI 7
- D INFERIORE A 6
- E INFERIORE A 5

361 UNA SOLUZIONE 0,1 M DI KCL AVRA' UN VALORE DI PH:

- A UGUALE A 6
- X B UGUALE A 7
- C MAGGIORE DI 7
- D INFERIORE A 6
- E INFERIORE A 5

- 362 UNA SOLUZIONE 0,1 M DI NH_4Cl PRESENTERA' UN VALORE DI PH:
X A MINORE DI 7
B UGUALE A 7
C MAGGIORE DI 7
D UGUALE A 8
E NESSUNA DELLE PRECEDENTI AFFERMAZIONI E' CORRETTA
- 363 UNA SOLUZIONE TAMPONE SI OTTIENE MESCOLANDO:
A UN ACIDO FORTE CON UNA BASE FORTE
B UN ACIDO DEBOLE CON UNA BASE DEBOLE
X C UN ACIDO DEBOLE COL RISPETTIVO SALE DI UNA BASE FORTE
D IL SALE DI UNA BASE FORTE COL SALE DI UN ACIDO FORTE
E NESSUNA DELLE PRECEDENTI AFFERMAZIONI E' CORRETTA
- 364 DOVENDO PREPARARE UNA SOLUZIONE TAMPONE A PH 7 ED AVENDO A DISPOSIZIONE SOLO NaOH PER REGOLARE IL PH DA QUALE DEI SALI SODICI DELL'ACIDO FOSFORICO PARTIRESTE:
X A NaH_2PO_4
B Na_3PO_4
C Na_2HPO_4
D $\text{Na}_2\text{HPO}_4 + \text{Na}_3\text{PO}_4$
E DA NESSUNO DI QUESTI
- 365 L'ESPRESSIONE CORRETTA DELL'EQUAZIONE DI HENDERSON-HASSELBACH E':
A $\text{PH} = \text{PKA} + \text{LOG} (\text{ACIDO}) / (\text{SALE})$
B $\text{PKA} = \text{PH} + \text{LOG} (\text{SALE}) / (\text{ACIDO})$
C $\text{PH} = \text{PKA} - \text{LOG} (\text{SALE}) / (\text{ACIDO})$
X D $\text{PH} = \text{PKA} + \text{LOG} (\text{SALE}) / (\text{ACIDO})$
E NESSUNA DELLE PRECEDENTI
- 366 UNA SOLUZIONE TAMPONE A PH 5 AVRA' MAGGIORE POTERE TAMPONANTE SE LA K_a DELL'ACIDO DI PARTENZA E':
A $\text{A1 } \text{K}_a = 7,5 \times 10^{-8}$
B $\text{A2 } \text{K}_a = 5,0 \times 10^{-13}$
C $\text{A3 } \text{K}_a = 1,5 \times 10^{-4}$
X D $\text{A4 } \text{K}_a = 1,9 \times 10^{-5}$
E $\text{A4 } \text{K}_a = 3,1 \times 10^{-5}$
- 367 UN ACIDO DEBOLE ADOPERATO PER PREPARARE UNA SOLUZIONE TAMPONE HA UN VALORE DI K_a DI $6,1 \times 10^{-8}$, QUALE SARA' L'INTERVALLO DI PH ENTRO IL QUALE LA SOLUZIONE AVRA' IL MAGGIORE POTERE TAMPONE?
A 5 - 11
B 8 - 14
X C 7 - 9
D 4 - 8
E 8 - 10
- 368 DELLE COPPIE ACIDO SALE RIPOSTATE QUALE SI PUO' CONSIDERARE UN SISTEMA TAMPONE FISIOLOGICO:
A ACIDO NITRICO - NITRATO
X B ACIDO CARBONICO - CARBONATO
C ACIDO SOLFORICO - SOLFATO
D ACIDO ACETICO - ACETATO
E NESSUNO DI QUESTI
- 369 SE TRA UNA SOLUZIONE ED IL SOLVENTE PURO INTERPONIAMO UNA MEMBRANA SEMIPERMEABILE POSSIAMO MISURARE UN DEFINITO LIVELLO PRESSORIO (PRESSIONE OSMOTICA) IL VALORE MISURATO INDICA:
A LA PRESSIONE DA ESERCITARE SULLA SOLUZIONE PER INSATURARE L'EQUILIBRIO DEL SOLUTO AI DUE LATI DELLA MEMBRANA
B LA PRESSIONE DA ESERCITARE SULLA SOLUZIONE PER IMPEDIRE IL PASSAGGIO DEL SOLUTO ATTRAVERSO LA MEMBRANA
C LA PRESSIONE DA ESERCITARE SULLA SOLUZIONE PER FAR PASSARE IL SOLUTO DA UN LATO ALL'ALTRO DELLA MEMBRANA
X D LA PRESSIONE DA ESERCITARE SULLA SOLUZIONE PER IMPEDIRE IL PASSAGGIO DEL SOLVENTE ATTRAVERSO LA MEMBRANA
E NESSUNA DELLE PRECEDENTI
- 370 LA PRESSIONE OSMOTICA DI UNA SOLUZIONE CONTENENTE N MOLI DI SOLUTO (NON ELETTROLITA) IN V LITRI DI SOLUZIONE E' ESPRESSA DALLA RELAZIONE:
A $\text{PO} = \text{NVRT}$
B $\text{PO} = \text{RT/NV}$
C $\text{PO} = \text{NV/RT}$
X D $\text{PO} = \text{NRT/V}$
E DA NESSUNA DI QUESTE
- 371 DUE SOLUZIONI, NON ELETTROLITICHE, SEPARATE DA UNA MEMBRANA SEMIPERMEABILE SI DICONO ISOTONICHE SE:
A CONTENGONO LA STESSA SOSTANZA IN CONCENTRAZIONI DIVERSE
X B CONTENGONO SOSTANZE DIFFERENTI MA IN CONCENTRAZIONI UGUALI
C LE CONCENTRAZIONI DELLE SOLUZIONI RIMANGONO INVARIATE
D IL SOLUTO PASSA DALLA SOLUZIONE PIU' CONCENTRATA A QUELLA PIU' DILUITA
E IN NESSUNO DEI CASI INDICATI

- 372 LA RESISTENZA ERITROCITARIA OSMOTICA (REO) MISURA LA FRAGILITA' OSMOTICA DEGLI ERITROCITI. DELLE SEGUENTI SOLUZIONI DI NaCl QUALE PROVOCA L'EMOLISI DEL SANGUE NORMALE?:
- A 0,85%
 - X B 0,40%
 - C 0,55%
 - D 1,00%
 - E 2,00%
- 373 UNA SOLUZIONE DI NaCl (PM 58,5) ED UNA DI GLUCOSIO (PM 180) AVRANNO ATTIVITA' OSMOTICA UGUALE SE:
- A LE CONCENTRAZIONI DI NaCl E DI GLUCOSIO SONO UGUALI
 - B LA CONCENTRAZIONE DI NaCl E' MAGGIORE DI QUELLA DEL GLUCOSIO
 - X C LA CONCENTRAZIONE DEL GLUCOSIO E' DUE VOLTE QUELLA DI NaCl
 - D LA CONCENTRAZIONE DI GLUCOSIO E' CIRCA 1/3 DI QUELLA DI NaCl
 - E LA CONCENTRAZIONE DI GLUCOSIO E' CIRCA 1/6 DI QUELLA DI NaCl
- 374 SAPENDO CHE IL PUNTO DI CONGELAMENTO DEL PLASMA E' - 0,56 LA CONCENTRAZIONE OSMOLARE DEL SANGUE SARA':
- A 1,04 MOSM/LITRO
 - X B 301 MOSM/LITRO
 - C 0,301 MOSM/LITRO
 - D 0,104 MOSM/LITRO
 - E 0,050 MOSM/LITRO
- 375 SI DEFINISCE PUNTO ISOELETTICO DI UN AMMINOACIDO IL VALORE DI PH AL QUALE:
- A SONO PRESENTI SOLO CARICHE NEGATIVE
 - B SONO PRESENTI SOLO CARICHE POSITIVE
 - X C SONO PRESENTI CARICHE POSITIVE E NEGATIVE IN EGUAL NUMERO
 - D SONO PRESENTI SIA CARICHE POSITIVE CHE NEGATIVE
 - E SONO PRESENTI CARICHE POSITIVE IN NUMERO DOPPIO DI QUELLE NEGATIVE
- 376 UN AMMINOACIDO HA PKA1 2,5 E PKA2 9,5. A QUALE DEI SEGUENTI VALORI DI PH L'AMMINOACIDO IN UN CAMPO ELETTRICO NON MIGRERA' NE' AL POLO + NE' A QUELLO - ?:
- A 5
 - B 10
 - C 7
 - X D 6
 - E 8
- 377 QUALE DEI SEGUENTI AMMINOACIDI E' UN AMMINOACIDO BASICO:
- X A ARGININA
 - B GLICINA
 - C METIONINA
 - D FENILALANINA
 - E NESSUNO DEI PRECEDENTI
- 378 QUANTI TETRAPEPTIDI DIFFERENTI SI POSSONO OTTENERE DALLA COMBINAZIONE DI 4 AMMINOACIDI A,B,C,D, :
- A 16
 - B 8
 - X C 64
 - D 32
 - E 48
- 379 UN POLIPEPTIDE PRESENTA UN ELEVATO ASSORBIMENTO DELLA LUCE A 280 NM, ESSO SARA' RICCO IN:
- A ALANINA
 - X B TRIPTOFANO
 - C CISTEINA
 - D ESTIDINA
 - E IN NESSUNO DI QUESTI CASI
- 380 QUALE AMMINOACIDO E' RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE DEI PONTI -S-S-:
- A TIROSINA
 - X B CISTEINA
 - C FENILALANINA
 - D SERINA
 - E NESSUNO DEI PRECEDENTI
- 381 QUALE DEGLI AMMINOACIDI ELENCATI E' UN AMMINOACIDO AROMATICO:
- X A TIROSINA
 - B LEUCINA
 - C PROLINA
 - D LISINA
 - E NESSUNO DI QUELLI ELENCATI
- 382 QUALE DEI SEGUENTI CODONI E' UN CODONE DI STOP:
- A GTA
 - B ACA
 - X C TAG
 - D GAT
 - E NESSUNA DI QUELLE ELENcate

383 LA SEQUENZA DI BASI TAT DEL DNA ORIGINA UNO DEI CODONI PER L'ISOLEUCINA; QUALE DELLE SEGUENTI TRIPLETTE E' IL CODONE DELLA LEUCINA:

- A AAU
- B UAA
- C AAA
- X D AUA
- E NESSUNA DI QUELLE ELENATE

384 L'ELETTROFORESI DI UNA MISCELA DI PROTEINE IN SOLUZIONE A PH 8,6 HA FORNITO LA SEQUENZA: (-)A-B-C-D-E(+). ORDINARE LE PROTEINE PER VALORI CRESCENTI DI PI:

- A C-B-D-A-E
- X B E-D-C-B-A
- C A-B-C-D-E-
- D D-C-B-D-E
- E D-C-B-A-E

385 GLI ISTONI SONO:

- X A PROTEINE BASICHE RICCHE IN LISINA E/O ARGININA
- B LEGATI COVALENTEMENTE AL DNA
- C PROTEINE AD ELEVATO PESO MOLECOLARE (OLTRE 200000)
- D DISSOCIATI DAL DNA PER DIGESTIONE CON NUCLEASI
- E NESSUNA DI QUESTE DEFINIZIONI E' ESATTA

386 LA DIFFUSIONE DELLA CO₂ ATTRAVERSO LA MEMBRANA ALVEOLARE E' 20 VOLTE PIU' VELOCE DI QUELLA DELL'OS-SIGENO PERCHE':

- A LA CO₂ E' SOGGETTA A TRASPORTO ATTIVO
- B L'AREA ALVEOLARE UTILE PER LA DIFFUSIONE DI CO₂ E' MAGGIORE
- X C LA SOLUBILITA' DELLA CO₂ IN H₂O E' MAGGIORE DI QUELLA DELL'O₂
- D IL GRADIENTE PRESSORIO DI CO₂ E' MAGGIORE
- E NESSUNA DI QUESTE DEFINIZIONI E' ESATTA

387 LA GOTTA E' UNA MALATTIA CARATTERIZZATA DA TASSI ELEVATI DI ACIDO URICO NEL SANGUE E NELLE URINE. TALE ACCUMULO E' DOVUTO AD UNA:

- A ALTERAZIONE DEL METABOLISMO GLUCIDICO
- X B ALTERAZIONE DEL METABOLISMO PURINICO
- C ALTERAZIONE DEL METABOLISMO LIPIDICO
- D ALTERAZIONE DEL METABOLISMO DEGLI AMMINOACIDI
- E NESSUNA DI QUESTE

388 IL LEGAME IDROGENO HA GRANDE IMPORTANZA NELLE MACROMOLECOLE BIOLOGICHE; NELLE PROTEINE ESSO E' RESPONSABILE:

- A DELLA STRUTTURA PRIMARIA
- B DELLA FORMAZIONE DEI LEGAMI DI SOLFURO
- X C DELLA STRUTTURA SECONDARIA
- D DELLA CARICA POSITIVA IN SOLUZIONI A PH FISIOLOGICO
- E DI NESSUNA DELLE PRECEDENTI

389 NELLA DENATURAZIONE DI UNA PROTEINA QUALI SONO I LEGAMI CHE VENGONO SPEZZATI:

- A PONTI DI SOLFURO -S-S-
- B LEGAMI PEPTIDICI
- X C LEGAMI IDROGENO
- D TUTTI E TRE I TIPI DI LEGAME ELENCATI
- E NESSUNO DI ESSI

390 UN ISOTOPO RADIOATTIVO E' CARATTERIZZATO DAL SUO TEMPO DI DIMEZZAMENTO CHE RAPPRESENTA:

- A IL TEMPO CHE IMPIEGANO GLI ATOMI PER DIVIDERSI A META'
- B IL TEMPO CHE IMPIEGA UN ATOMO PER EMETTERE META' DELLE SUE PARTICELLE
- C IL TEMPO CHE IMPIEGA L'ISOTOPO PER RADDOPPIARE LA SUA QUANTITA'
- X D IL TEMPO NECESSARIO AL DECADIMENTO DI META' DEGLI ATOMI INIZIALMENTE PRESENTI
- E IL TEMPO CHE IMPIEGA L'ISOTOPO PER QUADRUPPLICARE LA SUA QUANTITA'

391 LE RADIAZIONI ALFA EMESSE DA UN ISOTOPO RADIATIVO SONO COSTITUITE DA:

- A ELETTRONI
- X B IONI HE 2+
- C PROTONI
- D RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE
- E DA NESSUNA DELLE PRECEDENTI

392 IL FENOLO (COMUNEMENTE DETTO ACIDO FENICO) APPARTIENE ALLA CLASSE DEGLI:

- A ACIDI
- X B ALCOOLI
- C ALDEIDI
- D CHETONI
- E A NESSUNA DELLE PRECEDENTI

393 UN'AMMINA SI DEFINISCE TERZIARIA QUANDO:

- A L'ATOMO DI AZOTO E' LEGATO A TRE ATOMI DI IDROGENO
- B L'ATOMO DI AZOTO E' LEGATO AD UN ATOMO DI C E DUE DI H
- C L'ATOMO DI AZOTO E' LEGATO A DUE C ED UN H
- X D L'ATOMO DI AZOTO E' LEGATO A TRE C
- E IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI

- 394 QUANTI ATOMI DI CARBONIO MINIMO SONO NECESSARI PER AVERE UN ALCOOL TERZIARIO:
A 2 ATOMI
B 3 ATOMI
X C 4 ATOMI
D 5 ATOMI
E 8 ATOMI
- 395 GLI ENZIMI SONO DEI CATALIZZATORI BIOLOGICI; ESSI PERTANTO:
A AUMENTANO L'ENERGIA DI ATTIVAZIONE DELLA REAZIONE
B FANNO DIMINUIRE LA KEQ DELLA REAZIONE
X C ABBASSANO L'ENERGIA DI ATTIVAZIONE DELLA REAZIONE
D FANNO AUMENTARE LA KEQ DELLA REAZIONE
E NESSUNA DELLE MODIFICAZIONI PRECEDENTI
- 396 IN UNA REAZIONE CATALIZZATA DA UN ENZIMA LA QUANTITA' DELL'ENZIMA:
A DIMINUISCE NEL CORSO DELLA REAZIONE
B AUMENTA NEL CORSO DELLA REAZIONE
X C RIMANE INVARIATA NEL CORSO DELLA REAZIONE
D RIMANE INVARIATA SOLO SE LA REAZIONE RAGGIUNGE L'EQUILIBRIO
E AUMENTA QUANDO LA REAZIONE RAGGIUNGE L'EQUILIBRIO
- 397 L'AZIONE TOSSICA DEL CIANURO E' DOVUTA A:
A FORMAZIONE DI UN COMPLESSO CON L'EMOGLOBINA
B COMBINAZIONE CON LA MEMBRANA ERITROCITARIA
X C INIBIZIONE DELLA CITOCROMO OSSIDASI
D BLOCCO DEL TRASPORTO DI OSSIGENO ATTRAVERSO IL SANGUE
E A NESSUNO DEI PRECEDENTI EFFETTI
- 398 IL (86) RN 222 E' IL PRODOTTO DI DECADIMENTO ALFA DI UN ISOTOPO RADIOATTIVO DEL RA. IL SUO PRECURSORE AVRA':
X A NUMERO DI MASSA MAGGIORE DI 4 UNITA' E NUMERO ATOMICO MAGGIORE DI 2 UNITA'
B NUMERO DI MASSA UGUALE E NUMERO ATOMICO INFERIORE DI 2 UNITA'
C NUMERO DI MASSA INFERIORE DI 4 UNITA' E NUMERO ATOMICO INFERIORE DI 2 UNITA'
D NUMERO DI MASSA MAGGIORE DI 2 UNITA' E NUMERO ATOMICO MAGGIORE DI 4 UNITA'
E NESSUNA DI QUESTE DEFINIZIONI E' ESATTA
- 399 FACENDO PASSARE LE RADIAZIONI NUCLEARI ATTRAVERSO UN CAMPO ELETTRICO AD ALTA TENSIONE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E' VERA:
A LE PARTICELLE ALFA NON DEVIANO
B LE PARTICELLE ALFA DEVIANO VERSO IL POLO +
X C LE PARTICELLE ALFA DEVIANO VERSO IL POLO -
D LE PARTICELLE ALFA DEVIANO IN PARTE VERSO + IN PARTE VERSO -
E NESSUNA DI QUESTE AFFERMAZIONI E' ESATTA
- 400 NELL'ATTRAVERSARE UN CAMPO ELETTRICO AD ALTA TENSIONE LE RADIAZIONI GAMMA:
X A NON SUBISCONO NESSUNA DEVIAZIONE
B DEVIANO VERSO IL POLO POSITIVO
C DEVIANO VERSO IL POLO NEGATIVO
D PERDONO PARTE DELLA LORO CARICA ELETTRICA
E PERDONO TUTTE LE LORO CARATTERISTICHE
- 401 ATTRAVERSANDO UN CAMPO ELETTRICO AD ALTA TENSIONE LE RADIAZIONI BETA:
A ATTRAVERSANO IL CAMPO SENZA SUBIRE ALCUNA DEVIAZIONE
X B SUBISCONO UNA DEVIAZIONE VERSO IL POLO POSITIVO
C SUBISCONO UNA DEVIAZIONE VERSO IL POLO NEGATIVO
D NON RIESCONO AD ATTRAVERSARE IL CAMPO AVENDO MASSA ESTREMAMENTE GRANDE
E NESSUNA DELLE PRECEDENTI AFFERMAZIONI E' ESATTA
- 402 SECONDO LA TEORIA DI BROENSTED SI DEFINISCE BASE UN COMPOSTO:
X A CAPACE DI ACCETTARE UN PROTONE
B CAPACE DI CEDERE UNA COPPIA DI ELETTRONI
C CAPACE DI LIBERARE IONI OH- IN SOLUZIONE
D CAPACE DI CEDERE UN PROTONE
E NESSUNA DELLE PRECEDENTI DEFINIZIONI E' ESATTA
- 403 LA REAZIONE TRA UN OSSIDO ED UNA ANIDRIDE DEL TIPO $CAO + SO_3 = CASO_4$ PUO' ESSERE CONSIDERATA UNA REAZIONE ACIDO BASE?
A SI PERCHE' NON COMPAGNONO NE' SPECIE H NE' OH
X B SI SECONDO LA TEORIA DI LEWIS
C SI SECONDO LA TEORIA DI BROENSTED
D SI PERCHE' SI FORMA UN SALE DELL'ACIDO SOLFORICO
E NESSUNA DELLE PRECEDENTI AFFERMAZIONI E' ESATTA
- 404 QUAL E' IL NUMERO DI OSSIDAZIONE DELL'OSSIGENO NEL PEROSSIDO DI IDROGENO:
A -2
B +2
C +1
X D -1
E -3

- 405 NELLA REAZIONE $\text{Cu} + \text{Cl}_2 = \text{CuCl}_2$ I NUMERI DI OSSIDAZIONE DEL Cl_2 A SINISTRA E A DESTRA DELLA REAZIONE SONO:
- X A 0; -1
B -1; -2
C 0; -2
D -1; 0
E -2; 0
- 406 UNA SOLUZIONE MANTENUTA A TEMPERATURA COSTANTE SI DICE SATURA QUANDO:
- A LA CONCENTRAZIONE E' SUPERIORE AD 1M
X B E' PRESENTE IL CORPO DI FONDO
C SOLVENTE E SOLUTO HANNO LA STESSA CONCENTRAZIONE
D LA CONCENTRAZIONE DEL SOLUTO SUPERA LA SUA SOLUBILITA'
E IN NESSUNA DI QUESTE SITUAZIONI
- 407 NELLA REAZIONE $\text{NH}_3 + \text{H}^+ = \text{NH}_4^+$ SI STABILISCE UN LEGAME:
- A COVALENTE
B IONICO
X C DATIVO
D METALLICO
E NESSUNO DEI PRECEDENTI
- 408 UNA REAZIONE SI DICE ALL'EQUILIBRIO QUANDO LA VARIAZIONE DI ENERGIA LIBERA:
- A E' MAGGIORE DI ZERO
X B E' UGUALE A ZERO
C E' MINORE DI ZERO
D E' MAGGIORE DI UNO
E E' MINORE DI UNO
- 409 SE UN SALE SI SCIOLGIE IN ACQUA CON REAZIONE ESOTERMICA, UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA:
- X A RIDUCE LA SOLUBILITA' DEL SALE
B AUMENTA LA SOLUBILITA' DEL SALE
C PROVOCA LA PRECIPITAZIONE DEL SALE GIA' IN SOLUZIONE
D NON HA ALCUN EFFETTO SULLA SOLUBILITA'
E NESSUNA DELLE AFFERMAZIONI E' ESATTA
- 410 IN UNA REAZIONE ESOTERMICA UN ABBASSAMENTO DELLA TEMPERATURA:
- A SPOSTERA L'EQUILIBRIO VERSO I REAGENTI
B NON AVRA' ALCUNA INFLUENZA SULL'EQUILIBRIO
X C SPOSTERA L'EQUILIBRIO VERSO I PRODOTTI DI REAZIONE
D SPOSTA L'EQUILIBRIO DALLA PARTE DEL REAGENTE PIU' VOLATILE
E NESSUNA DELLE AFFERMAZIONI E' CORRETTA
- 411 DOVENDO EFFETTUARE UNA CURVA DI TARATURA PER IL DO SAGGIO DEL GLUCOSIO SIERICO QUALE DEI SEGUENTI INTERVALLI DI CONCENTRAZIONE UTILIZZERESTE?
- A 10-130
B 60-350
C 0-110
D 100-500
X E 0-700
- 412 IL GLUCOSIO PUO' ESSERE DOSATO IN FOTOMETRIA DI FIAMMA IN EMISSIONE?
- A NO, PERCHE' IL GLUCOSIO NON EMETTE RADIAZIONI
B SI SE SI USA UNA FIAMMA A BASSA ENERGIA
C SI SE VIENE DISCIOLTO IN UN SOLVENTE ADATTO
X D NO, PERCHE' LA MOLECOLA VIENE DISTRUTTA DALLA FIAMMA
E NO, PERCHE' IL FENOMENO DELL'EMISSIONE NON SEGUE LA LEGGE DI LAMBERT-BEER
- 413 LA LEGGE DI LAMBERT-BEER DEFINISCE CHE:
- A L'ASSORBIMENTO DI RADIAZIONI LUMINOSE DA PARTE DI UNA SOLUZIONE E' PROPORZIONALE ALLA SUA CONCENTRAZIONE E DIPENDE DALLO SPESSORE DEL MATERIALE DI CUI E' FATTA LA CUVETTA DI LETTURA
B L'ASSORBIMENTO DI RADIAZIONI LUMINOSE DA PARTE DI UNA SOLUZIONE E' PROPORZIONALE ALLA SUA CONCENTRAZIONE E DIPENDE DAL VOLUME DELLA CUVETTA DI LETTURA
X C L'ASSORBIMENTO DI RADIAZIONI LUMINOSE DA PARTE DI UNA SOLUZIONE E' PROPORZIONALE ALLA SUA CONCENTRAZIONE E DIPENDE DAL DIAMETRO DELLA CUVETTA DI LETTURA
D SOLO PER SOLUZIONI CHE ASSORBONO NELL'ULTRAVIOLETTO ESISTE PROPORZIONALITA' TRA LA LORO CONCENTRAZIONE E L'ASSORBIMENTO DI RADIAZIONI
E SOLO PER SOLUZIONI CHE ASSORBONO NEL VISIBILE ESISTE PROPORZIONALITA' TRA LA LORO CONCENTRAZIONE E L'ASSORBIMENTO DI RADIAZIONI
- 414 SE DI UNA SOLUZIONE SONO NOTI L'ASSORBENZA ED IL COEFFICIENTE DI ESTINZIONE MOLARE E' POSSIBILE CALCOLARNE LA CONCENTRAZIONE APPLICANDO UNA DELLE SEGUENTI FORMULE:
- A ASSORBENZA + CAMMINO OTTICO / COEFFICIENTE ESTINZIONE MOLARE
B ASSORBENZA X COEFFICIENTE DI ESTINZIONE MOLARE / CAMMINO OTTICO
X C ASSORBENZA / COEFFICIENTE DI ESTINZIONE MOLARE X CAMMINO OTTICO
D (ASSORBENZA - CAMMINO OTTICO) / COEFFICIENTE ESTINZIONE MOLARE
E ASSORBENZA / COEFFICIENTE DI ESTINZIONE MOLARE - CAMMINO OTTICO

- 415 PER TRACCIARE IL GRAFICO DI UNA CURVA DI TARATURA BISOGNA RIPORTARE:
 A SULL'ASSE DELLA ASCISSE (X) I VALORI DELLE LUNGHEZZE D'ONDA E SULL'ASSE DELLE ORDINATE (Y) LE CONCENTRAZIONI CALCOLATE
 X B SULL'ASSE DELLA ASCISSE (X) LE CONCENTRAZIONI DEGLI STANDARDS E SULL'ASSE DELLE ORDINATE (Y) I VALORI DI ASSORBENZA CORRISPONDENTI
 C SULL'ASSE DELLA ASCISSE (X) LE CONCENTRAZIONI DEGLI STANDARDS E SULL'ASSE DELLE ORDINATE (Y) I VALORI DI LUNGHEZZA D'ONDA
 D SULL'ASSE DELLA ASCISSE (X) I VALORI DI ASSORBENZA DEGLI STANDARDS E SULL'ASSE DELLE ORDINATE (Y) I CORRISPONDENTI VALORI DI CONCENTRAZIONE
 E SULL'ASSE DELLE ASCISSE (X) I VALORI DI LUNGHEZZA D'ONDA E SULLE ORDINATE I VALORI CORRISPONDENTI DI ASSORBIMENTO
- 416 UN FLUORIMETRO DIFFERISCE DA UNO SPETTROFOTOMETRO:
 A PERCHE' LA SUA SORGENTE LUMINOSA E' UNA LAMPADA AL FLUORO
 B PERCHE' HA DUE LAMPADIE
 C SOLO PERCHE' HA DUE SELETTORI DI LUNGHEZZA D'ONDA
 X D PERCHE' HA DUE SELETTORI DI LUNGHEZZA D'ONDA ED IL RIVELATORE E' AD ANGOLO RISPETTO ALLA CUVETTA DI LETTURA
 E NON ESISTE DIFFERENZA RILEVANTE TRA ESSI
- 417 NELLA SPETTROFOTOMETRIA DI ASSORBIMENTO ATOMICO LA FIAMMA:
 A RAPPRESENTA LA SORGENTE LUMINOSA
 X B E' NECESSARIA A ROMPERE I LEGAMI INTERATOMICI
 C SERVE PER GENERARE L'ENERGIA NECESSARIA PER LA REAZIONE DI DOSAGGIO
 D SERVE PER BRUCIARE EVENTUALI INTERFERENTI PRESENTI NELLA MATRICE SIERICA
 E E' NECESSARIA PER ECCITARE GLI ATOMI
- 418 L'ELETTROFORESI E' UNA TECNICA CHE VIENE UTILIZZATA PER:
 A ROMPERE I LEGAMI PEPTICI
 B FORNIRE UNA CARICA ELETTRICA ALLE PROTEINE
 C SEPARARE ESCLUSIVAMENTE LE PROTEINE
 X D SEPARARE COMPOSTI DOTATI DI CARICA ELETTRICA
 E SEPARARE LE PROTEINE NEI PEPTIDI COMPONENTI
- 419 NELL'ELETTROFORESI DELLE PROTEINE IL TAMPONE DEVE ESSERE CAMBIATO SPESSO PERCHE':
 A CON L'EVAPORAZIONE AUMENTA LA FORZA IONICA E, PERTANTO, AUMENTA LA VELOCITA' DI MIGRAZIONE DELLE PROTEINE
 B SI SVILUPPANO MUFFE CHE DETERMINANO L'AGGREGAZIONE DELLE PROTEINE
 X C CON L'EVAPORAZIONE AUMENTA LA FORZA IONICA E, PERTANTO, DIMINUISCE LA VELOCITA' DI MIGRAZIONE DELLE PROTEINE
 D VARIA IL PH CHE DIVENTA PIU' BASICO
 E VARIA IL PH CHE DIVENTA PIU' ACIDO
- 420 DOPO LA SEPARAZIONE ELETTROFORETICA LE FRAZIONI SIEROPROTEICHE:
 A POSSONO VENIRE DIRETTAMENTE QUANTIZZATE AL DENSITOMETRO
 B POSSONO ESSERE SOLO VISUALIZZATE AL DENSITOMETRO MA NON QUANTIZZATE
 X C POSSONO ESSERE QUANTIZZATE AL DENSITOMETRO SOLO PREVIA COLORAZIONE
 D IN OGNI CASO POSSONO ESSERE QUANTIZZATE DIRETTAMENTE IN FLUORIMETRIA
 E DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE ESTRATTE DAL SUPPORTO PER ESSERE QUANTIZZATE IN DENSITOMETRIA
- 421 IL PH DEL SUCCO GASTRICO E' NORMALMENTE:
 A 0,5 - 0,8
 X B 1,0 - 1,8
 C 2,5 - 2,8
 D 3,5 - 3,8
 E 4,5 - 4,8
- 422 L'ALCALOSI RESPIRATORIA E' DOVUTA A:
 X A ACCELERAZIONE DEGLI SCAMBI RESPIRATORI
 B RALLENTAMENTO DEL FLUSSO AEREO RESPIRATORIO
 C RALLENTAMENTO DELLA DIFFUSIONE DEI GAS A LIVELLO RESPIRATORIO
 D IPOPNIA DA INSUFFICIENZA MUSCOLARE
 E IPOPNIA DA INIBIZIONE DEI CENTRI RESPIRATORI
- 423 AUMENTO DELLA PCO2 SI RILEVA NELLA:
 A ALCALOSI RESPIRATORIA COMPENSATA
 B ALCALOSI RESPIRATORIA SCOMPENSATA
 C ACIDOSI METABOLICA COMPENSATA
 X D ACIDOSI RESPIRATORIA COMPENSATA
 E ALCALOSI METABOLICA SCOMPENSATA
- 424 L'ACIDOSI RESPIRATORIA E' PROVOCATA DA:
 A ACCUMULO DI ACIDO LATTICO
 B IPERVENTILAZIONE POLMONARE
 X C IPOVENTILAZIONE POLMONARE
 D RIDOTTA ESCREZIONE RENALE DI ACIDI
 E SINDROME DI FANCONI, DE TONI, DEBRE'

425 IL TASSO PLASMATICO DI HCO_3 E' DI NORMA:

- A 150 MEQ/L
- B 100 MEQ/L
- C 75 MEQ/L
- D 50 MEQ/L
- X E 25 MEQ/L

426 IN CONDIZIONI NORMALI IL PH DEL SANGUE E':

- A 7,50 +/- 0,02
- X B 7,40 +/- 0,02
- C 7,30 +/- 0,02
- D 7,20 +/- 0,02
- E 7,10 +/- 0,02

427 QUALI DELLE SEGUENTI RADIAZIONI HA IL MAGGIOR POTE
RE DI PENETRAZIONE NEI TESSUTI:

- A RADIAZIONI ECCITANTI
- B PARTICELLE BETA
- C PARTICELLE ALFA
- D RAGGI X
- X E RAGGI GAMMA

428 QUALI FRA LE SEGUENTI SONO RADIAZIONI ECCITANTI:

- X A INFRAROSSO
- B RAGGI X
- C RAGGI GAMMA
- D PARTICELLE ALFA E BETA
- E ONDE HERTZIANE

429 QUALI FRA LE SEGUENTI SONO RADIAZIONI IONIZZANTI:

- A INFRAROSSO
- X B RAGGI GAMMA
- C ULTRAVIOLETTO
- D ONDE HERTZIANE
- E VISIBILE

430 L'UNITA' DI MISURA DELLA "DOSE DI ESPOSIZIONE" AL-
LE RADIAZIONI E':

- A CURIE
- B BECQUEREL
- X C ROENTGEN
- D RAD
- E REM

431 L'UNITA' DI MISURA DELLA "DOSE SPECIFICA ASSORBI-
TA" DELLE RADIAZIONI E':

- A CURIE
- B BECQUEREL
- C ROENTGEN
- X D RAD
- E REM

432 L'UNITA' DI MISURA DELLA "DOSE BIOLOGICA EFFICACE"
DELLE RADIAZIONI E':

- A CURIE
- B BECQUEREL
- C ROENTGEN
- D RAD
- X E REM

433 LE ONDE HERTZIANE POSSONO PROVOCARE FENOMENI
PATOLOGICI A LIVELLO DI:

- A MIDOLLO OSSEO
- X B CRISTALLINO
- C FEGATO
- D CUTE
- E SISTEMA NERVOSO

434 LA RIPARAZIONE DEL DANNO PROVOCATO DALLE RADIAZIO-
NI ULTRAVIOLETTE E' DOVUTA A:

- A ENDONUCLEASI
- B ESONUCLEASI
- C DNA-POLIMERASI
- D LIGASI
- X E TUTTI I PRECEDENTI ENZIMI

435 IL VICINO ULTRAVIOLETTO HA EFFETTO FOTOPROTETTORE
NEI CONFRONTI DEL LONTANO ULTRAVIOLETTO MEDIANTE:

- A INATTIVAZIONE DELLE ENDONUCLEASI
- B ATTIVAZIONE DELLE ESONUCLEASI
- X C ALLUNGAMENTO DELLA FASE G-1
- D NESSUNO DI QUESTI MECCANISMI
- E TUTTI QUESTI MECCANISMI

436 L'EFFETTO PRINCIPALE DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI
SU MATERIALI BIOLOGICI E' LEGATO A:

- A EFFETTO JOULE
- B EFFETTO FOTOELETTRICO
- C EFFETTO COPPIA
- X D EFFETTO COMPTON
- E EFFETTO FOTORIATTIVATORE

437 QUAL E' IL LIVELLO MASSIMO DI ASSORBIMENTO DELLE
RADIAZIONI, AL DI SOPRA DELLE QUALI LE LESIONI DI
UN EPITELIO COLPITO SONO SEMPRE IRREVERSIBILI:

- A 100 RADS
- B 1000 RADS
- X C 2000 RADS
- D 5000 RADS
- E 10000 RADS

- 438 LE "ESCARRE" SONO TIPICHE DELLE USTIONI DI:
A I GRADO
B II GRADO
X C III GRADO
D IV GRADO
E TUTTI I GRADI
- 439 LE BOLLE O "FLITTENE" SONO TIPICHE DELLE USTIONI DI:
A I GRADO
X B II GRADO
C III GRADO
D IV GRADO
E TUTTI I GRADI
- 440 QUALE FRA I SEGUENTI NON E' UN EFFETTO GENERALE DELLE ALTE TEMPERATURE:
A ANEMIA
X B IPOAZOTEMIA
C IPOPROTEINEMIA
D TOSSIEMIA
E SHOCK
- 441 LA STEATOSI PIU' FREQUENTE E' QUELLA EPATICA DA:
X A TRIGLICERIDI
B COLESTEROLO
C ACIDI GRASSI LIBERI
D FOSFOLIPIDI
E SFINGOLIPIDI
- 442 QUALE FRA LE SEGUENTI SOSTANZE NON E' UN AGENTE STEATOGENO:
A ETANOLO
B ARSENICO
C TETRACLORURO DI CARBONIO
X D CALOMELANO
E ETIONINA
- 443 QUALE FRA LE SEGUENTI SOSTANZE NON E' UN AGENTE FLOGOGENO:
A TREMENTINA
B CALOMELANO
X C ETIONINA
D ACIDO URICO
E ASBESTO
- 444 QUALE TRA I SEGUENTI ANTIBIOTICI INTERFERISCE CON IL LEGAME TRA AMINOACIL-T-RNA E SUBUNITA' RIBOSOMIALE 30S:
A ACTINOMICINA
B RIFAMPICINA
C PUROMICINA
X D TETRACICLINE
E PENICILLINA
- 445 QUALE TRA I SEGUENTI ANTIBIOTICI INTERFERISCE CON IL LEGAME TRA AMINOACIL-T-RNA E LA SUBUNITA' RIBOSOMIALE 50S:
X A PUROMICINA
B PENICILLINA
C RIFAMPICINA
D ACTINOMICINA
E MITOMICINA
- 446 IL CLORAMFENICOLO:
A INIBISCE LA SINTESI DELLO RNA
B INIBISCE LA SINTESI DEL DNA
C INIBISCE LA RNA POLIMERASI
D INIBISCE LA SUBUNITA' RIBOSOMIALE 30S
X E INIBISCE LA SUBUNITA' RIBOSOMIALE 50S
- 447 QUALE TRA I SEGUENTI ANTIBIOTICI E' UN INIBITORE DELLA SINTESI PROTEICA:
A MITOMICINA
X B PUROMICINA
C RIFAMPICINA
D PENICILLINA
E ACTINOMICINA
- 448 QUALE TRA I SEGUENTI ANTIBIOTICI E' UN INIBITORE DELLE RNA POLIMERASI:
A MITOMICINA
B PUROMICINA
C CLORAMFENICOLO
X D RIFAMPICINA
E ACTINOMICINA
- 449 QUALI FRA I SEGUENTI MICROORGANISMI SONO PARASSITI INTRACELLULARI OBBLIGATI:
A CLOSTRIDII
X B RICKETTSIE
C BRUCELLE
D MICOBATTERI
E PSEUDOMONAS
- 450 QUALI FRA I SEGUENTI MICROORGANISMI SONO PARASSITI INTRACELLULARI FACOLTATIVI:
X A GONOCOCCI
B STREPTOCOCCI
C RICKETTSIE
D CLAMIDIE
E STAFILOCOCCI

451 QUALI TRA I SEGUENTI MICROORGANISMI PRODUCONO COAGULASI:
A CLOSTRIDI
B STREPTOCOCCI BETA-EMOLITICI
X C STAFILOCOCCI AUREI
D STAFILOCOCCI EPIDERMICI
E SALMONELLE

452 QUALI TRA I SEGUENTI MICROORGANISMI PRODUCONO LECITINASI O TOSSINA ALFA:
X A CLOSTRIDIUM PERFRINGENS
B STAFILOCOCCO AUREO
C SALMONELLA TYPHIMURIUM
D STREPTOCOCCO ALFA-EMOLITICO
E STREPTOCOCCO BETA-EMOLITICO DI GRUPPO A

453 LA TOSSINA DIFTERICA AGISCE:
A STIMOLANDO L'ADENILATO CICLASI
B SCINDENDO LA LECITINA
X C INATTIVANDO IL FATTORE DI ALLUNGAMENTO 2 (EF-2)
D DISSOLVENDO IL COLLAGENO
E DISSOLVENDO LA FIBRINA

454 LA TOSSINA COLERICA AGISCE SULL'ADENILATO CICLASI:
A LEGANDOSI ALLA SUBUNITA' ALFA
B BLOCCANDO LA SUBUNITA' ALFA
X C MODIFICANDO LA STRUTTURA DELLA SUBUNITA' ALFA
D BLOCCANDO IL COMPLESSO ALFA-BETA-GAMMA
E BLOCCANDONE IL LEGAME CON IL GTP

455 QUALE TRA LE SEGUENTI TOSSINE BATTERICHE HA UNO SPICCATO EFFETTO SUL RICAMBIO IDRICO-SALINO:
A TOSSINA BOTULINICA
B ENTEROTOSSINA STAFILOCOCCICA
C TOSSINA TETANICA
X D TOSSINA COLERICA
E ENDOTOSSINA DEI BATTERI GRAM-NEGATIVI

456 QUALE TRA I SEGUENTI NON E' UN EFFETTO DELLE ENDOTOSSINE DEI BATTERI GRAM-NEGATIVI:
A FEBBRE
B RIDUZIONE DELLE RISERVE DI GLICOGENO EPATICO
C LEUCOPENIA
D TROMBOCITOPENIA
X E ANEMIA

457 QUALI TRA I SEGUENTI POSSONO ESSERE CONSIDERATI BATTERI "OPPORTUNISTI":
X A PROTEUS
B RICKETTSIE
C CLOSTRIDI
D SALMONELLA
E BRUCELLE

458 QUALI TRA I SEGUENTI POSSONO ESSERE CONSIDERATI BATTERI "OPPORTUNISTI":
A MICOBATTERI
B CLOSTRIDI
C SALMONELLE
D BRUCELLE
X E PSEUDOMONAS

459 LE ENDOTOSSINE DEI BATTERI GRAM-NEGATIVI SONO:
A POLISACCARIDI
B PROTEINE
C GLICOPROTEINE
X D LIPOPOLISACCARIDI
E LIPOPROTEINE

460 QUALE DELLE SEGUENTI TOSSINE BATTERICHE E' FORTEMENTE PIROGENA:
A TOSSINA COLERICA
B TOSSINA STAFILOCOCCICA
C TOSSINA ALFA DEL CL.PERFRINGENS
D TOSSINA DIFTERICA
X E ENDOTOSSINA DEI BATTERI GRAM-NEGATIVI

461 L'ENTEROTOSSINA STAFILOCOCCICA POSSIEDE TUTTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE, ECCETTO UNA. INDICARE QUALE:
A HA UN PESO MOLECOLARE DI CIRCA 40.000 Da
B E' PRODOTTA SOLO DA ALCUNI CEPPI DI ST. AUREUS MA NON DALLO ST. EPIDERMIDIS
X C E' TERMOLABILE
D E' ASSORBITA MOLTO RAPIDAMENTE NELL'INTESTINO
E AGISCE STIMOLANDO I RECETTORI NERVOSI A LIVELLO GASTRO-INTESTINALE

462 QUALE DELLE SEGUENTI TOSSINE AGISCE A LIVELLO DELLE PLACCHE MOTRICI BLOCCANDO IL RILASCIO DI ACETILCOLINA:
A TOSSINA DIFTERICA
B TOSSINA TETANICA
X C TOSSINA BOTULINICA
D TOSSINA COLERICA
E TOSSINA ALFA DEL CL. PERFRINGENS

463 QUALE DELLE SEGUENTI TOSSINE SI LEGA AI GANGLIOSIDI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE:
A TOSSINA DIFTERICA
X B TOSSINA TETANICA
C TOSSINA BOTULINICA
D TOSSINA COLERICA
E TOSSINA ALFA DEL CL. PERFRINGENS

- 464 QUALE DELLE SEGUENTI TOSSINE AGISCE ANCHE A LIVELLO DELLE PLACCHE MOTRICI CAUSANDO ACCUMULO DI ACETILCOLINA:
A TOSSINA DIFTERICA
X B TOSSINA TETANICA
C TOSSINA BOTULINICA
D TOSSINA COLERICA
E TOSSINA ALFA DEL CL. PERFRINGENS
- 465 QUALI TRA LE SEGUENTI SOSTANZE CANCEROGENE DEVONO AVERE NELL'AMBIENTE DI LAVORO UN VALORE SOGLIA (OSSIA DEVONO ESSERE TRATTATE A CICLO CHIUSO):
A VINIL-CORURO
B BETA-NAFTILAMINA
C BENZIDINA
X D TUTTE LE PRECEDENTI
E NESSUNA DELLE PRECEDENTI
- 466 QUAL E' LA CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMISSIBILE NELL'AMBIENTE DI LAVORO PER LA MAGGIOR PARTE DELLE POLVERI INERTI:
A 1 PARTE PER BILIONE
B 10 MICROGRAMMI/M3
C 1 MG/M 3
X D 10 MG/M 3
E 100 MG/M 3
- 467 FORME DIARROICHE INTESTINALI POSSONO ESSERE PROVOCATE DA:
A TOGAVIRUS
X B ROTAVIRUS
C REOVIRUS
D POXVIRUS
E PARAMIXOVIRUS
- 468 INFEZIONI DELLE VIE AEREE SUPERIORI POSSONO ESSERE CAUSATE DA:
A TOGAVIRUS
B ROTAVIRUS
X C REOVIRUS
D POXVIRUS
E PAPOVAVIRUS
- 469 L'AUMENTO COMPENSATORIO DI VOLUME DEL MUSCOLO CARDIACO IN SEGUITO AD UN DIFETTO VALVOLARE E' UN ESEMPIO DI:
A IPERPLASIA
B METAPLASIA
C ANAPLASIA
X D IPERTROFIA
E DISPLASIA
- 470 INDICATE QUALE TRA LE SOTTOINDICATE CONDIZIONI PATOLOGICHE NON E' UNA DEGENERAZIONE CELLULARE:
A RIGONFIAMENTO TORBIDO
X B AMILOIDOSI
C DEGENERAZIONE IDROPICA
D STEATOSI
E DEGENERAZIONE VACUOLARE
- 471 IN QUALE DELLE SEGUENTI MALATTIE SI OSSERVANO SINTOMI NEUROLOGICI NON CORRELATI ALLA PRODUZIONE DI UNA ESOTOSSINA:
A TETANO
B BOTULISMO
C DISSENTERIA
X D RABBIA
E DIFTERITE
- 472 L'IRRADIAZIONE CON DOSI SUPERIORI A 10000 RADS (ENERGIA IONIZZANTE) PROVOCA TUTTE QUESTE ALTERAZIONI AD ECCEZIONE DI UNA. INDICATE QUALE:
X A LA MORTE DELL'ANIMALE IN POCHE GIORNI
B LA MORTE DELL'ANIMALE IN POCHE ORE
C CONVULSIONI E COMA
D ALTERAZIONI NELLA PERMEABILITA' DELLA MEMBRANA CELLULARE
E ALTERAZIONI NELLA COMPARTIMENTALIZZAZIONE DEL NA + E DEL K +
- 473 MICRORGANISMI GRAM-POSITIVI, COCCOIDI, BETA-EMOLITICI, BACITRACINA-POSITIVI, SONO:
X A STREPTOCOCCUS PYOGENES
B STAPHYLOCOCCUS AUREUS
C ESCHERICHIA COLI
D NEISSERIA MENINGITIDIS
E HAEMOPHYLUS INFLUENZAE
- 474 I RAGGI U.V. PROVOCANO TUTTI I SEGUENTI EFFETTI SUL DNA, AD ECCEZIONE DI UNO. INDICATE QUALE:
A DIMERIZZAZIONE DELLA TIMINA
B INEFFICIENTE LETTURA DEL CODICE
C INEFFICIENTE SINTESI DEL MRNA
D ATTIVAZIONE DEI SISTEMI BIOLOGICI DI "REPAIR"
X E ROTTURE CROMOSOMICHE
- 475 IL TITOLO DI ANTISTREPTOLISINE RISULTA AUMENTATO IN UNA SOLA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI. INDICATE QUALE:
X A STADIO ACUTO DELLA MALATTIA REUMATICA
B STADIO SUBACUTO DELL'ARTRITE REUMATOIDE
C SPONDILITE ANCHILOPOIETICA
D ARTROPATIA URATICA
E OSTEOARTROSI DIFFUSA

- 476 L'ESAME CITOLOGICO DEL LIQUOR IN CORSO DI MENINGITE TUBERCOLARE MOSTRA IN MISURA NOTEVOLE PREVALENZA DI:
A MASTOCITI
X B LINFOCITI
C GRANULOCITI EOSINOFILI
D GRANULOCITI NEUTROFILI
E CELLULE DI LANGHANS
- 477 LA FEBBRE INTERMITTENTE DI TIPO ONDULANTE SI OSSERVA SPESSO IN UNA DI QUESTE CONDIZIONI:
A PERTOSSE
B TIFO ADDOMINALE
C DIFTERITE
X D BRUCELLOSI
E SEPSI PUERPERALE
- 478 TUTTE LE SEGUENTI SONO INFEZIONI DA VIRUS COXSACKIE AD ESCLUSIONE DI UNA, INDICATE QUALE:
A MORBO DI BORNHOLM
X B ASPERGILLOSI
C GRIPPE ESTIVA
D ERPANGINA
E MIOCARDITE VIRALE
- 479 IL MYCOPLASMA PNEUMONIAE PUO' PROVOCARE UNA:
A ANEMIA MEGALOBLASTICA
X B ANEMIA EMOLITICA
C PNEUMOCONIOSI
D PLEURITE ESSUDATIVA
E POLIGLOBULIA
- 480 L'AGENTE EZIOLOGICO DEL MUGHETTO E' UNO DEI SEGUENTI MICETI:
X A CANDIDA ALBICANS
B HISTOPLASMA CAPSULATUM
C BLASTOMYCES DERMATITIDIS
D CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS
E TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES
- 481 LA LOCALIZZAZIONE PIU' COMUNE D'INFEZIONE DA ESCHERICHIA COLI, E':
A COLECISTI
B APPARATO GASTROINTESTINALE
C PERITONEO
D APPARATO RESPIRATORIO
X E APPARATO URINARIO
- 482 LA CARBONIZZAZIONE DEI TESSUTI IN SEGUITO AD ESPOSIZIONE A FONTI DI CALORE, SI HA NELLE:
A USTIONI DI I GRADO
B USTIONI DI II GRADO
C USTIONI DI III GRADO
X D USTIONI DI IV GRADO
E USTIONI DI V GRADO
- 483 UNA DOSE DI ASSORBIMENTO DI RADIAZIONI IONIZZANTI FINO A 2000 RADS:
X A PROVOCA LA MORTE PER ALTERAZIONI DEL SISTEMA EMATOPOIETICO
B NON E' LETALE
C PROVOCA LIEVI ALTERAZIONI GASTROINTESTINALI
D PROVOCA LESIONI OSSEE
E PROVOCA LA MORTE IN POCHE ORE
- 484 QUALE ORGANO E' PIU' RESISTENTE ALL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI ATOMICHE:
A MIDOLLO OSSEO
B FEGATO
C APPARATO DIGERENTE
D APPARATO GENITALE
X E SISTEMA NERVOSO CENTRALE
- 485 I DANNI BIOLOGICI PROVOCATI DA CORRENTE ELETTRICA SONO PIU' GRAVI IN CASO DI CORRENTE:
A CONTINUA A BASSO VOLTAGGIO
B ALTERNATA AD ALTO VOLTAGGIO
X C ALTERNATA AD ALTO VOLTAGGIO CHE ATTRAVERSA IL CORPO IN SENSO BRACCIO SINISTRO - BRACCIO DESTRO
D ALTERNATA A BASSO VOLTAGGIO
E CONTINUA A BASSA INTENSITA' IN UN SOGGETTO CHE ABBIAM ALTA RESISTENZA
- 486 TUTTE LE SEGUENTI SOSTANZE SONO STEATOGENE TRanne UNA. INDICATE QUALE:
A CLOROFORMIO
B ETANOLO
C ETIONINA
D METANOLO
X E ACIDO ACETICO
- 487 LA TOSSINA DI ORIGINE FUNGINA ALFA-AMANITINA, ESTRATTA DA AMANITINA PHALLOIDES, AGISCE:
A INIBENDO LA SINTESI PROTEICA
X B INIBENDO SELETTIVAMENTE LA RNA POLIMERASI
C DIMERIZZANDO LA TIMINA
D PROVOCANDO MUTAZIONI PUNTIFORMI NEL DNA
E BLOCCANDO L'ATTIVITA' DEI RIBOSOMI

- 488 QUALE TRA I SEGUENTI ANTIBIOTICI AGISCE SULLA BIOSINTESI DELLA PARETE CELLULARE BATTERICA:
X A AMPICILLINA
B CLORAMFENICOLO
C TETRACICLINA
D STREPTOMICINA
E RIFAMPICINA
- 489 A FREQUENZA TRA I 500 E I 2000 HZ, QUALI INTENSITA' DI RUMORE NON SONO TOLLERABILI NELL'AMBIENTE DI LAVORO PER PIU' DI UN'ORA:
A 20 DB
B 40 DB
C 80 DB
X D 100 DB
E 150 DB
- 490 UNA DELLE SOTTOELENATE ALTERAZIONI RAPPRESENTA UNA DEGENERAZIONE CONNETTIVALE. INDICATE QUALE:
A DEGENERAZIONE COLLOIDE
B RIGONFIAMENTO TORBIDO
C EMOSIDEROSI
X D MELANOSI
E SATURNISMO
- 491 QUALI TRA QUESTE SOSTANZE PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO SONO CANCEROGENE:
A ASBESTO
B CATRAME
C BENZIDINA
D CLORURO DI VINILE
X E TUTTE LE PRECEDENTI
- 492 QUALE DELLE SEGUENTI CAUSE NON PROVOCA IPERTROFIA O IPERPLASIA:
A ABLAZIONE DI UN ORGANO QUANDO VI SIA QUELLO CONTRO LATERALE
B CAUSE ORMONALI
C FATTORI DI CRESCITA COME L'ERITROPOIETINA NEL CASO DEL MIDOLLO OSSEO
D IPERLAVORO NEL CASO DEL TESSUTO MUSCOLARE
X E AUMENTO DEL LIVELLO DEI CALONI TESSUTO SPECIFICI
- 493 L'ANAPLASIA SI ACCOMPAGNA A:
X A RIPRISTINO DELLA SINTESI DI ALCUNI ISOENZIMI E PROTEINE FETALI
B AUMENTO DELLA DIFFERENZIAZIONE CELLULARE
C BLOCCO IN G2 DEL CICLO CELLULARE
D DIMINUZIONE DELLA GLICOLISI AEROBICA
E BLOCCO DELLA GLICOGENOLISI
- 494 LE LIPOFUSCINE SONO:
A PRECURSORI NELLA SINTESI DELL'EMOGLOBINA
X B PIGMENTI DA USURA
C ANTIMETABOLITI
D RESPONSABILI DELLE LESIONI NELL'ALCAPTONURIA
E PRODOTTI DI DEGRADAZIONE DEGLI ORMONI TIROIDEI
- 495 QUALE DELLE SEGUENTI SOSTANZE STABILIZZA LE MEMBRANE LISOSOMIALI:
A TETRACLORURO DI CARBONIO
B VITAMINA A
X C CORTICOSTEROIDI
D PLASMINOGENO
E BRADICHININA
- 496 QUALE DELLE SEGUENTI PATOLOGIE E' UN'ALTERAZIONE NUCLEARE:
A AMILOIDOSI
X B PICNOSI
C GLICOGENOSI
D FOSFOSFINGOLIPIDOSI
E POICHILOCITOSI
- 497 LA METAPLASIA E' UNA:
A ALTERAZIONE DELLA FAGOCITOSI
B PERDITA DELLA INIBIZIONE DA CONTATTO
C CRESCITA CELLULARE INDISCRIMINATA
X D ALTERAZIONE DELLA DIFFERENZIAZIONE CELLULARE
E ALTERAZIONE DA ACCUMULO DI GLICOGENO
- 498 L'ANAPLASIA E':
A UN TIPO DI NECROSI
B UNA INIBIZIONE DELLA DIVISIONE CELLULARE
X C UN'ALTERAZIONE DELLA DIFFERENZIAZIONE CELLULARE
D UNA INFILTRAZIONE DI MATERIALE ESTRANEO ALLA CELLULA
E UNA GLICOGENOSI
- 499 I CALONI SONO:
A SOSTANZE IPERTROFIZZANTI
B INIBITORI DELLA MITOSI SPECIE-SPECIFICI
C CARCINOGENI
D SOSTANZE CHE PROMUOVONO LA FAGOCITOSI
X E INIBITORI DELLA MITOSI TESSUTO-SPECIFICI
- 500 LA DEGRANULAZIONE DEL RETICOLO ENDOPLASMATICO E' UN'ALTERAZIONE CHE SI HA:
A NELL'AMIDOIDOSI
B NELLA PICNOSI
X C NELLA STEATOSI EPATICA DA TETRACLORURO DI CARBONIO
D NELLA GLICOGENOSI DI TIPO II
E NELL'IPERTIROIDISMO

- 501 ALTERAZIONI DELLA MEMBRANA LISOSOMIALE POSSONO ESSERE DOVUTE A TUTTE LE SEGUENTI CAUSE, TRANNE UNA. INDICATE QUALE:
- A ANOMALIE STRUTTURALI DELLA MEMBRANA STESSA
 - B ESALTATA TENDENZA ALLA FUSIONE
 - C AZIONE DI AGENTI FISIOLGICI COME LA VITAMINA A
 - D AZIONE DI AGENTI LABILIZZANTI PATOLOGICI COME LE ESOTOSSINE BATTERICHE
 - X E AZIONE DI AGENTI FISIOLGICI COME IL CORTISONE
- 502 LA PICNOSI E':
- A UNA RAREFAZIONE E SCOMPARSA DELLE CROMATINE NUCLEARI
 - B UNA ALTERAZIONE DELLA MEMBRANA NUCLEARE
 - X C UN ADDENSAMENTO DI TUTTO IL NUCLEO E DELLA CROMATINA
 - D UNA DEGENERAZIONE MITOCONDRIALE
 - E UN ADDENSAMENTO DEL RETICOLO ENDOPLASMATICO
- 503 IL RIGONFIAMENTO MITOCONDRIALE O "MITOCHONDRIAL SWELLING" E' DOVUTO:
- A AD AUMENTO DELLE COMPONENTI STRUTTURALI DEL MITOCONDRIO
 - X B A MODIFICAZIONE DELL'EQUILIBRIO DEI FATTORI CHE REGOLANO LA FORMA DEL MITOCONDRIO CON ASSUNZIONE DI ACQUA
 - C A PERDITA DELLA ORGANIZZAZIONE SPAZIALE DELLE "CRISTAE"
 - D A FORMAZIONE DI VACUOLI INTRAMITOCONDRIALI
 - E A TRASFORMAZIONE LAMELLARE DEI MITOCONDRI
- 504 UNA SOLA DELLE SEGUENTI CAUSE NON PRODUCE MODIFICAZIONI DELLA MATRICE MITOCONDRIALE E DELLE CRISTAE. INDICATE QUALE:
- A ACCUMULO DI CATIONI BIVALENTI (ES. DEPOSITO CA E P I)
 - B DEPOSITO DI MATERIALI ANORMALI COME LA FERRITINA
 - C DEPOSITO DI MATERIALI DENSII LAMELLARI DA SOMMINISTRAZIONE DI P-DIMETILAMINO AZOBENZENE (DAB)
 - X D ECCESSO DI SUBSTRATO ED OSSIGENO E DIFICIT DI ADP
 - E PRESENZA DEL COSIDDETTO "CORPUS INTRA CRISTAM"
- 505 UNA DELLE SOSTANZE SOTTOELENCATE NON PROVOCA RIGONFIAMENTO MITOCONDRIALE AGENDO SUI PROCESSI ENERGETICI:
- A TIROXINA
 - B INSULINA
 - X C ATP
 - D 2,4-DINITROFENOLO
 - E CA++
- 506 TUTTE LE SOTTOELENCATE CAUSE PRODUCONO IPERPLASIA O IPERTROFIA, TRANNE UNA. INDICATE QUALE:
- A AUMENTATE RICHIESTE DI LAVORO MECCANICO
 - B AUMENTATA RICHIESTA FUNZIONALE
 - C SQUILIBRIO ORMONALE
 - D DIMINUITA CONCENTRAZIONE DI CALONI
 - X E MANCATO APPORTO DI MATERIALI NUTRITIVI (DA DENERVAZIONE)
- 507 INDICATE QUALE DELLE MODIFICAZIONI SOTTOELENCATE NON E' UNA METAPLASIA:
- A TRASFORMAZIONE DI EPITELI DI RIVESTIMENTO IN EPITELI GHIANDOLARI
 - B TRASFORMAZIONE DI UN CONNETTIVO DIFFERENZIATO IN UN ALTRO TIPO DI CONNETTIVO UGUALMENTE DIFFERENZIATO
 - X C TRASFORMAZIONE DI UN EPITELIO DI RIVESTIMENTO IN UN CONNETTIVO MUCOSO
 - D METAPLASIA MUCOSA DEI CONNETTIVI
 - E METAPLASIA OSSEA
- 508 SI DEFINISCE COME STRUTTURA PRIMARIA DI UNA PROTEINA:
- A LA DISPOSIZIONE LINEARE CHE LE CATENE POLIPEPTIDICHE ASSUMONO QUANDO SONO DENATURATE
 - X B L'ORDINE DI SUCCESSIONE DEGLI AMONACIDI NELLA CATENA PEPTIDICA
 - C LA CONFORMAZIONE ELICOIDALE PRESENTE IN ALCUNI TRATTI DELLE CATENE POLIPEPTIDICHE
 - D LA CONFORMAZIONE DELLA CATENA PROTEICA DOVUTA ALLA FORMAZIONE DI PONTI DI SOLFURO
 - E UNA SEQUENZA ANCESTRALE DA CUI SONO DERIVATE LE SEQUENZE CHE OSSERVIAMO OGGI
- 509 LE ENDOTOSSINE SONO:
- A POLISACCARIDI
 - B LIPOPOLISACCARIDI
 - X C LIPOPOLISACCARIDI LEGATI AD UNA PROTEINA
 - D PROTEINE
 - E LIPOPROTEINE
- 510 LE ENDOTOSSINE DEI BATTERI GRAM-NEGATIVI SI IDENTIFICANO CON:
- A L'ANTIGENE CAPSULARE
 - B L'ANTIGENE VI
 - C L'ANTIGENE CILIARE
 - X D L'ANTIGENE SOMATICO
 - E LE ENDOTOSSINE NON SONO ANTIGENICHE

- 511 LA NECROSI CELLULARE E' CARATTERIZZATA DA UNA SOLA DELLE SEGUENTI LESIONI IRREVERSIBILI.
INDICATE QUALE:
A PICNOSI NUCLEARE
B GLICOGENOSI NUCLEARE
C RIGONFIAMENTO MITOCONDRIALE A PICCOLA AMPIEZZA
D NOTEVOLE AUMENTO DELLA GLICOLISI
X E DEGRANULAZIONE DEL RETICOLO ENDOPLASMATICO GRANULARE
- 512 L'INTERFERONE INIBISCE LA MOLTIPLICAZIONE VIRALE CON IL SEGUENTE MECCANISMO:
A STIMOLANDO LA RISPOSTA IMMUNE CELLULO MEDIATA
B STIMOLANDO LA RISPOSTA UMORALE
C AZIONE ANTIVIRALE DIRETTA CHE BLOCCA LA FORMAZIONE DELL'RNA MESSAGGERO
X D STIMOLANDO LE CELLULE NON INFETTE A PRODURRE UNA PROTEINA CHE PREVIENE L'ASSEMBLAGGIO DI NUOVE PARTICELLE VIRALI
E ALTERANDO LA MEMBRANA CELLULARE IN MODO TALE DA PREVENIRE LA PENETRAZIONE DEL VIRUS
- 513 QUALE DELLE SEGUENTI INFEZIONI VIRALI MATERNE NEL PRIMO TRIMESTRE DI GRAVIDANZA PUO' CON MAGGIOR PROBABILITA' PORTARE A MORTE IL FETO O CAUSARE ANOMALIE CONGENITE:
A MORBILLO
X B ROSOLIA
C PAROTITE
D VARICELLA
E RESPIRATORIO-SINCINZIALE
- 514 I CORPI DI NEGRI SONO CARATTERISTICI DI:
A TOXOPLASMOSI
B NEUROSIFILIDE
C ROSOLIA CONGENITA
D MENINGITE ASETTICA
X E NESSUNA DI QUESTE AFFEZIONI
- 515 UN GIOVANE DI 17 ANNI CON SPLENOMEGALIA, LEUCOCITOSI, ANTICORPI ETEROFILI E CELLULE DI DOWNEY, PROBABILMENTE E' AFFETTO DA:
A GONORREA
B TIFO
C TUBERCOLOSI
X D MONONUCLEOSI INFETTIVA
E SIFILIDE
- 516 LO STAPHYLOCOCCUS AUREUS PUO' CAUSARE UNA GRAVE INTOSSICAZIONE ALIMENTARE CHE E' IL RISULTATO DELL'AZIONE DI UNA:
X A ENTEROTOSSINA
B EMOLISINA
C LEUCOCIDINA
D COAGULASI
E PENICILLINASI
- 517 INDICATE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIGUARDANTI L'ENDOCARDITE BATTERICA SUB-ACUTA E' CORRETTA:
A DI SOLITO SI REALIZZA SULLA SUPERFICIE ENDOCARDICA NON DANNEGGIATA
B E' RAPIDAMENTE PROGRESSIVA
C E' SPESSO CAUSATA DA STREPTOCOCCI BETA-EMOLITICI
X D E' SPESSO CAUSATA DA STREPTOCOCCI ALFA-EMOLITICI O VIRIDANTI
E E' FACILMENTE CURABILE CON GLI ANTIBIOTICI, IN QUANTO ESISTE UNA BUONA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA NEI LEMBI VALVOLARI
- 518 LA DIFTERITE E' CAUSATA DA:
A KLEBSIELLA
B LISTERIA
C PNEUMOCOCCUS
X D CORINEBACTERIUM
E CLOSTRIDIUM
- 519 TRA I TUMORI DELLA MIDOLLARE DEL SURRENE QUAL E' QUELLO CHE SI MANIFESTA CON MAGGIOR FREQUENZA:
A GANGLIONEUROBLASTOMA
B GANGLIONEUROMA
C SIMPATICOBLASTOMA
X D FEOCROMOCITOMA
E TUMORE CARCINOIDE
- 520 QUALE DELLE FORME MORBOSE SOTTOINDICATE NON E' DOVUTA AD UN DIFETTO DI TIPO RECETTORIALE:
A MIASTENIA GRAVIS
B MALATTIA DI GRAVES O DI FLAIAIANIJ-BASEDOW
X C MORBO DI ADDISON
D MALATTIE ALLERGICHE
E DISTROFIA MUSCOLARE
- 521 QUAL E' IL GRUPPO CHIMICO PRESENTE SULLA MOLECOLA DELL'ADRENALINA CHE DETERMINA LA SPECIFICITA' DI LEGAME CON I RECETTORI DI TIPO BETA:
A L'ANELLO FENOLICO DELL'AMINOACIDO TIROSINA
B UN GRUPPO IDROSSILICO
X C IL GRUPPO METILICO
D IL GRUPPO CARBOSSILICO
E UN GRUPPO AMINICO

- 522 UNA DELLE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI PATOLOGICHE DEL MORBO DI ADDISON E' LA IPERPIGMENTAZIONE CUTANEA E DELLE MUCOSE; QUESTO FENOMENO SI MANIFESTA:
A PERCHE' AUMENTA LA CONCENTRAZIONE DELL'ORMONE NORADRENALINA
X B PERCHE' AUMENTA LA CONCENTRAZIONE DELL'ORMONE CORTICOTROPO (ACTH)
C PERCHE' DIMINUISCE LA SINTESI E LA CONCENTRAZIONE DEGLI ORMONI CORTICO-STEROIDEI
D PERCHE' DIMINUISCE LA QUOTA DI CORTISOLO LIBERO IN CIRCOLO
E PERCHE' AUMENTA L'AFFINITA' DELL'ORMONE MELANOCITA STIMOLANTE AI MELANOCITI
- 523 IL COLESTEROLO E' IL SUBSTRATO NATURALE PER LA SINTESI DEGLI ORMONI STEROIDEI
X A STEROIDEI
B TIROIDEI
C CATECOLAMINE
D GONADOTROPINE
E PROSTAGLANDINE
- 524 QUALE DEGLI ORMONI SOTTOINDICATI NON ESPLICA IL PROPRIO EFFETTO ATTIVANDO L'ADENILATO CICLASI:
A TIREOTROPINA
B GLUCAGONE
X C INSULINA
D FOLLICOLOSTIMOLANTE
E CORTICOTROPO
- 525 LA CAUSA PIU' FREQUENTE DI INSUFFICIENZA CORTICO SURRENALE ACUTA, SINDROME DI WATERHOUSE-FRIDERICKSEN E':
A INFIAMMAZIONE ACUTA
B TUBERCOLOSI
C CARCINOMA
X D SETTICEMIE E/O EMORRAGIE
E ADENOMI
- 526 LA TIREOTOSSICOSI E L'ESOF TALMO NEL MORBO DI GRAVES SI ACCOMPAGNANO AL GOZZO, LA PATOGENESI DI QUESTA ALTERAZIONE TIROIDEA E' DA RIPORTARSI A:
A AUMENTO DELLA CONCENTRAZIONE DI ORMONE TIREOTROPO CIRCOLANTE
B AUMENTO DI ORMONI TIROIDEI CIRCOLANTI
C PRESENZA DI SOSTANZE TOSSICHE
X D PRESENZA DI AUTOANTICORPI
E ACCUMULO DI GRASSO NELLA GHIANDOLA
- 527 GLI ORMONI GLICOATTIVI CORTICOSSURRENALICI DETERMINANO L'EFFETTO SUL METABOLISMO GLICIDICO:
X A AUMENTANDO LA GLUCONEOGENESI
B AUMENTANDO LA DEGRADAZIONE DEL GLICOGENO
C DIMINUENDO LA GLICOGENO SINTESI
D DIMINUENDO IL CONSUMO DI GLUCOSIO
E INIBENDO LA SINTESI DI INSULINA
- 528 LE MODIFICAZIONI POST-TRASLAZIONALI DELLE PROTEINE SONO DIVERSE MA TUTTE IMPORTANTI PER LA FUNZIONE BIOLOGICA; LA TIREOGLOBULINA NELLA SUA MATURAZIONE SUBISCE UNA MODIFICAZIONE CHE NON E' RISCONTRABILE IN NESSUNA ALTRA PROTEINA
A GLICOSILAZIONE
B METILAZIONE
C FOSFORILAZIONE
X D IODINAZIONE
E SIALILAZIONE
- 529 UN FENOMENO GENERALE DELLA BIOLOGIA CELLULARE E' L'ENDOCITOSI; QUALE TRA LE FORME SOTTO ELENCA TE NON E' MEDIATA DA RECETTORI:
A MICROPINOCITOSI
X B PINOCITOSI
C PINOCITOSI FLUIDA
D PINOCITOSI SELETTIVA
E ENDOCITOSI RECETTOSOMA DIPENDENTE
- 530 QUALE ORMONE, TRA QUELLI INDICATI, E' UNA PROTEINA SEMPLICE:
X A SOMATOTROPO
B TIREOTROPO
C FOLLICOLO STIMOLANTE
D LUTEINIZZANTE
E GONADOTROPINA CORIONICA
- 531 IL 17-IDROSSI PROGESTERONE E' UN PRECURSORE DELL'ORMONE
A ALDOSTERONE
X B CORTISOLO
C PROGESTERONE
D DEIDRO EPIANDROSTENEDIONE
E DESOSSICORTICOSTERONE
- 532 IL "PEPTIDE VASOATTIVO INTESTINALE" = (VIP) HA UN EFFETTO STIMOLANTE (RELEASING FACTOR) LA SINTESI E L'ESCREZIONE DELL'ORMONE:
A FOLLICOLOSTIMOLANTE
B LUTEINIZZANTE
C TIREOTROPO
X D PROLATTINA
E CORTICOTROPO

- 533 L'ORMONE CORTICOTROPO E' UNA PROTEINA DI 39 AMINO ACIDI (AA); L'ATTIVITA' BIOLOGICA DI QUESTA PROTEINA E' LEGATA ALLA PRESENZA DI UNA SPECIFICA SEQUENZA AMINOACIDICA CHE RICONOSCE E SI LEGA AL RECETTORE SULLA CORTICALE DEL SURRENE; QUALE TRA QUESTE SOTTOINDICATE E' LA SEQUENZA SPECIFICA:
- X A AA 1 - AA 14
B AA 15 - AA 20
C AA 16 - AA 19
D AA 20 - AA 33
E AA 34 - AA 39
- 534 GLI ORMONI TIROIDEI IN CIRCOLO SONO PRESENTI SOTTO UNA FORMA LIBERA E LEGATA A PROTEINE PLASMATICHE; A QUALE DI QUESTE PROTEINE SONO LEGATI GLI ORMONI TIROIDEI IN CIRCOLO:
- A TRANSFERRINA
B TIREOGLOBULINA
C GAMMAGLOBULINE
X D PRE-ALBUMINA
E FETUINA
- 535 IL PRECURSORE DELL'ANGIOTENSINA E':
- A LA RENINA
B L'ENZIMA CONVERTENTE
C LA CALICREINA
X D L'ANGIOTENSINOGENO
E IL BRADICHININOGENO
- 536 NELL'IPERCOLESTEROLEMIA ESSENZIALE SI OSSERVA GENE RALMENTE:
- A IPERGLICEMIA
B URICEMIA DIMINUITA
C IPERPOTASSIEMIA
X D ALTA INCIDENZA DI CORONAROPATIE
E LIPURIA
- 537 IL FAVISMO E' UN'ANEMIA EMOLITICA DOVUTA A CARENZA DI:
- X A GLUCOSIO-6-FOSFATO DEIDROGENASI
B PIRUVATO CHINASI
C TRIOSO-FOSFATO-ISOMERASI
D GLUCOSIO-6-FOSFATO ISOMERASI
E GLICERALDEIDE-3-FOSFATO DEIDROGENASI
- 538 IPERPROTIDEMIA SI PUO' RILEVARE IN UNA DI QUESTE CONDIZIONI:
- A USTIONI ESTESE
B CIRROSI EPATICA
C SINDROME NEFROSICA
X D PLASMOCITOMA
E TIREOTOSSICOSI
- 539 NELLA PRODUZIONE DELL'EDEMA QUALE DI QUESTE CONDIZIONI PATOLOGICHE E' IMPORTANTE:
- X A ALTERAZIONE DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA
B IPOCALCEMIA
C ALTERAZIONE DEL FATTORE XII DI HAGEMAN DELLA COAGULAZIONE
D AUMENTATA SINTESI DI LIPOPROTEINE
E IPERGAMMAGLOBULINEMIA MONOCLONALE
- 540 UN TRASUDATO SI DISTINGUE DA UN ESSUDATO PER:
- X A MAGGIOR CONTENUTO IN BRADICHININA
B MINOR CONTENUTO IN PROTEINE
C AUMENTO DELLA CONCENTRAZIONE DI ISTAMINA
D MAGGIORE ATTIVITA' CHEMIOTATTICA
E MAGGIOR CONTENUTO DI MUCOPOLISACCARIDI (REAZIONE DI RIVALTA POSITIVA)
- 541 LA IPERPOTASSIEMIA SI ACCOMPAGNA A:
- A AUMENTO DELLA GLICEMIA
B AUMENTO DELLA URICEMIA
C DIMINUZIONE DEL TASSO DI SIEROALBUMINA CIRCOLANTE
X D ALTERAZIONI DEL TRACCIATO ELETTROCARDIOGRAFICO
E LEUCOCITOSI
- 542 LO PSEUDOIPOPARATIROIDISMO E' UNA SINDROME DOVUTA A:
- A DIFETTO DI VITAMINA D
B DIFETTO DELL'ESCREZIONE DEI FOSFATI
X C DIFETTO DEL RIASSORBIMENTO RENALE DEL CALCIO
D AUMENTO DEL RIASSORBIMENTO RENALE DEI FOSFATI
E ALTERATA RISPOSTA OSSEA ALL'ORMONE
- 543 IL DIBETE INSIPIDO E' DOVUTO AD UN:
- A DIFETTO DI INSULINA
B ECCESSO DI GLUCAGONE
C ECCESSO DI OSSITOCINA
X D DIFETTO DI VASOPRESSINA
E DIFETTO DI ALDOSTERONE
- 544 L'IPERPLASIA CONGENITA DEL CORTICOSURRENE E' DOVUTA A DIFETTI CONGENITI DELLA SINTESI DI ENZIMI DEPUTATI ALLA SINTESI DEGLI ORMONI: IL DIFETTO DELLA SINTESI DI QUALE DI QUESTI ENZIMI NON E' COMPATIBILE CON LA VITA:
- A 11 IDROSSILASI
B 21 IDROSSILASI
X C DESMOLASI
D 17 IDROSSILASI
E 18 IDROSSISTEROIDO DEIDROGENASI

- 545 QUALE DI QUESTE CAUSE NON PROVOCA DEPLEZIONE DI SODIO:
A ECCESSIVA SUDORAZIONE
X B IPERALDOSTERONISMO
C VOMITO
D DIARREA
E IPOSURRENALISMO
- 546 L'ATTIVITA' BIOLOGICA DEL PARATORMONE A LIVELLO RENALE DETERMINA:
A AUMENTO DEL RIASSORBIMENTO DEL SODIO
B AUMENTO DEL RIASSORBIMENTO DEL CLORO
C AUMENTO DEL RIASSORBIMENTO DEI FOSFATI
X D AUMENTO DEL RIASSORBIMENTO DEL CALCIO
E AUMENTO DEL RIASSORBIMENTO DEL POTASSIO
- 547 L'ANGIOTENSINOGENO E' UN POLIPEPTIDE CHE REGOLA LA SINTESI DELL'ORMONE:
X A ALDOSTERONE
B TESTOSTERONE
C CORTISOLO
D CORTOCOSTERONE
E ESTROGENI
- 548 CARENZA DI VITAMINA K SI PUO' OSSERVARE IN TUTTE QUESTE CONDIZIONI AD ECCEZIONE DI UNA. QUALE?
A EPATOCOLANGITE
B FISTOLE BILIARI
C SINDROME DI MALASSORBIMENTO
X D IPERTENSIONE ARTERIOSA
E ITTERO DA OCCLUSIONE
- 549 LA PATOGENESI DELLE MUCOPOLISACCARIDOSI E' DA RIPORTARE A DIFETTI CONGENITI DELLA SINTESI DEGLI ENZIMI CHE VENGONO DEPOSITATI NEI LISOSOMI; SI RICONOSCE UNA TRASMISSIONE EREDITARIA DI TIPO AUTOSOMICA RECESSIVA PER TUTTE LE FORME CONOSCIUTE ESCLUSA UNA. LA TRASMISSIONE DI QUALE DELLE FORME SOTTOELENATE E' LEGATA AL CROMOSOMA X:
A SINDROME DI SANFILIPPO (TIPO III B) (EPARANSOLFATASI)
B SINDROME DI HURLER (TIPO I) (ALFA IDURONIDASI)
X C SINDROME DI HUNTER (TIPO II) (IDURONATOSOLFATASI)
D SINDROME DI SLY (TIPO VII) (BETA GLUCORANIDASI)
E SINDROME DI MORQUIO (TIPO IV B) (BETA GALATTOSIDASI)
- 550 LA REGOLAZIONE DEI LIVELLI DI CAMP CITOPLASMATICI SONO REGOLATI, OLTRE CHE DALL'ENZIMA ADENILATO-CI CLASI, DA QUALE ALTRO ENZIMA:
A PROTEINE.CHINASI
B FOSFATASI
C GLICOGENOSINTETASI
D FOSFORILASI
X E FOSFODIESTERASI
- 551 IL DEFICIT DI CERULOPLASMINA (MORBO DI WILSON) E' CARATTERIZZATO DA:
A ANEMIA E PIASTRINOPENIA
X B DEFICIT NEUROLOGICI, CIRROSI EPATICA, INFILTRATO CORNEALE
C ANEMIA, GLOSSITE ATROFICA, SINDROME TABETIFORME
D EDEMA, ATROFIA INTESTINALE, ALTERAZIONI NEUROLOGICHE E PSICOMATICHE
E ITTERO, ALTERAZIONI NEUROLOGICHE
- 552 I LIVELLI NORMALI DI BILIRUBINA NEL SANGUE SONO:
A 0.1 MG/DL
X B 1.0 MG/DL
C 10.0 MG/DL
D 100.0 MG/DL
E 500.0 MG/DL
- 553 QUALE DI QUESTE SINDROMI NON E' CARATTERIZZATA DA ITTERO:
A SINDROME DI CRIGLER-NAJJAR
B SINDROME DI GILBERT
C SINDROME DI DUBIN-JOHNSON
X D SINDROME DI WILSON
E SINDROME DI ROTOR
- 554 LA SINDROME DI CRIGLER-NAJJAR E' DOVUTA A:
X A UN DEFICIT EREDITARIO DI GLICURONAZIONE DELLA BILIRUBINA
B UN DEFICIT EREDITARIO DELLE PROTEINE VETTRICI DELLA BILIRUBINA
C UN'ALTERAZIONE DELL'ESCREZIONE DELLA BILIRUBINA
D IPEREMOLISI
E CALCOLOSI BILIARE
- 555 QUALE SOSTANZA VIENE RITENUTA LA CAUSA PIU' PROBABILE DEL COMA EPATICO:
A GLUCOSIO
B UREA
X C AMMONIACA
D BILIRUBINA
E ACIDO URICO

- 556 LA SINDROME DI ZOLLINGER-ELLISON E' DOVUTA A UNA IPERPRODUZIONE DI:
X A GASTRINA
B CORTICOSTERONE
C ALDOSTERONE
D COLECISTOCHININA
E BILIRUBINA
- 557 PER QUALE DI QUESTE MALATTIE E' STATA RISCONTRATA UNA CHIARA ASSOCIAZIONE CON ANTIGENI DEL SISTEMA HLA:
A SPRUE TROPICALE
X B MORBO CELIACO
C MORBO DI WILSON
D CIRROSI EPATICA
E MORBO DI WHIPPLE
- 558 LO SVILUPPO E LA FUNZIONE DELLE CELLULE DI LEYDIG E' REGOLATO DA:
A GONADOTROPINA FSH
B PROLATTINA
X C GONADOTROPINA LH
D SOMATOTROPO
E ACTH
- 559 LA SINDROME DI KLINEFELTER E' UN:
X A IPOGONADISMO PRIMITIVO
B IPOGONADISMO SECONDARIO
C SINDROME DA OSTRUZIONE
D IPOSURENALISMO
E SINDROME DA CARENZA DI TESTOSTERONE
- 560 LA VITAMINA A E' ESSENZIALE NEL:
X A MECCANISMO DELLA VISIONE
B DEGRADAZIONE DEL GLUCOSIO
C SINTESI DEGLI ACIDI GRASSI
D ATTIVITA' DELLA POMPA DEL SODIO
E TRASPORTO DEGLI AMINOACIDI
- 561 IL MECCANISMO D'AZIONE DELLA VITAMINA K A LIVELLO DEI FATTORI DELLA COAGULAZIONE VITAMINA K-DIPENDENTE CONSISTE IN:
A IDROSSILAZIONE DELLA FENILALANINA
B METILAZIONE
C ADP-RIBOSILAZIONE
X D GAMMA-CARBOSSILAZIONE DELL'ACIDO GLUTAMMICO
E ACETILAZIONE
- 562 LA CORTECCIA SURRENALE PRODUCE:
A ALDOSTERONE NELLA ZONA RETICOLARE
B STEROIDI ANDROGENI NELLA ZONA GLOMERULARE
C ANGIOTENSINA NELLA ZONA GLOMERULARE
X D CORTISOLO NELLA ZONA FASCICOLATA
E NESSUNA DELLE PRECEDENTI
- 563 LA SINDROME DI KLINEFELTER E' CARATTERIZZATA DA:
X A CARIOGRAMMA ANORMALE
B AGENESIA DEI DEFERENTI
C CARDIOPATIA CONGENITA
D ALTERAZIONI DELLE GONADOTROPINE
E ALTERAZIONI DEL TESTOSTERONE
- 564 QUALE FATTORE REGOLA L'INCREZIONE DEL PARATORMONE:
A FOSFATURIA
B CALCIURIA
C MAGNESIEMIA
X D CALCEMIA
E FOSFOREMIA
- 565 I RECETTORI DEGLI ORMONI GLICOPROTEICI, PRESENTI SULLE MEMBRANE CELLULARI DEGLI ORGANI BERSAGLIO, SONO STRUTTURE COMPLESSE FORMATE DA PIU' DI UN COMPONENTE LA MEMBRANA CELLULARE: TRA LE SOSTANZE SOTTOELENCATE QUALE ENTRA A FAR PARTE DEI RECETTORI:
A COLESTEROLO
B GLICOGENO
X C GANGLIOSIDI
D MUCOPOLISACCARIDI
E COLLAGENO
- 566 IN UN FRAMMENTO DI DNA E' CONTENUTO UN GENE BATTE RICO COMPLETO DI SEGNALI DI INIZIO E TERMINE DELLA TRASCRIZIONE. VOLENDO TRASCRIVERLO IN VITRO PER ANALIZZARE IL MESSAGGERO, QUALE DELLE SEGUENTI MISCELE, CONTENENTI NUCLEOTIDI RADIOATTIVI, VI PARE LA PIU' ADATTA?
A DNA STAMPO, APOENZIMA DELLA RNA POLIMERASI, NTP-GAMMA-P 32
B DNA STAMPO, OLOENZIMA DELLA RNA POLIMERASI, NTP-GAMMA-P 32
C DNA STAMPO, APOENZIMA DELLA RNA POLIMERASI, NTP-ALFA-P 32
X D DNA STAMPO, OLOENZIMA DELLA RNA POLIMERASI, NTP-ALFA-P 32
E DNA STAMPO, OLOENZIMA DELLA RNA POLIMERASI, NTP-ALFA-P 32, UN DONATORE DI ENERGIA COME L'ATP
- 567 INDICARE QUALE, FRA GLI ELEMENTI GENETICI ELENCATI NON PUO' ESSERE DEFINITO UN REPLICONE.
A FATTORI DI CONIUGAZIONE
B BATTERIOFAGI
X C TRASPOSONI
D PLASMIDI RICOMBINANTI
E CROMOSOMA BATTERICO

- 568 VIENE SCOPERTO UN OPERONE BIOSINTETICO CHE PRODUCE UN NUOVO AMINOACIDO REGOLATO DA UN GENE CHE CODIFICA PER UNA PROTEINA. LE MUTAZIONI DEL GENE REGOLATORE DANNO ORIGINE A MUTANTI AUXOTROFI PER L'AMINOACIDO. SE NE DEDUCE CHE IL TIPO DI CONTROLLO E':
- A METABOLICO
 - B NEGATIVO
 - X C POSITIVO
 - D TRADUZIONALE
 - E POST TRADUZIONALE
- 569 QUALE PERCENTUALE DELLE PROTEINE MITOCONDRIALI E' CODIFICATA DAL GENOMA MITOCONDRIALE?
- A 100% CIRCA
 - B 80% CIRCA
 - C 50% CIRCA
 - X D 10% CIRCA
 - E 0% CIRCA
- 570 LA 35 S-METIONINA, IL 3 H-MANNOSIO, LA 14 C-PROLINA, LA 3 H-TIMIDINA E LA 3 H-URIDINA SONO MOLECOLE CHE POSSONO ESSERE CONVENIENTEMENTE USATE PER MARCARE, RISPETTIVAMENTE:
- X A PROTEINE, GLICOPROTEINE, COLLAGENE, DNA, RNA
 - B GLICOPROTEINE, COLLAGENE, PROTEINE, RNA, DNA
 - C PROTEINE, GLICOPROTEINE, RNA, DNA, COLLAGENE
 - D PROTEINE, RNA, COLLAGENE, DNA, GLICOPROTEINE
 - E DNA, GLICOPROTEINE, PROTEINE, RNA, COLLAGENE
- 571 INDICARE QUALE FRA I SEGUENTI AMINOACIDI PUO' FUNGERE DA DONATORE DI GRUPPI METILICI:
- A AC. ASPARTICO
 - B VALINA
 - C PROLINA
 - X D METIONINA
 - E AC. GLUTAMMICO
- 572 DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI: 1) UNA MUTAZIONE IN UN SEGNALE GENETICO NON E' COMPLEMENTABILE ED E' QUINDI DOMINANTE. 2) UNA MUTAZIONE NEL CISTRONE DI UNA PROTEINA E' COMPLEMENTABILE ED E' QUINDI RECESSIVA. 3) LE MUTAZIONI NEI SEGNALE GENETICI SONO DOMINANTI SOLO IN CIS.
- A SOLO LA 1 E LA 2 SONO ESATTE
 - B SOLO LA 2 E LA 3 SONO ESATTE
 - C SOLO LA 1 E LA 3 SONO ESATTE
 - X D TUTTE SONO ESATTE
 - E NESSUNA E' ESATTA
- 573 INDICARE QUALE FRA LE SEGUENTI PROTEINE MITOCONDRIALI E' LOCALIZZATA SULLA MEMBRANA INTERNA DEI MITOCONDRI:
- A MALATO DEIDROGENASI
 - B ACETILCOA SINTETASI
 - X C ATPASI F1
 - D CITRATO SINTETASI
 - E OSSALSUCCINATO DEIDROGENASI
- 574 QUALI DELLE SEGUENTI MOLECOLE NON E' PRESENTE NEI CLOROPLASTI?
- A FICOCIANINA
 - B CLOROFILLA
 - C CAROTENOIDI
 - X D CERULOPLASMINA
 - E XANTOFILLA
- 575 IL NUMERO DIPLOIDE DEI CROMOSOMI NELL'UOMO E':
- A 24
 - B 48
 - X C 46
 - D 23
 - E 30
- 576 DI QUALI DEI SEGUENTI TUMORI DEL TESTICOLO L'AFP RAPPRESENTA IL MARKER TUMORALE PER ECCELLENZA?
- A SEMINOMA PURO
 - X B TUMORE DEL SENO ENDODERMICO
 - C TUMORE A CELLULE DI SERTOLI
 - D TUMORE A CELLULE INTERSTIZIALI DI LEIDING
 - E ANDROBLASTOMA
- 577 I POLIPEPTIDI:
- A SONO POLIMERI DEL GLUCOSIO O DI ALTRI ESOSI
 - B SONO POLIMERI DI BASI AZOTATE
 - C SONO COMPOSTI FORMATI DA 4-5 AMINOACIDI
 - X D SONO LUNGHE CATENE DI AMINOACIDI
 - E SONO MACROMOLECOLE COMPLESSE CON FUNZIONI DI SOSTEGNO O DI RISERVA
- 578 IL NUMERO DIPLOIDE DI CROMOSOMI DI UN DATO ORGANISMO E' 12. IN UN ORGANISMO TRIPLOIDE DELLA STESSA SPECIE, IL NUMERO DI CROMOSOMI E':
- A 13
 - B 36
 - C 7
 - X D 18
 - E 64

579 UNA DONNA CON VISIONE NORMALE, IL CUI PADRE ERA DAL TONICO (ROSSO-VERDE), SPOSA UN UOMO A VISIONE NORMALE. QUAL E' LA PROPORZIONE TEORICA DI FIGLI MASCHI NON DALTONICI?

A 3/4
B 1/4
X C 1/2
D 1/8
E 2/3

580 UNA DONNA DALTONICA (ROSSO-VERDE) SPOSA UN UOMO A VISIONE NORMALE. QUAL E' LA PERCENTUALE DI FIGLIE FEMMINE DALTONICHE?

X A 0%
B 25%
C 1%
D 50%
E 75%

581 LA FENILCHETONURIA E' DOVUTA ALLA DEFICIENTE ATTIVITA' DI UNO DEI SEGUENTI ENZIMI:

A TIROSINA-IDROSSILASI
B TIROSINA-DECARBOSSILASI
C OMOGENTISINICO-OSSIGENASI
D ALANINA AMINOTRANSFERASI
X E FENILALANINA-IDROSSILASI

582 CONSIDERIAMO DUE GENI NON ASSOCIATI A E B. DALL'IN CROCIO TRA UN INDIVIDUO CON GENOTIPO AaBb ED UN INDIVIDUO AaBb NASCONO FIGLI CON FENOTIPO:

A Ab 10%, AB 40%, ab 40%, aB 10%
B AB 50%, ab 50%
X C Ab 25%, AB 25%, ab 25%, aB 25%
D 9/16 Ab, 3/16 AB, 3/16 ab, 9/16 aB
E 1/4 A, 1/4 a, 1/4 B, 1/4 b

583 LA TRASDUZIONE E':

X A LA TRASMISSIONE DI MATERIALE GENETICO DA UN BATTERIO AD UN ALTRO, MEDIATA DA VIRUS
B LA FUSIONE DI DUE CROMOSOMI
C IL TRASFERIMENTO DI UNA PARTE DI UN CROMOSOMA AD UN ALTRO
D IL TRASFERIMENTO DI MATERIALE GENETICO DIRETTAMENTE DA UN BATTERIO ALL' ALTRO
E IL PRODOTTO DELLA RICOMBINAZIONE GENETICA

584 PER AUTOSOMI SI INTENDONO CROMOSOMI:

A GIGANTI
B METACENTRICI
C TELOCENTRICI
D AD ANELLO
X E CHE NON SONO ETEROCROMOSOMI

585 IN UNA SPECIE DIPLOIDE A 40 CROMOSOMI, QUANTI CROMOSOMI SESSUALI SI TROVANO NELL'UOVO?

X A 1
B 2
C 20
D 19
E 40

586 LO "SPLICING" DELL'RNA CONSISTE IN:

A AGGIUNTA DI POLI-A
X B ELIMINAZIONE DELLE SEQUENZE INTERVALLANTI (IVS)
C MODIFICAZIONE POST-TRASCRIZIONALE DI ALCUNE BASI
D DEGRADAZIONE AD OPERA DI RIBONUCLEASI
E SINTESI AD OPERA DI RNA-POLIMERASI

587 QUALE DELLE SEGUENTI NON E' UNA MUTAZIONE CROMOSOMICA:

A INVERSIONE
B SHIFT
C DELEZIONE
X D TRANSIZIONE
E FUSIONE

588 PER "POLIMORFISMO BILANCIATO" SI INTENDE:

A LA COSTANZA DELLE FREQUENZE GENICHE DA GENERAZIONE A GENERAZIONE
B LA PRESENZA DI FORME ALLERGICHE MULTIPLE DI UN GENE, AVENTI TUTTE LA STESSA FREQUENZA
X C UNA CONDIZIONE DI POLIMORFISMO MANTENUTA ATTRAVERSO UN VANTAGGIO SELETTIVO PER L'ETEROZIGOTE
D LA PRESENZA DI CROMOSOMI ANOMALI DERIVATI DA UNA TRASLOCAZIONE RECIPROCA BILANCIATA
E LA PRESENZA DI CARATTERI POLIGENICI, IN CUI CIASCUN GENE CONTRIBUISCE AL CARATTERE IN MANIERA UGUALE

589 QUALE DELLE SEGUENTI NON E' UN'ANOMALIA CROMOSOMICA:

A SINDROME DI EDWARDS
B SINDROME DI PATAN
C SINDROME DI DOWN
D SINDROME DEL "PIANTO DI GATTO"
X E SINDROME DI SJOGREN

590 LA COSIDDETTA "LEGGE DELLA OMOGENEITA' DEL FENOTIPO DI PRIMA GENERAZIONE" CORRISPONDE ALLA:

A LEGGE DI MAIDY-WEINBERG
X B 1 LEGGE DI MENDEL
C 2 LEGGE DI MENDEL
D 3 LEGGE DI MENDEL
E NESSUNA DELLE PRECEDENTI

- 591 QUAL E' LA FASE FINALE DELL'INFIAMMAZIONE ACUTA SE CONDO LA SEQUENZA DESCRITTA DA ROBBINS:
X A DIAPEDESI DEI LEUCOCITI
B AUMENTO DELLA PERMEABILITA' CAPILLARE E VENULARE
C CONCENTRAZIONE EMATICA
D STASI EMATICA
E VASODILATAZIONE CAPILLARE
- 592 QUALE DEFICIT IMMUNOLOGICO SI ACCOMPAGNA A MALFORMAZIONI FACCIALI:
A DISGENIA RETICOLARE
B SINDROME DI WISKOTT-ALDRICH
C AGAMMAGLOBULINEMIA DI TIPO SVIZZERO
X D SINDROME DI DE GEORGE
E MORBO DI BRUTON
- 593 QUALE FRA I SEGUENTI AGENTI PATOGENI PUO' SFUGGIRE ALLE RISPOSTE IMMUNITARIE MEDIANTE IL FENOMENO DELLA "MIMETIZZAZIONE ANTIGENICA":
A TRIPANOSOMA
B PLASMODIO DELLA MALARIA
X C SCHISTOSOMA
D TOXOPLASMA
E VIRUS DELL'INFLUENZA
- 594 SI DEFINISCE TRADUZIONE:
A IL PROCESSO DI TRASPORTO ATTIVO DELLE SOSTANZE ATTRAVERSO LA MEMBRANA
B LA REPLICAZIONE SEMICONSERVATIVA DEL DNA
C IL TRASPORTO DEGLI AMINOACIDI DA PARTE DEL TRNA
D IL PASSAGGIO DAL LINGUAGGIO DEL DNA AL LINGUAGGIO DELL'RNA
X E FORMAZIONE DI UN POLIPEPTIDE A PARTIRE DA MRNA
- 595 QUANTI AMINOACIDI VERRANNO INCORPORATI IN UNA PROTEINA IN BASE ALLA LETTURA DI QUESTO RNA DA SINISTRA A DESTRA? AUGAUGAAUAAUUAGUUUAAAAUAGG
A NESSUNO
X B 9
C 6
D 27
E 8
- 596 I PROCARIOTI SONO:
A ORGANISMI PRIMITIVI, CAPACI DI METABOLIZZARE MA NON DI RIPRODURSI
B ORGANISMI UNICELLULARI, PROTOZOI E PROTOFITI
X C ORGANISMI PRIVI DI ORGANELLI INTERNI DELIMITATI DA MEMBRANE, QUALI ALGHE AZZURRE E BATTERI
D CELLULE RIPRODUTTIVE DI ORGANISMI A RIPRODUZIONE AGAMICA
E FORME INTERMEDIE TRA VIVENTI E NON VIVENTI, QUALI I VIRUS
- 597 QUALE DEI SEGUENTI MARKERS DEI TUMORI EPITELIALI DELL'OVAIO E' PIU' FREQUENTEMENTE ASSOCIATO AL CISTOADENOCARCINOMA SIEROSO?
A IL CEA
X B IL CA-125
C IL CA-19,9
D IL CA-50
E L'ISOENZIMA DI REGAN
- 598 QUALE TRA LE SEGUENTI TECNICHE NON PUO' ESSERE UTILIZZATA PER LO STUDIO DI CELLULE VIVE?
X A MICROSCOPIA ELETTRONICA
B MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA
C MICROSCOPIA IN CONTRASTO DI FASE
D MICROSCOPIA IN CAMPO OSCURO
E CITOFUOROGRAFIA
- 599 L'ALLUNGAMENTO E L'ACCORCIAMENTO DEI MICROVILLI SULLA SUPERFICIE DELLE CELLULE CHE NE SONO PROVVISI E' DOVUTO A:
A RAPIDI FLUSSI DI MATRICE CITOPLASMATICA
B TRANSIZIONE GEL/SOL LOCALIZZATA ALLA PERIFERIA DELLA CELLULA
X C POLIMERIZZAZIONE/DEPOLIMERIZZAZIONE DI ACTINA
D FORMAZIONE/SCISSIONE DEL LEGAME MICROVILLINA-TUBULINA
E SCISSIONE DI ATP OPERATA DALLA DINEINA
- 600 L'ENF E' UN ENZIMA GLICOLITICO I CUI LIVELLI SIERICI AUMENTANO SOPRATTUTTO:
A NELL'ADENOCARCINOMA DEL COLON
X B NEL NEUROBLASTOMA
C NEL PAPILLOMA VESCICALE
D NEL CARCINOMA DEL TESTICOLO AD ELEMENTI DERIVANTI DAL SACCO VITELLINO
E NEL CANCRO DELLO STOMACO
- 601 I PORI NUCLEARI SONO STRUTTURE CHE: 1) CONSENTONO I PASSAGGI DI MACROMOLECOLE DAL CITOPLASMA ALLO SPAZIO PERINUCLEARE E VICEVERSA; 2) CONSENTONO I PASSAGGI DI MACROMOLECOLE DAL NUCLEOPLASMA ALLO SPAZIO PERINUCLEARE E VICEVERSA; 3) CONSENTONO ESCLUSIVAMENTE IL PASSAGGIO DI MACROMOLECOLE IN USCITA DAL NUCLEO.
A TUTTE LE AFFERMAZIONI SONO ESATTE
X B TUTTE LE AFFERMAZIONI SONO ERRATE
C SOLO LA 1 E' ESATTA
D SOLO LA 2 E' ESATTA
E SOLO LA 3 E' ESATTA

- 602 L'UROPORFIRINOGENO E' FORMATO DALL'UNIONE DI:
A 5 MOLECOLE DI PORFOBILINOGENO
X B 4 MOLECOLE DI PORFOBILINOGENO
C 3 MOLECOLE DI PORFOBILINOGENO
D 2 MOLECOLE DI PORFOBILINOGENO
E 1 MOLECOLA DI PORFOBILINOGENO A 1 ATOMO DI FE
- 603 LA REAZIONE DI PAUL-BUNNEL-DAVIDSON E' POSITIVA NELLA INFEZIONE DOVUTA A:
A TOXOPLASMA GONDII
B CYTOMEGALOVIRUS
X C VIRUS DI EPSTEIN-BARR
D VIRUS HERPES SIMPLEX
E OGNUNO DI QUESTI AGENTI PATOGENI
- 604 UNA MONONUCLEOSI INFETTIVA E' CLINICAMENTE SOSPETTIBILE QUANDO SI RILEVA FEBBRE CON:
A SPLENOMEGALIA
B ANGINA IN SOGGETTO GIOVANE NON SENSIBILE AGLI ANTI BIOTICI
C ESANTEMA
D ANGINA ASSOCIATA A LINFOADENOPATIA CERVICO-CRANIALE
X E TUTTI QUESTI SINTOMI ASSOCIATI
- 605 L'UROBILINURIA E' INTENSAMENTE POSITIVA:
A NEGLI ITTERI EMOLITICI
B NELLE EPATITI ACUTE SENZA STASI BILIARE
C NELLE EPATITI SUBACUTE SENZA STASI BILIARE
D NELLE CIRROSI EPATICHE
X E IN TUTTE QUESTE CONDIZIONI
- 606 IL CARCINOMA POLMONARE PUO' METASTATIZZARE IN DIVERSI ORGANI E TESSUTI. FRA QUESTI, QUELLO PIU' COLPITO E':
A OSSO
B SURRENE
C MILZA
D RENE
X E FEGATO
- 607 IL CICLO ERITROCITARIO DEL PLASMODIUM MALARIAE DURA:
A 12 ORE
B 24 ORE
C 36 ORE
D 48 ORE
X E 72 ORE
- 608 PARTICELLA SFEROIDALE CON GUSCIO ED UNA PARTE CENTRALE DETTA "CORE" (PARTICELLA DI DANE) SI RILEVA NEL SANGUE CIRCOLANTE DI:
A PORTATORE DI COLITE AMEBIASICA
B PORTATORE DI ANTIGENE DUZO
C PORTATORE DI VIRUS EPATITE A
X D PORTATORE DI VIRUS EPATITE B
E PORTATORE DI EPATITE NON A E NON B
- 609 IN QUALE DI QUESTE AFFEZIONI MORBOSE LA CONCENTRAZIONE GLOBULARE MEDIA DI HB E' DIMINUITA?
A PSEUDO-POLIGLOBULIA DA STRESS
B POLIGLOBULIA DA AFFEZIONI IN CUI NON E' DIMOSTRABILE L'IPERPRODUZIONE DI ERITROPOIETINA
C POLIGLOBULIA DA IPERPRODUZIONE PRIMITIVA DI ERITROPOIETINA
D POLIGLOBULIA DA IPOSSIA
X E POLICITEMIA VERA (M. DI VAQUEZ)
- 610 I PORTATORI SANI DI S. TYPHI SONO IDENTIFICABILI MEDIANTE:
X A COPROCULTURA
B EMOCOLTURA
C ES.COLTURALE DEL LIQUOR
D SIERODIAGNOSI DI WRIGHT
E DYE TEST
- 611 UNA BATTERIURIA HA SIGNIFICATO SICURAMENTE PATOLOGICO QUANDO I GERMI SONO PER ML DI URINA:
A 1.000-1.500
B 10.000-15.000
C 20.000-30.000
D 40.000-50.000
X E >100.000
- 612 LA PENETRAZIONE CELLULARE DEL GLUCOSIO E' CATALIZZATA DALL'INSULINA A LIVELLO:
X A DEL TESSUTO MUSCOLARE
B DELLE GHIANDOLE ESOCRINE
C DEL GLOBULO ROSSO
D DELLE CELLULE NERVOSE
E DI TUTTI QUESTI ELEMENTI
- 613 IL GIP (GASTRIC INHIBITOR POLYPEPTIDE) E' PRODOTTO A LIVELLO:
A COLECISTICO
B DELLO STOMACO
X C DUODENO-DIGIUNALE
D DEL COLON
E DEL PANCREAS

- 614 L'HABITAT PREFERENZIALE NELL'UOMO DEL VIRUS DELLA POLIOMIELITE E':
A NELL'ORO-FARINGE
B NELLO STOMACO
C NEL FEGATO
X D NELL'INTESTINO TENUE
E NEL PANCREAS
- 615 LA TOSSINA DIFTERICA E':
A TERMOSTABILE
B A STRUTTURA LIPIDICA
C NON DIFFUSIBILE
D DI PESO MOLECOLARE DI 5.000
X E CAPACE DI BLOCCARE LE SINTESI PROTEICHE CELLULARI A LIVELLO DI TRADUZIONE
- 616 NELLE SALMONELLOSI MINORI, CIOE' NON DOVUTE ALLA S. TYPHI ED A QUELLE PARATIFICHE, SINTOMO FRA QUESTI PRESSOCHE' COSTANTE E' LA:
X A DIARREA
B COPROSTASI
C ROSEOLA LENTICOLARE
D SPLENOMEGALIA
E NAUSEA
- 617 COMPLICANZA DELL'ANEMIA PERNICIOSA E':
A L'IPERTROFIA DELLE PLICHE DELLA MUCOSA GASTRICA
X B IL CARCINOMA GASTRICO
C LA GASTRITE IPERSECRETIVA IPERCLORIDICA
D L'ULCERA GASTRICA
E L'ULCERA DUODENALE
- 618 NELLE ANEMIE EMOLITICHE ACQUISITE DA ANTICORPI CALDI INCOMPLETI, QUESTI:
X A SONO DELLE IGG
B HANNO POTERE AGGLUTINANTE COMPLETO
C ESPLICANO MASSIMA ATTIVITA' A 30-32 GRADI C.
D HANNO SPECIFICITA' ANTI-I
E HANNO SPECIFICITA' ANTI-P
- 619 IL GLUCOSIO PUO' ATTRAVERSARE LIBERAMENTE LA MEMBRANA CELLULARE, CIOE' SENZA L'INTERVENTO DELL'INSULINA, A LIVELLO:
X A DELL'ENTEROCITA
B DEL TESSUTO MUSCOLARE
C DEL TESSUTO ADIPOSO
D DI TUTTI QUESTI TESSUTI
E DI NESSUNO DI QUESTI TESSUTI
- 620 UNA MOLECOLA DI IGM PUO' LEGARE FINO A:
A 20 MOLECOLE DI COMPLEMENTO
B 50 MOLECOLE DI COMPLEMENTO
C 100 MOLECOLE DI COMPLEMENTO
D 150 MOLECOLE DI COMPLEMENTO
X E 250 MOLECOLE DI COMPLEMENTO
- 621 QUALE DI QUESTI SINTOMI E' SEMPRE PRESENTE NELLE LEUCEMIE MIELOIDE CRONICHE?
X A SPLENOMEGALIA
B DOLENZA STERNALE ALLA PRESSIONE
C FEBBRE
D EPATOMEGALIA
E PRIAPISMO
- 622 LA NEFROPATIA GRAVIDICA, O GESTOSI, E' CARATTERIZZATA DA:
A ASSENZA DI EDEMI
X B IPERTENSIONE ARTERIOSA
C IPOURICEMIA
D FONDO OCULARE NORMALE
E EMATURIA SENZA PROTEINURIA
- 623 IL PROGESTERONE, IL PIU' ATTIVO DEGLI ORMONI CON AZIONE PROGESTATIVA, HA TUTTI QUESTI EFFETTI BIOLOGICI AD ESCLUSIONE DI UNO. QUALE?
A TRASFORMAZIONE SECRETIVA DELL'ENDOMETRIO
X B STIMOLAZIONE DELLA MOTILITA' UTERINA
C INIBIZIONE DELLA SECREZIONE CERVICALE IN FASE FOLLICOLINICA
D AZIONE IPERtermIZZANTE
E INDUCE PROLIFERAZIONE DEGLI ACINI MAMMARI
- 624 IL METABOLISMO GLUCIDICO NELL'INSUFFICIENZA CRONICA SURRENALICA E' CARATTERIZZATO DA:
A CURVA GLICEMICA DA CARICO ORALE DI GLUCOSIO DI TIPO DIABETICO
B CURVA GLICEMICA DA CARICO ENDOVENOSO DI GLUCOSIO NORMALE MA SENZA IPOGLICEMIA TERMINALE
C RISERVE DI GLICOGENO AUMENTATE
D GLICOSURIA POST-PRANDIALE
X E SPICCATO SENSIBILITA' ALL'INSULINA
- 625 LA BIOSINTESI DELLE CATECOLAMINE HA INIZIO DA QUESTO ELEMENTO:
X A TIROSINA
B FOSFOLIPIDI
C COLESTEROLO
D SQUAIENE
E PROGESTERONE

- 626 NEL LINFOMA DI HODGKIN SI RILEVA:
A ELEVATA POSITIVITA' DELLA REAZIONE CUTANEA ALL'ANTIGENE PAROTITICO RISPETTO AI CONTROLLI
B COMPROMISSIONE DELL'IMMUNITA' DI TIPO UMORALE
X C COMPROMISSIONE DELL'IMMUNITA' DI TIPO CELLULARE
D AUMENTATA REATTIVITA' CUTANEA DI TIPO RITARDATO AD ANTIGENI DIVERSI
E REATTIVITA' CUTANEA AD ANTIGENI DIVERSI TANTO MAGGIORE QUANTO PIU' ELEVATA E' LA DEPLEZIONE LINFOCITARIA
- 627 QUALE PARTE DEL CORTICOSURRENE E' STIMOLATA DALL'ANGIOTENSINA II?
A ZONA RETICOLARE
B ZONA FASCICOLATA
X C ZONA GLOMERULARE CORTICALE
D TUTTE QUESTE ZONE
E NESSUNA DI QUESTE ZONE
- 628 LA CARENZA DI 11-BETA-IDROSSILASI A LIVELLO CORTICO-SURRENALICO PROVOCA INSUFFICIENTE FORMAZIONE DI:
A PROGESTERONE
X B CORTISOLO
C DESOSSICORTISOLO
D DESOSSICORTICOSTERONE
E PREGNENOLONE
- 629 CALCEMIA E FOSFOREMIA DIMINUITE E FOSFATASI ALCALINA AUMENTATA SI RILEVANO ABITUALMENTE IN CORSO DI:
X A OSTEOMALACIA
B OSTEOPOROSI
C M. DI PAGET
D TUTTE QUESTE ALTERAZIONI OSSEE
E NESSUNA DI QUESTE ALTERAZIONI OSSEE
- 630 L'ECHINOCOCCO E':
X A UNA TENIA
B UN TRIPANOSOMA
C UN TRICHOMONAS
D UN PLASMODIO
E UNA LEISHMANIA
- 631 IL DIABETE PRE-CLINICO E' CARATTERIZZATO DA:
A TOLLERANZA GLUCIDICA NORMALE MA RIDOTTA SECREZIONE INSULINICA DA CARICO DI GLUCOSIO
X B GLICEMIA A DIGIUNO NORMALE MA PATOLOGICA DOPO IL PASTO E DOPO CARICO DI GLUCOSIO
C TOLLERANZA GLUCIDICA NORMALE DOPO CARICO DI GLUCOSIO MA ALTERATA AL TEST SENSIBILIZZATO AL CORTISONE
D GLICEMIA CON VALORI ELEVATI A DIGIUNO
E GRANDE FACILITA' A PASSARE DA IPERGLICEMIA CON CHETO-ACIDOSI A CRISI IPOGLICEMICA
- 632 QUALE DI QUESTE ALTERAZIONI UMORALI E' SEMPRE PRESENTE NEL RACHITISMO?
A IPOFOSFATASEMIA ALCALINA
B IPOCALCEMIA
C ANEMIA
X D IPOFOSFOREMIA
E LEUCOCITOSI
- 633 LA SIDEROCROMATOSI SECONDARIA E' DOVUTA A:
A DIFETTO DI CERULOPLASMINA
X B TRASFUSIONI RIPETUTE DI SANGUE
C EPATITE VIRALE ACUTA
D IPERINCREZIONE DI ERITROPOIETINA
E STILLICIDIO EMATICO
- 634 CALCEMIA AUMENTATA E FOSFOREMIA DIMINUITA CARATTERIZZANO UNA DI QUESTE CONDIZIONI MORBOSE:
X A IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO
B OSTEOPOROSI
C RACHITISMO
D OSTEOMALACIA
E M. OSSEA DI PAGET
- 635 PRODOTTO EXTRACELLULARE DELLO STREPTOCOCCO EMOLITICO NON DOTATO DI PROPRIETA' ANTIGENICA E' LA:
A STREPTOCHINASI
B TOSSINA ERITROGENICA
C STREPTOJALURONIDASI
D STREPTOLISINA O
X E STREPTOLISINA S
- 636 QUALE DI QUESTE EMOPATIE SI TRASFORMA CON RELATIVA FREQUENZA IN UN LINFOMA TIPO HODGKIN O NON HODGKIN
A LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA
X B LEUCEMIA LINFATICA CRONICA
C LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA LEUCOPENICA
D LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA BASOFILA
E LEUCEMIA ACUTA
- 637 LE BASI DEL DNA SONO COSTITUITE DA TUTTI QUESTI ELEMENTI AD ESCLUSIONE DI UNO, CHE E' CARATTERISTICO DELL'RNA. QUALE E' QUESTA BASE NON PRESENTE NEL DNA?
X A URACILE
B ADENINA
C GUANINA
D CITOSINA
E TIMINA

638 QUALE DI QUESTI REPERTI DI LABORATORIO E' COSTANTE NEL LINFOGRANULOMA DI HODGKIN?
 A LEUCOCITOSI
 B PIASTRINEMIA AUMENTATA
 C EOSINOFILIA
 D MONOCITOSI
 X E LINFOPENIA

639 LESIONI CUTANEE CARATTERIZZATE DA LESIONI NODULARI AD EVOLUZIONE ULCERATIVA SI RILEVANO IN CORSO DI:
 A TENIASI
 B ASCARIDOSI
 X C SPOROTRICOSI
 D ESCHINOCOCCOSI
 E TUTTE QUESTE PARASSITOSI

640 MALATTIA AUTOSOMICA RECESSIVA:
 A LA PORFIRIA ACUTA INTERMITTENTE
 B LA DISTROFIA MIOTONICA
 X C LA SINDROME ADRENO-GENITALE
 D L'EMOCROMATOSI
 E IL RENE POLICISTICO

641 IN QUALE DI QUESTI ELEMENTI DELLA SERIE ERITROBLASTICA IL NUCLEO CONTIENE DUE-TRE NUCLEOLI?
 A ERITROBLASTO BASOFILO
 B ERITROBLASTO POLICROMATICO
 C ERITROBLASTO ORTOCROMATICO
 X D PROERITROBLASTO
 E RETICULOCITO

642 IL VIBRIONE DEL COLERA, PENETRATO PER VIA ORALE:
 A ADERISCE TENACEMENTE ALLE CELLULE DI RIVESTIMENTO DEL TENUE
 B PASSA ATTRAVERSO LA MUCOSA INTESTINALE
 X C SI MOLTIPLICA NEL DIGIUNO
 D PASSA DALLA MUCOSA ENTERICA NEL CIRCOLO GENERALE NELLA FASE PRECOCE DELLA MALATTIA
 E REALIZZA TUTTI QUESTI MECCANISMI

643 IPOCALCEMIA ABITUALMENTE SI RILEVA IN CORSO DI:
 X A SINDROME DA MALASSORBIMENTO
 B IPERPARATIROIDISMO
 C MIELOMA MULTIPLO
 D SARCOIDOSI
 E IPERVITAMINOSI D

644 NELLE FASI INIZIALI DELLA CIRROSI EPATICA IL FEGATO RISULTA MOLTO SPESSO:
 X A AUMENTATO DI VOLUME E DI PESO
 B DIMINUITO DI VOLUME E DI PESO
 C DI VOLUME E DI PESO NORMALE
 D DI CONSISTENZA DIMINUITA
 E PTOSICO

645 L'ERISIPELA E' UNA INFEZIONE CUTANEA DOVUTA A:
 A ACTINOMICETI
 X B STREPTOCOCCO BETA-EMOLITICO
 C SALMONELLA TYPHI
 D BRUCELLA ABORTUS
 E BRUCELLA MELITENSIS

646 QUALE DI QUESTI ELEMENTI DELLA SERIE MIELOIDE RISULTA PRIVO DI GRANULAZIONI CITOPLASMATICHE?
 A PROMIELOCITO
 B MIELOCITO
 C METAMIELOCITO
 D MIELOBLASTO
 X E EMOCITOBlasto

647 L'INSORGENZA DI FEBBRE CON MANIFESTAZIONI DI HERPES LABIALIS E' RARA IN TUTTE QUESTE AFFEZIONI MORBOSE AD ESCLUSIONE DI UNA, NELLA QUALE E' FREQUENTE. QUAL E' QUESTA AFFEZIONE?
 X A POLMONITE DA PNEUMOCOCCO
 B TUBERCOLOSI POLMONARE
 C BRUCELLOSI
 D TIFO ADDOMINALE
 E POLMONITE DA MYCOPLASMA

648 NELLA POLMONITE DA MYCOPLASMA PNEUMONIAE SI RILEVA:
 X A OPACITA' RADIOLOGICA POLMONARE DISOMOGENEA E SFUMATA
 B DIMINUZIONE COSTANTE DELLE EMOAGGLUTININE DA FREDDO
 C LEUCOCITOSI
 D LINFOPENIA RELATIVA ED ASSOLUTA
 E VES NORMALE

649 ULCERE INTESTINALI A <<BOTTONI DI CAMICIA>> SI RILEVANO IN CORSO DI:
 X A AMEBIASI
 B FEBBRE TIFOIDE
 C COLERA
 D COLITE ULCEROSA
 E NESSUNA DI QUESTE

650 NELL'IPOTIROIDISMO IPOFISARIO E' DI NOTEVOLE IMPORTANZA DIAGNOSTICA IL REPERTO DI:
 A CARDIOMEGALIA
 B MACROGLOSSIA
 C GOZZO
 D IPERTRICOSI
 X E ASSENZA DI TSHEMIA AL TEST DI STIMOLAZIONE CON TRH

- 651 LA SOGLIA RENALE PER IL GLUCOSIO E' DI NORMA PER LA GLICEMIA, UN TASSO EMATICO DI:
X A MG 170-180
B MG 140-150
C MG 130-140
D MG 125-130
E MG 115-125
- 652 I VALORI NORMALI DELLA FOSFATASI ACIDA PROSTATICA SIERICA DOSATA CON METODO RADIOIMMUNOLOGICO SONO COMPRESI TRA:
A 0,8-7 NG/ML
B 4-10 NG/ML
C 15-25 NG/ML
X D 0,4-4 NG/ML
E 0,5-8 NG/ML
- 653 LA INFESTAZIONE DA GIARDIA LAMBLIA SI APPALESA CON I SINTOMI DI:
A ULCERA GASTRICA
B ULCERA DUODENALE
C COLITE ULCEROSA
X D DUODENO-DIGIUNITE CRONICA
E IPERORESSIA
- 654 NELLA LEISHMANIOSI VISCERALE IL QUADRO CLINICO E' CARATTERIZZATO DA:
X A SPLENOMEGALIA
B IPERGLOBULIA
C LEUCOCITOSI NEUTROFILA
D PIASTRINOSI
E TUTTI QUESTI SINTOMI
- 655 NEI SOGGETTI AFFETTI DA LEUCEMIA LINFATICA CRONICA SI RILEVA:
A AUMENTO FREQUENTE DELLE IGE
B COSTANTE AUMENTO DI TUTTE LE IMMUNOGLOBULINE SIERICHE
X C PROLIFERAZIONE DELLE CELLULE LINFATICHE B
D COSTANTE AUMENTO RELATIVO DEI LINFOCITI T
E DIMINUZIONE DELLA CUPREMIA
- 656 QUALE DI QUESTE LEUCEMIE PRESENTA UNA SPICCATA TENDENZA ALLA COAGULAZIONE INTRAVASCOLARE DISSEMINATA?
X A LEUCEMIA PROMIELOCITICA ACUTA
B LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA LEUCOPENICA
C LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA EOSINOFILA
D LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA
E LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA
- 657 QUALE DI QUESTI GERMI E' GRAM-NEGATIVO?
A CLOSTRIDIO BOTULINICO
X B DIPLOCOCCO DI NEISSER
C STREPTOCOCCO
D STAFILOCOCCO
E MICOBATTERIO DELLA TUBERCOLOSI
- 658 IN QUALE DI QUESTE ENDOCRINOPATIE SI PUO' RILEVARE UNA SINDROME DA MALASSORBIMENTO?
A DIABETE MELLITO
B IPOPARATIROIDISMO
C TIREOTOSSICOSI
D INSUFFICIENZA SURRENALICA
X E TUTTE QUESTE ENDOCRINOPATIE
- 659 L'ANGIOTENSINA II:
A INIBISCE LA SINTESI DI NORADRENALINA A LIVELLO DEI GANGLI SIMPATICI
X B STIMOLA LA PRODUZIONE DI CATECOLAMINE DAL SURRENE
C DIMINUISCE LA LIBERAZIONE DI CATECOLAMINE A LIVELLO DELLE TERMINAZIONI SIMPATICHE
D ACCENTUA LA RICAPTAZIONE A LIVELLO DELLE TERMINAZIONI SIMPATICHE DELLE CATECOLAMINE LIBERATE
E HA EFFETTO INIBENTE DIRETTO SUI NEURONI DELL'AREA POSTREMA DEL BULBO
- 660 AUTOANTICORPI LIBERI NEL SIERO IN CORSO DI ANEMIE EMOLITICHE AUTOIMMUNI SONO DIMOSTRABILI MEDIANTE:
A TEST DI COOMBS DIRETTO
X B TEST DI COOMBS INDIRETTO
C TEST DEL ROSSO CONGO
D REAZIONE DI FLOCCULAZIONE DI CITOCOL
E TEST AL PREDNISOLONE DI LITTLE E KATZ
- 661 LA VITA MEDIA DELLE EMAZIE E' NORMALMENTE DI:
X A 120 GIORNI
B 60 GIORNI
C 30 GIORNI
D 15 GIORNI
E 7 GIORNI
- 662 QUALE DEI SEGUENTI MARKERS TUMORALI CONVIENE ASSOCIARE ALLA PAP PER LA DIAGNOSI ED IL MONITORAGGIO DEL CANCRO DELLA PROSTATA?
A IL CEA
B IL GICA
C L'AFP
X D IL PSA
E L'NSE

- 663 L'ANTIGENE HBS AG NELLA MAGGIORANZA DEI PAZIENTI
AFFETTI DA EPATITE VIRALE:
A COMPARE NEL SIERO DURANTE IL PERIODO DI INCUBAZIONE
DELL'INFEZIONE ACUTA
B PERSISTE PER TUTTA LA DURATA DELLA MALATTIA
C SCOMPARE ABITUALMENTE DAL CIRCOLO NELLA CONVALESCENZA
D NON SI COMPORTA SECONDO QUESTE CARATTERISTICHE
X E SI COMPORTA SECONDO QUESTE CARATTERISTICHE
- 664 IL PERIODO DI INCUBAZIONE DELL'EPATITE DA VIRUS B
E' GENERALMENTE DI:
X A 150-180 GIORNI
B 80-100 GIORNI
C 60-80 GIORNI
D 40-60 GIORNI
E 20-40 GIORNI
- 665 LA CALCITONINA:
A HA STRUTTURA STEROIDEA
B E' SECRETA IN NOTEVOLE QUANTITA' NELLE IPOCALCEMIE
X C RIDUCE LA CONCENTRAZIONE DI CA++ NEI FLUIDI EXTRACELLULARI
D POTENZIA L'ATTIVITA' DEL PARATORMONE
E E' DOTATA DI TUTTE QUESTE CARATTERISTICHE
- 666 LA RICERCA DI IGE SPECIFICHE NEL SIERO MEDIANTE RADIALALLERGOABSORBENT TEST (RAST) E' INDICATA IN CASO DI:
X A POLLINOSI
B REAZIONI DA RIGETTO DI TRAPIANTO
C ANEMIE EMOLITICHE
D M. DA SIERO
E DERMATITE DA CONTATTO
- 667 L'INCREZIONE DI SOMATOTROPINA (GH) E' STIMOLATA DALLA SOMMINISTRAZIONE DI:
A GLUCOSIO
B TIREOLIBERINA (TRH)
C METOPIRONE
D SULPIRIDE
X E INSULINA
- 668 L'ESCHERICHIA COLI E' SPESSO CAUSA DI FLOGOSI DELLE VIE URINARIE E DI PIELONEFRITE IN QUANTO:
A CAPACE DI MOLTIPLICARSI NELLE URINE
B CAPACE DI RESISTERE ALLA FAGOCITOSI
C CAPACE DI RESISTERE ALL'ATTIVITA' BATTERICIDA SIERICA
D IL SUO ANTIGENE CAPSULARE PUO' INDURRE UNA TOLLERANZA IMMUNOLOGICA
X E CAPACE DI ESPLICARE TUTTE QUESTE FUNZIONI
- 669 L'AZIONE DELLA CALCITONINA A LIVELLO OSSEO:
A E' CONDIZIONATA AL PARATORMONE
B E' CONDIZIONATA ALLA VITAMINA D
C PROVOCA AUMENTO DEGLI OSTEOCLASTI
D STIMOLA IL RIASSORBIMENTO SCHELETRICO
X E DETERMINA RIDUZIONE DELLA ESCREZIONE URINARIA DI IDROSSIPROLINA
- 670 LA MAGGIOR PARTE DELLA BILIRUBINA DERIVA DAL CATABOLISMO DELLA:
A ALBUMINA
B MELANINA
X C EMOGLOBINA
D TIROSINA
E TRIPTAMINA
- 671 INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALICA ACUTA INSORGE, SPECIE NEL BAMBINO, IN CORSO DI:
A IPERPLASIA CORTICOSURRENALICA BILATERALE
B CUSHING DA CARCINOMA SURRENALICO
C CRIPTORCHIDISMO
X D SEPSI ACUTA MENINGOCOCCICA
E S. SURRENOGENITALE CONGENITA
- 672 NEL M. DI HODGKIN SI RILEVA ABITUALMENTE:
A IMMUNITA' CELLULARE ESALTATA
B IPERGLOBULIA
C IPO-ALFA-2-GLOBULINEMIA
D IPOCUPREMIA
X E IPOSIDEREMIA
- 673 NELLA GENESI DELLA RISPOSTA IMMUNOLOGICA HANNO FONDAMENTALE IMPORTANZA:
A I LINFOCITI
B I MACROFAGI
C LE PLASMACELLULE
D NESSUNA DI QUESTE CELLULE
X E TUTTE QUESTE CELLULE
- 674 QUALE DI QUESTI ORMONI CORTICOSURRENALICI E' UN GLUCORTICOIDE?
A PROGESTERONE
B ESTRIOLO
X C DEIDROCORTICOSTERONE
D ALDOSTERONE
E NESSUNO DI QUESTI ORMONI

- 675 NELL'INSUFFICIENZA CORTICOTROPINICA SI RILEVA:
 A NETTA ELEVAZIONE DEL CORTISOLE PLASMATICO DOPO SOMMINISTRAZIONE DI PIROGENI
 B PIGMENTAZIONE CUTANEA MELANICA
 X C MANCATA RISPOSTA DEL TEST DI LIDDLE AL METOPIRONE
 D AUMENTO DEL TASSO EMATICO DI ACTH DOPO SOMMINISTRAZIONE PARENTALE DI LISINA-VASOPRESSINA
 E RADDOPPIO DEL TASSO EMATICO DI ACTH DOPO STIMOLO INSULINICO
- 676 L'IPOGONADISMO DA DIFETTO DI INCREZIONE DI FSH PROVOCA:
 A PUBERTA' RITARDATA
 B PUBERTA' PRECOCE
 C S. DI STEIN-LEVENTHAL
 D S. DI KLINEFELTER
 X E STERILITA'
- 677 NELL'IPERALDOSTERONISMO PRIMITIVO CARATTERISTICA E':
 X A LA DIMINUITA PRODUZIONE DI RENINA
 B LA CORTISOLEMIA DIMINUITA
 C L'AUMENTATA ELIMINAZIONE URINARIA DI GLUCOCORTICOIDI
 D L'AUMENTATA ELIMINAZIONE URINARIA DI ANDROGENI
 E L'ACIDOSI IPERCLOREMICA
- 678 QUALE DI QUESTI ORMONI SURRENALICI E' DEL GRUPPO DEI MINERALCORTICOIDI?
 X A ALDOSTERONE
 B CORTICOSTERONE
 C CORTISONE
 D IDROCORTISONE
 E DEIDROCORTICOSTERONE
- 679 LA TIROIDITE DI HASHIMOTO E':
 A UNA TIROIDITE GRANULOMATOSA
 B UNA TIROIDITE ACUTA
 C UNA TIROIDITE LIGNEA (STRUMA FERICO)
 X D UNO STRUMA LINFOMATOSO
 E UNA TIROIDITE FIBROINVASIVA
- 680 L'ANEMIA EMOLITICA DA IPERSENSIBILITA' ALLE FAVE (FAVISMO) E' DOVUTA A CARENZA DI:
 X A GLUCOSIO-6-FOSFATODEIDROGENASI (G6PD)
 B PIRUVATOCHINASI
 C TRIOSOFOSFATO-ISOMERASI
 D 2-3 DIFOSFO-GLICERATOMUTASI
 E GLUCOSIO-6-FOSFATO-ISOMERASI
- 681 IL TEST DI COOMBS INDIRETTO E' POSITIVO IN CASO DI:
 A ANEMIA SIDEROPENICA
 X B PRESENZA NEL SIERO DI ANTICORPI INCOMPLETI
 C PRESENZA SULLA SUPERFICIE ERITROCITARIA DI ANTICORPI E/O COMPLEMENTO
 D IPOTRANSFERRINEMIA ACQUISITA
 E ANEMIA DA CARENZA PROTEICA
- 682 LA MALARIA TERZANA BENIGNA E' PROVOCATA:
 A SOLO DAL PLASMODIUM VIVAX
 B SOLO DAL PLASMODIUM OVALE
 X C SIA DAL PLASMODIUM VIVAX CHE DAL PLASMODIUM OVALE
 D SOLO DAL PLASMODIUM MALARIAE
 E SOLO DAL PLASMODIUM FALCIPARUM
- 683 LA REAZIONE CUTANEA ALLA TUBERCOLINA E' DI TIPO:
 A ANAFILATTICO
 B PSEUDO-ALLERGICO
 C CITOLITICO CITOTOSSICO
 D DA IMMUNOCOMPLESSI
 X E RITARDATO
- 684 REAZIONE CITOCHIMICA PAS-POSITIVA SI RILEVA NELLA LEUCEMIA ACUTA:
 A MIELOBLASTICA
 B PROMIELOCITICA
 C MIELO-MONOCITICA
 X D LINFOBLASTICA
 E MONOBLASTICA-MONOCITICA
- 685 QUALE DI QUESTI REPERTI NON E' COSTANTE NEL FAVISMO SUBITO DOPO LA CRISI?
 A EMOGLOBINEMIA
 B IPERBILIRUBINEMIA INDIRETTA
 C ANEMIA DI GRADO VARIABILE CON SFERO-CITOSI
 D DIMINUIZIONE DELLE RESISTENZE OSMOTICHE ERITROCITARIE
 X E LEUCOCITOSI E TROMBOCITOSI
- 686 QUALE DI QUESTI ELEMENTI CITOLOGICI HA MAGGIORE DIAMETRO (100-150 MICRON) RISPETTO AGLI ALTRI?
 A PROLINFOCITO
 B LINFOCITO
 X C MEGACARIOCITO LINFOIDE
 D PLASMACELLULA
 E PIASTRINA

- 687 ASSORBIMENTO ATTIVO MEDIANTE CARRIER E CONSUMO DI ENERGIA AVVIENE NELLA PARETE INTESTINALE PER:
 A IL FRUTTOSIO
 X B IL GLUCOSIO
 C GLI AMINOACIDI DICARBOSSILICI
 D GLI AC. GRASSI
 E I MONOGLICERIDI
- 688 PRURITO GENERALIZZATO SI RILEVA FREQUENTEMENTE IN TUTTE QUESTE CONDIZIONI AD ESCLUSIONE DI UNA. QUALE?
 A ANCHILOSTOMIASI
 B UREMIA CRONICA
 C IPERTIROIDISMO
 D OSTRUZIONE DELLE VIE BILIARI
 X E VITILIGINE
- 689 NELLA SINDROME SURRENOGENITALE CONGENITA SI PUO' AVERE QUESTA CATENA DI EVENTI, DI CUI UNO E' QUI RIFERITO IN MODO ERRONEO. QUALE?
 A IPERPIGMENTAZIONE CUTANEA
 B DA IPERINCREZIONE DI ACTH
 C DOVUTA A BLOCCO TOTALE DELLA 21-IDROSSILASI
 X D CHE PROVOCA IPERPRODUZIONE DI CORTISOLO
 E E IPERPRODUZIONE DI ANDROGENI E POSSIBILE SINDROME DA PERDITA DI SALE
- 690 IL SEMINOMA E' UNA NEOPLASIA CHE, NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI:
 A E' IL PIU' RARO DEI TUMORI TESTICOLARI
 B E' QUASI SEMPRE BILATERALE
 C SVILUPPA RAPIDAMENTE
 X D PREDILIGE IL TESTICOLO CRIPTORCHIDE
 E DA' METASTASI MOLTO PRECOCEMENTE
- 691 NELLA PRIMA SETTIMANA LA DIAGNOSI DI FEBBRE TIFOIDE PUO' ESSERE FACILMENTE POSTA MEDIANTE:
 X A L'EMOCOLTURA
 B LA COPROCOLTURA
 C LA SIERODIAGNOSI DI WIDAL
 D LA REAZIONE DI PAUL-BUNNELL-DAVIDSON
 E LA RICERCA DELLA RISPOSTA SIEROLOGICA AL PROTEUS OX19
- 692 IL PERIODO DI INCUBAZIONE DELL'EPATITE DA VIRUS A E' GENERALMENTE DI:
 A 1-2 GIORNI
 B 3-6 GIORNI
 C 7-8 GIORNI
 D 9-10 GIORNI
 X E 15-50 GIORNI
- 693 IL GIP (GASTRIC INHIBITOR POLYPEPTIDE) SVOLGE UNA FUNZIONE DI:
 A STIMOLAZIONE DELLA MOTILITA' GASTRICA
 X B STIMOLAZIONE DELLA SECREZIONE DIGIUNO-ILEALE
 C STIMOLAZIONE DELLA SECREZIONE DI PEPSINA INIBITA DALLA IPOGLICEMIA INSULINICA
 D STIMOLAZIONE DELLA SECREZIONE DI HCL INIBITA DALLA IPOGLICEMIA INSULINICA
 E INIBIZIONE DELLA SECREZIONE DI INSULINA
- 694 IL RITMO CIRCADIANO DEL CORTISOLO PREVEDE VALORI MASSIMI E MINIMI DI CORTISOLEMIA PER LE ORE:
 A MAX FRA LE 2 E LE 6 MIN FRA LE 18 E LE 22
 X B MAX FRA LE 6 E LE 10 MIN FRA LE 22 E LE 24
 C MAX FRA LE 10 E LE 14 MIN FRA LE 1 E LE 4
 D MAX FRA LE 14 E LE 18 MIN FRA LE 4 E LE 8
 E MAX FRA LE 18 E LE 22 MIN FRA LE 8 E LE 12
- 695 LA MALATTIA DA SIERO ETEROLOGO HA UN PERIODO DI INCUBAZIONE DI:
 A POCCHI MINUTI
 B 1-2 ORE
 C 12-24 ORE
 D 2-4 GIORNI
 X E 7-12 GIORNI
- 696 QUALE DI QUESTI PRODOTTI E' ELEMENTO INTERMEDIO NELLA SINTESI DEL COLESTEROLO DALL'ACETATO?
 A L'ACIDO URICO
 X B LO SQUALENE
 C IL TRIPTOFANO
 D IL FRUTTOSIO
 E LA LECITINA
- 697 MALATTIA DA METAZOI CAPACI DI PROVOCARE SUB-OCCLUSIONE OD OCCLUSIONE INTESTINALE E':
 A L'OSSIURASI
 B L'ANCHILOSTOMIASI
 C LA CISTICERCOSI
 X D L'ASCARIDIASI
 E LA TENIASI
- 698 LA BILIRUBINEMIA TOTALE DEL SIERO DI SANGUE E' NORMALMENTE DI:
 A 0,01-0,05 MG/DL
 B 0,07-0,10 MG/DL
 C 0,12-0,14 MG/DL
 D 0,20-0,25 MG/DL
 X E 0,30-1,00 MG/DL

- 699 QUALE DI QUESTI DATI DI LABORATORIO RISULTA NETTAMENTE AUMENTATO NELLE FASI DI ATTIVITA' DEL LINFOGRANULOMA HODGKIN?
- X A CUPREMIA
B PIASTRINEMIA
C SIDEREMIA
D ALBUMINEMIA
E AZOTEMIA
- 700 NEL LIQUOR, DI NORMA, GLI ELEMENTI CITOLOGICI SONO IN MISURA MEDIAMENTE DI:
- X A 3-4/MM ELEVATO ALLA TERZA
B 12-15/MM ELEVATO ALLA TERZA
C 20-25/MM ELEVATO ALLA TERZA
D 30-35/MM ELEVATO ALLA TERZA
E 40-45/MM ELEVATO ALLA TERZA
- 701 LA FORMA GRAVE O SUBACUTA DELL'EPATITE VIRALE PUO' EVOLVERE VERSO:
- A L'ATROFIA SUBACUTA
B LA CIRROSI POST-NECROTICA
C L'EPATITE CRONICA INATTIVA
D LA FIBROSI PORTALE RESIDUA
X E TUTTE QUESTE POSSIBILI FORME DI EPATOPATIA
- 702 LA DIAGNOSI DI CERTEZZA DELL'INFEZIONE COLERICA SI PRATICA RICERCANDO IL GERME MEDIANTE:
- X A COPROCULTURA
B MIELOCULTURA
C EMOCOLTURA
D URINOCOLTURA
E TUTTE QUESTE INDAGINI
- 703 NELL'ANEMIA PERNICIOSA SI RILEVA:
- X A IL VOLUME GLOBULARE AUMENTATO
B MICROCITOSI
C RETICOLOCITEMIA AUMENTATA
D LEUCOCITOSI
E IPERCLORIDRIA
- 704 QUALE DI QUESTI GERMI E' GRAM-POSITIVO?
- A VIBRIONE DEL COLERA
B MENINGOCOCCO
X C CLOSTRIDIO BOTULINICO
D BRUCELLA MELITENSE
E SALMONELLA TYPHI
- 705 IL MIXEDEMA DELL'ADULTO E' DI REGOLA CAUSATO DA:
- A IPERVOLEMIA
B DIMINUZIONE DELL'H2O INTERSTIZIALE
C POLIURIA
X D AUMENTO DELL'H2O TOTALE CORPOREA
E POTOMANIA
- 706 LA DERMATITE DA CONTATTO E' UNA REAZIONE IMMUNE DI:
- A TIPO PSEUDOALLERGICO
B I TIPO: REAGINICA
C II TIPO: CITOTOSSICA
D III TIPO: DA IMMUNOCOMPLESSI
X E IV TIPO: CELLULARE
- 707 PNEUMOPATIA PARASSITARIA DA PROTOZOI E' QUELLA DA:
- X A AMEBIASI
B IDATIDOSI
C ASCARIDOSI
D SCHISTOSOMIASI
E DISTOMATOSI
- 708 IL CITOPLASMA ERITROCITARIO E':
- X A ACIDOFILO
B NEUTROFILO
C POLICROMATOFILO
D BASOFILO
E INTENSAMENTE BASOFILO
- 709 I MEROZOITI DELLA MALARIA CHE SI LIBERANO DALLA ROTTURA DEL GLOBULO ROSSO:
- A SONO INOCULATI COME TALI DALL'ANOFELE NELL'UOMO
B DERIVANO IMMEDIATAMENTE DAL TROFOZOITA
C DERIVANO IMMEDIATAMENTE DALLE SPOROZOITA
D DANNO ORIGINE DIRETTAMENTE ALLO SCHIZONTE
X E DERIVANO DALLA DIVISIONE DELLO SCHIZONTE
- 710 NELL'INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALICA SECONDARIA (RIDOTTA SECREZIONE DI ACTH) SI RILEVA QUASI SEMPRE:
- X A ALDOSTERONE NORMALE
B MELANODERMIA
C IPERSODIEMIA
D IPOPOTASSIEMIA
E IPERCLOREMIA
- 711 LA MELATONINA (5-METOSI-N-ACETILTRIPTAMINA) E' UN ORMONE SECRETO:
- A DALLA TIROIDE
B DAL CORTICOSURRENE
C DALLA IPOFISI
X D DALLA PINEALE
E DALLA PARATIROIDI
- 712 LA CARENZA DI C-21-IDROSSILASI A LIVELLO SURRENALICO PROVOCA:
- X A IPERINCREZIONE DI ACTH
B AUMENTATA SINTESI DI DESOSSICORTICOSTERONE
C AUMENTATA SINTESI DI CORTISOLO
D AUMENTATA SINTESI DI ALDOSTERONE
E DIMINUITA SINTESI DI ESTRADIOLO

713 IL VOLUME EMATICO TOTALE, CIOE' LA MASSA SANGUIGNA, E' ALL'INCIRCA:
A L'1% DEL PESO CORPOREO
B IL 2% DEL PESO CORPOREO
C IL 4% DEL PESO CORPOREO
X D L'8% DEL PESO CORPOREO
E IL 15% DEL PESO CORPOREO

714 IL GLUCAGONE NEL PLASMA:
A E' AUMENTATO SOLO NEL DIABETE NON INSULINO-DIPENDE NTE
B E' AUMENTATO SOLO NEL DIABETE INSULINO- DIPENDENTE
X C E' AUMENTATO SIA NEL DIABETE INSULINO-DIPENDENTE CHE NON INSULINO-DIPENDENTE
D E' DIMINUITO NEL DIABETE INSULINO-DIPENDENTE
E E' DIMINUITO NEL DIABETE NON INSULINO-DIPENDENTE

715 QUALI ISOENZIMI DELL'LDH SONO PIU' FREQUENTEMENTE PRESENTI NELLE NEOPLASIE SOLIDE:
A LDH 1 E LDH 2
B LDH 1 E LDH 3
C LDH 2 E LDH 3
D LDH 4 E LDH 5
E NESSUNO DI QUESTI

716 QUANTE MOLECOLE DI C9 POSSONO FISSARSI SUL COM- PLESSO C 6,7,8:
A 1
B 2
C 4
X D 6
E 10

717 QUALE FRA LE SEGUENTI STRUTTURE NON E' PRESENTE NEI LINFONODI:
A CORDONI MIDOLLARI
X B GUAINE LINFATICHE PERIARTERIORI
C FOLLICOLI PRIMARI
D CORTECCIA PARAFOLLICOLARE
E CENTRI GERMINATIVI

718 QUALE FRA LE SEGUENTI MOLECOLE NON PRESENTA UN'ANA LOGIA STRUTTURALE CON LE IMMUNOGLOBULINE:
A ANTIGENE THY-1
B COMPONENTE SECRETORIO (SC)
X C CATENA J
D BETA-2-MICROGLOBULINA
E ANTIGENI MCH DI CLASSE II

719 IL CA-19.9 O GICA E' UN ANTIGENE ESPRESSO ESSENZIALMENTE DA:
X A NEOPLASIE DELL'APPARATO DIGERENTE
B LINFOMI
C CARCINOMA DEL POLMONE
D EPITELIOMI
E OSTEOSARCOMI

720 QUALI FORZE HANNO PARTICOLARE IMPORTANZA NELLA REAZIONE SECONDARIA ANTIGENE-ANTICORPO:
A FORZE DI VAN DER WAALS
B LEGAMI IDROGENO
X C FORZE ELETTROSTATICHE
D INTERAZIONI COVALENTI
E LEGAMI IDROFILI

721 QUALE FRA LE SEGUENTI PROTEINE E' DOTATA DI MAGGIORE CAPACITA' IMMUNOGENA:
A CITOCROMO C
X B FLAGELLINA
C OVOALBUMINA
D SIEROALBUMINA
E GAMMAGLOBULINA

722 QUAL E' L'AMINOACIDO N-TERMINALE ESSENZIALE PER LA FUNZIONE BIOLOGICA DELLE CHININE VASOATTIVE:
A LISINA
B METIONINA
C ISTIDINA
X D ARGININA
E TIROSINA

723 SU QUALE SEZIONE DEL LETTO VASCOLARE TERMINALE L'ISTAMINA HA UN EFFETTO CONTRAENTE:
A VENULE POST-CAPILLARI
X B CAPILLARI
C SFINTERI PRE-CAPILLARI
D ARTERIOLE PRE-CAPILLARI
E METARTERIOLE

724 IL SEGUENTE QUADRO: AGAMMAGLOBULINEMIA, ASSENZA DI FOLLICOLI NEI LINFONODI, CONTA LINFOCITARIA NORMA LE, TIMO NORMALE, VI FA PENSARE A:
X A MORBO DI BRUTON
B SINDROME DI GEORGE
C AGAMMAGLOBULINEMIA DI TIPO SVIZZERO
D DISGENESIA RETICOLARE
E SINDROME DI NEZELOF

- 725 IL FENOMENO DELLA "FACILITAZIONE" O "ENHANCEMENT"
E' DOVUTO A:
A LINFOCITI T CITOTOSSICI
B CELLULE NK
C ANTICORPI PRECIPITANTI
D ANTICORPI CITOTOSSICI
X E ANTICORPI BLOCCANTI
- 726 IL METODO COSIDDETTO DELLA "CRESCITA E LEGATURA"
E' IMPIEGATO NELLO STUDIO DI:
A TRAPIANTI DI RENE
B TRAPIANTI CUTANEI
X C IMMUNITA' ANTI-TUMORALE
D INFIAMMAZIONE
E IBRIDI CELLULARI SOMATICI
- 727 QUANTI GRUPPI DI ASSOCIAZIONE ESISTONO NEL GENOMA
DELLA SPECIE UMANA?
A 2
B 22
X C 23
D 44
E 46
- 728 SE UNA PIANTA DI MAIS ETEROZIGOTE PER GLI ALLELI
"BASSO" E "FOGLIE RUGOSE" (ENTRAMBI RECESSIVI RISPET
TO A "ALTO" E "FOGLIE LISCE") E' AUTOFECONDATA E
SI RACCOLGONO 160 SEMI CHE VENGONO FATTI GERMINARE
QUAL E' IL NUMERO DI PIANTE "ALTE"
A 10
B 20
C 40
D 90
X E 120
- 729 QUAL E' L'ANTICODONE DEL TRNA CHE RICONOSCE IL
CODONE ACC DEL MRNA?
A GUU
B TGG
X C UGG
D CCA
E CAA
- 730 TUTTI GLI IBRIDI DI PRIMA GENERAZIONE SONO:
A OMOZIGOTI
B RICOMBINANTI
C ETEROGENEI
X D UNIFORMI
E DIFORMI
- 731 QUALE DEI SEGUENTI AMINOACIDI E' PARTICOLARMENTE
ABBONDANTE NEL COLLAGENE?
A ISOLEUCINA
B FENILALANINA
C ACIDO GLUTAMMICO
X D PROLINA
E METIONINA
- 732 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI DESCRIVE MEGLIO
IL COMPORTAMENTO DI UN EFFETTORE ALLOSTERICO?
X A MODIFICA LA CONFORMAZIONE DELL'ENZIMA
B ALTERA LA COSTANTE DI ASSOCIAZIONE TRA LE SUB-
UNITA' DELL'ENZIMA
C INATTIVA PERMANENTEMENTE L'ENZIMA
D SI LEGA AL SITO ATTIVO DELL'ENZIMA
E ALTERA IL PUNTO DI EQUILIBRIO DELLA REAZIONE
- 733 GLI ENZIMI DI RESTRIZIONE SONO:
A ESONUCLEASI CHE AGISCONO SUL DNA
B ESONUCLEASI CHE AGISCONO SULL'RNA
X C ENDONUCLEASI CHE AGISCONO SUL DNA
D ENDONUCLEASI CHE AGISCONO SULL'RNA
E ENDOPEPTIDASI
- 734 IL LATTOSIO E':
A UN MONOSACCARIDE CHE SI TROVA NEL LATTE DEI MAMMI
FERI
B UN ESOSO CHE UNITO AL GLUCOSIO DA' LUOGO AL GALATT
OSIO
C COSTITUITO DA DUE MOLECOLE DI GLUCOSIO UNITE CON
LEGAME BETA 1-4
D IL POLISACCARIDE DI CUI E' MOLTO RICCO IL LATTE
VACCINO
X E UN DISACCARIDE COSTITUITO DA GALATTOSIO E GLUCOSIO
- 735 NEL SISTEMA DEI GRUPPI SANGUIGNI ABO, A E B SONO
ALLELI CODOMINANTI. QUAL E' LA PROGENIE ATTESA DA
INCROCI AB X AB?
A TUTTI AB
X B 1/4 AA, 1/2 AB, 1/4 BB
C 1/2 AA, 1/2 BB
D 1/4 AB, 1/2 AA, 1/4 BB
E 1/2 AA, 1/2 BB, 1/2 AB
- 736 NELL'INFEZIONE MALARICA L'ANOFELE INOCULA NELL'
UOMO PLASMODI COME:
A MEROZOITI
B TROFOZOITI
X C SPOROZOITI
D SCHIZONTI
E MICROGAMETOCITI

- 737 QUALE DI QUESTI ELEMENTI DEL SANGUE HA NUCLEO PRIVO DI NUCLEOLI?
A MELOBLASTO
X B GRANULOCITO NEUTROFILO
C LINFOBLASTO
D MEGACARIOBLASTO
E PLASMOBLASTO
- 738 FRA I MARKERS BIOLOGICI CHE CONSENTONO DI VALUTARE LE MODIFICAZIONI QUANTITATIVE DELLA POPOLAZIONE NEOPLASTICA QUELLO CHE SI RISCONTRA A LIVELLI ELEVATI NEL SIERO DI OLTRE IL 50% DEI PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMA BRONCHIALE E:
A IL <<BIG ACTH>>
B LA FOSFATASI ALCALINA SIMIL-PLACENTARE (PLAP)
C L'ISTAMINASI
D LA SPERMINA
X E L'ANTIGENE CARCINO-EMBRIONARIO (CEA)
- 739 LA SOMATOSTATINA (SECRETA DALLE CELLULE D DEL SISTEMA APUD) E' DOTATA DI ATTIVITA':
A STIMOLANTE LA SECREZIONE PANCREATICA DI ENZIMI
B STIMOLANTE LA MOTILITA' GASTRICA
C STIMOLANTE LA MOTILITA' COLECISTICA
D STIMOLANTE LA SECREZIONE ENTERICA
X E INIBENTE LA SECREZIONE GASTRICA
- 740 UNA MOLECOLA DI TRANSFERRINA VEICOLA:
A UN ATOMO DI FERRO FERRICO
B SEI ATOMI DI FERRO FERRICO
X C DUE ATOMI DI FERRO FERRICO
D QUATTRO ATOMI DI FERRO FERRICO
E OTTO ATOMI DI FERRO FERRICO
- 741 NELL'ITTERO EMOLITICO SI RILEVA:
A GOT AUMENTATA
X B PROTROMBINEMIA NORMALE
C FOSFATASI ALCALINA AUMENTATA
D BILIRUBINA CONIUGATA AUMENTATA
E GGT AUMENTATA
- 742 LA DIMINUZIONE DEL FLUSSO EMATICO RENALE PROVOCA:
A IPOALDOSTERONISMO
B DIMINUITO RIASSORBIMENTO TUBULARE DI H2O
X C AUMENTATA INCREZIONE DI RENINA
D DIMINUITO RIASSORBIMENTO TUBULARE DEL SODIO
E NESSUNO DI QUESTI FENOMENI
- 743 FRA LE TOSSINFEZIONI ALIMENTARI LA PIU' TEMIBILE PER L'UOMO E' QUELLA DOVUTA A:
A SALMONELLA SAINT-PAUL
B STREPTOCOCCUS FACCALIS
X C TOSSINA BOTULINICA
D ENTEROTOSSINA STAFILOCOCCICA
E CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TIPO A
- 744 LA CERULOPLASMINA (A-GLOBULINA) E' RESPONSABILE DEL TRASPORTO PALSMATICO:
A DEL POTASSIO
B DEL SODIO
C DEL COBALTO
D DEL FERRO
X E DEL RAME
- 745 NELLA DONNA SEGNI DI VIRILIZZAZIONE ED IRSUTISMO SI RILEVANO IN CORSO DI:
A M. DI ADDISON
B M. DI SIMMONDS
X C S. DI CUSHING
D S. DI TURNER
E MIXEDEMA DELL'ADULTO
- 746 LA GLICOGENOSI DI II TIPO, O M. DI POMPE, E' DOVUTA A:
A DEFICIT DI FOSFORILASI MUSCOLARE
B DEFICIT DI GLUCOSIO-6-FOSFATASI
C DEFICIT DELL'ENZIMA DETAMIFICANTE
X D DEFICIT DI ALFA-GLUCOSIDASI
E DEFICIT DELL'ENZIMA RAMIFICANTE
- 747 IL TOXOPLASMA:
A E' DOTATO DI SPECIFICITA' DI SPECIE (COLPISCE SOLO UOMO E CONIGLIO)
X B DA' UNA INFEZIONE ESTREMAMENTE DIFFUSA NELL'UOMO
C DA' MALATTIA PIU' FREQUENTE NELL'ADULTO
D NON SUPERA LA BARRIERA PLACENTARE
E NELLA CISTI SI RIPRODUCE TUMULTUOSAMENTE
- 748 IL CLOSTRIDIUM BOTULINUM E':
A GRAM-NEGATIVO
B AEROBIO
X C SPORIGENO
D CAPSULATO
E NON DOTATO DI CIGLIA

- 749 LE IGM:
 A SONO TRASMESSE DALLA MADRE AL FETO
 X B HANNO ATTIVITA' LIMITATA AL TORRENTE CIRCOLATORIO
 C HANNO ATTIVITA' PREVALENTE NEGLI SPAZI EXTRACELLULARI
 D HANNO ATTIVITA' PROTETTIVA PREVALENTE A LIVELLO DELLE MUCOSE
 E HANNO ATTIVITA' REAGINICA
- 750 QUALE DI QUESTI ELEMENTI DELLA SERIE ERITROBLASTICA E' PRIVO DI NUCLEO?
 A PROERITROBLASTO
 B ERITROBLASTO BASOFILO
 C ERITROBLASTO ORTOCROMATICO
 D ERITROBLASTO POLICROMATOFILO
 X E ERITROCITA
- 751 IL PERIODO DI INCUBAZIONE DELL'EPATITE DA VIRUS NON A NON B E' IN GENERE DI:
 A 2-10 GIORNI
 X B 18-100 GIORNI
 C 150-170 GIORNI
 D 170-180 GIORNI
 E 180-200 GIORNI
- 752 NELLA REAZIONE ANTIGENE-ANTICORPO SONO COINVOLTE:
 A FORZE DI VAN DER WAALS
 B FORZE DI COULOMB
 C LEGAMI AD H
 D LEGAMI IDROFOBICI
 X E TUTTE QUESTE FORZE
- 753 I LINFOCITI T <<HELPER>> (CIOE' ADIUVANTI):
 A NON HANNO CAPACITA' COOPERATIVA CON I LINFOCITI B
 B SONO CAPACI DI PRODURRE DIRETTAMENTE ANTICORPI
 X C REAGISCONO GENERALMENTE CON I DETERMINANTI DELLE PROTEINE CARRIER
 D REAGISCONO GENERALMENTE CON I DETERMINANTI APTENICI
 E PRESENTANO TUTTE QUESTE CARATTERISTICHE
- 754 I SEGUENTI EVENTI FANNO PARTE DELLA RISPOSTA INFIAMMATORIA ACUTA. SE POSTI NELLA SEQUENZA CORRETTA QUALE SI VERIFICA PER TERZO:
 A DILATAZIONE VASALE
 X B EMOCONCENTRAZIONE LOCALE E RALLENTAMENTO DELLA CORRENTE SANGUIGNA
 C MARGINAZIONE DEI LEUCOCITI
 D MIGRAZIONE DEI LEUCOCITI
 E AUMENTO DELLA PERMEABILITA' VASALE
- 755 NELLA NEFROPATIA LUPICA SI RILEVA:
 X A PRESENZA DI MATERIALE ELETTRODENSO A DISPOSIZIONE IRREGOLARE SU AMBEDUE I LATI DELLA MEMBRANA BASALE
 B NEGATIVA LA RICERCA DEL DNA LIBERO NEL SIERO
 C AUMENTO DEI LIVELLI SERICI DI C1, C3 E C4 DEL COMPLEMENTO
 D ASSENZA DI DNA NATIVO A LIVELLO GLOMERULARE
 E ASSENZA DI DNA DENATURATO A LIVELLO GLOMERULARE
- 756 L'AGENTE PATOGENO DELLA MALARIA TERZANA BENIGNA E':
 A UNA LEISHMANIA
 X B UN PLASMODIO
 C UN TRIPANOSOMA
 D UNA GIARDIA
 E UN TRICHOMONAS
- 757 NELL'INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALICA SI RILEVANO TUTTI QUESTI FENOMENI AD ESCLUSIONE DI UNO. QUALE?
 A IPONATREMIA
 B IPOVOLEMIA
 C AUMENTO DEGLI IDROGENIONI NEL SIERO
 D IPERPOTASSIEMIA
 X E IPERCLOREMIA
- 758 LA REAZIONE IMMUNE DI TIPO EMOLITICO DOVUTA A INCIDENTE TRASFUSIONALE E'DI:
 A I TIPO: REAGINICA
 X B II TIPO: CITOTOSSICA
 C III TIPO: DA COMPLESSI IMMUNI
 D IV TIPO: CELLULARE
 E TIPO PSEUDOALLERGICO
- 759 L'ADENILATO-CICLASI E' UN ENZIMA PRESENTE IN QUALE STRUTTURA CELLULARE:
 X A MEMBRANA BASALE
 B CITOPLASMA
 C RETICOLO ENDOPLASMATICO
 D MEMBRANA LISOSOMIALE
 E MITOCONDRI
- 760 TRA I SEGUENTI NEURO-TRASMETTITORI CEREBRALI QUALE SVOLGE L'AZIONE DI PIF: FATTORE INIBENTE PROLATTINA
 X A DOPAMINA
 B NORADRENALINA
 C SEROTONINA
 D ADRENALINA
 E GABA

- 761 NELL'IPERPLASIA SURRENALE CONGENITA IL DEFICIT DI QUALI ENZIMI SI ACCOMPAGNA AD IPERTENSIONE:
A 20-22 DESMOLASI
B 21 IDROSSILASI
C 3-BETA-OLO-DEIDROGENASI
D 18-IDROSSILASI
X E 11-IDROSSILASI E/O 17-IDROSSILASI
- 762 IL MECCANISMO D'AZIONE DI QUALE DEGLI ORMONI SOTTO INDICATI SI ESPLICA TRAMITE L'ATTIVAZIONE DELL'ADENILATO CICLASI:
A INSULINA
B OSSITOCINA
C ORMONE DELLA CRESCITA
X D ORMONE ADRENOCORTICOTROPO
E ALDOSTERONE
- 763 L'AUMENTO DELLA CONCENTRAZIONE PLASMATICA DI CALCI TONINA E' INDICATIVA DI:
A CARCINOMA PAPILLIFERO
X B CARCINOMA MIDOLLARE
C CARCINOMA FOLLICOLARE
D CARCINOMA ANAPLASTICO
E ADENOMA TIREOTOSSICO
- 764 QUALE FRA I SEGUENTI ORMONI INIBISCE LA SINTESI E LA SECREZIONE DI ORMONE ADRENOCORTICOTROPO (ACTH):
A CORTICOSTERONE
X B CORTISOLO
C ALDOSTERONE
D IDROCORTISONE
E TESTOSTERONE
- 765 QUALE DEI SEGUENTI ORMONI E' CARENTE NEL DIABETE INSIPIDO:
A BETA-ENDORFINE
B OSSITOCINA
X C VASOPRESSINA
D SOMATOMEDINA
E INSULINA
- 766 LA RENINA E' PRODOTTA DAL:
A FEGATO
X B RENE
C PANCREAS
D NUCLEI DIENCEFALICI
E POLMONE
- 767 LA TIREOGLOBULINA E' UNA:
A PROTEINA SEMPLICE
B LIPOPROTEINA
X C GLICOPROTEINA
D MUCOPROTEINA
E LIPOFUSCINA
- 768 IL TESTOSTERONE E' SINTETIZZATO NEL TESTICOLO:
A DALLE CELLULE DEL SERTOLI
B DAI TUBULI SEMINIFERI
C DAGLI SPERMATOGONI
X D DALLE CELLULE DI LEYDIG
E DAGLI SPERMATOCITI
- 769 L'INTERAZIONE TRA ORMONE POLIPEPTIDICO E RECETTORE SPECIFICO DI MEMBRANA PORTA ALL'AUMENTO DELLA PRODUZIONE DI AMP-CICLICO INTRACELLULARE ATTIVANDO:
A GUANILATO-CICLASI
B FOSFOROESTERASI
X C ADENILATO-CICLASI
D FOSFOLIPASI A 2
E ESOCINASI
- 770 I SINTOMI DELL'ACROMEGALIA COMPRENDONO:
A ECCESSIVA TRASPIRAZIONE
B DIMINUZIONE DELLA LIPIDO
C GALATTORREA
X D TUTTI I SUDETTI
E NESSUNO DEI SUDETTI
- 771 L'INCREZIONE DI ADH PUO' ESSERE STIMOLATA DA:
X A DIMINUZIONE DEL VOLUME INTRAVASCOLARE
B DIMINUZIONE DELL'OSMOLARITA' PLASMATICA
C ALCOOL
D DIETA RICCA DI SALE
E ARGININA
- 772 LA SOMATOSTATINA E' SECRETA DALLE:
A CELLULE ALFA DELLE ISOLE DI LANGHERANS
B CELLULE BETA DELLE ISOLE DI LANGHERANS
C CELLULE C DELLE ISOLE DI LANGHERANS
X D CELLULE D DELLE ISOLE DI LANGHERANS
E NESSUNA DELLE PRECEDENTI
- 773 LA SINDROME DI KLINEFELTER E' ASSOCIATA CON TUTTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TRANNE CHE:
A ANOMALIA CROMOSOMICA
B INFERTILITA'
X C BASSA STATURA
D GINECOMASTIA
E TESTICOLI PICCOLI E DURI

774 LE SEGUENTI ALTERAZIONI ISTOLOGICHE DEL TESTICOLO SONO PRESENTI NELLA SINDROME DI KLINEFELTER TRanne:

- A ASSENZA DELLE FIBRE ELASTICHE RETICOLARI INTORNO ALLA TUNICA PROPRIA
- B IALINIZZAZIONE E FIBROSI DEI TUBULI SEMINIFERI
- X C TUBULI SEMINIFERI IMMaturi CON EPITELIO GERMINALE INDIFFERENZIATO
- D SCARSITA' DI ELEMENTI CELLULARI NEI TUBULI SEMINIFERI
- E IPERPLASIA DELLE CELLULE DI LEYDIG

775 IN UNA DI QUESTE CONDIZIONI MORBOSE NON SI RILEVA UNO STATO DI MAGREZZA, QUALE?

- A IPERTIROIDISMO
- B IPOsURRENALISMO CRONICO
- X C IPOFUNZIONE OVARICA
- D ANORESSIA PSICHICA
- E IPOPANPITUITARISMO

776 NEL DIABETE INSIPIDO:

- A LA FUNZIONE CORTICOSURRENALICA E' ALTERATA
- X B VI E' IPONATRIEMIA ED IPOCLOREMIA
- C LA PRESSIONE ARTERIOSA E' ALTA
- D SONO PRESENTI EDEMI
- E LA FUNZIONE RENALE E' ALTERATA

777 LA PROTEINA PLASMATICA CHE LEGA CON MAGGIORE AFFINITA' GLI ORMONI TIROIDEI E':

- A ALBUMINA
- B TBPA
- X C TBG
- D GAMMAGLOBULINA
- E TIREOGLOBULINA

778 IL TSH PLASMATICO SI ELEVA ESAGERATAMENTE DOPO SOMMINISTRAZIONE DI TRH NEL:

- X A IPOTIROIDISMO PRIMITIVO
- B IPERTIROIDISMO DA MORBO DI BASEDOW
- C IPERTIROIDISMO DA GOZZO NODULARE
- D IPOTIROIDISMO DA IPOPITUITARISMO
- E SOGGETTO CHE ASSUME DOSI MASSIVE DI T4

779 LA SECREZIONE DI PROLATTINA E' DIMINUITA DA:

- A ALFAMETILDOPA
- X B L-DOPA
- C ESERCIZIO FISICO
- D STRESS CHIRURGICO
- E UREMIA

780 NEL DIABETE DELL'ETA' ADULTA DELL'OBESO VI E' LA SEGUENTE ALTERAZIONE TIPICA:

- A ANEMIA EMOLITICA
- B IPERURICEMIA
- X C DIMINUZIONE DEL NUMERO DEI RECETTORI PER L'INSULINA
- D MARCATA IPOPRODUZIONE D'INSULINA
- E AUTOANTICORPI ANTI RECETTORI PER L'INSULINA

781 QUALI ENZIMI CELLULARI SONO ATTIVATI DAL CAMP:

- A GLICOSIDASI
- X B CHINASI
- C LIPASI
- D POLIMERASI
- E FOSFODIESTERASI

782 IL TRH E' UN ORMONE CHE REGOLA LA SINTESI DI:

- A INSULINA
- X B TSH
- C CORTISOLO
- D ACTH
- E PARATORMONE

783 QUALE DI QUESTI ORMONI HA NELLA SUA STRUTTURA 19 ATOMI DI CARBONIO?

- A PROGESTERONE
- B CORTICOSTERONE
- C ALDOSTERONE
- X D TESTOSTERONE
- E ESTRADIOLO

784 LA CARENZA O ASSENZA DI 18-IDROSSILASI DETERMINA UNA DEFICIENZA DELLA SINTESI DI:

- A PROGESTERONE
- B DEIDROEPIANDROSTERONE
- C CORTICOSTERONE
- X D ALDOSTERONE
- E NESSUNA DELLE PRECEDENTI

785 QUALE ORMONE ESPLICA L'AZIONE LEGANDOSI AD UN RECEPTORE NUCLEARE:

- A ORMONE PARATIROIDEO
- B NORADRENALINA
- X C ESTRADIOLO
- D ACTH
- E PROLATTINA

786 QUALI TRA QUESTI ORMONI ESPLICA LA SUA AZIONE LEGANDO SI AD UN RECEPTORE DI MEMBRANA:

- X A FSH
- B TRIODOTIRONINA
- C CORTISOLO
- D ALDOSTERONE
- E TIROXINA

787 LE CELLULE ACIDOFILE DELL'ADENOIPOFISI SECERNONO:
A TSH
X B PRL
C ACTH
D FSM
E INSULINA

788 NEL DIABETE INSIPIDO LE URINE SONO:
X A IPOTONICHE
B ISOTONICHE
C IPERTONICHE
D CARICHE DI ALBUMINA
E CARICHE DI GLUCOSIO

789 LA PRINCIPALE AZIONE DELL'ORMONE FSH NELL'UOMO E'
SU:
A INTERSTIZIO TESTICOLARE
B CELLULE GERMINALI
X C CELLULE DEL SERTOLI
D PARETE TUBULARE
E EPIDIDIMO

790 LA SOMATOSTATINA E' UN ORMONE CHE:
X A INIBISCE LA SECREZIONE DI GH
B STIMOLA LA SECREZIONE DI GH
C STIMOLA LA SECREZIONE DI TSH
D FAVORISCE L'AZIONE DEL GH
E FAVORISCE L'AZIONE DELL'AMPCICLICO

791 LA CORTECCIA SURRENALE PRODUCE:
A ALDOSTERONE NELLA ZONA LENTICOLARE
B STEROIDI ANDROGENI NELLA ZONA GLOMERULARE
C ANGIOTENSINA NELLA ZONA GLOMERULARE
X D CORTISOLO NELLA ZONA FASCICOLATA
E GH

792 QUAL E' IL PESO MOLECOLARE DELLA TIREOGLOBULINA:
A 100.000 Da
B 250.000 Da
X C 660.000 Da
D 6.660.000 Da
E 1.500.000 Da

793 IL TSH PLASMATICO E' DIMINUITO IN:
A MALATTIA DI HASHIMOTO
B IPOTIROIDISMO
C GOZZO DA DEFICIT IODICO
X D IPERTIROIDISMO
E IPOTIROIDISMO PRIMARIO

794 LA SINDROME DI KLINEFELTER E' CARATTERIZZATA DAL:
X A CARIOGRAMMA ANORMALE
B AGENESIA DEI DEFERENTI
C CARDIOPATIA CONGENITA
D ALTERAZIONI DELLE GONADOTROPINE
E ALTERAZIONI DEL TESTOSTERONE

795 IL PROGESTERONE:
A E' UN ORMONE PROTEICO
B PRESENTA 18 ATOMI DI C
X C PRESENTA 21 ATOMI DI C
D PRESENTA 17 ATOMI DI C
E PRESENTA 19 ATOMI DI C

796 IL TIPO FAGICO DI ALCUNI MICRORGANISMI E' CORRELA-
TO CON:
A IL POTERE PATOGENO
B LA VIRULENZA
C LA ANTIBIOTICO-RESISTENZA
X D TUTTE LE PRECEDENTI CONDIZIONI
E NESSUNA DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI

797 SONO RICKETTSIOSI LE SEGUENTI INFEZIONI, ECCETTO
UNA:
A FEBBRE BOTTONOSA DEL MEDITERRANEO
B FEBBRE DELLE MONTAGNE ROCCIOSE
C TIFO ESANTEMATICO
X D FEBBRE GIALLA
E TIFO MURINO

798 UNA DELLE SEGUENTI MALATTIE INFETTIVE E' STATA
RECENTEMENTE DICHIARATA SCOMPARSA DAL MONDO
DALLA OMS:
A PESTE BUBBONICA
B FEBBRE GIALLA
C TIFO ESANTEMATICO
X D VAILO
E DENGUE

799 IL PRINCIPALE SERBATOIO DI TOXOPLASMA GONDII E':
A IL CAVALLO
B LE ZECCHIE
C ALCUNI UCCELLI
D L'UOMO INFETTO
X E IL GATTO

800 GLI ARBOVIRUS SONO:
A VIRUS CAPACI DI INFETTARE SOLO LE CELLULE DI ALCU-
NI INVERTEBRATI
B VIRUS RESPONSABILI DELLA MALATTIA DEL MOSAICO DI
ALCUNI VEGETALI
C VIRUS CHE PROVOCANO TUMORI NEI VEGETALI
X D VIRUS TRASMESSI DA INSETTI A VERTEBRATI
E UN SOTTO GRUPPO DI ONCO RNA VIRUS

- 801 LA MOSCA GLOSSINA PALPALIS E' L'ABITUALE AGENTE TRASMETTITORE DI:
A PLASMODIUM VIVAX
B PLASMODIUM FALCIPARUM
X C TRYPANOSOMA GAMBIENSE
D TRYPANOSOMA CRUZI
E RICKETTSIA PROWAZEKI
- 802 DAI TESSUTI SEDE DELLE LESIONI CARATTERISTICHE DEL REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO SI ISOLA ABITUALMENTE:
A IL VIRUS REUMATICO
B LO STREPTOCOCCO VIRIDANS
C LO STREPTOCOCCO B-EMOLITICO
D LO STAFILOCOCCO AUREO
X E NESSUN MICRORGANISMO
- 803 NELLA SIERODIAGNOSI DELLA LUE GLI ANTICORPI PIU' SPECIFICI SONO QUELLI CONTRO:
A L'ANTIGENE LIPOIDEO
B L'ANTIGENE TREPONEMICO PROTEICO SOLUBILE
C L'ANTIGENE GLICOLIPIDICO
D L'ANTIGENE NUCLEOPROTEICO
X E L'ANTIGENE POLISACCARIDICO
- 804 LO SVILUPPO DELLA RESISTENZA ALLA TENSIONE NEL TESTO CICATRIZIALE E' PRINCIPALMENTE DIPENDENTE DA
A CONTRAZIONE DELLA CICATRICE
X B CONTENUTO DI COLLAGENO DELLA CICATRICE
C CONTENUTO DI ACIDO ASCORBICO DELLA CICATRICE
D NUMERO DEI CAPILLARI NEO-FORMATI
E LIVELLO DEL FATTORE CHEILODOGENICO
- 805 HANNO AZIONE FACILITANTE LA FAGOCITOSI I SEGUENTI FATTORI, ECCETTO UNO:
A CA++
B MG++
C NARCOTICI
D FIBRINA
X E IPEROSMOLARITA'
- 806 LE PROSTAGLANDINE HANNO LA STRUTTURA CHIMICA DI:
A POLIPEPTIDI
B SOSTANZE A NUCLEO CICLICO-PENTANO-
X C ACIDI GRASSI CICLICI
D ACIDI GRASSI ALIFATICI INSATURI
E FOSFOLIPIDI
- 807 NELL'INFIAMMAZIONE LE PROSTAGLANDINE HANNO AZIONE:
A ISTAMINO-SIMILE
B BRADICHININO-SIMILE
X C MODULATRICE DEL PROCESSO INFIAMMATOIO, AVENDO ALCUNE AZIONI PROINFIAMMATORIE, ALTRE ANTI-INFIAMMATORIE
D AGGREGANTE PIASTRINICA
E ANTIAGGREGANTE PIASTRINICA
- 808 NELLA CANCEROGENESI CHIMICA L'AZIONE INIZIALE E' DATA:
A DAL CO-CANCEROGENO
X B DAL CANCEROGENO
C DALL'IRRITAZIONE
D DA FENOMENI DEGENERATIVI
E DA NECROSI
- 809 NELLA CANCEROGENESI CHIMICA L'AZIONE PROMOVENTE E' DATA:
A DAL PROCESSO COAGULATIVO
B DA FENOMENI DEGENERATIVI
C DA NECROSI
D DAL CANCEROGENO
X E DAL CO-CANCEROGENO
- 810 IL POLIOMA E' UN TUMORE:
A DEL CANE
B DELL'UOMO
C DELLA SCIMMIA
X D DEL TOPO
E DEL GATTO
- 811 NELLA ONCOGENESI DA VIRUS A DNA LE CELLULE PERMISSIVE CONSENTONO:
X A LA REPLICAZIONE VIRALE
B LA TRASFORMAZIONE NEOPLASTICA
C LA INSORGENZA DI FENOMENI DEGENERATIVI
D LA BIOSINTESI DI ANTIGENI TUMORALI
E NESSUNA DI QUESTE RISPOSTE E' ESATTA
- 812 IL VIRUS DI EPSTEIN-BARR E' L'AGENTE ETIOLOGICO:
A DELLA LEUCEMIA DI RAUSCHER
B DELLA LEUCEMIA DI GROSS
X C DEL CARCINOMA NASOFARINGEO
D DEL MESOTELIOMA
E NESSUNA DI QUESTE RISPOSTE E' ESATTA
- 813 UN VIRUS ONCOGENO MASCHERATO SI IDENTIFICA:
A CON IL VIRUS RICOPERTO DA MUCOPROTEINE
B CON IL VIRUS RICOPERTO DA MUCOPOLISACCARIDI ACIDI
C CON IL VIRUS RIVESTITO DAL CAPSIDE
D CON L'ACIDO NUCLEICO VIRALE
X E CON IL VIROGENE

814 L'AFFINITA' DELL'ANTIGENE PER L'ANTICORPO DIPENDE:
A DALLA CLASSE DI IMMUNOGLOBULINE
X B DALLA FORZA DI LEGAME CON L'APTENE E CON UN
DETERMINANTE ANTIGENICO
C DAL NUMERO DEI DETERMINANTI ANTIGENICI
D DALLA PRESENZA DI IONI CALCIO NEL MEZZO
E DALLE MODIFICAZIONI DELLA REGIONE CERNIERA

815 PER AZIONE DELLA PAPAINA, DA UNA MOLECOLA DI IG SI
OTTENGONO:
A DUE CATENE LEGGERE E DUE PESANTI
X B DUE FRAMMENTI FAB E UN FRAMMENTO FC
C UN FRAMMENTO (FAB)2
D UN FRAMMENTO (FAB)2 E UN FRAMMENTO FC
E PORZIONE VARIABILI E COSTANTI DELLE CATENE

816 PER AZIONE DELLA PEPSINA DA UNA MOLECOLA DI IG SI
OTTENGONO:
A DUE CATENE LEGGERE E UN FRAMMENTO FC
B DUE FRAMMENTI FAB E UN FRAMMENTO FC
X C UN FRAMMENTO (FAB)2
D UN FRAMMENTO (FAB)2 E UN FRAMMENTO FC
E PORZIONI VARIABILI E COSTANTI DELLE CATENE

817 ATTRAVERSO LA PLACENTA PASSANO:
A LE IGM
X B LE IGG
C GLI IMMUNOCOMPLESSI IN ECCESSO DI ANTIGENE
D GLI IMMUNOCOMPLESSI IN ECCESSO DI ANTICORPO
E GLI IMMUNOCOMPLESSI COL COMPLEMENTO FISSATO

818 LA FAMIGLIA DI IG PRESENTE NEL SIERO NORMALE NELLA
CONCENTRAZIONE PIU' BASSA E' QUELLA DELLE:
A IGG
B IGM
C IGD
D IGA
X E IGE

819 NELLA RISPOSTA SECONDARIA VERSO ANTIGENI NON ALLER
GENI, SI HA SINTESI DI:
A IGA
B IGM
X C IGG
D IGE
E IGD

820 IL FATTORE REUMATOIDE E' DI REGOLA:
X A IMMUNOGLOBULINA 19 S
B IMMUNOGLOBULINA 7 S
C ANTIGENE
D APTENE
E GRUPPO DETERMINANTE

821 UNO DI QUESTI ORMONI NON E' SECRETO DALLA ADENOI-
POFISI, QUALE:
A ACTH
X B ADH
C LH
D TSH
E FSH

822 LE LIPOPROTEINE AD ALTA DENSITA' (HDL) TRASPORTANO
PREVALENTEMENTE IL SEGUENTE COMPONENTE:
A TRIGLICERIDI ENDOGENI
B TRIGLICERIDI ESOGENI
C COLESTEROLO
X D FOSFOLIPIDI
E ACIDI GRASSI LIBERI

823 LA RENINA POSSIEDE TUTTE LE PROPRIETA' ELENcate EC
CETTO UNA, QUALE:
A E' UN ENZIMA PROTEOLITICO
B VIENE SECRETO DALLE CELLULE DELL'APPARATO IUXTA-
GLOMERULARE DEL RENE
X C VIENE ATTIVATA DALLA PLASMINA
D IL SUO SUBSTRATO NATURALE E' L'ANGIOTENSINOGENO
(ALFA-2-GLOBULINA PLASMATICA)
E PRODUCE ANGIOTENSINA I CHE, CONVERTITA IN ANGIOTEN
SINA II, ESERCITA EFFETTO IPERTENSIVO DIRETTAMENTE
ATTRAVERSO LIBERAZIONE DI ALDOSTERONE

824 LA PRIMA E PIU' IMPORTANTE BARRIERA SPECIFICAMENTE
IMMUNE CONTRO UN AGENTE INFETTIVO PROVENIENTE DAL
L'ESTERNO E' RAPPRESENTATA DA:
X A IG A PRESENTI NELLE SECREZIONI DELLE MUCOSE E DEL-
LA CUTE
B IG M PRODOTTE DAL TESSUTO LINFOEPITELIALE DELLE SO
TTOMUCOSE
C LISOZIMA
D INTERFERONE, INDOTTO NELLE CELLULE EPITELIALI DELLA
MUCOSA
E LINFOCITI SPECIFICAMENTE IMMUNI DELLE MUCOSE

825 LA CURVA DI DISSOCIAZIONE DELL'EMOGLOBINA E' SPO-
STATA A DESTRA (AUMENTO DELLA DISSOCIAZIONE) PER
LA SEGUENTE CAUSA:
A DIMINUITA PRESSIONE DI CO2
X B AUMENTATA PRESSIONE DI CO2
C AUMENTO DEL PH
D AUMENTATA PRESSIONE DI N2
E DIMINUITA PRESSIONE DI N2

826 IL PH NORMALE DEL SANGUE E' COMPRESO TRA I SEGUEN-
TI VALORI:
A 6.8-7.0
B 7.0-7.1
C 7.1-7.3
X D 7.3-7.5
E 7.5-7.9

827 QUALE ENZIMA E' CARENTE NELLA MAPLE SYRUP URINE
DISEASE:
X A TIROSINASI
B TIROSINA-AMINOTRANSFERASI
C FENILALANINAIIDROSSILASI
D ALFACHETOACILDEIDROGENASI
E PROLINAOSSIDASI

828 LE CAUSE DI MORTE PIU' FREQUENTI SONO:
A MALATTIE INFETTIVE
B TRAUMATISMI
C MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
D TUMORI
X E MALATTIE CARDIOCIRCOLATORIE

829 LA PARIETARIA OFFICINATIS PUO' PROVOCARE:
A ECZEMA
X B ASMA
C PLEURITE
D BRONCHITE CON BRONCHIECTASIE
E ENFISEMA

830 LA GANGRENA GASSOSA E' UNA FORMA DI NECROSI
ASSOCIATA A:
A INFEZIONI DA MICETI
B ENFISEMA
C TUBERCOLOSI
X D INFEZIONI DA CLOSTRIDI
E TRAUMATISMI MUSCOLARI

831 L'ACQUA PUO' ESSERE VEICOLO DI:
A VARICELLA
X B COLERA
C TUBERCOLOSI
D CARBONCHIO
E SIFILIDE

832 IL FUMO DI TABACCO PUO' PROVOCARE:
A MESOTELIOMI PLEURICI
B ANTRACOSI
C EMBOLIA
X D CARCINOMI DEL POLMONE
E MELANOMI

833 IL PRINCIPALE BERSAGLIO CELLULARE PER L'AZIONE DEL
LE RADIAZIONI E':
X A DNA
B MEMBRANA CELLULARE
C MITOCONDRI
D RIBOSOMI
E LIPOSOMI

834 LA PCO2 DEL SANGUE E' DI NORMA:
X A =40 MM HG
B <20 MM HG
C <30 MM HG
D >50 MM HG
E >60 MM HG

835 IL PH DEL SANGUE E' AUMENTATO IN UNA DI QUESTE CON
DIZIONI:
X A VOMITO
B ECLAMPSIA
C ACIDOSI DIABETICA
D POLMONITI
E UREMIA

836 NELL'EPATITE CRONICA AGGRESSIVA ATTIVA RISULTA
AUMENTATO UNO DI QUESTI METABOLITI:
A ALBUMINEMIA
X B TRANSAMINASEMIA
C PSEUDOCOLINESTERASI
D BILINOGENO FECAL
E PROTROMBINEMIA

837 LA FOSFATASI ACIDA E' AUMENTATA NEL SANGUE PER:
A OSTEOMALACIA
B ITTERO OCCLUSIVO
C SARCOIDOSI
X D CARCINOMA DELLA PROSTATA
E NEOPLASIE EPATICHE

838 NEL PLASMA, IN QUANTITA' PARI A 3-7 MG/DL, E' REPERI
BILE NORMALMENTE:
A ALCOL METILICO
B AZOTO UREICO
X C ACIDO URICO
D ACIDO ASCORBICO
E SULFONAMIDE

839 L'AGENTE EZIOLOGICO DEL MUGHETTO E' UNO DEI SEGUEN
TI MICETI:
X A CANDIDA ALBICANS
B HISTOPLASMA CAPSULATUM
C BLASTOMYCES DERMATITIDIS
D CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS
E TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES

- 840 LA TOXOPLASMOSI E' UNA:
A MICOSI DIFFUSA
X B MALATTIA DA PROTOZOI
C INFEZIONE DA ARBOVIRUS
D INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS
E INFEZIONE DA COXSACKIE
- 841 IL PESO MOLECOLARE DELLA HB E':
A 5.800 Da
B 13.700 Da
C 14.400 Da
X D 68.000 Da
E 80.000 Da
- 842 LA SEDE DEI CROMOSOMI E':
X A ENDONUCLEARE
B ENDOCITOPLASMATICA
C ENDOMITOCONDRIALE
D ENDOLISOSOMIALE
E NELL'APPARATO DEL GOLGI
- 843 QUALE DI QUESTI E' UN COLORANTE ACIDO COMUNEMENTE IMPIEGATO IN CITOLOGIA:
A PIRONINA
X B EOSINA
C BLU DI METILENE
D BLU DI TOLUIDINA
E TIONINA
- 844 LE CELLULE DELLA GLIA SONO:
A CELLULE NERVOSE
B CELLULE DELL'EPITELIO TUBULARE RENALE
X C CELLULE NON NERVOSE
D CELLULE DEL MIDOLLO OSSEO
E CELLULE SPLENICHE
- 845 NELL'ERITROCITA MATURO SI RILEVA:
A IL NUCLEO
B IL COMPLESSO DEL GOLGI
C I CENTRIOLI
D I MITOCONDRI
X E NESSUNA DI QUESTE FORMAZIONI
- 846 IL SARCOMERO RISULTA COSTITUITO DALLA:
A BANCA H
B BANCA A
C PARTE DI MIOFIBILLE CHE SI ESTENDE TRA DUE LINEE 7
D BANCA I
X E BANCA A E DELLE DUE META' DELLE BANDE I CONTIGUE
- 847 LA GHIANDOLA MAMMARIA E' UNA GHIANDOLA:
A OLOCRINA
X B APOCRINA
C MESOCRINA
D ENDOCRINA
E MISTA
- 848 IL GENE E':
A UNA STRUTTURA RESPONSABILE DELLA CROMOSOMOCINETICA
X B UN SEGMENTO CROMOSOMICO CHE COSTITUISCE UN'UNITA' EREDITARIA
C UNO ZIGOTE
D UN ANTICODONE
E NESSUNA DI QUESTE ENTITA'
- 849 LA BILIRUBINA E' UN PIGMENTO CHE ORIGINA PER IL 20%:
A DALLA ERITROPOIESI INEFFICACE
B DAL CATABOLISMO DELLE CATALASI
C DAL CATABOLISMO DEI CITOCROMI
D DAL CATABOLISMO DELLA MIOGLOBINA
X E DA TUTTE QUESTE FONTI
- 850 L'INFLUENZA A, B e C E' PROVOCATA DA VIRUS DELLA CLASSE:
X A MYXOVIRUS
B HERPESVIRUS
C ADENOVIRUS
D TOGAVIRUS
E PICORNAVIRUS
- 851 LA REAZIONE DI ARTHUS E' UNA REAZIONE IMMUNE DA:
A ANTICORPI SERICI CHE REAGISCONO CON ANTIGENI CONIUGATI CON CELLULE TESSUTALI
X B ANTICORPI PRECIPITANTI CHE REAGISCONO CON L'ANTIGENE NEGLI SPAZI TESSUTALI NEL CONTESTO DELLE PARETI VASALI O IN CIRCOLO
C ANTICORPI SERICI CHE REAGISCONO CON COSTITUENTI DELLE CELLULE TESSUTALI
D LINFOCITI CHE REAGISCONO DIRETTAMENTE CON L'ANTIGENE
E ANTICORPI SIERICI CHE REAGISCONO CON APTENI CONIUGATI CON CELLULE TESSUTALI
- 852 IN NA+, IL K+ E L'ACQUA AD ESSI OSMOTICAMENTE LEGATA SONO ASSORBITI ATTRAVERSO LA PARETE INTESTINALE
A CON MECCANISMO FACILITATO
B CON MECCANISMO PASSIVO
X C CON MECCANISMO ATTIVO
D SENZA CONSUMO DI ENERGIA
E SECONDO GRADIENTE DI CONCENTRAZIONE

- 853 IL PLASMINOGENO VIENE ATTIVATO IN PLASMINA DA UN ATTIVATORE TESSUTALE E DA:
A FIBRINOGENO
B FIBRINA
X C UROCHINASI
D PROTROMBINA
E TROMBOPLASTINA
- 854 LA REAZIONE IMMUNE DI IV TIPO (REAZIONE RITARDATA) E' INIZIATA DA:
X A CELLULE MONONUCLEATE CAPACI DI REAGIRE DIRETTAMENTE CON L'ANTIGENE
B ALLERGENI
C ANTICORPI SERICI CHE REAGISCONO CON COSTITUENTI DELLE CELLULE TESSUTALI O CON ANTIGENI AD ESSE CONIUGATI
D ANTICORPI PRECIPITANTI CHE REAGISCONO CON L'ANTIGENE NEGLI SPAZI TESSUTALI
E REAGINE
- 855 LA BILIRUBINA NON CONIUGATA E':
A NON LEGATA ALLE ALBUMINE DEL SIERO
X B INSOLUBILE IN ACQUA
C DEFINITA <<DIRETTA>> NELLA REAZIONE DI VAN DEN BERGH
D ESCRETA DAI RENI
E PRIVA DI AFFINITA' PER I LIPIDI
- 856 NELLE FORME CRONICHE DI BRUCELLOSI SOLO UNA DI QUESTE INDAGINI DA' RISULTATI SEMPRE SICURI AI FINI DIAGNOSTICI. QUALE?
X A MIELOCOLTURA
B EMOCOLTURA
C SIEROAGGLUTINAZIONE DI WRIGHT
D AUMENTO DELLE IGM
E AUMENTO DELLE IGG
- 857 LE SOMATOMEDINE, MEDIATORI DELL'AZIONE DELL'ORMONE DELLA CRESCITA, HANNO ANCHE AZIONE:
A MINERALCORTICOIDE
B ESTROGENICA
C IPERGLICEMIZZANTE
X D INSULINO-SIMILE
E SIMPATICOMIMETICA
- 858 TRA LE PIU' FREQUENTI COMPLICANZE CRONICHE DEL DIABETE DEVE ESSERE ELENcata LA SEGUENTE ALTERAZIONE:
A SCLEROSI POLMONARE
X B RETINOPATIA
C GOTTA
D INSUFFICIENZA SURRENALICA
E IPERTIROIDISMO
- 859 LA 5-ALFA-REDUTTASI E' UN ENZIMA CHE CONVERTE:
X A IL TESTOSTERONE IN DIIDROTESTOSTERONE
B IL 17-BETA-ESTRADIOLO IN ESTRONE
C IL PROGESTERONE IN ALDOSTERONE
D CORTISOLO IN ALDOSTERONE
E IL TESTOSTERONE IN ESTRONE
- 860 L'ESTRIOLO E' INDICE DELLA FUNZIONE:
A SURRENALICA
B SURRENALE FETALE
C PLACENTARE
X D FETOPLACENTARE
E OVARICA MATERNA
- 861 QUALE ENZIMA CATALIZZA LA TRASFORMAZIONE DELLA NORADRENALINA IN ADRENALINA:
A FENILALANINA IDROSSILASI
B MONAMINA OSSIDASI
C TIROSINA IDROSSILASI
D TIROSINASI
X E FENIL-ETANOLAMINA-METIL-TRANSFERASI
- 862 QUAL'E' LA PIU' FREQUENTE ALTERAZIONE PATOLOGICA CHE DETERMINA L'IPERALDOSTERONISMO:
A TUBERCOLOSI
B SIFILIDE
X C ADENOMI
D CARCINOMI
E IPERPLASIE
- 863 QUALE ORMONE DETERMINA L'OVULAZIONE:
A LA PROLATTINA
B L'ORMONE FOLLICOLO STIMOLANTE
X C L'ORMONE LUTEINIZZANTE
D L'OSSITOCINA
E L'ORMONE DELLA CRESCITA
- 864 LA GINECOMASTIA SI PUO' RISCONTRARE IN:
A APLASIA TESTICOLARE CONGENITA
B MORBO DI BASEDOW
C COLITE ULCEROSA
D SINDROME DI CRUVEILHIER-BAUMGARTEN
X E IN TUTTE LE CONDIZIONI SUDDETTE
- 865 QUALE DELLE CONDIZIONI INDICATE NON CAUSA GOZZO:
A DIFETTO DI ORGANIFICAZIONE DELLO IODIO
B DIFETTO DELLA CAPTAZIONE DELLO IODIO
C DIFETTO DI DESIODASI
D DIFETTO DEL TRASPORTO DELLO IODIO
X E DIFETTO DI SECREZIONE DI TIREOGLOBULINA

- 866 QUALI TRA LE SEGUENTI NON E' UNA CAUSA DI CHETOSI DIABETICA:
X A AUMENTATA ATTIVITA' PIRUVICO-DEIDROGENASICA
B FORTE DIMINUZIONE DELLA LIPOGENESI
C DIMINUITA FORMAZIONE DI NADPH+ DA PARTE DEL CICLO DEI PENTOSI
D RIDOTTE DISPONIBILITA' DI ACIDO OSSALACETICO
E INCREMENTATA LIPOLISI
- 867 CHE COS'E' LA TRANSCORTINA:
A UNA CATECOLAMINA
B UN ENZIMA DELLA CORTICALE DEL SURRENE
C LA PROTEINA VETTRICE DEL CORTICOSTEROLO
X D LA GLOBULINA VETTRICE DEL CORTISOLO
E UN ORMONE SURRENALICO
- 868 LE CELLULE C PARAFOLLICOLARI DELLA TIROIDE DERIVANO:
X A DALLE CRESTE NEURALI
B DAL SACCO VITELLINO
C DALLE CELLULE FOLLICOLARI (TIREOCITI)
D DALLE CRESTE GENITALI (SOLO PER LA PARTE EPITELIALE)
E DAL MIDOLLO OSSEO
- 869 DI QUANTE SUB-UNITA' SONO COSTITUITI GLI ORMONI LH FSH E TSH:
A 1
X B 2
C 3
D 4
E 5
- 870 UNA DI QUESTE ALTERAZIONI E' PRESENTE NEL DIABETE MELLITO:
A IPOTENSIONE
X B ISPESSIMENTO DELLA MEMBRANA BASALE DEI CAPILLARI
C IPOGLICEMIA
D AMILOIDOSI
E GLICOGENOSI
- 871 QUAL E' LA PERCENTUALE DI CARBOIDRATI NELLA STRUTTURA CHIMICA DELLA PROLATTINA E DEL GH:
X A 0%
B 15-20%
C 22-30%
D 40-50%
E 100%
- 872 LA TIREOGLOBULINA E' UNA PROTEINA SINTETIZZATA IN:
A FEGATO
B RENE
X C TIROIDE
D PANCREAS
E PARATIROIDI
- 873 L'INCREZIONE DI PARATORMONE E' REGOLATA PRINCIPALMENTE:
X A DAL LIVELLO DELLA CALCEMIA
B DAL LIVELLO DELLA FOSFATEMIA
C DAL LIVELLO DELLA POTASSEMIA
D DAL LIVELLO DELLA CLOREMIA
E DAL LIVELLO DELL'ALDOSTERONE
- 874 NEL FEOCROMOCITOMA SONO PRESENTI I SEGUENTI SINTOMI E SEGNI TRANNE CHE:
A IPERTENSIONE
B TACHICARDIA
X C IPOTENSIONE
D DOLORE TORACICO
E PALLORE
- 875 GLI ORMONI CHE PROVOCANO IL PICCO OVULATORIO DI LH SONO:
X A ESTROGENI
B PROGESTERONE
C FSH
D TUTTI I PRECEDENTI
E NESSUNO DEI PRECEDENTI
- 876 LE CAUSE PIU' COMUNI DI IPOTIROIDISMO INCLUDONO:
A IPOPIUITARISMO
B TRATTAMENTO DELL'IPERTIROIDISMO
X C TRAUMA CHIRURGICO DOVUTO AD INTERVENTO SULLA TIROIDE
D APLASIA CONGENITA DELLE PARATIROIDI
E DOSI ECCESSIVE DI CALCITONINA
- 877 UNA DEFICIENTE RISPOSTA DELL'AMP CICLICO RENALE AL PARATORMONE E' PRESENTE IN PAZIENTI CON:
X A PSEUDOIPOPARATIROIDISMO
B PSEUDOPSEUDOIPOPARATIROIDISMO
C IPOPARATIROIDISMO DA ABLAZIONE CHIRURGICA DELLE PARATIROIDI
D IPOPARATIROIDISMO IDIOPATICO
E IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO

878 TUMORI FUNZIONANTI DELLE CELLULE DI LEYDIG PRODUCONO ELEVATE QUANTITA' DI:
 A LH
 B FSH
 X C TESTOSTERONE
 D PRL
 E NESSUNA DELLE PRECEDENTI

879 QUALE DEI SEGUENTI TEST NON E' USATO PER LA VALUTAZIONE DELLA RISERVA DI GH:
 A IPOGLICEMIA INSULINICA
 B L-DOPA
 C INFUSIONE DI ARGININA
 X D VASOPRESSINA
 E SFORZO FISICO

880 GLI ORMONI TIROIDEI DERIVANO DA:
 X A AMINOACIDI
 B GRASSI NEUTRI
 C FOSFOLIPIDI
 D GLICIDI
 E NUCLEOTIDI

881 GLI ORMONI TIROIDEI SONO TRASPORTATI IN CIRCOLO DALLA PROTEINA:
 A TRANSCORTINA
 B TIREOGLOBULINA
 C TRANSFERRINA
 X D PREALBUMINA
 E ALFA FETOPROTEINA

882 LA COLESTEROLEMIA E' DIMINUITA IN QUALE DI QUESTE CONDIZIONI:
 A IPERCORTICOSURRENALISMO
 B IPERALDOSTERONISMO
 C IPERPARATIROIDISMO
 X D IPERTIROIDISMO
 E DIABETE

883 I 17-CHETOSTEROIDI RAPPRESENTANO UN PRODOTTO DEL CATABOLISMO DEL:
 A PROGESTERONE
 X B TESTOSTERONE
 C COLESTEROLO
 D ALDOSTERONE
 E CORTISOLO

884 QUALE SOSTANZA BLOCCA LA BIOSINTESI DEGLI ORMONI TIROIDEI:
 A METILXANTINE
 B ACIDO URICO
 X C TIOURACILE
 D ACIDO ASCORBICO
 E SALICILATO

885 LE PROSTAGLANDINE STIMOLANO LA ghiandola tiroide DETERMINANDO:
 A UN INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI TIREOTROPINA
 B UNA DIMINUZIONE DI FATTORE IPOTALAMICO RILASCIANTE LA TIREOTROPINA
 C UN AUMENTO DI FATTORE IPOTALAMICO RILASCIANTE LA TIREOTROPINA
 X D UN EFFETTO TIREOTROPO SIMILE SULLA ghiandola tiroide
 E UN'AZIONE ANTAGONIZZANTE GLI EFFETTI DELL'ORMONE TIREOTROPO

886 QUALE DI QUESTE AFFERMAZIONI E' INESATTA:
 A L'INSULINA DIMINUISCE LA GLICEMIA, IL GLUCAGONE LA AUMENTA
 X B L'INSULINA DIMINUISCE IL GLICOGENO EPATICO, IL GLUCAGONE LO AUMENTA
 C L'INSULINA AUMENTA LA UTILIZZAZIONE DEL GLUCOSIO, IL GLUCAGONE LA DIMINUISCE
 D L'INSULINA DIMINUISCE LA GLUCOGENOGENESI, IL GLUCAGONE L'AUMENTA
 E L'INSULINA AUMENTA LA LIPOSINTESI, IL GLUCAGONE LA DIMINUISCE

887 INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI DEFINIZIONI DI "VIRULENZA" E' PIU' CORRETTA:
 A LA CAPACITA' DEL MICRORGANISMO DI DETERMINARE UNA MALATTIA
 B LA CAPACITA' DEL MICRORGANISMO DI PRODURRE TOSSINE A LORO VOLTA PATOGENE PER L'ORGANISMO
 C LA RESISTENZA DEL MICRORGANISMO AGLI ANTICORPI ED AGLI ALTRI FATTORI DI DIFESA IMMUNITARIA DELL'ORGANISMO
 X D LA CAPACITA' DI UN DATO MICRORGANISMO DI SUPERARE LE DIFESE DI UN DATO OSPITE, IN DETERMINATE CONDIZIONI
 E LA RESISTENZA DEL MICRORGANISMO AGLI AGENTI TERAPEUTICI (ANTIBIOTICI ETC.)

888 I CROMOSOMI NELLO SPERMATOZOO MATURO SONO IN NUMERO DI:
 A 48
 B 46
 C 22
 D 24
 X E 23

889 IL PRINCIPALE PRODOTTO DI SECREZIONE ORMONALE DEL TESTICOLO E':
 A ANDROSTENEDIONE
 B CORTISOLO
 X C TESTOSTERONE
 D PROLATTINA
 E ESTROGENI

- 890 LO SVILUPPO E LA FUNZIONE DELLE CELLULE DI LEYDIG E' REGOLATO DA:
A GONADOTROPINA FSH
B PROLATTINA
X C GONADOTROPINA LH
D SOMATOTROPO
E ACTH
- 891 LA SINDROME DI KLINEFELTER E' UN:
X A IPOGONADISMO PRIMITIVO
B IPOGONADISMO SECONDARIO
C SINDROME DA OSTRUZIONE
D IPOSURRENALISMO
E SINDROME DA CARENZA DI TESTOSTERONE
- 892 SI E' DATO IL NOME DI "MALATTIA DEI LEGIONARI" A:
A IL TIPO ESANTEMATICO, PERCHE' FREQUENTE IN FORMA EPIDEMICA NEGLI ESERCITI CHE ROMA INVIAVA AI CONFINI DELL'IMPERO
B UNA EPIDEMIA DI "SPAGNOLA" CHE COLPI' I LEGIONARI ITALIANI IN SPAGNA NEL 1936
C UNA INFEZIONE DA VIRUS RESPIRATORIO SINCRIZIALE A PREVALENTE LOCALIZZAZIONE RESPIRATORIA, FREQUENTE IN FORMA EPIDEMICA NELLE CASERME E NEGLI ACCAMPAMENTI MILITARI
X D UNA INFEZIONE CON PREVALENTE LOCALIZZAZIONE POLMONARE, SOSTENUTA DA UN BATTERO SPECIFICO GRAMNEGATIVO, DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO IN PICCOLI FOCOLAI EPIDEMICI
E LA MENINGITE CEREBRO-SPINALE DA MENINGOCOCCO, FREQUENTE IN PICCOLI FOCOLAI EPIDEMICI IN CASERME, SCUOLE ETC.
- 893 LE ENDOTOSSINE SONO:
A POLISACCARIDI
B LIPOPOLISACCARIDI
X C LIPOPOLISACCARIDI LEGATI AD UNA PROTEINA
D PROTEINE
E LIPOPROTEINE
- 894 LE ENDOTOSSINE DEI BATTERI GRAM-NEGATIVI SI IDENTIFICANO CON:
A L'ANTIGENE CAPSULARE
B L'ANTIGENE VI
C L'ANTIGENE CILIARE
X D L'ANTIGENE SOMATICO
E CON NESSUNO DEI PRECEDENTI ANTIGENI

- 895 GLI ANTICORPI CONTRO LE ENDOTOSSINE HANNO AZIONE:
A NEUTRALIZZANTE LA ENDOTOSSINA
B PRECIPITANTE LA ENDOTOSSINA
X C AGGLUTINANTE I BATTERI PRODUTTORI DELLA ENDOTOSSINA
D TUTTE LE PRECEDENTI
E NESSUNA DELLE PRECEDENTI
- 896 LA REAZIONE DI PAUL BUNNEL-DAVISON, USATA NELLA DIAGNOSI DI MONONUCLEOSI INFETTIVA, CONSISTE NELLA:
A AGGLUTINAZIONE DI PROTEUS X-19
B AGGLUTINAZIONE DI EMAZIE DI PECORA
C AGGLUTINAZIONE DI EMAZIE DI PECORA DOPO ASSORBIMENTO DEL SIERO CON PROTEUS X 19
X D AGGLUTINAZIONE DI EMAZIE DI PECORA DOPO ASSORBIMENTO DEL SIERO SU RENE DI CAVIA
E AGGLUTINAZIONE DI UNA SOSPENSIONE DI VIRUS DI EPSTEIN-BARR OTTENUTA DA COLLARE SU UOVA EMBRIONALE
- 897 LA CELLULA GIGANTE TIPO LANGHANS E' CARATTERIZZATA DA:
A FORMA ROTONDEGGIANTE, CITOPLASMA BASOFILO, PRESENZA DI 2-3 NUCLEI CENTRALI CON GROSSI NUCLEOLI
B FORMA ALLUNGATA, CITOPLASMA BASOFILO, PRESENZA DI 1-2 NUCLEI PURE ALLUNGATI, CON DISPOSIZIONE DELLA CROMATINA A RUOTA
X C FORMA ROTONDEGGIANTE, CITOPLASMA ACIDOFILO, NUMEROSI NUCLEI, PER LO PIU' DISPOSTI ALLA PERIFERIA
D FORMA ROTONDEGGIANTE, CITOPLASMA ACIDOFILO, POCHI NUCLEI, PER LO PIU' CENTRALI
E FORMA VARIA, CITOPLASMA LIEVEMENTE BASOFILO, NUCLEO UNICO, CON 3-4 NUCLEOLI
- 898 DELLE SEGUENTI STRUTTURE O MOLECOLE UNA SOLA NON E' ASSOCIATA CON LA MEMBRANA PLASMATICA, QUALE:
A POMPE IONICHE
B MICROFILAMENTI CONTRATTILI
C RECETTORI
X D ENZIMI PER LA SINTESI PROTEICA
E PROTEINE CITOSCHELETRICHE
- 899 I LISOSOMI SONO CORRELATI CON LE SEGUENTI FUNZIONI ECCETTO UNA, QUALE:
X A DEMOLIZIONE DEI RADICALI PEROSSIDI E DELL'ACQUA OSSIGENATA
B DEMOLIZIONE DEL GLICOGENO
C DEMOLIZIONE DEGLI SFINGOLIPIDI
D DEMOLIZIONE DEGLI ACIDI NUCLEICI
E DEMOLIZIONE DEI MUCOPOLISACCARIDI

- 900 IL RETICOLO ENDOPLASMATICO LISCIO HA LE SEGUENTI PROPRIETA' ECCETTO UNA:
A PARTECIPA ALLA SINTESI DEGLI STEROIDI
B AUMENTA DOPO SOMMINISTRAZIONE DI FENOBARBITAL
C SINTETIZZA COMPOSTI CANCEROGENI DA MOLECOLE INATTIVE
D INATTIVA FARMACI E ALTRE MOLECOLE TOSSICHE
X E E' IL SITO SPECIFICO PER LA SINTESI PROTEICA
- 901 IL RETICOLO ENDOPLASMATICO GRANULARE HA LE SEGUENTI PROPRIETA', ECCETTO UNA:
A E' IL SITO SPECIFICO DELLA SINTESI PROTEICA
B METABOLIZZA IL TETRACLORURO DI CARBONIO
C E' MOLTO ABBONDANTE IN TUTTE LE CELLULE CHE SECRONO PROTEINE
D VIENE DISTRUTTO DAI METABOLITI CHE ORIGINANO DAL CCl4
X E HA UN RUOLO FONDAMENTALE NEL METABOLISMO ENERGETICO
- 902 LA NECROSI CELLULARE E' CARATTERIZZATA DA UNA SOLA DELLE SEGUENTI LESIONI (LESIONE IRREVERSIBILE), QUALE:
A PICNOSI NUCLEARE
B GLICOGENOSI NUCLEARE
C RIGONFIAMENTO MITOCONDRIALE A PICCOLA AMPIEZZA
D NOTEVOLE AUMENTO DELLA GLICOLISI
X E DEGRANULAZIONE DEL RETICOLO ENDOPLASMATICO GRANULARE
- 903 CARATTERISTICHE DELLA SENESCENZA DI UNA MALATTIA DI UNA CELLULA O TESSUTO SONO LE SEGUENTI, ECCETTO UNA; QUALE:
A DIMINUZIONE DEL CONTENUTO DELL'ACQUA INTRACELLULARE
B AUMENTO DEL CONTENUTO TOTALE DI CALCIO IN UN TESSUTO
C ACCUMULO DI PIGMENTI E INCLUSIONI PATOLOGICHE (ES. LIPOFUSCINE)
X D MAGGIORE CAPACITA' DI DIFFERENZIARSI E QUINDI AUMENTO DELLE FUNZIONI DI BASE COME CONSUMO DI O2
E NESSUNA DI QUESTE RISPOSTE E' ESATTA
- 904 IL PAPILOMA DI SHOPE E' PROVOCATO:
X A DA UN VIRUS A DNA
B DA UN VIRUS A RNA
C DA SPENNELATURE CON CATRAME
D DA RADIAZIONI
E IMMUNODEFICIENZE
- 905 LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIGUARDANTI LE METASTASI SONO VERE, ECCETTO UNA:
A UNA METASTASI PROVENIENTE DAL VENTRICOLO SINISTRO SI FERMA QUASI SEMPRE AL CERVELLO
B UN TIPO DI MELANOMA MALIGNO DA' METASTASI QUASI ESCLUSIVAMENTE AL POLMONE
X C I CARCINOMI DANNO METASTASI SOLO PER VIA EMATICA
D I SARCOMI DANNO METASTASI PER VIA EMATICA
E IL CORIONEPITELIOMA DA' DIFFICILMENTE METASTASI TUTTAVIA E' ESTREMAMENTE INVASIVO
- 906 LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIGUARDANTI I SARCOMI SONO VERE, ECCETTO UNA, QUALE:
A I TUMORI CONNETTIVALI MALIGNI SI DIVIDONO IN SARCOMI BLASTICI E SARCOMI IMMaturi
X B I SARCOMI BLASTICI SONO PIU' MALIGNI E MENO DIFFERENZIATI DEI SARCOMI IMMaturi
C IL FIBROSARCOMA CONTIENE COLLAGENE
D IL LEIOMIOSARCOMA E' UN SARCOMA LE CUI CELLULE PRESENTANO UN CERTO GRADO DI DIFFERENZIAZIONE VERSO LE CELLULE MUSCOLARI LISCE
E IL CONDROSARCOMA E' UN TUMORE CONNETTIVALE DIFFERENZIATO VERSO IL TESSUTO CARTILAGINEO
- 907 LE SEGUENTI SONO TUTTE VIE DI METASTASI, ECCETTO UNA, QUALE:
A VIA LINFATICA
B VIA TRANSCELOMATICA
C VIA CANALICOLARE
D VIA EMATICA
X E VIA TRANSCUTANEA
- 908 TRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIGUARDANTI I CARCINOMI UNA SOLA E' VERA, QUALE:
X A LE PERLE CORNEE O CHERATINICHE SONO PRESENTI NEL CARCINOMA SPINOCELLULARE
B IL POLIPO E' UN TUMORE BENIGNO CHE NEL TEMPO SICURAMENTE SI TRASFORMA IN CARCINOMA
C IL CARCINOMA BASOCELLULARE, ESSENDO MENO DIFFERENZIATO, E' PIU' MALIGNO, INVASIVO E METASTALIZZANTE RISPETTO AL CARCINOMA SPINOCELLULARE
D LE PERLE CORNEE SI TROVANO NEL FIBROSARCOMA
E IL LIPOMA E' UN TUMORE EPITELIALE BENIGNO
- 909 CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA MALIGNITA' CELLULARE SONO LE SEGUENTI ECCETTO UNA, QUALE:
A CAPACITA' DI DARE METASTASI
B CAPACITA' INVASIVA E CARIOTIPO ABNORME
C ALTA GLICOLISI AEROBICA E ALTA VELOCITA' DI CRESCITA
X D SVILUPPO, DI REGOLA, DI TUMORI DI PIU' GROSSE DIMENSIONI
E MANCANZA DELLA INIBIZIONE DELLA CRESCITA DA CONTATTO E MANCATA REGOLAZIONE DELLA CRESCITA

- 910 GLI ESTROGENI ESPLICANO IL MECCANISMO D'AZIONE REAGENDO A LIVELLO DEL NUCLEO DELLA CELLULA BERSAGLIO CON:
- A ISONI
 - B NUCLEOTIDI
 - C ZUCCHERI
 - X D PROTEINE ACIDE
 - E DNA
- 911 IL TEST INDIRETTO DI COOMBS PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-D SI ESEGUE:
- A CON EMASIE RH+ DI GRUPPO A
 - B CON EMASIE RH- DI GRUPPO A
 - X C CON EMASIE RH+ DI GRUPPO 0
 - D CON EMASIE RH- DI GRUPPO 0
 - E CON EMASIE DI MONTONE
- 912 IL TEST DIRETTO DI COOMBS PER DETERMINAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-D SI ESEGUE:
- A SU EMASIE DELLA MADRE
 - X B SU EMASIE DEL FETO
 - C COL SIERO DEL FETO
 - D COL SIERO DELLA MADRE
 - E COL SIERO DI TUTTI E DUE
- 913 IL LATS (LONG ACTING THYROID STIMULATOR) E':
- A UN ORMONE
 - B UN POLIPEPTIDE
 - C UNO STEROIDE
 - D UNA LIPOPROTEINA
 - X E UN ANTICORPO
- 914 LA PROTEINA C REATTIVA CHE FORMA UN PRECIPITATO CON IL CARBOIDRATO C GRUPPO SPECIFICO DEGLI PNEUMOCOCCHI E':
- X A UNA MOLECOLA OPSONIZZANTE
 - B UNA MOLECOLA IMMUNOGLOBULINICA
 - C UN ANTICORPO INCOMPLETO
 - D UN ANTICORPO NATURALE
 - E UNA SOSTANZA SIMIL-LISOZIMICA

- 915 DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI SULLE IMMUNOGLOBULINE UNA E' ERRATA:
- A LE IG A SECRETORIE SONO DIMERI FORMATI DA DUE IG A PIU' DUE PROTEINE DETTE "PEZZO DI GIUNZIONE" E "PEZZO DI TRASPORTO"
 - B LA PREMINENTE FUNZIONE DELLE IG D E' IL RICONOSCIMENTO DELL'ANTIGENE
 - C LE IG M SONO GENERALMENTE ABBONDANTI NELLA RISPOSTA PRIMARIA
 - X D LE IG E SONO LE UNICHE IMMUNOGLOBULINE CAPACI DI ATTIVARE IL COMPLEMENTO
 - E LE IG E SI LEGANO COL LORO FRAMMENTO FC AD UNO SPECIFICO RECEPTORE DELLA MEMBRANA DEI BASOFILI E MASTOCITI
- 916 LA BILIRUBINA NON CONIUGATA HA LE SEGUENTI PROPRIETA', ECCETTO UNA; QUALE:
- A NON E' IDROSOLUBILE
 - B E' LEGATA ALL'ALBUMINA DEL PLASMA
 - C NON PASSA NELLE URINE
 - D ATTRAVERSA LA BARRIERA EMATOENCEFALICA
 - X E NON E' PRESENTE NORMALMENTE NEL PLASMA
- 917 NEL GRAFICO ELETTROFORETICO NORMALE LE PROTEINE QUANTITATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATE SONO:
- X A ALBUMINA
 - B ALFA-1-GLOBULINE
 - C ALFA-2-GLOBULINE
 - D BETA-GLOBULINE
 - E GAMMA-GLOBULINE
- 918 ALL'ESAME ELETTROFORETICO DELL'EMOGLOBINA DI UN INDIVIDUO OMOZIGOTE PER L'EMOGLOBINOPATIA S (ANEMIA FALCIFORME) SI VEDONO:
- X A 1 SOLA EMOGLOBINA
 - B 2 EMOGLOBINE
 - C 3 EMOGLOBINE
 - D 4 EMOGLOBINE
 - E UN NUMERO VARIABILE DI EMOGLOBINE A SECONDA DEI DIFFERENTI INDIVIDUI
- 919 IL DNA CONTENUTO NEL NUCLEO DI UNA CELLULA UMANA:
- X A E' SOVRABBONDANTE; POTREBBE CODIFICARE PER UN NUMERO DI PROTEINE MOLTO MAGGIORE
 - B E' ESATTAMENTE SUFFICIENTE A CODIFICARE PER LE PROTEINE ESISTENTI NELLA CELLULA
 - C E' INFERIORE AL NUMERO DI PROTEINE PRODOTTO DALLE CELLULE
 - D E' IN GRAN PARTE RIPETITIVO
 - E NESSUNA DELLE PRECEDENTI RISPOSTE E' ESATTA

- 920 LE PROTEINE DEL CAPSIDE VITALE:
A NON HANNO UNA FUNZIONE PROTETTIVA DEL GENOMA
B NON HANNO ALCUNA IMPORTANZA PER L'INFEZIONE
C SONO CODIFICATE DAL GENOMA DELL'OSPITE
X D SONO CODIFICATE DAL GENOMA VIRALE
E NON HANNO FUNZIONE DI ATTACCO AI RECETTORI DELLE CELLULE DELL'OSPITE
- 921 I VIRUS POSSONO ESSERE COLTIVATI IN LABORATORIO IN
A COLTURE PRIMARIE DI RENI DI SCIMMIA
B UOVA
C ANIMALI DI LABORATORIO
D CELLULE POLMONARI UMANE DIPLOIDI
X E TUTTE LE RISPOSTE SONO ESATTE
- 922 GLI ISOTOPI SONO:
A NUCLIDI AVENTI LA STESSA MASSA ATOMICA MA DIFFERENTI NUMERI ATOMICI
X B NUCLIDI AVENTI LO STESSO NUMERO ATOMICO MA DIFFERENTI MASSE ATOMICHE
C NUCLIDI EMETTENTI NEUTRONI
D NUCLIDI EMETTENTI RAGGI GAMMA
E NUCLIDI AVENTI DIFFERENTE NUMERO ATOMICO E DIFFERENTE MASSA ATOMICA
- 923 L'ARROSSAMENTO CHE CARATTERIZZA L'INFIAMMAZIONE ACUTA E' DOVUTO SOPRATTUTTO A:
A EDEMA DEI TESSUTI
B MARGINAZIONE DEI LEUCOCITI NEI PICCOLI VASI
C TROMBOSI DEI VASI
X D DILATAZIONE DEI VASI
E NESSUNA RISPOSTA E' ESATTA
- 924 IL CONTENUTO EMOGLOBINICO NORMALE DEL SANGUE DELL'UOMO E':
A 3-5 G/DL
B 7-10 G/DL
X C 13-15 G/DL
D 18-20 G/DL
E 22-25 G/DL
- 925 IL FABBISOGNO PROTEICO QUOTIDIANO DI UN SOGGETTO ADULTO E SANO E' DI
A 3,0 G/KG. PESO CORPOREO (P.C.)
B 2,5 G/KG. P.C.
C 2,0 G/KG. P.C.
D 1,5 G/KG. P.C.
X E 1,0 G/KG. P.C.
- 926 LA TRANSAMINASI SERICA GOT E' AUMENTATA SEMPRE IN UNA DI QUESTE CONDIZIONI:
A PLEURITE ESSUDATIVA
B RIPETUTE EMODIALISI
C GOTTA
X D INFARTO MIOCARDICO ACUTO
E SINDROME NEFROSICA
- 927 LA DENOMINAZIONE "RH POSITIVO" STA AD INDICARE LA PRESENZA NELL'EMAZIE DELL'UOMO DELL'ANTIGENE:
X A D
B C
C C MINUSCOLA
D E
E E MINUSCOLA
- 928 IL TASSO PLASMATICO DI HCO_3 E' DI NORMA:
A 150 M EQ/L
B 100 M EQ/L
C 75 M EQ/L
D 50 M EQ/L
X E 25 M EQ/L
- 929 LA CREATININEMIA E' AUMENTATA NELLA:
A GASTRITE IPOCLORIDRICA
B ANEMIA IPOCROMICA
C ASMA BRONCHIALE
X D INSUFFICIENZA RENALE
E MIASTENIA
- 930 CARENZA DI VITAMINA K SI MANIFESTA CON:
A OSTEOMALACIA
B LINGUA A CARTA GEOGRAFICA
X C EMORRAGIE
D PALPEBRITE ANGOLARE
E NEFROPATIA DA FENACETINA
- 931 NEL SIERO DEL SANGUE DI GRUPPO B SI RILEVANO ANTICORPI:
A ANTI AB
X B ANTI A
C ANTI B
D NESSUNO DI QUESTI ANTICORPI
E ANTI-H
- 932 NELLA FORMULA LEUCOCITARIA DI NORMA I GRANULOCITI BASOFILI SONO PERCENTUALMENTE:
A 10-12%
B 7-10%
C 5-7%
D 2-5%
X E 0,5-1%

- 933 LA CROMATINA E' CONTENUTA:
A NEL CITOPLASMA
X B NEL NUCLEO
C NEL LISOSOMA
D NEL RIBOSOMA
E NELL'APPARATO DEL GOLGI
- 934 QUALE FRA QUESTE E' LA FORMA PIU' SEMPLICE DI VITA ORGANIZZATA:
X A BATTERIOFAGO
B BATTERIO
C TREPONEMA
D RICKETTSIA
E PORTOZOO
- 935 I LISOSOMI SONO CONTENUTI:
A NEL NUCLEOLO
B NEL NUCLEO
X C NEL CITOPLASMA
D NELL'APPARATO DEL GOLGI
E NEI MITOCONDRI
- 936 L'EMOGLOBINA E':
A UN FOSFOLIPIDE
B UNA GLICOPROTEINA
C UNA FOSFOPROTEINA
D UNA LIPOPROTEINA
X E UNA CROMOPROTEINA
- 937 IL PROCESSO PER CUI L'INFORMAZIONE GENETICA VIENE TRASMESSA DAL DNA ALL'RNA E' CHIAMATA:
A MEIOSI
B TRADUZIONE
X C TRASCRIZIONE
D DUPLICAZIONE
E DIPLODIA
- 938 NELLA MEIOSI QUALE DI QUESTI STADI FA PARTE DELLA PROFASE I:
A LEPTOTENE
B ZIGOTENE
C PACHITENE
D DIPLTENE
X E TUTTI QUESTI STADI
- 939 UN GENOTIPO CON DUE ALLELI IDENTICI IN UN DETERMINATO LOCUS E' UN
A MONOZIGOTE
B DIZIGOTE
C ETEROZIGOTE
X D OMOZIGOTE
E EMIZIGOTE
- 940 IL SITO DI UN CROMOSOMA OCCUPATO DA UNO SPECIFICO GRUPPO DI ALLELI SI CHIAMA:
X A LOCUS
B GENOMA
C CENTROMERO
D CISTRONE
E CODONE
- 941 QUALE DI QUESTE MALATTIE E' UNA MALATTIA AUTOSOMICA RECESSIVA:
A FEOCROMOCITOMA
X B ALBINISMO
C SCLEROSI TUBEROSA
D NEUROFIBROMATOSI
E RETINOBLASTOMA
- 942 TUTTI I CROMOSOMI CHE NON SONO CROMOSOMI DEL SESSO VENGONO DENOMINATI COME:
X A AUTOSOMI
B ALLELI
C DIZIGOTI
D CROMATICI
E CODONI
- 943 QUALE DI QUESTI ELEMENTI HA UN PESO ATOMICO DI 14,008:
A OSSIGENO
X B AZOTO
C SODIO
D CARBONIO
E CALCIO
- 944 NELLA REAZIONE ANTIGENE-ANTICORPO SONO COINVOLTE:
A FORZE DI VAN DER WAALS
B FORZE DI COULOMB
C LEGAMI DI IDROGENO
D LEGAMI IDROFOBICI
X E TUTTE QUESTE FORZE
- 945 IL DNA E' FORMATO DA UNA DOPPIA CATENA POLINUCLEOTIDICA (DOPPIA SPIRALE) LE CUI BASI AZOTATE ALL'INTERNO DELLE DUE CATENE SONO UNITE DA LEGAMI IDROGENO CHE SI FORMANO FRA:
A ADENINA DA UN LATO E AC. FOSFORICO DALL'ALTRO LATO
B ADENINA DA UN LATO E GLUCOSIO DALL'ALTRO LATO
X C ADENINA DA UN LATO E TIMINA DALL'ALTRO LATO
D CITOSINA DA UN LATO E URACILE DALL'ALTRO LATO
E CITOSINA DA UN LATO E SC. URICO DALL'ALTRO LATO

946 QUALE DI QUESTI ACIDI GRASSI E' COSTITUITO DA SOLO DUE ATOMI DI CARBONIO:
A AC. CAPROICO
B AC. CAPRILICO
C AC. CAPRICO
X D AC. ACETICO
E AC. BUTIRRICO

947 LA CREATININEMIA DEL SIERO E' NORMALMENTE DI:
A 0,2-0,5 MG/DL
B 0,5-0,7 MG/DL
X C 0,8-1,2 MG/DL
D 2,0-2,5 MG/DL
E 3,0-3,5 MG/DL

948 IL BATTERIOFAGO E':
X A UN VIRUS PATOGENO PER I BATTERI
B UN FATTORE DI ACCRESCIMENTO BATTERICO
C UNA SHIGELLA
D UN VIBRIONE
E UNA RICKETTSIA

949 IL CICLO VITALE DI UNA PARTICELLA VIRALE ESIGE PER COMPIERSI:
A LA DISPONIBILITA' DI UN OSPITE NON SPECIFICO
B LA DISPONIBILITA' DI PROCARIOTI
X C L'ESIGENZA DI UN MECCANISMO SPECIFICO DI RICONOSCIMENTO DELL'OSPITE
D LA DISPONIBILITA' DI EUCARIOTI
E LA DISPONIBILITA' DI UN OSPITE SPECIFICO

950 LA PRINCIPALE FUNZIONE DELLA MOLECOLA DI ACIDO NUCLEICO CONTENUTA NELLE PARTICELLE VIRALI E':
A IDENTIFICARE L'OSPITE ADATTO ALLA RIPRODUZIONE DEL VIRUS
X B CODIFICARE PER LE PROTEINE VIRALI
C CATALIZZARE LE REAZIONI NECESSARIE PER LA LISI DELLA CELLULA OSPITE
D PROMUOVERE NELLA CELLULA INFETTATA LA REPLICA DELL'RNA E LA TRASCRIZIONE DELLE PROTEINE DELL'OSPITE
E AGEVOLARE LA FORMAZIONE DEL CAPSIDE VIRALE

951 IL MATERIALE GENETICO E':
A SEMPRE DNA
B SEMPRE RNA
C SEMPRE UNA PROTEINA
X D DI SOLITO DNA, IN QUALCHE CASO RNA
E DI SOLITO RNA, IN QUALCHE CASO DNA

952 SEGNARE LA STRUTTURA SUBCELLULARE CHE NON E' PRESENTE IN UNA CELLULA PROCARIOTA:
A RETICOLO ENDOPLASMATICO
B MITOCONDRI
C NUCLEO
X D MEMBRANA CITOPLASMATICA
E APPARATO DEL GOLGI

953 QUANTE SONO LE POSSIBILI CATENE POLIPEPTIDICHE:
A 4
B 20
C CIRCA 100
D CIRCA 100.000
X E PRATICAMENTE INFINITE

954 GLI AMINOACIDI SONO UNITI FRA DI LORO PER FORMARE UNA PROTEINA CON UN LEGAME DI TIPO:
A ESTERE
B ETERE
X C PEPTIDICO
D NON COVALENTE
E IDROFOBICO

955 SI DEFINISCE COME STRUTTURA PRIMARIA DI UNA PROTEINA:
A LA DISPOSIZIONE LINEARE CHE LE CATENE POLIPEPTIDICHE ASSUMONO QUANDO SONO DENATURATE
X B L'ORDINE DI SUCCESSIONE DEGLI AMINOACIDI NELLA CATENA PEPTIDICA
C IL RIEMPIMENTO ELICOIDALE PRESENTE IN ALCUNI TRATTI DELLE CATENE POLIPEPTIDICHE
D LA CONFORMAZIONE DELLA CATENA PROTEICA DOVUTA ALLA FORMAZIONE DI PONTI DI SOLFURO
E UNA SEQUENZA UGUALE DI AMINOACIDI IN INDIVIDUI DI UNA STESSA SPECIE

956 LA REAZIONE DI FOTOSINTESI:
A DEVE AVVENIRE INTERAMENTE ALLA LUCE
X B DEVE AVVENIRE PARZIALMENTE ALLA LUCE (ALMENO LA FASE LUMINOSA)
C DEVE AVVENIRE PARZIALMENTE ALL'OSCURO (ALMENO LA FASE OSCURA)
D CONSISTE NELLA COMBINAZIONE DELLA CO₂ E DELL'O₂
E CONSISTE NELLA COMBINAZIONE DELL'O₂ E DELL'H₂O

957 UNA MUTAZIONE COSIDDETTA SPONTANEA:
A PUO' ESSERE DOVUTA ALLO SHIFT TAUTOMERICO DELLA BASE
B PUO' ESSERE INDOTTA DA RADIAZIONI IONIZZANTI O NON IONIZZANTI
C PUO' ESSERE INDOTTA DA UN ERRORE DELLA DNA POLIMERASI
D PUO' ESSERE INDOTTA DA ERRORI NEI FRAMMENTI DI RICOMBINAZIONE DEL DNA
X E TUTTE LE AFFERMAZIONI SONO ESATTE

958 UNA MUTAZIONE PUO' AVVENIRE A LIVELLO:

- X A DEL DNA
- B DELL'RNA
- C DELL'RNA, MA SOLO MESSAGGERO
- D DELL'RNA
- E DELLE PROTEINE

959 I RAGGI U.V.:

- A SONO RADIAZIONI IONIZZANTI
- X B SONO RADIAZIONI NON IONIZZANTI
- C NON PROVOCANO LA FORMAZIONE DI DIMERI DI TIMINA
- D NON HANNO EFFETTO MUTAGENO
- E NON INDUCONO LA ROTTURA DEI CROMOSOMI

960 SE UN GENE HA 3 ALLELI, QUANTI SONO I GENOTIPI POSSIBILI:

- A 1
- B 3
- X C 6
- D 9
- E 12

961 QUALE CLASSE DI IMMUNOGLOBULINE E' RESPONSABILE DEI SINTOMI CLINICI DELL'ALLERGIA ATOPICA:

- A IGD
- B IGM
- X C IGE
- D IGG
- E IGA

962 LA CLOROFILLA:

- A HA ATTIVITA' ENZIMATICA: CATALIZZA LA FOTOSINTESI
- X B VIENE ECCITATA DALLA LUCE E DA' IL VIA ALLA FOTOSINTESI
- C SI SCINDE, ALLA LUCE, CAPTANDO CO₂ E LIBERANDO O₂
- D TRASPORTA L'O₂ NELLE PIANTE, COME L'EMOGLOBINA NEGLI ANIMALI
- E NESSUNA AFFERMAZIONE E' CORRETTA

963 UN NUCLEOTIDE E' UN COMPOSTO COSTITUITO DA:

- A UN RIBOSIO LEGATO AD UNA BASE AZOTATA MEDIANTE L'ATOMO DI CARBONIO IN POSIZIONE 3'
- X B UN PENTOSIO LEGATO AD UNA BASE AZOTATA MEDIANTE L'ATOMO DI CARBONIO IN POSIZIONE 1', E AD UN RADICALE FOSFORICO IN POSIZIONE 5'
- C DUE BASI AZotate COMPLEMENTARI
- D DUE MOLECOLE DI PENTOSIO LEGATE FRA DI LORO MEDIANTE UN PONTE FOSFODIESTERICO
- E DUE BASI AZotate NON COMPLEMENTARI

964 I MITOCONDRI SONO ORGANELLI CELLULARI DOTATI DI SEMIAUTONOMIA GENETICA. CIO' SIGNIFICA CHE:

- A SINTETIZZANO DA SOLI LE PROPRIE PROTEINE UTILIZZANDO MESSAGGERI DI ORIGINE NUCLEARE
- X B POSSEGGONO UN PROPRIO MATERIALE GENETICO
- C POSSEGGONO PROTEINE CODIFICATE SOLO DAL PROPRIO MATERIALE GENETICO
- D POSSONO SOPRAVVIVERE PER QUALCHE GENERAZIONE SE ISOLATI DALLE CELLULE
- E POSSEGGONO PROTEINE CODIFICATE SOLO DAL MATERIALE GENETICO NUCLEARE

965 ALCUNI TIPI DI CELLULE DELLE PIANTE CONTENGONO I CLOROPLASTI. TALI ORGANELLI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- X A SONO LA SEDE DELLA FOTOSINTESI
- B SONO LA SEDE DELLA RESPIRAZIONE CELLULARE
- C SONO LA SEDE SIA DELLA FOTOSINTESI CHE DELLA RESPIRAZIONE
- D NON GODONO DI SEMIAUTONOMIA GENETICA
- E STRUTTURALMENTE PRESENTANO UNA SOLA MEMBRANA

966 GLI INDIVIDUI CHE COMPONGONO LA QUARTA GENERAZIONE NELLA DISCENDENZA DI UN CERTO ANTENATO CONSERVANO UNA FRAZIONE DEL GENOMA DI QUELL'ANTENATO PARI A:

- A 1/2
- B 1/8
- X C 1/16
- D 1/32
- E TUTTO IL GENOMA

967 IN UNA MALATTIA LEGATA AL CROMOSOMA X, COME SARANNO LE FIGLIE DI UN PADRE SANO E DI UNA MADRE OMIZIGOTE PER L'ALLELE RECESSIVO PATOLOGICO

- A 100% SANE
- B 50% SANE 50% MALATE
- C 100% MALATE
- X D 100% PORTATRICI SANE
- E 50% SANE 50% PORTATRICI

968 QUALE FRA QUESTE E' LA FORMULA DELL'ALCOOL ETILICO

- A CH₃-OH
- X B CH₃-CH₂OH
- C CH₃-CH₂-CH₂O
- D CH₃-CH₂-CH₂-CH₂OH
- E CH₂OH

969 QUALI DI QUESTI TESSUTI DANNEGGIATI NON HA POSSIBILITA' DI RIGENERAZIONE:

- A ADIPOSO
- B MUSCOLARE
- X C NERVOSO
- D EPITELIALE
- E ENDOTELIALE

970 L'AZOTO COSTITUISCE DELL'ARIA INSPIRATA IL:

- A 20%
- B 48%
- X C 79%
- D 81%
- E 96%

971 L'APPORTO GIORNALIERO RACCOMANDATO DI PROTEINE IN UN SOGGETTO MASCHIO ADULTO DI ETA' > 20 ANNI, PESO KG 65, ALTEZZA 1,70 M E' ALL'INCIRCA DI GRAMMI:

- A 15 DIE
- B 20 DIE
- C 30 DIE
- D 40 DIE
- X E 60 DIE

972 QUALE DI QUESTI ALIMENTI E' IL PIU' RICCO IN AMINO ACIDI ESSENZIALI:

- A LENTICCHIE
- B AVENA
- X C UOVA
- D RISO
- E CAROTE

973 QUALE DI QUESTE (DNA) FUNZIONI ESPLICA L'ACIDO DESOSSIRIBONUCLEICO:

- A SINTESI PROTEICA
- X B TRASMISSIONE DEI CARATTERI EREDITARI
- C GLICOSILAZIONE PROTEICA
- D TUTTE QUESTE FUNZIONI
- E NESSUNA DI QUESTE

974 QUALE DI QUESTI ALIMENTI E' PARTICOLARMENTE RICCO DI CALCIO:

- A CARNE OVINA
- X B FORMAGGIO
- C SPINACI
- D CROSTACEI
- E CAROTE

975 LA METILAZIONE DELLE BASI E' UN FENOMENO CHE RIGUARDA SOPRATTUTTO:

- A L'MRNA
- X B IL TRNA
- C TUTTI I TIPI DI RNA
- D SOLO GLI RNA DEGLI EUCARIOTI
- E L'RNA VIRALE

976 NELLE CELLULE DI EUCARIOTI:

- A LA TRASCRIZIONE AVVIENE NEL CITOPLASMA
- X B LA TRADUZIONE AVVIENE NEL CITOPLASMA
- C LA TRASCRIZIONE AVVIENE NEI MITOCONDRI
- D LA TRADUZIONE AVVIENE NEL NUCLEO
- E LA TRADUZIONE AVVIENE NEI MITOCONDRI

977 LA SINTESI DI RNA, DETTA TRASCRIZIONE:

- A IMPLICA LA SINTESI DI UNA SEQUENZA DI RIBONUCLEOTI DI UGUALE A QUELLA ESISTENTE DEL DNA CORRISPONDENTE
- X B IMPLICA LA SINTESI DI UNA SEQUENZA DI RIBONUCLEOTI DI COMPLEMENTARE A QUELLA DEL DNA CORRISPONDENTE
- C NON IMPLICA LA RIPRODUZIONE DELL'INFORMAZIONE GENETICA ESISTENTE NEL DNA CORRISPONDENTE
- D PROVOCA LA COMPARSA DI UNA NUOVA INFORMAZIONE GENETICA
- E NESSUNA DELLE RISPOSTE E' ESATTA

978 L'RNA DIFFERISCE DAL DNA PERCHE':

- A HA UNA BESE PURINICA DIVERSA
- X B HA UNA BASE PIRIMIDINICA DIVERSA
- C NON E' UN POLIMERO AD ALTO PESO MOLECOLARE
- D E' PRESENTE NORMALMENTE NELLA CELLULA CON UNA STRUTTURA A DOPPIA CATENA MENTRE IL DNA HA SOLITAMENTE UNA STRUTTURA A SINGOLA CATENA
- E HA UNA STRUTTURA LINEARE

979 QUALI FRA QUESTE MOLECOLE SONO PRESENTI NELL'RNA:

- X A ACIDO FOSFORICO
- B DESOSSIRIBOSO
- C TIMINA
- D ACIDO FOSFATIDICO
- E DESOSSIRIBONUCLEICO

980 LA FUNZIONE SPECIFICA DEL NUCLEOLO E':

- A LA SINTESI DI RNA MESSAGGERO
- B LA SINTESI DELLE PROTEINE RIBOSOMALI
- X C LA SINTESI DI RNA RIBOSOMALE
- D LA SINTESI DI RNA DI TRASFERIMENTO
- E LA SINTESI DI DNA

981 TRA L'MRNA ED IL GENE CORRISPONDENTE ESISTE UNA PRECISA RELAZIONE STRUTTURALE. ESSA CONSISTE NEL FATTO CHE:

- A ENTRAMBI POSSIEDONO UGUALI SEQUENZE DI BASE
- B POSSIEDONO SEQUENZE DI BASI NON COMPLEMENTARI
- X C SONO CAPACI DI INTERAGIRE TRA LORO FORMANDO MOLECOLE IBRIDE
- D HANNO UGUALE PESO MOLECOLARE
- E POSSIEDONO BASI COMPLETAMENTE DIVERSE

982 GLI STUDI TRASVERSALI:

- X A SONO FRA I MENO COSTOSI E DISPENDIOSI
- B FORNISCONO TASSI DI INCIDENZA
- C SONO APPLICABILI NELLO STUDIO DI FENOMENI PATOLOGICI RARI
- D SONO CONDOTTI CON METODO NON CAMPIONARIO
- E FORNISCONO PROVE DEFINITIVE SUI RAPPORTI CASUALI FRA FENOMENI

- 983 FRA I VANTAGGI DEGLI STUDI RETROSPETTIVI VI SONO TUTTI I SEGUENTI TRanne UNO:
A TEMPO DI ESECUZIONE BREVE
B ADATTO PER MALATTIE RARE
C I SOGGETTI NON DEVONO NECESSARIAMENTE ACCONSENTIRE ALLO STUDIO
D NUMERO DI SOGGETTI NECESSARI PICCOLO
X E PERMETTE IL CALCOLO DELL'INCIDENZA
- 984 IN UNO STUDIO PROSPETTICO SI MANIFESTARONO 30 CASI DI MALATTIA IN UN GRUPPO DI 100 PERSONE ESPOSTE AD UN DATO FATTORE DI RISCHIO MENTRE SE NE MANIFESTARONO 5 FRA 90 PERSONE NON ESPOSTE A QUEL FATTORE COME SI CALCOLA IL RISCHIO RELATIVO?
A (30:5) X (70:90)
B (100:30) X (90:5)
C (5X70) : (30:100)
D (70:30) X (90:5)
X E (30:100) : (5:90)
- 985 IL GENE CHE CODIFICA LA CATENA PESANTE DELLE IMMUNOGLOBULINE E' FORMATO DA:
A UN GENE PER LA REGIONE COSTANTE ED UNO PER QUELLA VARIABILE
B UNA SINGOLA SEQUENZA DI DNA
C DAGLI ESONI L, V, J, C
D DAGLI ESONI V, D, J, C
X E DAGLI ESONI L, V, D, J, C
- 986 QUALE FRA LE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIGUARDANTI IL FRAMMENTO FAB' E' VERA:
X A E' LEGGERMENTE PIU' GRANDE DEL FAB
B E' BIVALENTE
C E' FACILMENTE CRISTALLIZZABILE
D NON E' IN GRADO DI LEGARSI AD ANTIGENI POLIVALENTI
E E' PRODOTTO DALLA DIGESTIONE CON PAPAINA
- 987 QUALE AFFERMAZIONE RIGUARDANTE LE IGE E' FALSA:
A SONO GLI UNICI ANTICORPI OMOCITOTROPI NELL'UOMO
B SONO MOLTO RICCHE IN CARBOIDRATI
X C PRESENTANO UNA REGIONE CERNIERA PARTICOLARMENTE LUNGA
D HANNO UN CATABOLISMO MOLTO RAPIDO
E PRESENTANO UNA DISPOSIZIONE DEI LEGAMI DISOLFURO INTRA- ED INTER-CATENARI DIVERSA DALLE ALTRE IG
- 988 INDICATE QUAL E' IL CORRETTO ORDINE DI CONCENTRAZIONE DELLE IMMUNOGLOBULINE UMANE, A PARTIRE DA QUELLE A PIU' ELEVATA CONCENTRAZIONE SIERICA FINO A QUELLE MENO ABBONDANTI:
A IGM-->IGC-->IGA-->IGD-->IGE
B IGA-->IGM-->IGG-->IGD-->IGE
X C IGG-->IGA-->IGM-->IGD-->IGE
D IGG-->IGM-->IGA-->IGD-->IGE
E IGG-->IGM-->IGD-->IGA-->IGE
- 989 DURANTE LA MATURAZIONE DELLE CELLULE B, QUALI IMMUNOGLOBULINE SONO ESPRESSE PRECOCEMENTE COME PROTEINE DI MEMBRANA:
A IGD E IGG
X B IGM E IGD
C IGM E IGG
D IGM E IGA
E IGG E IGA
- 990 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIGUARDANTI I LINFOCITI T E' FALSA:
A SONO SENSIBILI ALL'EFFETTO MITOGENO DELLA CONCAVALINA A
B RECANO SULLA MEMBRANA DETERMINANTI IDIOTIPICI
C RAPPRESENTANO LA QUOTA PRINCIPALE DI LINFOCITI NEL SANGUE PERIFERICO
X D PRODUCONO INTERLEUCHINA 1
E SONO RESI TOLLERANTI PIU' FACILMENTE DEI LINFOCITI B
- 991 NELL'INTERAZIONE MACROFAGO-LINFOCITA T, UNO DEI SEGNALE PER L'ATTIVAZIONE DEL LINFOCITA T E' DATO DA
A L'ANTIGENE DI ISTOCOMPATIBILITA' DI CLASSE 1
B L'ANTIGENE DI ISTOCOMPATIBILITA' DI CLASSE 2
X C L'ANTIGENE DI CLASSE 2 PIU' L'ANTIGENE ESTRANEO
D L'ANTIGENE DI CLASSE I PIU' L'ANTIGENE ESTRANEO
E L'ANTIGENE ESTRANEO DA SOLO
- 992 LA PRODUZIONE DI ANTICORPI MONOCLONALI SEGUE LA FUSIONE TRA:
A DUE LINFOCITI B
B UN LINFOCITA B E UNA PLASMACELLULA
C UNA PLASMACELLULA ED UNA CELLULA DI MIELOMA
D DUE PLASMACELLE
X E UN LINFOCITA B ED UNA CELLULA DI MIELOMA
- 993 NEL COMPLESSO MAGGIORE DI ISTOCOMPATIBILITA', I GENI DELLA CLASSE 3 CODIFICANO PER:
A ANTIGENI MAGGIORI DI ISTOCOMPATIBILITA' (TIPO HLA-A E B)
B ANTIGENI DI ISTOCOMPATIBILITA', TIPO HLA-D/DR
X C FATTORI DEL COMPLEMENTO
D ANTIGENI MINORI DI ISTOCOMPATIBILITA'
E ANTIGENI TIPO QA, TL

- 994 NEL CORSO DELLA RISPOSTA PRIMARIA AD ANTIGENI TIMO-INDIPENDENTI, VENGONO PREVALENTEMENTE PRODOTTI ANTICORPI DI CLASSE:
- X A IGM
B IGG
C IGM ED IGG
D IGD
E IGA
- 995 NEL PROCESSO DI AUMENTO DELLA PERMEABILITA' DI TIPO IMMEDIATO-TRANSITORIO SONO INTERESSATE:
- A ARTERIOLE
B CAPILLARI
X C VENULE
D TUTTI QUESTI SISTEMI
E NESSUNO DI QUESTI SISTEMI
- 996 UN CLONE CELLULARE E' UNA POPOLAZIONE DI CELLULE CHE:
- A SI DUPLICANO CONTEMPORANEAMENTE
B SINTETIZZANO GROSSE QUANTITA' DI PROTEINE SPECIFICHE
C CRESCONO IN ASSENZA DI SIERO
D DERIVANO DALLA FUSIONE DI DUE CELLULE
X E DERIVANO DA UNA CELLULA PROGENITRICE
- 997 NEL CANCRO MIDOLLARE DELLA TIROIDE QUALI DEI SEGUENTI MARKERS TUMORALI POSSONO ESSERE UTILIZZATI?
- X A CEA E CALCITONINA
B GICA E POA
C TG E TPA
D TG E AFP
E ACTH ED HCG
- 998 DA QUANTI AMINOACIDI E' FORMATA LA BRADICHININA
- A 8
X B 9
C 10
D 11
E 12
- 999 QUALI DI QUESTI TIPI DI CELLULE COMPAGNO PER PRIMA NELL'ESSUDATO
- A MONOCITI
B LINFOCITI
X C NEUTROFILI
D PIASTRINE
E BASOFILI
- 1000 DA QUALE AMINOACIDO DERIVA L'ISTAMINA:
- A FENILALANINA
B PROLINA
C ARGININA
X D ISTIDINA
E METIONINA
- 1001 NELLA VIA DI ATTIVAZIONE DEL COMPLEMENTO QUALE DEI SEGUENTI ELEMENTI E' NECESSARIO:
- A CA++
B FE+++
C K+
X D MG++
E NA+
- 1002 PER AZIONE DELLA CICLOOSSIGENASI SULL'ACIDO ARACHIDONICO QUALE DI QUESTE SOSTANZE SI FORMANO:
- A TROMBOSSANI
B PROSTACICLINE
C PROSTAGLANDINE
D NESSUNA DI QUESTE SOSTANZE
X E TUTTE QUESTE SOSTANZE
- 1003 PER AZIONE DELLA LIPO-OSSIGENASI SULL'ACIDO ARACHIDONICO QUALI DI QUESTE SOSTANZE SI FORMANO:
- A TROMBOSSANI
B PROSTACICLINE
C PROSTAGLANDINE
X D NESSUNA DI QUESTE SOSTANZE
E TUTTE QUESTE SOSTANZE
- 1004 QUALE DI QUESTE SOSTANZE SI FORMA PARTENDO DALL'ACIDO ARACHIDONICO COME PRECURSORE:
- A ISTAMINA
B BRADICHININA
C SEROTONINA
X D PROSTAGLANDINA
E CALLICREINA
- 1005 NEL PROCESSO DELLA VISIONE LA RADOPSINA E' COSTITUITA DA OPSINA E:
- A IL CIS-RETINOLO
B IL TRANS-RETINOLO
C ACIDO RETINOICO
X D IL CIS-RETINALE
E IL TRANS-RETINALE
- 1006 QUALE DI QUESTE VITAMINE PRESENTA NELLA SUA STRUTTURA UN ANELLO PIRROLICO CON AL CENTRO CHELATO UN ATOMO DI COBALTO:
- A VITAMINA A
B VITAMINA B1
X C VITAMINA B12
D VITAMINA C
E VITAMINA K

1007 LA 25IDROSSILASI NECESSARIA ALLA IDROSSILAZIONE DELLA VITAMINA D HA ORIGINE:
 A INTESTINALE
 B RENALE
 X C EPATICA
 D CARDIACA
 E MUSCOLARE

1008 IL FATTORE XI DELLA COAGULAZIONE ATTIVA:
 X A IL FATTORE IX
 B IL FATTORE VIII
 C IL FATTORE X
 D IL FATTORE XII
 E LA PROTROMBINA

1009 QUAL E' LA FORMA ATTIVA DELLA VITAMINA D:
 A 25 IDROSSICOLECALCIFEROLO
 X B 1,25 DIIDROSSICOLECALCIFEROLO
 C 24,25 DIIDROSSICOLECALCIFEROLO
 D 25,26 DIIDROSSICOLECALCIFEROLO
 E 7 DEIDROCOLESTEROLO

1010 QUALI DI QUESTE SOSTANZE NON ENTRA NELLA REGOLAZIONE DELLA VITAMINA D:
 A CA++
 B HPO4 -2
 X C FE +3
 D PTH
 E CALCITONINA

1011 LA VITAMINA D AGISCE A LIVELLO OSSEO INFLUENZANDO LA BGP (BONE GAMMA ACIDO CARBOSSIGLUTAMICO) SINERGISTICAMENTE CON:
 A VITAMINA A
 B VITAMINA B1
 C VITAMINA C
 D VITAMINA E
 X E VITAMINA K

1012 L'AZIONE DELLA VITAMINA C NEL METABOLISMO DEL COLLAGENO AVVIENE MEDIANTE L'IDROSSILAZIONE DI:
 A SERINA
 B TREONINA
 C ISTIDINA
 X D PROLINA
 E FENILALANINA

1013 IL TASSO DI MORTALITA' INFANTILE E' UGUALE A:
 A (NUMERO DI MORTI INFANTILI) / (TOTALE DELLA POPOLAZIONE) X 1000
 B (NUMERO DI MORTI NEL I ANNO DI VITA) / (TOTALE DELLA POPOLAZIONE) X 1000
 X C (NUMERO DI MORTI NEL I ANNO DI VITA) / (NUMERO DI NATI VIVI IN QUELL'ANNO) X 1000
 D (NUMERO DI MORTI NEL I ANNO DI VITA) / (NUMERO DI NATI MORTI + N. NATI VIVI IN QUELL'ANNO) X 1000
 E (NUMERO DI MORTI NEL I ANNO DI VITA + N. NATI MORTI) / (NUMERO NATI VIVI IN QUELL'ANNO) X 1000

1014 LA MODA E':
 A LA MEDIA DI UNA POPOLAZIONE
 B LA MEDIA DI UNA SERIE DI NUMERI
 C IL VALORE CENTRALE DI UNA DISTRIBUZIONE
 X D IL VALORE PIU' FREQUENTE DI UNA DISTRIBUZIONE
 E LA MEDIA DI UNA DISTRIBUZIONE

1015 SE UNA MALATTIA COLPISCE SIMULTANEAMENTE PERSONE DI PARECCHIE NAZIONI E LE COLPISCE IN NUMERO CHIARAMENTE IN ECCESSO ALLA NORMALE ATTESA, LA MALATTIA SI DICE:
 A ENDEMICA
 B EPIDEMICA
 X C PANDEMICA
 D EPIZOOTICA
 E EUZOOTICA

1016 I PARASSITI AD ALTA RESTRIZIONE VENGONO DENOMINATI
 A OLIGOXENI
 B MONOXENI
 C EURIXENI
 D OBBLIGATI
 X E ESTENOXENI

1017 I FENOMENI DI EMATOFAGIA AMEBICA CARATTERIZZANO LA FORMA:
 A PRECISTICA
 B MINUTA
 C CISTICA
 D METACISTICA
 X E ISTOLITICA

1018 L'INFEZIONE TOXOPLASMICA UMANA PUO' ESSERE CONTRATTATA:
 A CONSUMANDO CARNI CRUDE O INSACCATI
 B ATTRAVERSO LA SALIVA DEI PORTATORI
 C MEDIANTE LE OOCISTI EMESSE DAI FELINI
 D PER TRASMISSIONE DIAPLACENTARE
 X E MEDIANTE TUTTE QUESTE MODALITA'

- 1019 QUALE DI QUESTE DEFINIZIONI NON CORRISPONDE A UN MORFOTIPO DI EMOFLAGELLATI?
A FORMA PROMASTIGOTE
B FORMA TRIPOMASTIGOTE
C FORMA EPIMASTIGOTE
D FORMA AMASTIGOTE
X E FORMA DIAMASTIGOTE
- 1020 AGENTE ETIOLOGICO DEL MORBO DI CHAGAS E' IL TRYPA-NOSOMA:
A BRUCEI
B GAMBIENSE
C RANGELI
D RHODESIENSE
X E CRUZI
- 1021 LA FASE SPOROGONICA DEL CICLO MALARICO SI SVOLGE:
A NELL'UOMO
B IN MOLTI INVERTEBRATI
C NEI CHIROTTERI
D IN ALCUNI VERTEBRATI
X E NELL'ANOFELE
- 1022 LE FORME GAMETOCITICHE A MEZZALUNA SONO CARATTERISTICHE DEL:
A PLASMODIUM VIVAX
B PLASMODIUM MALARIAE
C PLASMODIUM OVALE
D NON SONO CARATTERISTICHE DEI PLASMODI
X E PLASMODIUM FALCIPARUM
- 1023 LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE FRA TAENIA SOLIUM E TAENIARHYNCHUS SAGINATUS SI EFFETTUA MEDIANTE L'OSSERVAZIONE:
A DELLE UOVA
B DELLA REGIONE CERVICALE
C DELL'ATRIO GENITALE
D E' IMPOSSIBILE
X E DELLE PROGLOTTIDI
- 1024 LO SVILUPPO LARVALE DEI NEMATODI E' CARATTERIZZATO DA:
A NESSUNA MUTA
B UNA MUTA
C DUE MUTE
D TRE MUTE
X E QUATTRO MUTE
- 1025 LE UOVA DI TRICHURIS TRICHIURA SONO RICONOSCIBILI PER:
A IL COLORE GIALLO-BRUNO
B L'APPIATTIMENTO LATERALE
C LA PRESENZA DI BLASTOMERI
D LO SPERONE LATERALE
X E LE POLARITA' RIFRANGENTI
- 1026 UN CASO "CONTROLLO" E' DEFINITO COME:
A UN SOGGETTO DELLA STESSA ETA' E SESSO DEL CASO
B UN SOGGETTO DELLA STESSA ORIGINE SOCIO-ECONOMICA DEL CASO
X C UN SOGGETTO CON LE STESSO CARATTERISTICHE DEL CASO TRanne L'ESPOSIZIONE AL FATTORE IN STUDIO
D UN SOGGETTO SCELTO A CASO
E UN SOGGETTO SCELTO SECONDO METODO RANDOM
- 1027 L'INCIDENZA DI UNA MALATTIA ESPRIME:
A IL NUMERO DI CASI IN UN CERTO PERIODO
B IL NUMERO DI NUOVI CASI IN UN PERIODO
C IL NUMERO DI CASI DIVISO LA POPOLAZIONE
D IL NUMERO DI NUOVI CASI DIVISO LA POPOLAZIONE
X E IL NUMERO DI NUOVI CASI IN UN PERIODO DIVISO LA POPOLAZIONE A RISCHIO
- 1028 GLI ELEVATI LIVELLI DI LH NEL PERIODO DI MENOPAUSA SONO DOVUTI A:
X A BASSI LIVELLI DI ESTROGENI
B BASSI LIVELLI DI PROGESTERONE
C BASSI LIVELLI DI FATTORI IPOTALAMICI
D ELEVATI LIVELLI DI ESTROGENI
E ELEVATI LIVELLI DI PROGESTERONE
- 1029 IL DOSAGGIO DEI MARKERS TUMORALI NEL SIERO HA INDICAZIONE PIU' CORRETTA:
A NELLO SCREENING DELLE NEOPLASIE
B NELLA STADIAZIONE DELLE NEOPLASIE
C NELLA DIAGNOSI DELLE NEOPLASIE
X D NEL MONITORAGGIO DELLA EVOLUZIONE E NEL CONTROLLO DELLA TERAPIA DELLE NEOPLASIE
E IN NESSUNO DEI CASI MENZIONATI
- 1030 I VALORI PIU' ELEVATI DI CEA SIERICO SI RISCONTRANO GENERALMENTE:
A NEI TUMORI DELLA MAMMELLA
B NEL CISTOADENOCARCINOMA MUCINOSO DELL'OVAIO
C NELL'ADENOCARCINOMA DEL POLMONE
D NEI TUMORI DELLA VESCICA
X E NEL CANCRO DEL COLON CON METASTASI EPATICHE

- 1031 I CORPI DI HEINZ SONO UN REPERTO:
A CHIMICO-CLINICO
B ANATOMO-PATOLOGICO
X C EMATOCHIMICO
D ISTOCHIMICO
E NESSUNO DEI PRECEDENTI
- 1032 QUALE DEI SEGUENTI MATERIALI BIOLOGICI VIENE UTILIZZATO PER EFFETTUARE UN CARIOGRAMMA:
A SPERMATOZOI
B OOCITI
C CELLULE EPIDERMICHE
D PLASMA
X E CELLULE DELLA MUCOSA BUCCALE
- 1033 IL TEST DI COOMBS E':
A UN TEST DI FUNZIONALITA' RESPIRATORIA
X B UN TEST IMMUNOEMATOLOGICO
C UN TEST RADIOIMMUNOLOGICO
D UN TEST DI FUNZIONALITA' EPATICA
E UN TEST DI FUNZIONALITA' GASTRICA
- 1034 LA COMPOSIZIONE CHIMICA DELLA SOSTANZA AMILOIDE E' DI TIPO:
A MUCOPOLISACCARIDE
B LIPIDICO
X C GLICOPROTEICO
D GLICIDICO
E SALINO
- 1035 LA PRESENZA DI MONOCITI, CELLULE GIGANTI, FIBROBLASTI E LINFOCITI SONO CARATTERISTICI DI:
A INFIAMMAZIONE ACUTA
B TESSUTO DI GRANULAZIONE
C FERITA IN CORSO DI RIPARAZIONE
X D INFIAMMAZIONE CRONICA
E SUPPURAZIONE
- 1036 IL TESSUTO DI GRANULAZIONE E' CARATTERIZZATO DA:
X A PROLIFERAZIONE DI NUOVI CAPILLARI CON FIBROBLASTI E NEO-FORMAZIONE DI COLLAGENI
B CELLULE GIGANTI E FIBROBLASTI
C CELLULE GIGANTI E LINFOCITI
D CELLULE GIGANTI, PLASMACELLULE E LINFOCITI
E PROLIFERAZIONE DI NUOVI CAPILLARI
- 1037 IL DOLORE ASSOCIATO ALL'INFIAMMAZIONE ACUTA SI RITIENE SIA DOVUTO A:
A EFFETTO DELLA PRESSIONE ESERCITATA DALL'ESSUDATO
B SEROTONINA
C CHININA
D NESSUNA DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI
X E TUTTE LE PRECEDENTI CONDIZIONI
- 1038 LE CELLULE PREVALENTI NELL'INFIAMMAZIONE PRODOTTA DA INFEZIONI VIRALI SONO:
X A LINFOCITI
B MASTCELLULE
C EOSINOFILI
D POLIMORFO-NUCLEATI NEUTROFILI
E PLASMACELLULE
- 1039 LA FORMAZIONE DI COLLAGENO NELLE FERITE IN CORSO DI RIPARAZIONE RICHIEDE:
A ALTI LIVELLI DI ORMONI DELLA CORTECCIA SURRENALE
B COLESTEROLO
X C VITAMINA C
D VITAMINA D
E VITAMINA K
- 1040 DOPO UNA LESIONE, QUALE TIPO CELLULARE RIGENERA ME NO FACILMENTE:
A NERVI PERIFERICI
X B NEURONI DEL SISTEMA CENTRALE
C EPIDERMIDE
D MUCOSA INTESTINALE
E EPITELIO DEI TUBULI RENALI
- 1041 LE SEGUENTI Affermazioni concernenti la tubercolosi sono tutte vere eccetto una, quale:
A LA RISPOSTA IMMUNE PUO' ARRESTARE L'EVOLUZIONE DELLA MALATTIA
B LA RISPOSTA IMMUNE E' CAUSA DI DANNO TESSUTALE
C LE LESIONI DERIVANTI DALLE PRECEDENTI INFEZIONI SP SPESSE DIFFERISCONO DA QUELLE CARATTERISTICHE DELLE SUPERINFEZIONI SUCCESSIVE
X D GLI ANTICORPI UMORALI RIVESTONO I MICRORGANISMI E LI DISTRUGGONO
E LA PIU' IMPORTANTE RISPOSTA IMMUNOLOGICA E' QUELLA CELLULO-MEDIATA
- 1042 TUTTI I SEGUENTI FENOMENI CARATTERIZZANO L'INFEZIONE DA CLOSTRIDIUM TETANI ECCETTO UNO, QUALE:
X A RAPIDA INVASIONE DEL SANGUE E BATTERIEMIA
B MANIFESTAZIONI CAUSATE DA UNA ESOTOSSINA
C ALTERAZIONI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE
D MODESTA CRESCITA BATTERICA NELLE FERITE DETERSE
E SPASMO DELLA MUSCOLATURA VOLONTARIA
- 1043 LE LESIONI DELLE RICKETTSIOSI SONO CAUSATE DA:
A TOSSINE PROVENIENTI DALL'ANTROPODO VETTORE
X B PROLIFERAZIONE DEI MICRORGANISMI NELLE CELLULE ENDOTELIALI, RISULTATI IN VASCULITE
C ACCUMULO DI CELLULE MONONUCLEATE IN SEDE PRERIVASCOLARE
D IPERSENSIBILITA' ANTICORPO-MEDIATA
E IPERSENSIBILITA' CELLULO-MEDIATA

- 1044 LE SEGUENTI AFFERMAZIONI CONCERNENTI LA SIFILIDE SONO TUTTE VERE ECCETTO UNA, QUALE:
A I SIFILOMI PRIMARI POSSONO ESSERE LOCALIZZATI AL PENE, ALL'ANO, ALLA LINGUA E I LINFONODI REGIONALI SONO INGRANDITI
X B LA SIFILIDE SECONDARIA E' LA CONSEGUENZA DI UNA RE INFEZIONE
C LA SORTITE E' UNA MANIFESTAZIONE TARDIVA
D LE GOMME SI POSSONO FORMARE IN TUTTI I TESSUTI
E LE SPIROCHETE POSSONO ATTRAVERSARE LA PLACENTA
- 1045 LA MALATTIA DA VIRUS DELLA MADRE CHE PIU' SPESSO CAUSA MALFORMAZIONI NEL FETO E':
X A LA ROSOLIA
B L'HERPES
C LA VARICELLA
D LA PAROTITE EPIDEMICA
E IL MORBILLO
- 1046 UN VETTORE ANIMALE E' NECESSARIO PER TRASMETTERE:
A LO STAFILOCOCCO
B LO PNEUMO-COCCO
X C LE RICKETTSIE
D POLIOMIELITE
E LA FEBBRE TIFOIDEA
- 1047 TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI AUMENTANO LE PROBABILIITA' DI INFEZIONI OPPORTUNISTICHE, ECCETTO UNA QUALE:
A TERAPIA ANTIBIOTICA
B TERAPIA CORTISONICA
C ETA' AVANZATA
X D PRESENZA DI MICROORGANISMI NEL TRATTO GASTRO-INTESTINALE
E TERAPIA IMMUNOSOPPRESSIVA
- 1048 LE LESIONI DELLE TUBERCOLOSI SONO PRINCIPALMENTE CAUSATE DA:
X A IPERSENSIBILITA' CELLULO-MEDIATA
B UNA ESOTOSSINA
C INTERESSAMENTO GRANULOMATOSO DEI VASI, A SUA VOLTA CAUSA DI INFARTI:
D I LISOSOMI DEI GRANULOCITI NEUTROFILI
E UNA ENDOTOSSINA
- 1049 LA DIAGNOSI DI TUBERCOLOSI ATTIVA E' PIU' FACILMENTE REALIZZABILE MEDIANTE:
A STRISCIO DELL'ESPETTORATO
B STRISCIO DEL LIQUIDO DI LAVAGGIO GASTRICO
C BIOPSIA DELLE LESIONI GRANULOCITOSE
X D CULTURA
E LESIONI TIPICHE AGLI ESAMI RADIOLOGICI
- 1050 L'EFFETTO MENO PROBABILE DI UNA SETTICEMIA E':
X A ENDOCARDITE BATTERICA
B SHOCK
C COAGULAZIONE INTRAVASCOLARE DISSEMINATA
D FEBBRE
E MORTE
- 1051 I VIRUS SONO COMPOSTI DA:
A SOLO DNA
B SIA DNA CHE RNA
C NE' DNA, NE' RNA
X D O RNA, O DNA
E NESSUNA DELLE PRECEDENTI
- 1052 QUALE DELLE SEGUENTI SOSTANZE CONTRIBUISCE MENO ALLA OSMOLARITA' DEL SIERO:
A SODIO
X B CREATININA
C CLORURI
D AZOTO UREICO
E GLUCOSIO
- 1053 L'ORGANO CHE HA LA PIU' BASSA PERCENTUALE DI ACQUA E':
A PELLE
B CUORE
C MUSCOLO
X D ADIPE
E CERVELLO
- 1054 LA PRIMA TAPPA DELLA TROMBOSI ARTERIOSA E':
A CONVERSIONE DELLA PROTROMBINA IN TROMBINA
B CONVERSIONE DI FIBRINOGENO IN FIBRINA
C ATTIVAZIONE DELLA ANTITROMBINA III
X D ADESIONE DELLE PIASTRINE ALLA PARETE VASALE
E FAGOCITOSI PROMOSSA DAL FATTORE HAGEMAN
- 1055 LA CAUSA MENO PROBABILE DI TROMBOSI VENOSA TRA LE SEGUENTI E':
A VARICI DEGLI ARTI INFERIORI
B IMMOBILIZZAZIONE PROLUNGATA
C TUMORI MALIGNI INTRADDOMINALI
X D ARTERIOSCLEROSI DELLA VENA CAVA INFERIORE
E INSUFFICIENZA CARDIACA CONGESTIZIA

- 1056 LA DISTRUZIONE IN VITRO DI CELLULE TUMORALI PUO' ESSERE PRODOTTA MEDIANTE TUTTI I SEGUENTI MECCANISMI, ECCETTO UNO, QUALE:
- X A CITOTOSSICITA' MEDIATA DA COMPLESSI ANTIGENE-ANTICORPI
- B CITOTOSSICITA' CELLULARE ANTICORPO-DIPENDENTE
- C CELLULE T CITOTOSSICHE
- D CITOTOSSICITA' ANTICORPO MEDIATA, COMPLEMENTO-DIPENDENTE
- E CITOTOSSICITA' MACROFAGO-MEDIATA
- 1057 UNA PROVA DI IMMUNITA' DELL'OSPITE CONTRO IL TUMORE E' FORNITA DA:
- A ELEVATI LIVELLI DI ANTIGENE CARCINOEMBRIONARIO IN CERTI PAZIENTI CANCEROSI
- B SVILUPPO DI ENERGIA CUTANEA VERSO ANTIGENI DA CUTI REAZIONI, IN PAZIENTI CANCEROSI
- C CAPACITA' DI PAZIENTI CANCEROSI DI RIGETTARE I LORO STESSI TUMORI DOPO IMMUNOTERAPIA
- D ALTA INCIDENZA DI MALATTIE AUTOIMMUNI IN PAZIENTI CANCEROSI
- X E NESSUNA DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI
- 1058 IL PRINCIPALE ARGOMENTO IN FAVORE DELLA SORVEGLIANZA IMMUNOLOGICA COME MECCANISMO DI PROTEZIONE VERSO LA CANCEROGENESI E':
- A I PAZIENTI CANCEROSI MANIFESTANO UNA REATTIVITA' IMMUNITARIA SPECIFICA VERSO GLI ANTIGENI ASSOCIATI AL TUMORE
- X B IL RISCHIO RELATIVO DI SVILUPPARE UN TUMORE E' GRADUAMENTE AUMENTATO IN INDIVIDUI IMMUNO-DEFICIENTI O IMMUNOSOPPRESSORI
- C TUTTI I TUMORI SONO FORTEMENTE IMMUNOGENI
- D L'IMMUNITA' VERSO I TUMORI PUO' ESSERE TRASFERITA ADOTTIVAMENTE
- E NESSUNA DELLE PRECEDENTI
- 1059 LE REAZIONI DI IPERSENSIBILITA' IMMEDIATA SONO ASSOCIATE CON TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI ECCETTO UNA, QUALE:
- A ANTICORPI REAGINICI
- B LIBERAZIONE DI MEDIATORI FARMACOLOGICI DA MASTCELLULE RIVESTITE DA ANTICORPI
- C ACCUMULO DI EOSINOFILI NEI TESSUTI INTERESSATI
- D ATTIVAZIONE DEL COMPLEMENTO
- X E NESSUNA DELLE RISPOSTE E' ESATTA
- 1060 L'IMMUNITA' CELLULO-MEDIATA E' UN IMPORTANTE MECCANISMO DI DIFESA DELL'OSPITE CONTRO TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI, ECCETTO UNA, QUALE:
- A INFEZIONI MICOTICHE PROFONDE
- X B INFEZIONI DA BATTERI PIOGENI
- C INFEZIONI TUBERCOLARI
- D SCHISTOSOMIASI
- E MORBILLO
- 1061 UNA MALATTIA CRONICA TRAPIANTO-CONTRO-OSPITE CON LESIONI CUTANEE SI OSSERVA COMUNEMENTE IN RICEVENTI DI:
- A TRAPIANTI CARDIACI
- X B TRAPIANTI DI MIDOLLO OSSEO
- C TRAPIANTI RENALI
- D TRAPIANTI DEL PANCREAS
- E TRAPIANTI CUTANEI
- 1062 QUALE DEI SEGUENTI NON E' UN TUMORE DI ORIGINE EPITELIALE:
- A CARCINOMA DELL'ESOFAGO
- B CARCINOMA DELLO STOMACO
- X C RABDOMIOSARCOMA
- D BASALIOMA
- E PAPILOMA FARINGEO
- 1063 UNA BIOPSIA MOSTRA NODULI TUMORALI CON STRUTTURA ADENOCARCINOMATOSA. LA SEDE PIU' PROBABILE DEL TUMORE PRIMITIVO E':
- A CERVELLETTO
- B PROSTATA
- C VESCICA
- X D COLON
- E CANALE ANALE
- 1064 QUALE DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE NON E' TIPICA DI UN SARCOMA:
- A PLEOMORFISMO
- B INVASIONE DEI VASI SANGUIGNI
- X C INVASIONE LINFATICA
- D ORIGINE MESODERMICA
- E METASTASI IN SEDI LONTANE
- 1065 IL PROCESSO DESCRITTO COME ANGIOGENESI E':
- A INVASIONE DI VASI SANGUIGNI DA PARTE DI CELLULE TUMORALI
- B DISSEMINAZIONE DELLE CELLULE TUMORALI MEDIANTE IL SANGUE
- C TUMORE DERIVANTE DA TESSUTI EMOPOIETICI
- X D PROLIFERAZIONE DI VASI SANGUIGNI NEOFORMATI IN UN TUMORE IN FASE DI CRESCITA
- E NECROSI CENTRALE CHE SI OSSERVA NEI TUMORI A RAPIDA CRESCITA DOVUTA AD INSUFFICIENZA DELLA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA NEL TUMORE

- 1066 QUALE DEI SEGUENTI TUMORI E' MENO ORMONODIPENDENTE
A CARCINOMA DELLA PROSTATA
B CARCINOMA DELLA MAMMELLA NELLA DONNA
C CARCINOMA DELLA TIROIDE
X D CARCINOMA DEL COLON
E CARCINOMA DELL'ENDOMETRIO
- 1067 UN CHELOIDE E':
X A UNA CICATRICE IPERTROFICA
B UN ESITO DELLA MAGGIOR PARTE DELLE FERITE INFETTE
C LA FASE INIZIALE DEL TESSUTO DI GRANULAZIONE
D UN TUMORE BENIGNO DI ORIGINE MELANOCITICA
E UN TUMORE MALIGNO DEL CONNETTIVO FIBROSO
- 1068 UN TUMORE COSTITUITO DA TESSUTI RAPPRESENTATIVI DI TUTTI E TRE I FOGLIETTI EMBRIONALI SI CHIAMA:
A ADENOCARCINOMA
B CARCINOSARCOMA
C TUMORE MISTO MESODERMICO
X D TERATOMA
E ADENOCARCINOMA PAPILLIFERO
- 1069 QUALE DEI SEGUENTI NON E' UN TUMORE DI ORIGINE MESSENCHIMALE:
X A PAPILLOMA
B EMANGIOMA
C LIPOMA
D RABDOMIOMA
E LEIOMIOMA
- 1070 I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEI COLORI DI ANILINA, A QUALE DI QUESTI TUMORI SONO PIU' ESPOSTI:
A CARCINOMA
B CARCINOMA DELLO STOMACO
C CARCINOMA SPINOCELLULARE DELLA CUTE
D CARCINOMA BASOCELLULARE DELLA CUTE
X E CARCINOMA DELLA VESCICA URINARIA
- 1071 QUALI DELLE SEGUENTI FORME NEOPLASTICHE PUO' CONSIDERARSI BENIGNA:
A MESOTELIOMA
B EPITELIOMA
C MELANOMA
D RETICOLOSARCOMA
X E PAPILLOMA
- 1072 LA PERCENTUALE PIU' ELEVATA DI IMMUNOGLOBULINE CIRCOLANTI E' COSTITUITA DA:
A IG A
B IG D
X C IG G
D IG E
E IG M
- 1073 IL TUMORE PIU' FREQUENTEMENTE ASSOCIATO A PRODUZIONE ECTOPICA DI ACTH E':
A IL CARCINOMA DELLA MAMMELLA
B IL CARCINOMA DELLO STOMACO
X C IL CARCINOMA POLMONARE
D IL CARCINOMA DEL COLON
E IL CARCINOMA DEL PANCREAS
- 1074 CON QUALE DEI SEGUENTI ORMONI IL TSH PRESENTA ANALOGIE STRUTTURALI:
X A LH
B PROGESTERONE
C INSULINA
D PROLATTINA
E GASTRINA
- 1075 QUALE FRA LE SEGUENTI IMMUNOGLOBULINE HA LA MAGGIORE CAPACITA' DI FISSARE IL COMPLEMENTO (VIA CLASSICA):
X A IGM
B IGG
C IGA
D IGD
E IGE
- 1076 CHE COSA E' IL FATTORE REUMATOIDE:
A UN ANTICORPO ANTI-NUCLEO
B UN ANTICORPO ANTI-ERITROCITI
C UN ANTICORPO ANTI-MEMBRANA SINOVIALE
D UN ANTICORPO ANTI-STREPTOCOCCO
X E UN ANTICORPO ANTI-IMMUNOGLOBULINE
- 1077 CHE COSA SI INTENDE PER CRIOGLOBULINA:
A UNA GLOBULINA CHE PRECIPITA A CALDO
X B UNA GLOBULINA CHE PRECIPITA A FREDDO
C UNA GLOBULINA PRESENTE NELLE URINE
D UNA GLOBULINA TERMO-LABILE
E UNA GLOBULINA TERMO-STABILE
- 1078 LA PROTEINA DI BENCE-JONES E':
A UNA BETA2-MICROGLOBULINA
X B UN MONOMERO O UN DIMERO DI CATENE LEGGERE DELLE IG
C UN MONOMERO O UN DIMERO DI CATENE PESANTI DELLE IG
D UN FATTORE DEL COMPLEMENTO
E UN AUTO-ANTICORPO
- 1079 LA CARATTERISTICA PATOGNOMONICA DEL MIELOMA MULTIPLO (PRESENTE NEL 100% DEI CASI) E':
A PRESENZA DI PROTEINA DI BENCE-JONES NELLE URINE
B PRESENZA DI UN COMPONENTE MONOCLONALE NEL SANGUE
C LESIONI OSTEOLITICHE
X D INFILTRAZIONE DI PLASMACELLULE NEL MIDOLLO OSSEO
E PRESENZA DI NUMEROSE PLASMACELLULE NEL SANGUE

- 1080 UN AUMENTO POLICLONALE DELLE IG E' SPESSO ASSOCIATO A:
A MIELOMA MULTIPLO
B MACROGLOBULINEMIA DI WALDENSTROM
X C MALATTIE EPATICHE CRONICHE
D IPERTIROIDISMO
E LEUCEMIE LINFATICHE CRONICHE
- 1081 LE ROSETTE E SONO FORMATE DA:
A LINFOCITI B
X B LINFOCITI T
C MACROFAGI
D GRANULOCITI
E PLASMACELLULE
- 1082 LE MAST-CELLULE SI RITROVANO ESSENZIALMENTE NEL:
A SANGUE
B MIDOLLO OSSEO
X C TESSUTO CONNETTIVO SOTTOCUTANEO E SOTTOMUCOSO
D TESSUTO NERVOSO
E LINFIA
- 1083 IL PEPTIDOGLICANO E' COSTITUENTE ESSENZIALE DELLA PARETE CELLULARE DI:
A MICOPLASMI
X B STREPTOCOCCI
C CLAMIDIE
D UREOPLASMA UREALITICUM
E RICKETTSIAE
- 1084 IL LIPOPOLISACCARIDE (LPS) RAPPRESENTA L'ENDOTOSSINA DI:
A STAPHYLOCOCCUS AUREUS
B STREPTOCOCCUS PYOGENES
X C SALMONELLA TYPHI
D NEISSERIA GONORRHOEA
E MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
- 1085 L'ACIDO MICOLICO E' COMPONENTE ESSENZIALE DELLA PARETE DEI:
X A MICOBATTERI
B SALMONELLA
C PSEUDOMONAS
D VIBRIONI
E STREPTOCOCCI
- 1086 MICRORGANISMI GRAM-POSITIVI, COCCOIDI, BETA EMOLITICI, BACILLARI-POSITIVI, SONO:
X A STREPTOCOCCUS PYOGENES
B STAPHYLOCOCCUS AUREUS
C NEISSERIA MENINGITIDIS
D ESCHERICHIA COLI
E HAEMOPHILUS INFLUENZAE
- 1087 LA TOSSINA DEL CORINAE BACTERIUM DIPHTERIAE E':
A CODIFICATA DA UN PLASMIDE
B PRESENTE IN TUTTI I CEPPI DI CORINEBATTERI
C UN'ENDOTOSSINA
X D UN ENZIMA DI ADP-RIBOSILAZIONE DELL' EF-2
E AGISCE A LIVELLO DELLE SINAPSI NEUROMUSCOLARI
- 1088 LA TOSSINA DEL VIBRIONE DEL COLERA:
A E' UN'ENDOTOSSINA
B E' CODIFICATA DA UN FAGO
C E' REGOLATA DA CONVERSIONE LISOGENICA
X D E' ATTIVA SULLA SUBUNITA' REGOLATRICE DELL'ADENILATO CICLASI
E E' ATTIVA SULLA ATPASI
- 1089 I MICOPLASMI SONO MICRORGANISMI:
A SPORIGENI
B GRAM-POSITIVI
X C PRIVI DI PARETE CELLULARE RIGIDA
D MOBILI
E SENSIBILI ALLE PENICILLINE
- 1090 NEL LIQUIDO CEFALORACHIDIANO DI UN INDIVIDUO NORMALE E' DI COMUNE RISCONTRO LA PRESENZA DI:
X A 2-10 LEUCOCITI/MM³
B 10-150 LEUCOCITI/MM³
C 50-300 LEUCOCITI/MM³
D FINO A 1000 LEUCOCITI/MM³
E FINO A 10.000 LEUCOCITI/MM³
- 1091 LA CANDIDA ALBICANS E':
A UN PROTOZOO
B UN BACILLO
C UN VIRUS A DNA
D UN MICRORGANISMO GRAM-NEGATIVO
X E UN MICETE TALVOLTA PATOGENO PER L'UOMO
- 1092 LA PSEUDOMONAS AERUGINOSA E' UN MICRORGANISMO:
X A PATOGENO OPPORTUNISTA
B GRAM-POSITIVO
C PRODUTTORE DI ESOTOSSINE
D IMMOBILE
E NON PATOGENO
- 1093 IL TERRENO DI COLTURA AGAR-MC CONKEY E':
X A DI ISOLAMENTO PRIMARIO PER ENTEROBATTERI
B SELETTIVO PER SALMONELLA
C SELETTIVO PER PSEUDOMONAS
D DI ISOLAMENTO PRIMARIO PER STREPTOCOCCI
E CONTIENE SANGUE AL 5%

- 1094 IL TERRENO DI COLTURA AGAR-SANGUE:
 A CONSENTE L'ISOLAMENTO DEI GRAM-POSITIVI
 B CONSENTE DI OSSERVARE L'EMOLISI DEGLI STREPTOCOCCI
 C E' DI ISOLAMENTO PRIMARIO PER GLI STAFILOCOCCI
 D CONTIENE SANGUE DEFIBRINATO DI CONIGLIO
 X E POSSIEDE TUTTE LE SUDETTE CARATTERISTICHE
- 1095 LA STREPTOLISINA-O:
 A E' UN ISOENZIMA DEGLI STREPTOCOCCI
 X B E' UN ESOTOSSINA DEGLI STREPTOCOCCI
 C E' UN ANTIGENE DELLO STAPHYLOCOCCUS AUREUS
 D AGISCE LITICAMENTE SUI GLOBULI BIANCHI
 E E' UNA PROTEINA OSSIGENO-STABILE
- 1096 LA CONIUGAZIONE BATTERICA:
 A E' UN MECCANISMO DI RICOMBINAZIONE GENETICA
 B AVVIENE TRAMITE LA FORMAZIONE DI PILI
 C E' UNIDIREZIONALE
 D E' UN PROCESSO MOLTO FREQUENTE TRA GLI ENTEROBATTERI
 X E POSSIEDE TUTTE LE CARATTERISTICHE SUDETTE
- 1097 QUALE TRA I SEGUENTI NON E' UN PICORNAVIRUS:
 A POLIOVIRUS
 B COXSACKIE A
 C ECHOVIRUS TIPO 8
 D RHINOVIRUS
 X E PARAMYXOVIRUS
- 1098 L'EPATITE VIRALE DI TIPO A E' CARATTERIZZATA DA:
 A UN PERIODO DI INCUBAZIONE DI 48-180 GIORNI
 B UN CONTAGIO DI TIPO ESCLUSIVAMENTE ORO-FECALE
 C LA PRESENZA DELL'ANTIGENE AUSTRALIA NEL SIERO
 X D UN AUMENTO DEL LIVELLO DI IGM
 E INEFFICACIA DELLA PROFILASSI CON GAMMA-GLOBULINE
- 1099 QUALE TRA I SEGUENTI VIRUS NON E' MAI ASSOCIATO CON UN INFEZIONE DI TIPO LATENTE:
 A VIRUS DELLA CORIOMENINGITE LINFOCITARIA
 B VIRUS DELL'ERPEZ ZOOSTER
 X C VIRUS DELLA VARICELLA
 D VIRUS DELL'ERPEZ SIMPLEX
 E ADENOVIRUS
- 1100 QUALE DI QUESTI VIRUS INFETTANDO UNA DONNA GRAVIDA DURANTE IL PRIMO TRIMESTRE DI GRAVIDANZA, PROVOCA LA MORTE O GRAVI ANORMALITA' AL FETO:
 A MORBILLO
 X B ROSOLIA
 C PAROTITE
 D VARICELLA
 E RESPIRATORIO SINCINZIALE
- 1101 QUALE TRA LE SEGUENTI NON E' UNA CARATTERISTICA DELLA GIARDIA LAMBLIA:
 A E' UN PROTOZOO
 X B E' DI SOLITO LOCALIZZATA NELLA PORZIONE ILEO-TERMINALE DEL PICCOLO INTESTINO
 C NON SI COLTIVA SU TERRENI ARTIFICIALI
 D PUO' PROVOCARE DIARREA CRONICA NEI PAZIENTI IMMUNO DEFICIENTI
 E E' MOBILE
- 1102 QUALE TRA I SEGUENTI PARASSITI NON E' UN PROTOZOO:
 A ENTAMOEBE COLI
 X B ECHINOCOCCUS GRANULOSUS
 C PNEUMOCYSTIS CARINII
 D PLASMODIUM VIVAX
 E GIARDIA LAMBLIA
- 1103 QUALE TRA I SEGUENTI PARASSITI NON E' UN PLATELMINTO:
 A TAENIA SAGINATA
 B DIPHYLLOBOTHRIUM
 C SCHISTOSOMA MANSONI
 D FASCIOLA HEPATICA
 X E ASCARIS LUMBRICOIDES
- 1104 LA CONCENTRAZIONE DEL FERRO PLASMATICO E' NORMALMENTE COMPRESA TRA:
 A 10-25 UG/DL
 B 20-60 UG/DL
 X C 50-160 UG/DL
 D 210-330 UG/DL
 E 500-850 UG/DL
- 1105 L'IPERPLASIA E' DOVUTA A:
 X A AUMENTO DI VOLUME DI UN TESSUTO PER AUMENTO DEL NUMERO DI CELLULE
 B PERDITA DELLA DIFFERENZIAZIONE CELLULARE
 C PERDITA DELL'INIBIZIONE DA CONTATTO
 D AUMENTO DI VOLUME DI UN TESSUTO PER AUMENTO DEL VOLUME CELLULARE
 E BLOCCO DELLE MITOSI
- 1106 IL FAVISMO E' UNA ANEMIA EMOLITICA DOVUTA A CARENZA DI:
 X A GLUCOSIO-6-FOSFATO DEIDROGENASI
 B GLUCOSIO-6-FOSFATASI
 C TRIOSIO-FOSFATO-ISOMERASI
 D GLUCOSIO-6-FOSFATO ISOMERASI
 E GLICERALDEIDE-3-FOSFATO DEIDROGENASI

1107 LA MAGGIOR PARTE DELL'AZOTO TOTALE URINARIO E' COSTITUITO DA:

- X A UREA
- B AMMONIACA
- C AC. URICO
- D CREATININA
- E AMINOACIDI

1108 IN CONDIZIONI NORMALI NELLE URINE NON SI RISCONTRA NO MAI:

- A ERITROCITI
- B LEUCOCITI
- C CELLULE EPITELIALI DI SFALDAMENTO
- D CILINDRI IALINI
- X E CILINDRI CERET

1109 LA STRUTTURA QUATERNARIA E' TIPICA:

- A DELLE PROTEINE CON PESO MOLECOLARE TRA 10.000 E 20.000
- X B DELLE PROTEINE COMPOSTE DA PIU' CATENE POLIPEPTIDI CHE
- C DELLE SOLFOPROTEINE
- D DELLE PROTEINE CONIUGATE
- E DEGLI OLIGOPEPTIDI

1110 LA COSTANTE DI MICHAELIS MENTEN (KM) DI UN ENZIMA E' UGUALE:

- A ALLA CONCENTRAZIONE DEL SUBSTRATO ALLA QUALE LA VELOCITA' DI REAZIONE E'MASSIMA
- B ALLA VELOCITA' MASSIMA CUI PUO' PROCEDERE LA REAZIONE
- C AL RECIPROCO DELLA VELOCITA' MASSIMA DI REAZIONE
- D ALLA CONCENTRAZIONE DI INIBITORE CHE DIMEZZA LA VELOCITA' MASSIMA
- X E ALLA CONCENTRAZIONE DEL SUBSTRATO ALLA QUALE LA VELOCITA' DI REAZIONE E'META' DI QUELLA MASSIMA

1111 GLI ACIDI BILIARI SONO DERIVATI:

- A DELLE LECITINE
- B DELLE GLICOPROTEINE
- C DELL'ERGOSTEROLO
- X D DEL COLESTEROLO
- E DELL'AC. OSSALACETICO

1112 I VERTEBRATI SUPERIORI SONO IN GRADO DI EFFETTUARE LA BIOSINTESI:

- A DI TUTTI GLI AMINOACIDI
- B DI NESSUN AMINOACIDO
- X C DI ALCUNI AMINOACIDI
- D DEGLI AMINOACIDI GLICOGENICI
- E DEGLI AMINOACIDI CHETOGENICI

1113 IL FABBISOGNO MEDIO GIORNALIERO DI CALCIO PER UN ADULTO OSCILLA INTORNO A:

- A 50 UG/DIE
- B 130 MG/DIE
- X C 0,8 G/DIE
- D 5,5 G/DIE
- E 30 G/DIE

1114 IL FABBISOGNO MEDIO GIORNALIERO DI VITAMINA B12 PER UN ADULTO OSCILLA INTORNO A:

- X A 5 UG/DIE
- B 2 MG/DIE
- C 18 MG/DIE
- D 40 MG/DIE
- E 130 MG/DIE

1115 IL FABBISOGNO MEDIO GIORNALIERO DI PROTEINE PER UN ADULTO OSCILLA TRA:

- A 10-15 G/DIE
- X B 55-65 G/DIE
- C 80-130 G/DIE
- D 200-270 G/DIE
- E 300-400 G/DIE

1116 IN QUALE DEI SEGUENTI TESSUTI O ORGANI L'INSULINA NON AUMENTA L'ASSUNZIONE DI GLUCOSIO:

- A MUSCOLI SCHELETRICI
- B MUSCOLO CARDIACO
- C MUSCOLI LISCI
- D FEGATO
- X E MUCOSA INTESTINALE

1117 QUALE DELLE SEGUENTI SOSTANZE NON STIMOLA, BENSI INIBISCE LA SECREZIONE DELL'INSULINA:

- A GLUCOSIO
- X B MANNOEPTUIOSIO
- C LEUCINA
- D GLUCAGONE
- E ARGININA

1118 NELL'IPERALDOSTERONISMO PRIMARIO SI RILEVA UNA DI QUESTE CONDIZIONI:

- A IPOTENSIONE ARTERIOSA
- B DIMINUITA INCREZIONE DI INSULINA
- C IPERREFLESSIA
- D IPOBICARBONATEMIA
- X E IPOPOTASSIEMIA

1119 LA SINDROME DI KLINEFELTER PUO' ESSERE DOVUTA:

- A NON DISGIUNZIONE MEIOTICA MATERNA
- B NON DISGIUNZIONE MEIOTICA PATERNA
- C PRECOCE NON DISGIUNZIONE MEIOTICA
- X D A TUTTE LE CAUSE SOPRADETTE
- E NESSUNA DELLE CAUSE SOPRADETTE

1120 L'ASSENZA DI 21-IDROSSILASI DETERMINA UN AUMENTO DI:
 A CORTISONE
 B ESTROGENI
 X C ANDROGENI
 D PROGESTERONE
 E ALDOSTERONE

1121 L'INSULINA REGOLA I LIVELLI EMATICI DEL:
 A CALCIO
 B MAGNESIO
 X C GLUCOSIO
 D FERRO
 E FOSFORO

1122 L'OVAIO POLICISTICO TIPICO E' CARATTERIZZATO DA:
 A NORMALE LH, ELEVATO FSH, DIMINUZIONE DI ESTRADIOLO
 B NORMALE LH, AUMENTO DEL TESTOSTERONE E DELL'ESTRADIOLO
 C NORMALE LH, AUMENTO ANDROSTENEDIONE ED ESTRADIOLO
 D AUMENTO DI LH, TESTOSTERONE ED ESTRADIOLO
 X E AUMENTO DI LH, ANDROSTENEDIONE ED ESTRONE

1123 LA FREQUENZA DELLA SINDROME DI KLINEFELTER E' DI:
 A 1:100
 X B 1:500
 C 1:10.000
 D 1:40.000
 E 1:50.000

1124 LA CO₂ PRODOTTA DAI TESSUTI PERIFERICI VIENE TRASPORTATA NEL SANGUE IN MAGGIOR PARTE:
 A SOTTO FORMA DI CO₂ IN SOLUZIONE
 B LEGATA AI GRUPPI AMINICI DELL'EMOGLOBINA
 X C SOTTO FORMA DI BICARBONATO
 D LEGATA AL GRUPPO EME DELL'EMOGLOBINA
 E SOTTO FORMA DI UREA

1125 NELLA CELLULA ANIMALE NON SONO PRESENTI:
 A LISOSOMI
 B CENTRIOLI
 C CORPI DI GOLGI
 D CIGLIA E FLAGELLI
 X E PLASMIDI

1126 NON E' CAUSA DI IPERFOSFATEMIA:
 A IPOPARATIROIDISMO
 B PSEUDO-IPOPARATIROIDISMO
 C INSUFFICIENZA RENALE
 D SOVRADOSAGGIO DI VIT. D
 X E OSTEOMALACIA

1127 NON E' CAUSA DI IPOMAGNESIEMIA:
 A SINDROMI DA MALASSORBIMENTO
 B DIARREA
 C IPERALDOSTERONISMO
 D TRATTAMENTO INSULINICO DEL COMA DIABETICO
 X E MORBO DI ADDISON

1128 QUALE DEI SEGUENTI DIFETTI GENETICI DI PROTEINE PLASMATICHE E' CLINICAMENTE ASINTOMATICO:
 X A BISALBUMINEMIA
 B DIFETTO GENETICO DI ALFA-ANTITRIPSINA
 C DIFETTO GENETICO DI CERULOPLASMINA
 D DIFETTO GENETICO DI ALFA-LIPOPROTEINE
 E DIFETTO GENETICO DI BETA-LIPOPROTEINE

1129 I VALORI PIU' ELEVATI DI TRIGLICERIDI SIERICI SI HANNO, SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI FREDRICKSON, NEI TIPI:
 A I E II
 X B I E V
 C II E III
 D II E IV
 E II E V

1130 L'ISOENZIMA DELLA LATTICO DEIDROGENASI LA CUI ATTIVITA' SIERICA AUMENTA IN MAGGIOR MISURA IN CASO DI INFARTO DEL MIOCARDIO E':
 X A LDH 1
 B LDH 2
 C LDH 3
 D LDH 4
 E LDH 5

1131 IN QUALE DI QUESTE AFFEZIONI MORBOSE SI RILEVA ABITUALMENTE LINFOCITOSI?
 A LINFOMA DI HODGKIN
 X B LINFOSARCOMA
 C STRESS, TRAUMI
 D USTIONI ESTESE
 E TUTTE QUESTE CONDIZIONI

1132 NELLE ANEMIE SIDEROPENICHE SI RILEVA:
 X A AUMENTO DELLA TRANSFERRINA INSATURA
 B IPERBILIRUBINEMIA
 C DIMINUITA CAPACITA' SERICA TOTALE DI FERRO-FISSAZIONE
 D DIMINUZIONE DELLA CUPREMIA
 E MEGALOCITOSI REATTIVA

- 1133 NELL'ANEMIA EMOLITICA CRONICA CON EMOGLOBINURIA PA
ROSSISTICA NOTTURNA SI RILEVA:
A LEUCOCITOSI
B IPERBILIRUBINEMIA CONIUGATA
C RETICOLOCITOSI SEMPRE ASSENTE
D EMOSIDERINURIA ASSENTE
X E RIDOTTA ATTIVITA' ACETILCOLINESTERASICA DEGLI ERI-
TROCITI
- 1134 GLI ANTICORPI ANTIERITROCITARI <<FREDDI>> SONO DI
TIPO COMPLETO E APPARTENGONO ALLA CLASSE IMMUNOGLO
BULINICA:
X A IGM
B IGG
C IGD
D IGA
E IGE
- 1135 LA FIBRINOLISI AVVIENE SOPRATTUTTO AD OPERA DI UN
ENZIMA PROTEOLITICO ELABORATO PRINCIPALMENTE DA:
X A LEUCOCITI
B ERITROCITI
C PIASTRINE
D FIBROBLASTI
E TUTTE QUESTE CELLULE
- 1136 IL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS:
A E' ANAEROBIO
B POSSIEDE UNA CAPSULA CEROSA
C NON NECESSITA DI APPORTO DI O₂
D NON E' ACIDO RESISTENTE
X E HA UN ELEVATO CONTENUTO LIPIDICO
- 1137 QUALE DI QUESTE FORME DI PESTE SI TRASMETTE GENE
RALMENTE PER CONTAGIO DIRETTO INTERUMANO?
A FORMA BUBBONICA
B FORMA SETTICEMICA
X C FORMA POLMONARE
D TUTTE QUESTE FORME
E NESSUNA DI QUESTE FORME
- 1138 IL PARATORMONE HA UNA DI QUESTE CARATTERISTICHE.
QUALE?
A E' UN FOSFOLIPIDE
B INIBISCE L'ASSORBIMENTO INTESTINALE DEL CA⁺⁺
C RIDUCE IL RIASSORBIMENTO TUBULARE DEL CA⁺⁺
X D AUMENTA LA CONCENTRAZIONE DI CA⁺⁺ NEI FLUIDI EXTRA
CELLULARI
E LA SUA SECREZIONE E' STIMOLATA DALLA IPERCALCEMIA
- 1139 LO PSEUDOIPOPARATIROIDISMO E' CARATTERIZZATO DA:
A DIFETTO DI TRASPORTO TUBULARE DI TREONINA
B GLICINURIA
C IPERCALCEMIA
X D SCARSA O NULLA RISPOSTA FOSFATURICA ALLA SOMMINI-
STRAZIONE ENDOVENOSA DI PARATORMONE
E IPOFOSFATEMIA
- 1140 NELLA SINDROME DA INADEGUATA SECREZIONE DI ADH SI
RILEVA:
X A AUMENTATA RITENZIONE RENALE DI H₂O
B DIMINUITA RITENZIONE RENALE DI H₂O
C VOLUME URINARIO AUMENTATO
D AUMENTATO RIASSORBIMENTO TUBULARE DEL NA
E IPERGLICEMIA
- 1141 LA SINDROME PARATIREOPRIVA E' CARATTERIZZATA DA:
X A IPERFOSFATEMIA
B IPERCALCEMIA
C AUMENTATA ESCREZIONE URINARIA DI CALCIO
D AUMENTATA ESCREZIONE URINARIA DI FOSFATI
E TUTTI QUESTI REPERTI
- 1142 L'ACIDO D-AMINOLEVULINICO E' AUMENTATO NELLE URINE
IN CORSO DI:
A PORFIRIA ERITROPOIETICA CONGENITA
B PROTOPORFIRIA ERITROPOIETICA
C COPROPORFITIA ERITROPOIETICA
D PORFIRIA CUTANEA TARDATA
X E PORFIRIA ACUTA INTERMITTENTE MANIFESTA
- 1143 LA MALATTIA AUTOSOMICA DOMINANTE E':
A L'ALBINISMO
B L'OMOCISTINURIA
C LA FENILCHETONURIA
D L'ANEMIA FALCIFORME
X E IL RENE POLICISTICO
- 1144 CARATTERISTICHE DELLE IGE SONO TUTTE QUESTE
TRANNE UNA. QUALE?
A SONO TERMOLABILI
B SONO PRESENTI NELLE SECREZIONI
C NON SUPERANO IL FILTRO PLACENTARE
X D FISSANO IL COMPLEMENTO
E SONO ATTIVE IN QUANTITA' MINIME
- 1145 L'AZIONE <<HELPER>> DEI LINFOCITI T SI ESPLICA:
X A SUI LINFOCITI B
B SULLE CELLULE EPITELIALI
C SULLE CELLULE ENDOTELIALI
D SULLE EMASIE
E SULLE PIASTRINE

- 1146 L'INSULINA:
A INIBISCE LA SECREZIONE GASTRICA DI HCL
X B STIMOLA LA SECREZIONE GASTRICA DI PEPSINA
C INIBISCE LA MOTILITA' GASTRICA
D INIBISCE LA SECREZIONE DI GLUCAGONE
E NON SVOLGE ALCUNA DI QUESTE FUNZIONI
- 1147 LA CALCITONINA:
X A INIBISCE IL RIASSORBIMENTO OSSEO
B HA EFFETTO IPERCALCEMIZZANTE
C HA EFFETTO IPERFOSFOREMIZZANTE
D ESALTA IL RIASSORBIMENTO RENALE DEL CALCIO
E ESALTA IL RIASSORBIMENTO TUBULARE RENALE DEI FOSFATI
- 1148 L'ENTEROGLUCAGONE STIMOLA LA:
A MOTILITA' ENTERICA
B SECREZIONE PANCREATICA
C SECREZIONE GASTRICA
X D SECREZIONE ENTERICA
E MOTILITA' GASTRICA
- 1149 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E' ESATTA:
A IL PH NON HA ALCUN EFFETTO SULL'ATTIVITA' ENZIMATICA
B L'ATTIVITA' ENZIMATICA AUMENTA ALL'AUMENTARE DEL PH
C L'ATTIVITA' ENZIMATICA DIMINUISCE ALL'AUMENTARE DEL PH
X D GENERALMENTE ESISTE PER CIASCUN ENZIMA UN PH AL QUALE L'ATTIVITA'E' MASSIMA
E LA MASSIMA ATTIVITA' ENZIMATICA SI HA AL PH FISIOLOGICO DI 7,4
- 1150 I CHILOMICRONI SONO COSTITUITI PREVALEMENTEMENTE DA:
X A TRIGLICERIDI
B FOSFOLIPIDI
C COLESTEROLO
D PROTEINE
E ACIDI GRASSI NON ESTERIFICATI
- 1151 IL POLISACCARIDE DI RISERVA PRESENTE NEI TESSUTI ANIMALI E':
A L'ALFA-AMIOSIO
B L'AMIOPECTINA
X C IL GLICOGENO
D I DESTRANI
E I MANNANI
- 1152 LA NICOTINAMIDE ADENININUCLEOTIDE (NAD) PRESENTA PICCHI DI ASSORBIMENTO:
X A A 260 E 340 NM
B SOLO A 340 NM
C SOLO A 260 NM
D A 340 E 405 NM
E A 260 E 405 NM
- 1153 TRA I COMPOSTI DETTI CORPI CHETONICI E' PRESENTE:
A ALFA-CHETOGLUTARATO
B SUCCINATO
C FUMARATO
X D BETA-IDROSSIBUTIRATO
E CARNITINA
- 1154 IL PIRIDOSSALFATO, DERIVATO DALLA VITAMINA B6, E' COENZIMA NELLE REAZIONI DI:
A DEAMINAZIONE
B DECARBOSSILAZIONE
X C TRANSAMINAZIONE
D OSSIDORIDUZIONE
E ISOMERIZZAZIONE
- 1155 I VERTEBRATI TERRESTRI, E QUINDI L'UOMO, SONO:
X A UREOTELICI
B AMMONIOTELICI
C URICOTELICI
D TUTTI E TRE
E NESSUNO DEI TRE
- 1156 LA TRASDUZIONE:
A E' UN MECCANISMO DI RICOMBINAZIONE GENETICA
B AVVIENE PER MEZZO DI FAGI TEMPERATI
C E' SPECIALIZZATA
D E' GENERALIZZATA
X E POSSIEDE TUTTE LE SUDETTE CARATTERISTICHE
- 1157 IL CLOSTRIDIO DEL TETANO E' UN MICRORGANISMO:
A SPORIGENO
B PRODUTTORE DI ESOTOSSINE
C GRAM-POSITIVO
D ANAEROBIO
X E CHE POSSIEDE TUTTE LE SUDETTE CARATTERISTICHE
- 1158 IL MICOBATTERIO DELLA TUBERCOLOSI E' UN MICRORGANISMO:
A MOBILE
B SPORIGENO
C GRAM-NEGATIVO
X D ACIDO-ALCOOL RESISTENTE
E PRODUTTORE DI ESOTOSSINE

- 1159 IN QUALE DELLE SEGUENTI MALATTIE VIRALI LA RISPOSTA IMMUNE VIRUS-INDOTTA NELL'OSPITE E' UN FATTORE IMPORTANTE NELLA PATOLOGIA DELLA MALATTIA:
A PAPILLOMA
B EPATITE TIPO B
X C CORIOMENINGITE LINFOCITARIA
D POLIOMELITE
E COXSACKIE
- 1160 L'INTERFERONE INIBISCE LA MOLTIPLICAZIONE VIRALE ME
DIANTE:
A STIMOLAZIONE DELLA RISPOSTA IMMUNE CELLULO-MEDIATA
B STIMOLAZIONE DELLA RISPOSTA IMMUNE UMORALE
C AZIONE ANTIVIRALE DIRETTA PER INIBIZIONE DEL MRNA
X D INDUZIONE NELLE CELLULE NON INFETTE DELLA SINTESI
DI UNA PROTEINA CHE PREVIENE L'ASSEMBLAGGIO DI NUO
VE PARTICELLE VIRALI
E ALTERAZIONE DELLA MEMBRANA CELLULARE CHE IMPEDISCE
LA PENETRAZIONE DEL VIRUS NELLE CELLULE
- 1161 IL TEST DI INIBIZIONE DELL'EMOAGGLUTINAZIONE E'
UTILIZZATO PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI:
A ANTICITOMEGALOVIRUS
B ANTI-HERPES SIMPLEX
C ANTI VIRUS RESPIRATORIO-SINCIZIALE
D ANTI VARICELLA
X E ANTI VIRUS INFLUENZALE
- 1162 UN VIRUS DI MEDIA GRANDEZZA, A DNA, CON UN PEPLOS
DI NATURA LIPIDICA A QUALE GRUPPO, TRA I SEGUENTI,
APPARTIENE:
A POXVIRUS
X B HERPESVIRUS
C ADENOVIRUS
D PICORNAVIRUS
E REOVIRUS
- 1163 L'ACIDO NALIDIXICO E' UN ANTIBIOTICO CHE AGISCE:
A SULLA SINTESI PROTEICA
X B SULLA REPLICAZIONE DEL DNA
C SULLA RNA POLIMERASI
D SULLA PARETE CELLULARE
E SUI RIBOSOMI
- 1164 L'ESCHERICHIA COLI E' UN BACILLO:
A GRAM-POSITIVO
B SPORIGENO
X C MOBILE
D CHE NON FERMENTA IL LATTOSIO
E CITOCROMO-OSSIDASI POSITIVO
- 1165 LA NEISSERIA GONORRHOEAE E' UN MICROORGANISMO:
A GRAM-POSITIVO
B MOBILE
C SPORIGENO
X D DI FORMA COCCOIDE
E NON PRESENTA NESSUNO DI QUESTI CARATTERI
- 1166 LA REAZIONE SIEROLOGICA DI VIDAL E':
A UNA REAZIONE DI AGGLUTINAZIONE
B SERVE A DETERMINARE IL TITOLO DEGLI ANTICORPI ANTI
-ANTIGENE O DELLE SALMONELLE
C SERVE A DETERMINARE IL TITOLO DEGLI ANTICORPI ANTI
-ANTIGENE H DELLE SALMONELLE
D E' POSITIVA DOPO LA SECONDA SETTIMANA DELL'INFEZIO
NE
X E HA TUTTE QUESTE CARATTERISTICHE
- 1167 L'ANTIGENE VI (VIRULENZA DELLE SALMONELLE) E':
A LOCALIZZATO SUI FLAGELLI
X B LOCALIZZATO SULLA CAPSULA
C PRESENTE SOLO NELLE SALMONELLE IN FASE S
D LOCALIZZATO SULLA PARETE CELLULARE
E LOCALIZZATO SULLA MEMBRANA PLASMATICA
- 1168 LE SPIROCHETE SONO MICROORGANISMI:
A IMMOBILI
B GRAM-NEGATIVI
C MOBILI PER MEZZO DI FLAGELLI
X D MOBILI PER MEZZO DI FILAMENTI ASSILI
E SPORIGENI
- 1169 L'INTOSSICAZIONE DA CLOSTRIDIUM BOTULINUM SI
TRASMETTE ALL'UOMO:
A PER CONTAGIO INTERUMANO
B PER VIA RESPIRATORIA
X C PER INGESTIONE DI CIBI INFETTI
D PER CONTAGIO DA ANIMALI
E PER PUNTURE DA INSETTI VETTORI
- 1170 LE CLAMIDIE SONO:
A VIRUS A DNA
B VIRUS AD RNA
X C BATTERI PARASSITI ENDOCELLULARI
D MICETI
E MICROORGANISMI SPIRILLARI
- 1171 UN MITOGENO SPECIFICO PER I LINFOCITI T E':
X A CONCAVALINA A
B POKEWEE MITOGEN (PWM)
C LIPOLISACCARIDE DI E. COLI (LPS)
D DERIVATI PROTEICI PURIFICATI (PPD) DA M. TUBERCULO
SIS
E SIERO ANTI-IG

- 1172 QUALE DI QUESTI METODI PERMETTE DI EFFETTUARE DELLE ANALISI QUANTITATIVE DI PROTEINE SOLUBILI:
 A IMMUNOELETTROFORESI
 B IMMUNODIFFUSIONE SEMPLICE
 C IMMUNODIFFUSIONE DOPPIA
 X D IMMUNODIFFUSIONE RADIALE
 E IMMUNOFLUORESCENZA
- 1173 NELLE MALATTIE DELLE CATENE PESANTI:
 A SI RITROVA QUASI SEMPRE LA PROTEINA DI BENICE-JONES
 X B NON SI RITROVA QUASI MAI LA PROTEINA DI BENICE-JONES
 C LA PROTEINA DI BENICE-JONES E' PRESENTE NEL SIERO MA NON NELLE URINE
 D LA PROTEINA DI BENICE-JONES E' PRESENTE NELLE URINE MA NON NEL SIERO
 E LA PRESENZA DI PROTEINA DI BENICE-JONES VARIA DA CASO A CASO
- 1174 NEL COLOSTRO LA CLASSE PREDOMINANTE DI IG E':
 A IGM
 B IGG
 X C IGA
 D IGD
 E IGE
- 1175 LA BETA2-MICROGLOBULINA E':
 A UNA CATENA DELLE IG
 B UN FATTORE DEL COMPLEMENTO
 C UN FATTORE DELLA COAGULAZIONE
 X D UNA CATENA DEGLI ANTIGENI DI ISTOCOMPATIBILITA'
 E UN PEPTIDE VASOATTIVO
- 1176 L'ERITROBLASTOSI FETALE E' DOVUTA AD ANTICORPI DELLA CLASSE:
 A IGM
 B IGA
 X C IGG
 D IGD
 E IGE
- 1177 QUALE E' IL NUMERO DI CROMOSOMI NELLA MADRE DI UN BAMBINO AFFETTO DA MONGOLISMO DA TRASLOCAZIONE:
 A 46
 B 64
 C 21
 D 23
 X E 45
- 1178 QUALE E' LA PROBABILITA' CHE DOPO LA NASCITA DI UN INDIVIDUO AFFETTO DA MONGOLISMO SPORADICO, SE NE VERIFICHI UNA SECONDA ANALOGA:
 X A 1:40 - 1:80
 B 1:80 - 1:250
 C 1:250 - 1:600
 D 1:600 - 1:1.000
 E 1:1.000 - 1:2.500
- 1179 QUALE DEI SEGUENTI CARIOTIPI SI RISCONTRA NELLA SINDROME DI TURNER:
 A XY
 B XX
 X C XO
 D YO
 E XXY
- 1180 LA TIREOPATIA NELLA QUALE SI RISCONTRANO PIU' FREQUENTEMENTE ANTICORPI ANTITIROIDEI E':
 A LA MALATTIA DI BASEDOW
 B IL MIXEDEMA PRIMITIVO
 C IL CARCINOMA TIROIDEO
 D L'IPOTIROIDISMO CONGENITO
 X E LA TIROIDITE DI HASHIMOTO
- 1181 IN QUALI DELLE SEGUENTI MALATTIE SI RISCONTRA LA PRESENZA DEL CROMOSOMA PHILADELPHIA (PH 1)
 A LEUCEMIA LINFOBLASTICA CRONICA
 X B LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA
 C SINDROME DI MARFAN
 D MALATTIA DI HUNTER
 E OMOCISTINURIA
- 1182 LE ZANZARE SONO VETTORI IN TUTTE LE SEGUENTI INFEZIONI, ECCETTO UNA:
 A FEBBRE GIALLA
 B MALARIA
 X C FEBBRE DI TSUTSUGAMASHI
 D DENGUE
 E ENCEFALITE DI S. LOUIS
- 1183 IN QUALE DEI SEGUENTI CASI DIMINUISCE LA CALCEMIA:
 A IPERVITAMINOSI D
 B ATROFIA OSSEA
 C MIELOMA MULTIPLO
 X D NEFROSII
 E IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO

1184 IN QUALE DEI SOTTOELENCATI CASI AUMENTA IL LIVELLO DI ALFA-FETO-PROTEINA NEL SIERO:
A TERATOMI
B SPINA BIFIDA
C MORBO CELIACO
X D CARCINIMA EPATOCELLULARE
E MONGOLISMO

1185 QUALE DELLE SEGUENTI FRAZIONI LIPOPROTEICHE CONTIENE LA PIU' ELEVATA PERCENTUALE DI COLESTEROLO:
A CHILOMICRONI
X B LDL
C VLDL
D HDL
E VLDL + HDL

1186 I CORPI DI HEINZ SONO UN:
A REPERTO CHIMICO-CLINICO
B REPERTO ANATOMO-PATOLOGICO
X C REPERTO EMATOCHIMICO
D REPERTO ISTOCHEMICO
E NESSUNO DEI PRECEDENTI

1187 L'HAEMOPHILUS INFLUENZAE SI RITROVA COME AGENTE Eziologico DI MENINGITE SPECIALMENTE:
A NEGLI ADULTI
B NEI LATTANTI
X C NEGLI ANZIANI
D NELLE PARTORIENTI
E NELLE GESTANTI

1188 IN QUALE DELLE SEGUENTI ALTERAZIONI CROMOSOMICHE SI RISCONTRA LA PRESENZA DI UNA DOPPIA DOSE DI MATERIALE GENETICO:
A DELEZIONE
B TRASLOCAZIONE
X C ISOCROMOSOMA
D FRAME-SHIFT
E INVERSIONE

1189 LA CONDIZIONE PATOLOGICA NELLA QUALE UN TIPO DI TESSUTO ADULTO E' SOSTITUITO DA UN ALTRO SI CHIAMA
A DISPLASIA
B ANAPLASIA
X C METAPLASIA
D APLASIA
E IPOPLASIA

1190 LA DIMINUZIONE DEL VOLUME DI UN ORGANO IN SEDE NORMALMENTE SVILUPPATO SI CHIAMA:
A APLASIA
B IPOPLASIA
X C ATROFIA
D METAPLASIA
E AGENESIA

1191 QUALE DEI SEGUENTI TUMORI E' STATO PIU' FORTEMENTE ASSOCIATO CON LA IPOTESI DI UNA EZIOLOGIA VIRALE:
A LEIOMIOMA DELL'UTERO
B CARCINOMA DEL POLMONE
C CARCINOMA DELL'ESOFAGO
X D LINFOMA DI BURKITT
E LINFOMA ISTIOCITICO

1192 QUALE DEI SEGUENTI TUMORI E' PIU' FREQUENTEMENTE ASSOCIATO CON LA PRODUZIONE DI UN ANTIGENE CARCINOEMBRIONARIO:
A CARCINOMA DELL'ESOFAGO
B LINFOMA MALIGNO
X C CARCINOMA DEL COLON
D SEMINOMA DEL TESTICOLO
E TERATOMA DEL TESTICOLO

1193 QUALE DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE NON E' TIPICA DEI TUMORI BENIGNI:
A INCAPSULAMENTO
B BASSO INDICE MITOTICO
X C INVASIONE DEI VASI SANGUIGNI
D CRESCITA LENTA
E BUONA DIFFERENZIAZIONE

1194 UN AUMENTO DI VOLUME DI UN TESSUTO PER AUMENTO DEL NUMERO DELLE CELLULE CHE LO COMPONGONO SI CHIAMA:
A APLASIA
B AGENESIA
C IPERTROFIA
X D IPERPLASIA
E METAPLASIA

1195 LA EZIOLOGIA DEL CARCINOMA BRONCHIOGENO E' PIU' CHIARAMENTE ASSOCIATA CON:
A ANOMALIE GENETICHE
B TENDENZA FAMILIARE
X C FUMO DI SIGARETTA
D VIRUS RESPIRATORI
E ENFISEMA

- 1196 TUTTE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI CONCERNENTI L'AMILOIDOSI SONO VERE, ECCETTO UNA, QUALE:
 A IN ALCUNI CASI E' ASSOCIATA AL PLASMOCITOMA MULTIPLO
 B IN ALCUNI CASI E' ASSOCIATA AD INFEZIONI
 X C LA FORMA PRIMARIA E QUELLA SECONDARIA DIFFERISCONO PER LA DISTRIBUZIONE DEGLI ORGANI COLPITI
 D IN ALCUNI CASI E' ASSOCIATA CON LA SINDROME NEFROTICA
 E IN ALCUNI CASI E' ASSOCIATA AD INSUFFICIENZA CARDIACA
- 1197 TUTTE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI SONO VERE, ECCETTO UNA, QUALE:
 A LA CALCIFICAZIONE DISTROFICA SI RIFERISCE A DEPOSIZIONE DI CALCIO IN TESSUTI PREVIAMENTE DANNEGGIATI
 B LA CALCIFICAZIONE METASTATICA E' ASSOCIATA CON ELEVATI LIVELLI DI CALCIO SIERICO
 X C LA PRESENZA DI MACROFAGI CONTENENTI EMOSIDERINA IMPLICA UN AUMENTATO ASSORBIMENTO DI FERRO
 D NELLA MALATTIA DI GAUCHER DELL'ADULTO IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E' DI SOLITO RISPARMIATO
 E LE GLICOGENOSI POSSONO INTERESSARE CUORE, FEGATO, RENE, MUSCOLI SCHELETRICI
- 1198 IPERGLICEMIA, IPERPIGMENTAZIONE CUTANEA, INSUFFICIENZA CARDIACA E CIRROSI SONO CARATTERISTICI DI:
 A FEGATO DEGLI ALCOLISTI
 B DIABETE MELLITO
 C EPATITE FULMINANTE
 X D EMOCROMATOSI
 E SPRUE NON TROPICALE
- 1199 LE MALATTIE EREDITARIE RECESSIVE SONO CARATTERIZZATE DALLE SEGUENTI CONDIZIONI, ECCETTO UNA, QUALE:
 A LA ESPRESSIONE FENOTIPICA DELLA MALATTIA NON E' PRESENTE NEI GENITORI
 B ENTRAMBI I GENITORI SONO PORTATORI DEL GENE PATOLOGICO
 C ESSE RAPPRESENTANO LA CATEGORIA PIU' COMUNE DI DISORDINI MENDELIANI
 X D GLI ASCENDENTI NON MALATI NON TRASMETTONO LA MALATTIA
 E UN GENE DISVITALE PUO' ESSERE EREDITATO SENZA VENIRE ESPRESSO
- 1200 TUTTE LE SEGUENTI AFFERMAZIONI CONCERNENTI LE MALATTIE EREDITARIE A CARATTERE DOMINANTE SONO VERE ECCETTO UNA, QUALE:
 A I PAZIENTI COLPITI DALLA MALATTIA HANNO UN GENITORE COLPITO DALLA STESSA MALATTIA
 B I PARENTI SANI NON TRASMETTONO LA MALATTIA
 X C ESSE RAPPRESENTANO LA PIU' COMUNE CATEGORIA DI DISORDINI MENDELIANI
 D IL FIGLIO DI UN GENITORE AFFETTO DALLA MALATTIA, CON L'ALTRO GENITORE SANO, HA IL 50% DI PROBABILITA' DI ESSERE AFFETTO DALLA MALATTIA
 E INDIVIDUI FENOTIPICAMENTE SANI NON SONO PORTATORI DEL GENE RELATIVO
- 1201 LA PIU' PROBABILE COMPLICANZA DOPO UN EPISODIO EMORRAGICO MASSIVO E':
 A INSUFFICIENZA EPATICA E RENALE
 B INSUFFICIENZA EPATICA E POLMONARE
 C INSUFFICIENZA CARDIACA E RENALE
 D INSUFFICIENZA CARDIACA E POLMONARE
 X E INSUFFICIENZA POLMONARE E RENALE
- 1202 NELLO SHOCK L'ORGANO MENO COMPROMESSO DAL PUNTO DI VISTA ANATOMICO O FUNZIONALE E':
 A POLMONE
 B RENE
 C TRATTO GASTRO-INTESTINALE
 D FEGATO
 X E AORTA
- 1203 LA TIPIZZAZIONE DEGLI ANTIGENI DW DEL SISTEMA HLA SI OTTIENE MEDIANTE:
 A AGGLUTINAZIONE
 B FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO
 C LINFOCITOTOSSINICITA'
 X D CULTURA MISTA LINFOCITARIA
 E NESSUNA DELLE PRECEDENTI
- 1204 LA TIMOSINA E':
 A UN ORMONE IPOFISARIO CHE REGOLA LO SVILUPPO DEL TIMO
 B UNA SOSTANZA CHE CONFERISCE IMMUNITA' ADOTTIVA SPECIFICA A SOGGETTI NON SENSIBILIZZATI
 C UN ANTI-SIERO CONTRO I TIMOCITI
 X D UN ORMONE TIMICO CHE INDUCE MATURAZIONE DELLE CELLULE PRE-T
 E UNA LINFOCHINA ELABORATA DA TIMOCITI ATTIVATI

- 1205 IL TEST PIU' SENSIBILE PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DI SUPERFICIE DELLA EPATITE B NEL SANGUE E':
 A FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO
 X B TEST RADIOIMMUNOLOGICO
 C IMMUNODIFFUSIONE
 D AGGLUTINAZIONE DI LATTICE
 E ELETTROFORESI CONTROCORRENTE
- 1206 SI PUO' PRODURRE TOLLERANZA IMMUNOLOGICA SPECIFICA CON TUTTI I SEGUENTI MECCANISMI, ECCETTO UNO, QUALI:
 A SOMMINISTRAZIONE DI ALTE DOSI DI ANTIGENE
 B INDUZIONE DI LINFOCITI SOPPRESSORI
 C PRODUZIONE DI IMMUNOGLOBULINE ANTI-IDIOTIPO
 X D TIMECTOMIA NELL'ADULTO
 E SOMMINISTRAZIONE DI BASSE DOSI DI ANTIGENE
- 1207 TUTTE LE SEGUENTI SONO FUNZIONI SVOLTE DALLA MILZA E DAI LINFOCITI NELLA DIFESA CONTRO LE INFEZIONI, ECCETTO UNA, QUALE:
 A PRODUZIONE DI ANTICORPI
 B CONTATTO INIZIALE TRA GLI ANTIGENI DEI MICRORGANISMI E LINFOCITI, RISULTANTE IN UNA RISPOSTA IMMUNE
 C FAGOCITOSI
 X D PRODUZIONE DI MONOCITI
 E RIMOZIONE DI MICRORGANISMI DAL SANGUE O DALLA LINFATA
- 1208 TUTTE LE SEGUENTI SONO TAPPE DELL'INVASIONE E MOLTIPLICAZIONE DEI VIRUS, ECCETTO UNA, QUALE:
 A ATTACCO AI RECETTORI DI SUPERFICIE DI CELLULE SENSIBILI
 B PENETRAZIONE DEL VIRUS NELLA CELLULA
 C ALTERAZIONE DEL COMPORTAMENTO GENETICO DELLA CELLULA
 D LE CELLULE INFETTATE DAL VIRUS SINTETIZZANO E QUALCHE VOLTA SECERNONO ATTIVAMENTE IL VIRUS
 X E NELLE INFEZIONI GRAVI IL VIRUS PUO' REPLICARSI NEL PLASMA SANGUIGNO
- 1209 UNA CUTIREAZIONE ALLA TUBERCOLINA POSITIVA E' INIZIALMENTE PROMOSSA DA:
 A POLIMORFONUCLEATI NEUTROFILI
 B IGG
 C IGE
 X D LINFOCHINA LIBERATA DA T-LINFOCITI SENSIBILIZZATI E STIMOLATI DALL'ANTIGENE
 E MACROFAGI
- 1210 LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI MICRORGANISMI PRESENTI E' UTILE NELLA VALUTAZIONE DELLE CULTURE DI
 A SANGUE
 B LIQUIDO PLEURICO
 C ESPETTORATO
 X D URINE
 E FECI
- 1211 LE LESIONI VASCOLARI DELLA SIFILIDE TERZIARIA INTERESSANO PIU' SPESSO LA:
 A AORTA ADDOMINALE
 B ARTERIA CORONARIA
 C VENA CAVA INFERIORE
 D CAROTIDE
 X E AORTA ASCENDENTE
- 1212 LA SENSIBILIZZAZIONE VERSO IL BACILLO TUBERCOLARE PROTEGGE DA UNA SUCCESSIVA INFEZIONE PRINCIPALMENTE PERCHE':
 A FORNISCE FATTORI CHEMIOTATTICI PER I GRANULOCITI NEUTROFILI
 B CAUSA NECROSI CASEOSA, CHE A SUA VOLTA DETERMINA LA MORTE DEI MICRORGANISMI
 X C PRODUCE UNA RAPIDA ED EFFICACE RISPOSTA MACROFAGICA
 D PROMUOVE LA CALCIFICAZIONE, CHE ISOLA I MICRORGANISMI
 E CAUSA IPERSENSIBILITA' CUTANEA VERSO I MICRORGANISMI
- 1213 QUALE DEI SEGUENTI FENOMENI PROPRI DELL'INFIAMMAZIONE ACUTA SI VERIFICA PRIMA:
 A FAGOCITOSI
 X B STASI
 C MARGINAZIONE DEI LEUCOCITI
 D MIGRAZIONE DEI LEUCOCITI
 E LIFOADENITE
- 1214 DA QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI E' MEGLIO DEFINITA L'INFIAMMAZIONE:
 X A UNA REAZIONE DELLA MICROCIRCOLAZIONE TESSUTALE AD UNO STIMOLO LESIVO
 B UNA FORMA DI EDEMA
 C CHEMIOTASSI DI LEUCOCITI VERSO I BATTERI
 D UNA FORMA DI PROLIFERAZIONE CELLULARE PATOLOGICA
 E MODIFICAZIONI CELLULARI PRODOTTE DA UNO STIMOLO LESIVO

1215 TRANNE RARE ECCEZIONI, NEL CASO DEL DIABETE MELLIT
O SI PARLA DI UNO DI QUESTI TIPI DI EREDITARIETA'
A EREDITARIETA' AUTOSOMICA DOMINANTE
B EREDITARIETA' AUTOSOMICA RECESSIVA
X C EREDITARIETA' POLIGENICA O MULTIFATTORIALE
D EREDITARIETA' DIAGINICA
E ASSENZA DI QUALSIVOGLIA CORRELAZIONE CON TRASMISSIO
NE EREDITARIA