



INDICACIONES PRE-OPERATORIAS

Conserve este documento y tráigalo el día de la cirugía

Paciente: Liam Daury Mercedes Guerrero

Edad: 1 años 1 meses

Exp: LDM002 | Tutor: Laura diaz

Procedimiento	Circuncisión + Frenillectomía Lingual
Diagnóstico	N47.1 — Fimosis Q38.1 — Anquiloglosia
Anestesia	Anestesia general
Fecha cirugía	miércoles, 3 de junio de 2026
Presentarse a las	06:00
Centro	Centro Médico de Especialidades Médicas (CMEM) — Emergencia de pediatría
Riesgo ASA	ASA I
PSS / Código Prestador	817151
ARS / Seguro	SENASA · Póliza: 189636688

AYUNO PRE-OPERATORIO OBLIGATORIO

Tipo de alimento / líquido

Ayuno

Última toma permitida

Leche materna

4h

NO después de las 03:00h

Fórmula / Sólidos / Leche entera

6h

NO después de las 01:00h

Agua / Líquidos claros

2h

NO después de las 05:00h

IMPORTANTE: Lactante mayor: Sólidos y fórmula 8 horas antes.



ESTUDIOS PRE-OPERATORIOS

- Hemograma completo (con diferencial)
- Tipo y grupo sanguíneo + pruebas cruzadas
- Glicemia en ayunas
- Creatinina sérica y BUN
- Rx de tórax PA (si tiene historia respiratoria o > 1 año)
- Traer resultados impresos el día de la cirugía.



MEDICAMENTOS EL DÍA DE LA CIRUGÍA

- Suspender todos los medicamentos orales durante el ayuno.
- EXCEPCIÓN: anticonvulsivantes, antihipertensivos y medicamentos críticos → administrar con un sorbo mínimo de agua (5–10 ml) el día de la cirugía, SOLO con indicación médica.
- Suspender AINES (ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco) 7 días antes.
- Suspender aspirina 10 días antes.



PREPARACIÓN ESPECIAL

- Baño o ducha completa la noche anterior con jabón antibacterial
- No aplicar cremas, lociones, talco ni perfumes el día de la cirugía.
- Ropa cómoda, holgada y fácil de remover.
- Uñas limpias y SIN esmalte (permite monitoreo de oximetría).
- Presentarse con el cabello limpio (niñas: sin hebillas metálicas ni aretes).
- Traer carnet de vacunas y documentos de identidad del tutor.
- Procedimiento: Circuncisión — coordinado con el equipo quirúrgico.



RESTRICCIONES

- No administrar AINES ni aspirina los 7-10 días previos (aumentan el sangrado).
- No administrar hierba medicinal, fitoterapia ni suplementos no aprobados.
- No aplicar vacunas en los 7 días previos (salvo indicación urgente).



SEÑALES DE ALARMA — Llame al médico o acuda a urgencias si:

- Fiebre > 38°C en las 48 horas previas a la cirugía.
- Infección activa de vías respiratorias superiores (resfriado, tos, congestión severa).
- Vómitos, diarrea o malestar gastrointestinal activo.
- Erupción cutánea nueva, reacción alérgica reciente.
- Convulsiones o cambios en el estado neurológico.
- Trauma o herida reciente en área quirúrgica.
- En cualquiera de estos casos: COMUNICARSE CON EL MÉDICO ANTES DE ACUDIR.



Notas: Favor Ingresar para acto quirúrgico ambulatorio



Dr. Lorenzo Ernesto Otaño Santiago · Exeq. 573-05 · Cirujano Pediátrico · Neonatal · Laparoscopista · 829-383-4449 · PSS (SENASA): 817151

Comuníquese ante cualquier duda o señal de alarma antes del día de la cirugía.