


Exercice 1.

On considère le rectangle $ABCD$ ci-contre, avec E , F , G , et H les milieux respectifs des côtés $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$ et $[AB]$. Le point O est l'intersection des diagonales du rectangle. Apparier chaque expression du produit scalaire avec son expression simplifiée.




1. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$
2. $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AF}$
3. $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{AB}$
4. $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AF}$

- a. $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{AB}$
- b. $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD}$
- c. $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AD}$
- d. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}$

Exercice 2.


Dans une unité de longueur donnée, on considère un carré $ABCD$ dont le côté mesure 3, accolé à deux rectangles identiques $BEFC$ et $EGHF$ de largeur 2. Calculer les produits scalaires suivants.



1. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$
2. $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BF}$
3. $\overrightarrow{EI} \cdot \overrightarrow{AG}$
4. $\overrightarrow{CF} \cdot \overrightarrow{GD}$
5. $\overrightarrow{IC} \cdot \overrightarrow{HG}$
6. $\overrightarrow{EJ} \cdot \overrightarrow{FA}$

Exercice 3.

On considère le rectangle $ABCD$ de longueur 10 et de largeur 6. Le point E est le milieu de $[AB]$ et F est le milieu de $[BC]$. Déterminer les valeurs exactes des produits scalaires suivants.



1. $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DB}$
2. $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{DF}$
3. $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DC}$
4. $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DF}$
5. $\overrightarrow{DF} \cdot \overrightarrow{DB}$

Exercice 4. On considère les points $A(5; -3)$, $B(-2; 7)$, $C(\frac{-1}{2}; 0)$ et $D(-5; \frac{3}{4})$. Calculer les produits scalaires

1. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$
2. $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$
3. $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}$

Exercice 5. Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ x \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ deux vecteurs du plan avec $x \in \mathbb{R}$ un réel. Déterminer la valeur de x pour obtenir

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2$
2. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -5$
3. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{7}{3}$
4. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{8}$

Exercice 6. On considère les points A , B et C tels que $AB = 7$, $AC = \sqrt{5}$ et $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Exercice 7. On donne $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{3}$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{6}$. Donner une valeur en degrés de l'angle entre les deux vecteurs.

Exercice 8. Déterminer les éventuelles valeurs du réel x pour lesquelles les vecteurs \vec{u} et \vec{v} sont orthogonaux.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 6 \\ x \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$	2. $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ x \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x-1 \\ 4 \end{pmatrix}$
3. $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix}$	4. $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ 8 \end{pmatrix}$

Exercice 9. On considère les points du plan suivants : $A(-10; 4)$, $B(-4; 1)$ et $C(-1; 7)$.

1. En utilisant le produit scalaire, montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle.
2. Déterminer les coordonnées du point D tel que le quadrilatère $ABCD$ soit un rectangle.

Exercice 10. (★★) On considère le point $A(3; 0)$ et la droite d d'équation $3x - 2y + 4 = 0$. On note H le projeté orthogonal du point A sur la droite d .

1. On note h l'abscisse du point H . Écrire l'ordonnée de H en fonction de h .
2. Déterminer la valeur de h en utilisant un produit scalaire.
3. Quelles sont les coordonnées de H ?
4. En déduire la distance du point A à la droite d , définie par la longueur AH .

Exercice 11. (★★) On considère le point $A(4; 5)$ et la droite d d'équation $5x + 4y + 1 = 0$. On note H le projeté orthogonal du point A sur la droite d . En appliquant la même méthode que dans l'exercice précédent, calculer la distance du point A à la droite d .

Exercice 12. Soient \vec{u} et \vec{v} deux vecteurs non nuls.

1. Supposons que \vec{u} et \vec{v} sont orthogonaux.
 - (a) Quelle est la valeur de $\cos(\vec{u}, \vec{v})$?
 - (b) En déduire la valeur de $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. Supposons maintenant que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
 - (a) Pourquoi peut-on affirmer que $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = 0$?
 - (b) Que peut-on alors dire de \vec{u} et \vec{v} ?
3. Qu'a-t-on prouvé dans cet exercice ?

Exercice 13. (★★) En utilisant la relation de Chasles et la distributivité du produit scalaire, prouver le résultat connu « les diagonales d'un losange sont perpendiculaires ».