

Skripta zadatka za pripremu prijemnog ispita za FON

Autor:
dr Ersin Gilić

Sjenica / Beograd, 2026.

Sadržaj

Predgovor	2
1 Prijemni ispit 2026. godine	4
2 Prijemni ispit 2025. godine	26
3 Prijemni ispit 2024. godine	47
4 Prijemni ispit 2023. godine	70
5 Prijemni ispit 2022. godine	92
6 Prijemni ispit 2021. godine	113
7 Prijemni ispit 2020. godine	135
8 Prijemni ispit 2019. godine	158
9 Prijemni ispit 2018. godine	181
10 Prijemni ispit 2017. godine	204
11 Prijemni ispit 2016. godine	226

Predgovor

Dobrodošli u skriptu koja je nastala sa jednim jasnim ciljem: da vam olakša, pojasni i uspešno utre put ka upisu na Fakultet organizacionih nauka (FON).

Priprema za prijemni ispit iz matematike na FON-u svake godine privlači ogroman broj kandidata, pri čemu i najmanje greške ili previdi prave razliku između budžetskog mesta i ostajanja ispod crte. Zadaci na prijemnom ispitu zahtevaju ne samo dobro poznavanje šablona, već i duboko razumevanje matematičke logike. Ova skripta je napisana upravo sa namerom da vam pruži maksimalnu sigurnost i predstavlja pouzdan most između vašeg srednjoškolskog znanja i visokih kriterijuma koji vas čekaju na ispitu.

Skripta je prvenstveno namenjena budućim studentima koji se pripremaju za polaganje prijemnog ispita iz matematike na FON-u, ali je izuzetno korisna i za kandidate koji se paralelno spremaju za Elektrotehnički fakultet (ETF), Saobraćajni, Građevinski ili druge tehničke i prirodno-matematičke fakultete. Zbog svog detaljnog i temeljnog pristupa, ona je odličan priručnik kako za učenike gimnazija, tako i za učenike srednjih stručnih škola koji žele da nadoknade i usavrše svoje znanje.

Materijal je koncipiran tako da obuhvata kompletne, detaljno analizirane i rešene probleme i zvanične rokove iz poslednjih godina. Ono što ovo izdanje čini jedinstvenim jeste metodološki pristup rešavanju zadataka:

- **Detaljnost bez kompromisa:** Svaki zadatak je analiziran i rešen postupno, bez preskakanja algebarskih i trigonometrijskih koraka i bez čuvenih zamki poput „odavde se lako dobija”.
- **Teorijska utemeljenost:** Tamo gde je to ključno za razumevanje, uz rešenja su priložene važne teorijske napomene, definicije i formule, što vam omogućava da kroz rad osvežite i utvrdite bitne delove teorijskog gradiva.
- **Precizna 2D i 3D vizuelizacija:** Geometrijski, stereometrijski i analitički zadaci praćeni su vrhunskim, matematički preciznim TikZ crtežima u ravni i prostoru, jer je vizuelizacija ključ pravog razumevanja.

Ova skripta je deo obimnijeg i savremenog projekta pripreme za prijemne ispite i studije. Za sve buduće kandidate obezbeđeni su besplatni materijali i kompleti probnih rokova koje možete direktno preuzeti i raditi online. Pored besplatnog sadržaja, kandidatima je na raspolaganju i naša kompletna interaktivna e-zbirka (digitalno izdanje), kojoj se dobija neograničen online pristup na godinu dana putem godišnje pretplate.

Takođe, naša podrška se ne završava položenim prijemnim ispitom i upisom na fakultet. Pored pripreme srednjoškolaca, drže se i visoko specijalizovani privatni i grupni časovi iz svih matematičkih predmeta (Matematika 1, Matematika 2, Diskretna matematika) za studente Fakulteta organizacionih nauka (FON), kao i za studente ETF-a i drugih tehničkih i matematičkih fakulteta u Beogradu i šire.

Savetujemo vam da zadatke ne čitate pasivno. Pokušajte prvo da svaki zadatak rešite samostalno, a tek kada nađete na prepreku, potražite smernicu u detaljnom rešenju. Ve-

rujemo da će vam ova skripta razbiti strah od matematike, uliti neophodno samopouzdanje i pomoći da prijemni ispit na FON-u položite sa maksimalnim brojem poena.

U Sjenici, 2026. godine

dr Ersin Gilić

Glava 1

Prijemni ispit 2026. godine

Zadatak 1. Vrednost izraza $(0,5)^{-2} + (0,2)^{-2} - (-0,125)^{-2} \cdot \sqrt{(-0,5)^4}$ jednaka je:

- (A) 11 (B) 13 (C) 8 (D) 15 (E) 10

Rešenje: Da bismo lakše izračunali vrednost datog brojevnog izraza, sve decimalne brojeve prebacimo u oblik razlomka:

$$0,5 = \frac{1}{2}, \quad 0,2 = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}, \quad -0,125 = -\frac{125}{1000} = -\frac{1}{8}$$

Uvrstimo ove razlomke u početni izraz:

$$I = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} - \left(-\frac{1}{8}\right)^{-2} \cdot \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^4}$$

Sada primenjujemo pravilo za negativan stepen $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$, kao i činjenicu da negativan broj na paran stepen postaje pozitivan:

- $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 2^2 = 4$
- $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2} = 5^2 = 25$
- $\left(-\frac{1}{8}\right)^{-2} = (-8)^2 = 64$

Sredimo izraz pod kvadratnim korenom:

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16} \implies \sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4}$$

Zamenimo dobijene vrednosti nazad u izraz:

$$I = 4 + 25 - 64 \cdot \frac{1}{4}$$

$$I = 29 - 16$$

$$I = 13$$

Tačan odgovor je pod **B**.

□

Zadatak 2. Knjiga je najpre poskupela za 40%, a zatim pojeftinila za 40%, tako da sada košta 2520 dinara. Početna cena knjige jednaka je:

- (A) 2116 dinara (B) 3528 dinara (C) 2520 dinara (D) 1008 dinara (E) 3000 dinara

Rešenje: Neka je x početna cena knjige u dinarima.

Korak 1: Prva promena cene (poskupljenje)

Kada cena knjige poskupi za 40%, njena nova cena iznosi 140% početne cene:

$$x_1 = x + 0,40x = 1,40x$$

Korak 2: Druga promena cene (pojeftinjenje)

Nakon toga, knjiga pojeftini za 40%, ali od **nova cene** x_1 . To znači da njena konačna cena iznosi 60% cene x_1 :

$$x_2 = x_1 - 0,40x_1 = 0,60x_1$$

Korak 3: Formiranje i rešavanje jednačine

Znamo da je konačna cena $x_2 = 2520$ dinara. Izrazimo x_2 direktno preko početne cene x :

$$0,60 \cdot (1,40x) = 2520$$

$$0,84x = 2520$$

$$x = \frac{2520}{0,84} = \frac{252000}{84}$$

$$x = 3000 \text{ dinara}$$

Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 3. Ako je $z = \frac{i^{2025} + i^{2026}}{i^{2021} + i^{2024}}$, gde je $i^2 = -1$, onda je z^2 jednako:

- (A) 2 (B) $-2i$ (C) $2i$ (D) -2 (E) -1

Rešenje: Da bismo pojednostavili kompleksan broj z , podsetimo se da se stepeni imaginarne jedinice i periodično ponavljaju na svaka četiri stepena ($i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$). Zato eksponente delimo sa 4 i posmatramo ostatak:

- $2025 = 4 \cdot 506 + 1 \implies i^{2025} = i^1 = i$
- $2026 = 4 \cdot 506 + 2 \implies i^{2026} = i^2 = -1$
- $2021 = 4 \cdot 505 + 1 \implies i^{2021} = i^1 = i$

- $2024 = 4 \cdot 506 + 0 \implies i^{2024} = i^0 = 1$

Uvrstimo ove vrednosti u izraz za z :

$$z = \frac{i - 1}{i + 1}$$

Možemo preurediti članove u brojiocu i imenitelju radi uočavanja pravilnosti:

$$z = \frac{-1 + i}{1 + i}$$

Izračunajmo sada direktno kvadrat ovog broja, odnosno z^2 :

$$z^2 = \left(\frac{-1 + i}{1 + i} \right)^2 = \frac{(-1 + i)^2}{(1 + i)^2}$$

Primenom formule za kvadrat binoma na brojilac i imenitelj dobijamo:

- $(-1 + i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$
- $(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$

Zamenom ovih vrednosti nazad u kvadrat razlomka imamo:

$$z^2 = \frac{-2i}{2i} = -1$$

Tačan odgovor je pod **E**. □

Zadatak 4. Ako je $p \neq 0$, $q \neq 0$ i $|p| \neq |q|$, onda je izraz $\left(\left(\frac{p^3}{q} - \frac{q^3}{p} \right) : \left(\frac{p}{q} + \frac{q}{p} \right) \right)^{-1}$.
 $(p - q)$ identički jednak izrazu:

- (A) pq (B) $p + q$ (C) $\frac{1}{p + q}$ (D) $\frac{1}{pq}$ (E) $\frac{1}{p - q}$

Rešenje: Pojednostavimo delove izraza unutar velike zagrade korak po korak.

Korak 1: Sređivanje deljenika i delitelja

Svedimo razlomke u prvoj zagradi na zajednički imenitelj pq :

$$\frac{p^3}{q} - \frac{q^3}{p} = \frac{p^4 - q^4}{pq}$$

Uočimo da brojilac možemo rastaviti kao razliku kvadrata: $p^4 - q^4 = (p^2 - q^2)(p^2 + q^2)$.

Svedimo na zajednički imenitelj i drugu zagradu:

$$\frac{p}{q} + \frac{q}{p} = \frac{p^2 + q^2}{pq}$$

Korak 2: Deljenje izraza u zagradi

Sada vršimo deljenje ova dva dobijena izraza:

$$\left(\frac{p^4 - q^4}{pq}\right) : \left(\frac{p^2 + q^2}{pq}\right) = \frac{(p^2 - q^2)(p^2 + q^2)}{pq} \cdot \frac{pq}{p^2 + q^2}$$

Skraćivanjem članova pq i $(p^2 + q^2)$, unutar zagrade ostaje samo:

$$p^2 - q^2$$

Korak 3: Primenjivanje negativnog stepena i finalni račun

Ceo naš izraz sada ima oblik:

$$(p^2 - q^2)^{-1} \cdot (p - q)$$

Zapišimo negativni stepen u obliku razlomka i rastavimo razliku kvadrata u imenitelju $p^2 - q^2 = (p - q)(p + q)$:

$$\frac{1}{p^2 - q^2} \cdot (p - q) = \frac{p - q}{(p - q)(p + q)}$$

Skraćivanjem faktora $(p - q)$ dobijamo konačan pojednostavljen izraz:

$$\frac{1}{p + q}$$

Tačan odgovor je pod **C**.

□

Zadatak 5. Ako je $f\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = \frac{1}{x}$ za $x \notin \{-1, 0\}$ i ako je f^{-1} inverzna funkcija funkcije f , onda je vrednost $f(2) \cdot f^{-1}(2)$ jednaka:

- (A) -3 (B) -1 (C) 9 (D) 1 (E) 3

Rešenje: Zadatak ćemo rešiti pronalaženjem eksplicitnog oblika funkcije $f(x)$ uvođenjem smene.

Korak 1: Određivanje funkcije $f(x)$

Uvedimo smenu za argument funkcije:

$$\frac{1-x}{1+x} = t$$

Izrazimo promenljivu x preko t :

$$1 - x = t(1 + x) \implies 1 - x = t + tx$$

$$1 - t = tx + x \implies x(t + 1) = 1 - t$$

$$x = \frac{1-t}{1+t}$$

Uvrstimo ovaj izraz za x u desnu stranu početne funkcionalne jednačine $f(t) = \frac{1}{x}$:

$$f(t) = \frac{1}{\frac{1-t}{1+t}} = \frac{1+t}{1-t}$$

Dakle, opšti oblik funkcije je $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$.

Korak 2: Izračunavanje vrednosti $f(2)$

Uvrstimo $x = 2$ u dobijenu funkciju:

$$f(2) = \frac{1+2}{1-2} = \frac{3}{-1} = -3$$

Korak 3: Izračunavanje vrednosti $f^{-1}(2)$

Po definiciji inverzne funkcije, važi da ako je $f^{-1}(2) = y$, onda je $f(y) = 2$. Iskoristimo ovo da nađemo y :

$$\begin{aligned} \frac{1+y}{1-y} = 2 &\implies 1+y = 2(1-y) \\ 1+y = 2-2y &\implies 3y = 1 \implies y = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Dakle, $f^{-1}(2) = \frac{1}{3}$.

Korak 4: Finalni proizvod

Tražena vrednost iznosi:

$$f(2) \cdot f^{-1}(2) = -3 \cdot \frac{1}{3} = -1$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 6. Broj svih celobrojnih rešenja nejednačine

$$\frac{(x-3)(x^2-8x+15)}{x+2} \leq 0$$

jednak je:

- (A) 3 (B) 5 (C) 2 (D) 7 (E) 1

Rešenje: Prvo uočimo uslov definisanosti razlomka (imenitelj ne sme biti nula):

$$x+2 \neq 0 \implies x \neq -2$$

Rastavimo kvadratni trinom $x^2 - 8x + 15$ u brojiocu na činioce. Tražimo dva broja čiji je zbir 8, a proizvod 15. To su brojevi 3 i 5:

$$x^2 - 8x + 15 = (x-3)(x-5)$$

Uvrstimo ovo nazad u nejednačinu:

$$\frac{(x-3)(x-3)(x-5)}{x+2} \leq 0 \implies \frac{(x-3)^2(x-5)}{x+2} \leq 0$$

Pošto je član $(x-3)^2 \geq 0$ za svako realno x , on ne utiče na znak razlomka, osim u tački gde je jednak nuli. Izraz $x = 3$ daje vrednost 0, što zadovoljava nejednačinu jer imamo znak ≤ 0 . Zbog toga je $x = 3$ sigurno jedno rešenje.

Za ostala rešenja posmatramo ostatak nejednačine:

$$\frac{x-5}{x+2} \leq 0$$

Ovaj razlomak je manji ili jednak nuli kada su brojilac i imenitelj suprotnog znaka, što se svodi na interval:

$$x \in (-2, 5]$$

Sada uključujemo i tačku $x = 3$ (koja već pripada ovom intervalu), pa je konačan skup realnih rešenja nejednačine:

$$x \in (-2, 5]$$

Zadatak traži broj ****celobrojnih**** rešenja. To su celi brojevi unutar ovog intervala:

$$x \in \{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

Prebrojavanjem vidimo da ima tačno 7 celobrojnih rešenja.

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 7. Vrednost izraza $2^{\log_4 25} - 7^{1+\log_7(2/7)}$ jedna ka je:

- (A) 2 (B) 6 (C) 5 (D) 4 (E) 3

Rešenje: Izračunajmo vrednost prvog i drugog člana datog izraza odvojeno, primenom osnovnih pravila za logaritme.

Sređivanje prvog člana ($2^{\log_4 25}$):

Transformišimo osnovu logaritma 4 kao 2^2 , a broj 25 kao 5^2 :

$$\log_4 25 = \log_{2^2} 5^2 = \frac{2}{2} \log_2 5 = \log_2 5$$

Sada prvi član postaje:

$$2^{\log_4 25} = 2^{\log_2 5} = 5$$

Sređivanje drugog člana ($7^{1+\log_7(2/7)}$):

Primenom pravila za stepenovanje $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$, imamo:

$$7^{1+\log_7(2/7)} = 7^1 \cdot 7^{\log_7(2/7)}$$

Znamo da važi osnovni logaritamski identitet $a^{\log_a b} = b$, pa je $7^{\log_7(2/7)} = \frac{2}{7}$:

$$7 \cdot \frac{2}{7} = 2$$

Finalni račun:

Oduzimanjem dobijenih vrednosti dobijamo konačan rezultat:

$$I = 5 - 2 = 3$$


Tačan odgovor je pod **E**.

□

Zadatak 8. Ako tačke $A(1, 2)$ i $B(3, 4)$ pripadaju kružnici k , čiji centar C pripada pravoj $y = 2x - 4$, onda je obim trougla ABC jednak:

- (A) $4\sqrt{2}$ (B) $2(2 + \sqrt{2})$ (C) $2(1 + \sqrt{2})$ (D) 5 (E) 7

Rešenje: Pošto tačke A i B pripadaju kružnici, rastojanja od centra $C(x_C, y_C)$ do ovih tačaka moraju biti jednaka, jer predstavljaju poluprečnik kružnice ($CA = CB = R$).



Korak 1: Određivanje koordinata centra C

Pošto centar C pripada pravoj $y = 2x - 4$, njegove koordinate možemo zapisati preko jedne promenljive: $C(x, 2x - 4)$. Postavimo jednačinu $CA^2 = CB^2$ koristeći formulu za rastojanje između dve tačke:

$$(x - 1)^2 + (2x - 4 - 2)^2 = (x - 3)^2 + (2x - 4 - 4)^2$$

$$(x-1)^2 + (2x-6)^2 = (x-3)^2 + (2x-8)^2$$

$$x^2 - 2x + 1 + 4x^2 - 24x + 36 = x^2 - 6x + 9 + 4x^2 - 32x + 64$$

Skraćivanjem $5x^2$ sa obe strane i sređivanjem dobijamo:

$$-26x + 37 = -38x + 73$$

$$12x = 36 \implies x = 3$$

Vratimo koordinatu x da bismo našli y : $y = 2(3) - 4 = 2$. Centar je tačka $C(3, 2)$.

Korak 2: Izračunavanje stranica trougla ABC

Trougao ABC ima dve stranice koje su jednake poluprečniku R :

$$R = CA = \sqrt{(3-1)^2 + (2-2)^2} = \sqrt{2^2 + 0} = 2$$

Dakle, $CA = 2$ i $CB = 2$.

Treća stranica trougla je dužina tetive AB :

$$AB = \sqrt{(3-1)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Korak 3: Izračunavanje obima

Obim trougla ABC je zbir svih njegovih stranica:

$$O = CA + CB + AB = 2 + 2 + 2\sqrt{2} = 4 + 2\sqrt{2} = 2(2 + \sqrt{2})$$

Tačan odgovor je pod **B**. □

Zadatak 9. Najmanje realno rešenje jednačine

$$3 \cdot 4^{x+1} + 2 \cdot 9^{x+1} = 35 \cdot 6^x$$

pripada intervalu:

- (A) $[-3, -2)$ (B) $[-4, -3)$ (C) $[-5, -4)$ (D) $[-2, -1)$ (E) $[-1, 0)$

Rešenje: Rastavimo eksponente na sabirke i pojednostavimo strukturu jednačine:

$$3 \cdot 4^x \cdot 4^1 + 2 \cdot 9^x \cdot 9^1 = 35 \cdot 6^x$$

$$12 \cdot 4^x + 18 \cdot 9^x = 35 \cdot 6^x$$

Ovo je homogena eksponencijalna jednačina. Podelimo celu jednačinu sa 9^x (pošto je $9^x > 0$ za sve x):

$$12 \cdot \frac{4^x}{9^x} + 18 = 35 \cdot \frac{6^x}{9^x}$$

Primetimo da važi $\frac{4^x}{9^x} = \left(\frac{2}{3}\right)^{2x}$ i $\frac{6^x}{9^x} = \left(\frac{6}{9}\right)^x = \left(\frac{2}{3}\right)^x$. Jednačina postaje:

$$12 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} - 35 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^x + 18 = 0$$

Uvedimo smenu $\left(\frac{2}{3}\right)^x = t$ uz uslov $t > 0$:

$$12t^2 - 35t + 18 = 0$$

Rešimo dobijenu kvadratnu jednačinu po t :

$$t_{1,2} = \frac{35 \pm \sqrt{1225 - 4 \cdot 12 \cdot 18}}{24} = \frac{35 \pm \sqrt{1225 - 864}}{24} = \frac{35 \pm \sqrt{361}}{24} = \frac{35 \pm 19}{24}$$
$$t_1 = \frac{54}{24} = \frac{9}{4}, \quad t_2 = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}$$

Vratimo smenu da bismo našli nepoznatu x :

1. $\left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{9}{4} \implies \left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \implies \left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \implies x_1 = -2$
2. $\left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{2}{3} \implies x_2 = 1$

Najmanje realno rešenje je $x = -2$. Broj -2 pripada poluotvorenom intervalu $[-2, -1)$ jer je uključen na levoj ivici.

Tačan odgovor je pod **D**. □

Zadatak 10. Razlika d aritmetičke progresije $a_1, a_2, \dots$ je ceo broj, a zbir prvih deset članova te progresije jednak je 155. Količnik q geometrijske progresije $b_1, b_2, \dots$ je takođe ceo broj, a zbir prva dva člana te progresije jednak je 9. Ako je $a_1 = q$ i $b_1 = d$, onda b_4 iznosi:

- (A) 24 (B) 96 (C) 48 (D) 54 (E) 64

Rešenje: Postavimo sisteme jednačina za obe progresije koristeći uslove zadatka.

Korak 1: Analiza aritmetičke progresije

Formula za zbir prvih n članova aritmetičkog niza je $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$. Za $S_{10} = 155$:

$$\frac{10}{2}(2a_1 + 9d) = 155 \implies 5(2a_1 + 9d) = 155 \implies 2a_1 + 9d = 31$$

Korak 2: Analiza geometrijske progresije

Zbir prva dva člana geometrijskog niza je $b_1 + b_2 = 9$. Pošto je $b_2 = b_1 \cdot q$, imamo:

$$b_1 + b_1q = 9 \implies b_1(1 + q) = 9$$

Korak 3: Metoda zamene i rešavanje po celim brojevima

Uvrstimo veze $a_1 = q$ i $b_1 = d$ u naše dve ključne jednačine: 1) $2q + 9d = 31 \implies 2q = 31 - 9d \implies q = \frac{31-9d}{2}$ 2) $d(1 + q) = 9$

Uvrstimo izraz za q u drugu jednačinu:

$$d \left(1 + \frac{31 - 9d}{2} \right) = 9 \implies d \left(\frac{2 + 31 - 9d}{2} \right) = 9$$

$$d(33 - 9d) = 18 \implies 33d - 9d^2 = 18$$

Podelimo celu kvadratnu jednačinu sa -3 i prebacimo sve na levu stranu:

$$3d^2 - 11d + 6 = 0$$

Rešenja po d su:

$$d_{1,2} = \frac{11 \pm \sqrt{121 - 4 \cdot 3 \cdot 6}}{6} = \frac{11 \pm \sqrt{121 - 72}}{6} = \frac{11 \pm \sqrt{49}}{6} = \frac{11 \pm 7}{6}$$

$$d_1 = \frac{18}{6} = 3, \quad d_2 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Pošto je u tekstu rečeno da je razlika d **ceo broj**, rešenje $d = \frac{2}{3}$ odbacujemo. Dakle, sigurno je $d = 3$.

Odavde direktno dobijamo ostale početne članove niza:

- $b_1 = d = 3$
- $q = \frac{31-9(3)}{2} = \frac{31-27}{2} = 2$ (što je takođe ceo broj, kako je i zahtevano).

Korak 4: Izračunavanje člana b_4

Četvrti član geometrijskog niza računa se po formuli $b_4 = b_1 \cdot q^3$:

$$b_4 = 3 \cdot 2^3 = 3 \cdot 8 = 24$$

Tačan odgovor je pod **A**.

□

Zadatak 11. Proizvod svih realnih rešenja jednačine

$$\sqrt{2x+8} - \sqrt{x+2} = 2$$

jednak je:

- (A) -28 (B) -4 (C) 28 (D) -14 (E) 14

Rešenje: Najpre moramo postaviti uslove definisanosti korena pod kojima jednačina ima smisla:

$$2x + 8 \geq 0 \implies x \geq -4$$