
THÈME 6 : CONDUITE SOUS INFLUENCE 🍷🚫

📖 COURS THÉORIQUE

6.1 ALCOOL AU VOLANT

A. Taux d'alcoolémie légaux

Au Cameroun et dans la plupart des pays :

Conducteurs confirmés :

- **0,5 g/L de sang** (0,25 mg/L d'air expiré)
- Équivalent : environ 2 verres standards

Jeunes conducteurs (permis < 2 ans) :

- **0,2 g/L de sang** (0,10 mg/L d'air expiré)
- Équivalent : pratiquement zéro - moins d'1 verre

Conducteurs professionnels (bus, taxi, poids lourds) :

- Souvent **0,2 g/L** également
- Tolérance zéro dans certains pays

ATTENTION : 1 verre suffit souvent à

dépasser 0,5 g/L ! **B. Qu'est-ce qu'un "verre**

standard" ?

Tous ces verres contiennent la même quantité d'alcool pur (≈10g) :

- 🍺 25 cL de bière (5°)
- 🍷 10 cL de vin (12°)
- 3 cL d'alcool fort (whisky, vodka, rhum à 40°)
- 🍸 8 cL d'apéritif (porto, martini à 18°)
- 🍹 25 cL de cocktail (variable selon recette)

IDÉE REÇUE : "La bière, c'est moins d'alcool" **FAUX !** Un demi de bière = un verre de vin = un shot de whisky

□

C. Élimination de l'alcool

Vitesse d'élimination : 0,15 g/L par heure en moyenne

Exemples :

- 0,5 g/L → 3-4 heures pour éliminer
- 1,0 g/L → 6-7 heures pour éliminer
- 1,5 g/L → 10 heures pour éliminer **RIEN n'accélère l'élimination**

:

- ✗ Café
- ✗ Eau
- ✗ Douche froide
- ✗ Vomir
- ✗ Faire du sport
- ✓ SEULE solution : ATTENDRE

Calcul approximatif : Nombre de verres $\times$ 0,2 g/L = taux d'alcoolémie estimé
(Pour un homme de 70kg à jeun)

Exemple : 3 verres $\rightarrow 3 \times 0,2 = 0,6$ g/L (AU-DESSUS de la limite !)

D. Effets de l'alcool sur la conduite

Dès 0,2 g/L (1 verre) :

- ⚠ Champ visuel rétréci
- ⚠ Perception des distances faussée
- ⚠ Réflexes ralentis

À 0,5 g/L (2 verres) - LIMITE LÉGALE :

- ⚠ Risque d'accident **multiplié par 2**
- ⚠ Euphorie, sous-estimation du danger
- ⚠ Temps de réaction +30%

À 0,8 g/L (4 verres) :

- ⚠ Risque d'accident **multiplié par 10**
- ⚠ Vision trouble
- ⚠ Manque de coordination
- ⚠ Somnolence

À 1,5 g/L et plus :

□

- ● Risque d'accident **multiplié par 30**
- ● État d'ivresse manifeste
- ● Incapacité de conduire
- ● Coma éthylique possible

E. Contrôle d'alcoolémie

Éthylotest (test d'haleine) :

- Contrôle de dépistage
- Résultat indicatif
- Si positif → test sanguin ou éthylomètre **Éthylomètre (appareil**

électronique) :

- Mesure précise dans l'air expiré
- Valeur légale
- Utilisé par la police **Prise de sang :**
- Mesure la plus précise □ Laboratoire
- Valeur légale maximale

Refus de se soumettre au test :

- = Reconnaissance de culpabilité
 - Sanctions identiques à alcoolémie positive
-
- Sanctions supplémentaires

F. Sanctions

Taux entre 0,5 et 0,8 g/L :

- Amende importante
- Retrait de points (3-6 points selon pays)
- Suspension du permis (3-6 mois)

Taux supérieur à 0,8 g/L :

- Délit pénal
- Amende très lourde
- Retrait de points (6 points)
- Suspension/annulation du permis (plusieurs années)
- Immobilisation du véhicule
- Possibilité de prison **Récidive :**
- Doublement des peines
- Annulation définitive du permis possible
- Confiscation du véhicule

□

Accident avec alcool :

- Responsabilité pénale aggravée
- Peines de prison fermes
- Assurance peut refuser de rembourser

6.2 DROGUES ET STUPÉFIANTS

TOLÉRANCE ZÉRO !

Substances concernées :

- Cannabis (marijuana, haschich)
- Cocaïne
- Héroïne
- Amphétamines
- Ecstasy
- Toutes drogues illicites

Effets sur la conduite :

- ⊗ Ralentissement des réflexes
- ⊗ Hallucinations possibles
- ⊗ Perte de concentration
- ⊗ Troubles de la perception
- ⊗ Somnolence ou hyperactivité
- ⊗ Prise de risques inconsidérée

Détection :

- Test salivaire
- Test urinaire
- Prise de sang

Sanctions :

- Identiques ou supérieures à l'alcool
- 2 ans de prison □ 4500€ d'amende
- Retrait de 6 points
- Suspension du permis 3 ans
- Obligation de soins **Alcool + Drogue :**
- Risque multiplié par 14
- Sanctions cumulées
- Très dangereux

6.3 MÉDICAMENTS

Certains médicaments altèrent la conduite !

□

Niveaux de risque (pictogrammes sur les boîtes) :

Niveau 1 (triangle jaune) :

- "Soyez prudent"
- Lire la notice

Niveau 2 (triangle orange) :

- "Soyez très prudent"
- Ne pas conduire sans avis médical

Niveau 3 (triangle rouge) :

- "ATTENTION : Danger"
- Ne pas conduire
- Trouver un autre moyen de transport

Médicaments à risque :

- Somnifères
- Tranquillisants, anxiolytiques
- Antidépresseurs
- Certains antidouleurs (morphine)
- Médicaments contre les allergies
- Collyres (vision trouble)

Règle : TOUJOURS lire la notice et demander au médecin/pharmacien

6.4 FATIGUE ET SOMNOLENCE

La fatigue tue autant que l'alcool !

Signes de fatigue au volant :

- Bâillements répétés
- Paupières lourdes
- Difficulté à fixer la route
- Raideur de nuque
- Difficulté à maintenir l'allure
- Franchissement de ligne involontaire
- Oubli des derniers kilomètres

Conséquences :

- Temps de réaction multiplié par 2
- Micro-sommeils (3-4 secondes)
- À 130 km/h, 4 secondes = 145 mètres à l'aveugle !



Prévention :

- Pause de 15-20 minutes toutes les 2 heures
- Dormir si fatigué (20 min de sieste = efficace)
- Ne PAS conduire de nuit si possible
- Partager la conduite
- Éviter de conduire entre 2h-5h et 13h-15h (pics de somnolence)

NE FONCTIONNE PAS :

- ✗ Café (effet temporaire de 30 min max)
- ✗ Radio forte
- ✗ Fenêtre ouverte
- ✗ Boissons énergisantes (effet court)
- ✓ SEULE solution : S'ARRÊTER ET DORMIR

? QUESTIONS D'ENTRAÎNEMENT - THÈME 6

NIVEAU FACILE ★

Question 1: Quel est le taux d'alcoolémie maximum autorisé pour un conducteur confirmé ?

A) 0,2 g/L B) 0,5 g/L C) 0,8 g/L D) 1,0 g/L

Réponse : B) 0,5 g/L Explication : 0,5 g/L de sang pour conducteurs confirmés. 0,2 g/L pour jeunes conducteurs et professionnels.

Question 2: Combien de temps faut-il pour éliminer l'alcool du sang ? A) 30 minutes B) 1 heure par verre C) 0,15 g/L par heure D) Immédiatement avec du café

Réponse : C) 0,15 g/L par heure Explication : Élimination fixe : 0,15 g/L/heure. Rien n'accélère ce processus (ni café, ni eau, ni douche froide).

Question 3: Pour les drogues au volant, la tolérance est de : A) 0,5 g B) 0,2 g C) 1 g D) Zéro (tolérance zéro)

Réponse : D) Zéro (tolérance zéro) Explication : Toute trace de drogue = infraction. Pas de seuil toléré. Sanctions très sévères.

□

Question 4: Un triangle rouge sur une boîte de médicaments signifie : A) Médicament cher
B) Attention, ne pas conduire C) Périmé D) Ordonnance obligatoire

Réponse : B) Attention, ne pas conduire Explication : Niveau 3 = triangle rouge = NE PAS CONDUIRE. Danger maximum. Trouver un autre transport.

Question 5: À 0,5 g/L d'alcool, le risque d'accident est multiplié par : A) 1 (pas d'augmentation) B) 2 C) 5 D) 10

Réponse : B) 2 Explication : Dès la limite légale (0,5g/L), risque déjà doublé. À 0,8g/L = $\times 10$. À 1,5g/L = $\times 30$!

NIVEAU MOYEN ★ ★

Question 6: Vous buvez 3 verres de vin. Votre taux d'alcoolémie approximatif est de : A) 0,2 g/L B) 0,4 g/L C) 0,6 g/L D) 1,0 g/L

Réponse : C) 0,6 g/L Explication : Règle approximative : nombre de verres $\times$ 0,2 = taux. $3 \times 0,2 = 0,6$ g/L $\rightarrow$ AU-DESSUS de la limite légale !

Question 7: Qu'est-ce qui accélère l'élimination de l'alcool ? A) Boire beaucoup d'eau B) Prendre une douche froide C) Boire du café D) Rien, seul le temps élimine l'alcool

Réponse : D) Rien, seul le temps élimine l'alcool Explication : Aucun truc ne fonctionne. Le foie élimine à vitesse fixe : 0,15g/L par heure. Seule solution : attendre.

Question 8: Un micro-sommeil dure environ : A) 1 seconde B) 3-4 secondes C) 10 secondes D) 1 minute

Réponse : B) 3-4 secondes Explication : Micro-sommeil = 3-4 sec. À 130 km/h = 145 mètres parcourus les yeux fermés ! Mortel.

Question 9: Quel est le taux d'alcoolémie pour un jeune conducteur (permis < 2 ans) ? A) 0,5 g/L (comme tout le monde) B) 0,8 g/L C) 0,2 g/L D) 1,0 g/L

Réponse : C) 0,2 g/L Explication : Jeunes conducteurs : 0,2 g/L = pratiquement zéro alcool. Moins d'un verre suffit à dépasser.

Question 10: Cannabis + Alcool = A) Les effets s'annulent B) Risque multiplié par 14 C) Pas plus dangereux qu'un seul D) Moins dangereux

Réponse : B) Risque multiplié par 14 *Explication : Combinaison alcool + drogue = effets décuplés. Risque d'accident multiplié par 14. Extrêmement dangereux.*

NIVEAU DIFFICILE ☆ ☆ ☆

Question 11: Vous avez 1,2 g/L d'alcoolémie. Combien de temps avant de redescendre sous 0,5 g/L ? A) 2 heures B) 4 heures C) 5 heures D) 8 heures

Réponse : C) 5 heures *Explication : $1,2 - 0,5 = 0,7$ g/L à éliminer. $0,7 \div 0,15$ par heure = 4,7 heures $\approx$ 5 heures d'attente.*

Question 12: Refuser de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie entraîne : A) Simple amende
B) Sanctions identiques à alcoolémie positive C) Aucune sanction D) Juste un avertissement

Réponse : B) Sanctions identiques à alcoolémie positive *Explication : Refus = présomption de culpabilité. Mêmes sanctions qu'une alcoolémie $> 0,8$ g/L + sanctions supplémentaires.*

Question 13: Un verre de bière (25cL à 5°) contient autant d'alcool qu'un : A) Demi-verre de vin B) Verre de vin (10cL à 12°) C) Deux verres de whisky D) Rien, la bière contient moins d'alcool

Réponse : B) Verre de vin (10cL à 12°) *Explication : Tous les "verres standard" contiennent 10g d'alcool pur : 25cL bière = 10cL vin = 3cL whisky.*

Question 14: En cas d'accident mortel avec alcoolémie positive, vous risquez : A) Simple amende B) Suspension de permis C) Prison ferme + retrait définitif du permis D) Rien si vous êtes assuré

Réponse : C) Prison ferme + retrait définitif du permis *Explication : Homicide involontaire + alcool = crime. Prison ferme (plusieurs années), permis retiré définitivement, casier judiciaire.*

□

Question 15: Quelle est la meilleure solution contre la fatigue au volant ? A) Café et radio forte B) Boisson énergisante C) Fenêtre ouverte D) S'arrêter et faire une sieste de 20 minutes

Réponse : D) S'arrêter et faire une sieste de 20 minutes *Explication : Seul le sommeil fonctionne. Café/radio/fenêtre = illusion de vigilance. Sieste de 15-20 min = très efficace.*