

## **CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PUNTOS GATILLO MIOFASCIALES (PGM) MEDIANTE TÉCNICAS INVASIVAS (PUNCIÓN SECA)**

Esta documentación ha sido elaborada conforme a las previsiones contenidas en la Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de Abril, la Ley andaluza de Salud 2/1998 de 15 de Junio y la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, reguladora de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, artículos 8, 9 y 10.

Es conveniente que lea este documento con atención y formule las preguntas que crea convenientes para entender el procedimiento para el cual le pedimos su consentimiento para el tratamiento de

---

El propósito de esta información no es alarmarle ni liberar de responsabilidad al Fisioterapeuta que le atiende. Se le proporciona para que usted, a partir de dicho conocimiento, pueda tomar la decisión libre y voluntaria de autorizar o rechazar este procedimiento.

### **¿Qué es un punto gatillo miofascial (PGM)?**

Un punto gatillo miofascial es un punto altamente irritable de dolor en un nódulo dentro de una banda tensa palpable de músculo esquelético. Es doloroso a la presión y cuando es estimulado puede provocar dolor referido (siempre siguiendo un mismo patrón para el mismo punto gatillo) y restricción del movimiento, así como sudoración y otros fenómenos autonómicos.

### **¿En que consiste el tratamiento de los PGM mediante técnicas invasivas (punción seca)?**

Consiste en la introducción de una aguja de acupuntura en el punto gatillo realizando varios abordajes sobre este sin llegar a extraer la aguja en la mayoría de los casos.

Normalmente se establece una pauta de una sesión semanal hasta un máximo de 6 sesiones. Si tras la tercera sesión no se observa mejoría, se suspendería el tratamiento y se establecerían como alternativas al mismo pautas de fisioterapia de tipo conservador (descritas más adelante)

Esta técnica debe ser realizada por fisioterapeutas formados específicamente para aplicarla con total garantía y deben disponer de la titulación que lo acredite.

### **Alternativas al tratamiento mediante Punción Seca:**

Existen técnicas de fisioterapia no invasiva tales como estiramientos, masajes, presión...dirigidas al tratamiento de los PGM, y usted podrá elegir las en lugar de la técnica invasiva que aquí se describe.

### **Objetivo de la técnica de Punción Seca:**

Fundamentalmente se persigue disminuir el dolor provocado por la existencia de PGM y otros problemas derivados de los mismos, como la limitación del movimiento y la presencia de fenómenos autonómicos.

### **Efectos secundarios o complicaciones derivados de la técnica:**

- ✓ Complicaciones (todas ellas reversibles): espasmo muscular o dolor postpunción momentáneo. Suelen desaparecer tras unas horas.
- ✓ Mareos durante la punción en personas muy sensibles.
- ✓ Miedo insuperable a las agujas que imposibilitan la aplicación de la técnica.
- ✓ Efectos secundarios como dermatitis por contacto, hematomas, espasmo muscular, infección... aunque son poco frecuentes. Para evitar infecciones, se aconseja dejar transcurrir 24 horas tras el tratamiento para bañarse en una piscina o baños públicos.
- ✓ Los peligros de la técnica son limitados, la probabilidad de que se produzcan es escasa y resultan en su mayoría evitables si se toman las medidas de precaución pertinentes: neumotórax (tratamiento músculos del tórax), mioedema, hemorragia, síncope vaso-vagal y lesión nerviosa.
- ✓ En este último caso debe avisar al fisioterapeuta si se produce una sensación eléctrica desagradable para que pueda modificar la zona de introducción de la aguja y así evitar la lesión nerviosa.

### **Riesgos derivados del estado de salud previo del paciente:**

- ✓ En las alergias a los metales, especialmente al níquel, no se podrán utilizar las agujas de acupuntura habituales.
- ✓ Pacientes con tratamiento con anticoagulantes son más propensos a sufrir hemorragias.
- ✓ Pacientes inmunodeprimidos o con linfadenectomías son más propensos a sufrir infecciones.
- ✓ Pacientes con hipotiroidismo pueden sufrir de edemas en el músculo tratado.
- ✓ Debe evitarse la punción seca en zonas de la piel que presenten algún tipo de herida o cicatriz, así como en enfermedades dérmicas como psoriasis o infecciones. También en tatuajes.
- ✓ Se evitará la punción profunda en mujeres embarazadas, especialmente durante los tres primeros meses del embarazo, y después de este período siempre y cuando la zona a tratar pueda afectar al feto.
- ✓ Se aconseja no realizar el tratamiento en pacientes con dolor crónico generalizado, como en el caso de la fibromialgia, si anteriormente ya se había utilizado la técnica sin obtener beneficios.

**Si usted se encuentra en alguna de estas circunstancias, comuníquelo a su fisioterapeuta.**

Paciente: D/Dña \_\_\_\_\_ con DNI \_\_\_\_\_

He leído la información relativa en cuanto al consentimiento informado, he sido informado de los riesgos del tratamiento, me han explicado las posibles alternativas y que en cualquier momento puedo revocar dicho consentimiento.

Estoy satisfecho con la información recibida, he podido plantear todas las preguntas que he creído convenientes y se me han aclarado las dudas planteadas.

En consecuencia de lo cual, doy mi consentimiento

En \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_