

1. Verifiche di limiti

Limite finito in un punto

Sia f una funzione definita in un intorno I del punto x_0 , escluso al più il punto x_0 .

Si dice che l è il **limite** della funzione nel punto x_0 e si indica

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

se, fissato comunque un numero $\varepsilon > 0$, è possibile determinare in corrispondenza di esso un numero $\delta_\varepsilon > 0$ tale che, per ogni $x \in I$ e verificante la condizione

$$0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon$$

risulti

$$|f(x) - l| < \varepsilon$$

cioè

$$l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$$

La condizione

$$0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon \quad \text{equivale a} \quad x_0 - \delta_\varepsilon < x < x_0 + \delta_\varepsilon \quad \text{con } x \neq x_0.$$

Esempi

Verificare i seguenti limiti:

$$1) \lim_{x \rightarrow -3} (2x - 1) = -7$$

Dobbiamo verificare che $\forall \varepsilon > 0$ la disequazione

$$|2x - 1 - (-7)| < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad |2x + 6| < \varepsilon$$

è soddisfatta in un intorno di -3 .

Svolgendo i calcoli risulta:

$$|2x + 6| < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad -\varepsilon < 2x + 6 < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad -6 - \varepsilon < 2x < -6 + \varepsilon$$

e quindi

$$-3 - \frac{\varepsilon}{2} < x < -3 + \frac{\varepsilon}{2}$$

Il limite è verificato perché, $\forall \varepsilon > 0$, abbiamo determinato un intorno di -3 , di

raggio $\delta_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2}$ dipendente da ε , per ogni x del quale risulta

$$|2x - 1 - (-7)| < \varepsilon.$$

$$2) \lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 4) = 3$$

Occorre verificare che $\forall \epsilon > 0$ la disequazione

$$|x^3 + 4 - 3| < \epsilon$$

è verificata in un intorno I di -1. Si ha:

$$\begin{aligned} -\epsilon &< x^3 + 1 < \epsilon \\ \Rightarrow -1 - \epsilon &< x^3 < -1 + \epsilon \Rightarrow \\ \sqrt[3]{-1 - \epsilon} &< x < \sqrt[3]{-1 + \epsilon} \end{aligned}$$

che costituisce un intorno di -1

$$3) \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + x) = 6$$

Occorre verificare che $\forall \epsilon > 0$ la disequazione


$$|x^2 + x - 6| < \epsilon$$

è verificata in un intorno I di 2. Si ha:

$$-\epsilon < x^2 + x - 6 < \epsilon$$

Equivalente, per $0 < \epsilon < \frac{25}{4}$, a

$$\begin{cases} x^2 + x - 6 < \epsilon \\ x^2 + x - 6 > -\epsilon \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{-1 - \sqrt{25 + 4\epsilon}}{2} < x < \frac{-1 + \sqrt{25 + 4\epsilon}}{2} \\ x < \frac{-1 - \sqrt{25 - 4\epsilon}}{2} \vee x > \frac{-1 + \sqrt{25 - 4\epsilon}}{2} \end{cases} \Rightarrow$$



$$\frac{-1 - \sqrt{25 + 4\epsilon}}{2} < x < \frac{-1 - \sqrt{25 - 4\epsilon}}{2} \quad \text{oppure} \quad \boxed{\frac{-1 + \sqrt{25 - 4\epsilon}}{2} < x < \frac{-1 + \sqrt{25 + 4\epsilon}}{2}}$$

Si osserva che l'intervallo $\frac{-1 + \sqrt{25 - 4\epsilon}}{2} < x < \frac{-1 + \sqrt{25 + 4\epsilon}}{2}$ individua un intorno di 2, mentre l'altro intervallo $\frac{-1 - \sqrt{25 + 4\epsilon}}{2} < x < \frac{-1 - \sqrt{25 - 4\epsilon}}{2}$ è un intorno di -3, pertanto risulta anche

$$\lim_{x \rightarrow -3} (x^2 + x) = 6$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 8} \sqrt{x+1} = 3$$

$\forall \varepsilon > 0$ verifichiamo che la disequazione

$$|\sqrt{x+1} - 3| < \varepsilon$$

cioè

$$3 - \varepsilon < \sqrt{x+1} < 3 + \varepsilon.$$

è soddisfatta in un intorno di 8.

Per $x \geq -1$, supposto $0 < \varepsilon < 3$, la disequaglianza precedente equivale a

$$(3 - \varepsilon)^2 < x + 1 < (3 + \varepsilon)^2$$

Da cui

$$(3 - \varepsilon)^2 - 1 < x < (3 + \varepsilon)^2 - 1$$

valori che costituiscono un intorno di 8.

Limite infinito in un punto

Sia f una funzione definita in un intorno I del punto x_0 , escluso al più il punto x_0 .

Si dice che:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \quad (-\infty)$$

se, fissato comunque un numero $M > 0$, è possibile determinare in corrispondenza di esso un numero $\delta_M > 0$ tale che, per ogni $x \in I$ verificante la condizione

$$0 < |x - x_0| < \delta_M$$

risulti:

$$f(x) > M \quad (f(x) < -M)$$

Esempi

Verificare i seguenti limiti:

$$1) \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty$$

Occorre dimostrare che $\forall M > 0$ la disequazione

$$\frac{1}{x-2} > M$$

è verificata in un intorno destro di 2, escluso il valore $x=2$.

Infatti si ha per $x > 2$

$$\frac{1}{x-2} > M \Rightarrow 0 < x - 2 < \frac{1}{M} \Rightarrow$$

$$2 < x < 2 + \frac{1}{M}$$

cioè un intorno destro di 2.

$$2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(3-x)^2} = +\infty$$

$\forall M > 0$ verifichiamo che la disequazione

$$\frac{1}{(3-x)^2} > M$$

è soddisfatta in un intorno di 3, escluso il punto 3.

Posto $x \neq 3$, si ha

$$(3-x)^2 < \frac{1}{M}$$

e quindi le soluzioni

$$3 - \frac{1}{\sqrt{M}} < x < 3 + \frac{1}{\sqrt{M}}, \quad x \neq 3$$

che costituiscono un intorno di 3.

$$3) \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{x+3}{x-4} = -\infty$$

Occorre dimostrare che $\forall M > 0$ la disequazione

$$\frac{x+3}{x-4} < -M$$

è verificata in un intorno sinistro di 4, escluso il valore $x=4$.

Infatti risulta per $x < 4$

$$\begin{aligned} \frac{x+3}{x-4} < -M &\Rightarrow \frac{4M-3}{M+1} < x < 4 \Rightarrow \\ &4 - \frac{7}{M+1} < x < 4 \end{aligned}$$

cioè in un intorno sinistro di 4.

$$4) \lim_{x \rightarrow 2^+} \log_2(x-2) = -\infty$$

$\forall M > 0$ verifichiamo che la disequazione

$$\log_2(x-2) < -M$$

è soddisfatta in un intorno destro di 2.

Si ha:

$$0 < x - 2 < 2^{-M}$$

da cui le soluzioni

$$2 < x < 2 + 2^{-M}$$

che costituiscono un intorno destro di 2.

Limite finito all'infinito

Sia f una funzione definita in un insieme E illimitato superiormente (illimitato inferiormente).
Si dice che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \quad (\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l)$$

se, fissato comunque un numero $\varepsilon > 0$, è possibile determinare in corrispondenza di esso un numero k_ε tale che per ogni $x \in E$ e maggiore (minore) di k_ε ,
risulti

$$|f(x) - l| < \varepsilon$$

Esempi

Verificare i seguenti limiti:

$$1) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+2}{3x} = \frac{1}{3}$$

$\forall \varepsilon > 0$ risolviamo la disequazione

$$\left| \frac{x+2}{3x} - \frac{1}{3} \right| < \varepsilon$$

Si ha successivamente

$$\left| \frac{2}{3x} \right| < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{3x}{2} \right| > \frac{1}{\varepsilon} \quad \Rightarrow \quad |x| > \frac{2}{3\varepsilon} \quad \Rightarrow \quad x < -\frac{2}{3\varepsilon} \vee x > \frac{2}{3\varepsilon}$$

Il limite risulta verificato poiché le soluzioni $x < -\frac{2}{3\varepsilon}$ costituiscono un intorno di $-\infty$.

La disequazione è verificata anche per i valori $x > \frac{2}{3\varepsilon}$ che costituiscono un intorno di $+\infty$, infatti
risulta anche $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+2}{3x} = \frac{1}{3}$, in definitiva risulta

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+2}{3x} = \frac{1}{3}.$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x+1}{x} = 4$$

Risolviemo $\forall \varepsilon > 0$ la disequazione

$$\left| \frac{4x+1}{x} - 4 \right| < \varepsilon$$

Risulta

$$\frac{1}{|x|} < \varepsilon \Rightarrow |x| > \frac{1}{\varepsilon}$$

Da cui

$$x < -\frac{1}{\varepsilon} \vee x > \frac{1}{\varepsilon}$$

dove le soluzioni $x < -\frac{1}{\varepsilon}$ costituiscono un intorno di $-\infty$ e le soluzioni $x > \frac{1}{\varepsilon}$ un intorno di $+\infty$.

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{-x^2+1} = 0$$

$\forall \varepsilon > 0$ risolviamo la disequazione

$$|2^{-x^2+1}| < \varepsilon$$

che, essendo $0 < 2^{-x^2+1} \quad \forall x$, equivale a

$$2^{-x^2+1} < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad -x^2 + 1 < \log_2 \varepsilon \quad \Rightarrow \quad x^2 > 1 - \log_2 \varepsilon$$

Posto $0 < \varepsilon < 1 \Rightarrow \log_2 \varepsilon < 0 \Rightarrow 1 - \log_2 \varepsilon > 0$, quindi la disequazione è verificata per

$$x < -\sqrt{1 - \log_2 \varepsilon} \vee x > \sqrt{1 - \log_2 \varepsilon}$$

Le seconde soluzioni costituiscono un intorno di $+\infty$, le prime un intorno di $-\infty$, infatti risulta anche $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^{-x^2+1} = 0$, cioè

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-x^2+1} = 0.$$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - e^{x+2}) = 1$$

Per $\forall \varepsilon > 0$

$$|1 - e^{x+2} - 1| < \varepsilon \Rightarrow e^{x+2} < \varepsilon \Rightarrow x + 2 < \log \varepsilon$$

da cui

$$x < -2 + \log \varepsilon$$

Si osserva che $\forall \varepsilon > 0$ la disequaglianza $x < -2 + \log \varepsilon$ definisce un intorno di $-\infty$.

Limite infinito all'infinito

Sia f una funzione definita in un insieme E illimitato superiormente (illimitato inferiormente).
Si dice che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad (\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty)$$

se, fissato comunque un numero $M > 0$, è possibile determinare in corrispondenza di esso un numero $k_M > 0$ tale che, per ogni $x \in I$ verificante la condizione $x > k_M$ ($x < k_M$), risulti

$$f(x) > M$$

Sia f una funzione definita in un insieme E illimitato superiormente (illimitato inferiormente).
Si dice che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \quad (\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty)$$

se, fissato comunque un numero $M > 0$, è possibile determinare in corrispondenza di esso un numero $k_M > 0$ tale che, per ogni $x \in I$ verificante la condizione $x > k_M$ ($x < k_M$), risulti

$$f(x) < M$$

Esempi

Verificare i seguenti limiti:

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log(2x - 5) = +\infty$

$\forall M > 0$ risolviamo la disequazione

$$\log(2x - 5) > M$$

Si ha

$$2x - 5 > e^M$$

soddisfatta per

$$x > \frac{5}{2} + \frac{1}{2}e^M$$

Si osserva che questi valori di x costituiscono un intorno di $+\infty$.

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \log(2x + 3) = +\infty$$

Si ha che $\forall M > 0$

$$\log(2x + 3) > M \Rightarrow 2x + 3 > e^M \Rightarrow x > \frac{e^M - 3}{2}$$

Si osserva che questi valori di x costituiscono un intorno di $+\infty$.

$$3) \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x+4} = +\infty$$

$\forall M > 0$ risolviamo la disequazione

$$e^{-x+4} > M$$

da cui

$$-x + 4 > \log M$$

le cui soluzioni sono

$$x < 4 - \log M$$

che costituiscono un intorno di $-\infty$.

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - e^{-x}) = -\infty$$

Si ha che $\forall M > 0$

$$(1 - e^{-x}) < -M \Rightarrow e^{-x} > M + 1 \Rightarrow -x > \log(M + 1)$$

Da cui

$$x < -\log(M + 1)$$

Si osserva che questi valori di x costituiscono un intorno di $-\infty$.

Esercizi

Verificare i seguenti limiti:

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} (3x - 4) = -1 \quad 2) \lim_{x \rightarrow -2} (-x^3 - 5) = 3 \quad 3) \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 4x + 2) = 2$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty \quad 5) \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{3x}{x+1} = -\infty \quad 6) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{3x} = \frac{2}{3}$$

$$7) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) = 0 \quad 8) \lim_{x \rightarrow -\infty} \log(2 - x) = +\infty \quad 9) \lim_{x \rightarrow +\infty} (4 - e^{3x}) = -\infty$$