

ජෛව විද්‍යාත්මක ඛඩ ඉරිඟු වගාව



ඉහළ ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක
අස්වැන්නක් සඳහා උපදෙස් පත්‍රිකාව


සමූහ ලංකා

සරු පසක විප්ලවය



☎ 0114 294 868 ☎ 0707 189 189

biogen

බයෝජෙන් ජීවගතික් (පුද්ගලික) සමාගම

ජෛව විද්‍යාත්මක ඛඩ ඉරිඟු වගාව

(සියලුම ජෛව විද්‍යාත්මක යෙදවුම් අක්කරයක් සඳහා වේ)

පස සකස් කිරීමේ අවධිය	රයිසොසාර ජෛව පොස්පේට්	සකසා ගත් පස මතුපිට රයිසොසාර ජෛව පොස්පේට් 20kg මලු 2ක් අක්කරයක් පුරා විසුරුවා හරින්න.
	රයිසොරියර් ජෛව ඝන පොහොර	සකසා ගත් පස මතුපිට රයිසොරියර් ජෛව ඝන පොහොර 40kg මලු 6ක් අක්කරයක් පුරා විසුරුවා හරින්න.
	රයිසෝන් W (සුදු මුඩිය සහිත)	රයිසෝන් W (සුදු මුඩිය සහිත) ලීටර 4 කෑන් එකක් 1:30 අනුපාතයට ජලය මිශ්‍ර කර සකස් කර ගත් පාත්ති මත ඉසින්න.
වර්ධක අවධිය	රයිසෝන් G (කොළ මුඩිය සහිත)	රයිසෝන් G (කොළ මුඩිය සහිත) ලීටර 4 කෑන් 3ක් 1:30 අනුපාතයට ජලය මිශ්‍ර කර අවස්ථා 3ක දී වගාවට ඉසින්න. 1 වෙනි අවස්ථාව : පැළ සිටුවා දින 10ක් ලීටර 4 කෑන් 1යි 2 වෙනි අවස්ථාව : පැළ සිටුවා දින 20 - 25ත් අතර ලීටර 4 කෑන් 1යි 3 වෙනි අවස්ථාව : පැළ සිටුවා දින 35 - 40ත් අතර ලීටර 4 කෑන් 1යි
	රයිසෝඩින් J සුපර් (කෘමි විකර්ෂකය)	රයිසෝඩින් J සුපර් (කෘමි විකර්ෂකය) ලීටර 4 කෑන් එකක්, 1:20 අනුපාතයට ජලය මිශ්‍ර කර පැළ සිටුවා දින 20 දී වගාවට ඉසින්න.
පිළිමි අවධිය	රයිසෝන් Y (කහ මුඩිය සහිත)	රයිසෝන් Y (කහ මුඩිය සහිත) ලීටර 4 කෑන් 2ක්, 1:30 අනුපාතයට ජලය මිශ්‍ර කර පැළ සිටුවා දින 45-60 අතර කාලයේ දී දෙවරක් වගාවට ඉසින්න.
	රයිසෝඩින් J සුපර් (කෘමි විකර්ෂකය)	රයිසෝඩින් J සුපර් (කෘමි විකර්ෂකය) ලීටර 4 කෑන් 1ක්, 1:20 අනුපාතයට ජලය මිශ්‍ර කර පැළ සිටුවා දින 45-60 අතර කාලයේ දී වගාවට ඉසින්න.

- ඕනෑම අවස්ථාවක පළිබෝධ හානියක් සඳහා රයිසෝඩින් J සුපර් (කෘමි විකර්ෂකය) 1:20 අනුපාතයට ජලය මිශ්‍ර කර වගාව පුරා ඉසින්න
- ඉහත සියලුම යෙදවුම් නිරූ වළිය නොමැති දිනක හෝ දිනයේ සවස් කාලයේ දී වගාවට යෙදීම අත්‍යවශ්‍ය වේ
- සියලුම යෙදවුම් 100% ස්වාභාවික හා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත වේ
- ඉහළ ප්‍රතිඵල සඳහා ජෛව ඩීප් ප්‍රතිකාරකය ඛඩ ඉරිඟු ඩීප් සඳහා යොදාගන්න
- වැඩිදුර උපදෙස් සඳහා ඩයෝපෙන් සමාගමේ ඔබ ප්‍රදේශයට අදාළ සම්බන්ධීකාරක මහතා අමතන්න

*උපරිම අස්වැන්නක් සඳහා ඉහත නිර්දේශිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ යුතුය.
 *මිල ගණන් 2022 යලි කන්නය සඳහා පමණක් නිර්දේශිතයි.