

Chapitre 3 : Convergence de Variables aléatoires

MA 361 : Probabilités continues

Pierre-Alain TOUPANCE
pierre-alain.toupance@esisar.grenoble-inp.fr

Grenoble INP - ESISAR
3^{ème} année

14 septembre 2015

Inégalité de Bienaymé - Tchébychev

Soit X une variable aléatoire réelle admettant une espérance $E(X)$ et une variance $V(X)$.

On a

$$\forall \varepsilon > 0, P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$$

Remarque :

- 1 Cette inégalité permet de majorer la probabilité que X soit éloigné d'au moins ε de $E(X)$.
- 2 Cette probabilité est d'autant plus faible que $V(X)$ est petit.

Démonstration : 1er cas X VAR discrète

Soit $(x_i, p_i)_{i \in I}$ la loi de probabilité de X où

$I = \{1, 2, \dots, n\}$ ou \mathbb{N} Soit $J = \{i \in I, |x_i - E(X)| \geq \varepsilon\}$

On a :

$$V(X) = \sum_{i \in J} (x_i - E(X))^2 p_i + \sum_{i \notin J} (x_i - E(X))^2 p_i$$

Ainsi

$$V(X) \geq \sum_{i \in J} (x_i - E(X))^2 p_i \geq \varepsilon^2 \sum_{i \in J} p_i$$

D'où

$$V(X) \geq \varepsilon^2 P(|X - E(X)| \geq \varepsilon)$$

Démonstration : 2ième cas X VAR continue dont f est une densité.

Soit $\forall x \in \mathbb{R}$, $h(x) = (x - E(X))^2 f(x)$, on a

$$V(X) =$$

Ainsi

$$V(X) \geq \int_{-\infty}^{E(X)-\varepsilon} h(x)dx + \int_{E(X)+\varepsilon}^{+\infty} h(x)dx$$

D'où

$$V(X) \geq \varepsilon^2 \left(\int_{-\infty}^{E(X)-\varepsilon} f(x)dx + \int_{E(X)+\varepsilon}^{+\infty} f(x)dx \right)$$

Or

$$P(|X - E(X)| > \varepsilon) = P(X - E(X) < -\varepsilon) + P(X - E(X) > \varepsilon)$$

$$= \int_{-\infty}^{E(X)-\varepsilon} f(x)dx + \int_{E(X)+\varepsilon}^{+\infty} f(x)dx$$

Démonstration : 2ième cas X VAR continue dont f est une densité.

Soit $\forall x \in \mathbb{R}$, $h(x) = (x - E(X))^2 f(x)$, on a

$$V(X) = \int_{-\infty}^{E(X)-\varepsilon} h(x)dx + \int_{E(X)-\varepsilon}^{E(X)+\varepsilon} h(x)dx + \int_{E(X)+\varepsilon}^{+\infty} h(x)dx$$

Ainsi

$$V(X) \geq \int_{-\infty}^{E(X)-\varepsilon} h(x)dx + \int_{E(X)+\varepsilon}^{+\infty} h(x)dx$$

D'où

$$V(X) \geq \varepsilon^2 \left(\int_{-\infty}^{E(X)-\varepsilon} f(x)dx + \int_{E(X)+\varepsilon}^{+\infty} f(x)dx \right)$$

Or

$$P(|X - E(X)| > \varepsilon) = P(X - E(X) < -\varepsilon) + P(X - E(X) > \varepsilon)$$

$$= \int_{-\infty}^{E(X)-\varepsilon} f(x)dx + \int_{E(X)+\varepsilon}^{+\infty} f(x)dx$$

Exercice

Soit F la fonction de répartition d'une VAR X qui suit une loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

Montrer que :

$$\forall x > 0, 1 - F(x) \leq \frac{1}{2x^2}$$

Définition : moyenne empirique

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et Soit $(X_i)_{i \in \llbracket 0;n \rrbracket}$ une suite de variables aléatoires réelles de même loi indépendantes.

La moyenne empirique de $(X_i)_{i \in \llbracket 1;n \rrbracket}$ est la VA :

$$\tilde{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Remarques : Si les VA X_i admettent des moments d'ordre 2 alors

❶ $E(\tilde{X}_n) = m$

❷ $V(\tilde{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$

où $m = E(X_i)$ et $\sigma^2 = V(X_i)$

Définition : convergence presque sûrement

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de VA sur Ω , on dit que (X_n) converge presque sûrement vers une VAR X lorsque :

$$P(\{\omega \in \Omega, \lim X_n(\omega) = X(\omega)\}) = 1$$

Remarque : La partie de Ω où X_n ne converge pas vers X est de probabilité nulle.

Loi faible des grands nombres

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et Soit $(X_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires réelles de même loi admettant des moments d'ordre 2.

Soit m l'espérance de ces variables aléatoires.

On a :

$$\forall \varepsilon > 0, \lim P(|\tilde{X}_n - m| \geq \varepsilon) = 0$$

Démonstration : D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchébychev, on a :

$$P(|\tilde{X}_n - m| \geq \varepsilon) = P(|\tilde{X}_n - E(\tilde{X}_n)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(\tilde{X}_n)}{\varepsilon^2}$$

$$P(|\tilde{X}_n - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

$$\text{Ainsi } \lim P(|\tilde{X}_n - m| \geq \varepsilon) = 0$$

Loi forte des grands nombres (théorème de Kolmogorov)

On considère n variables aléatoires X_1, X_2, \dots, X_n de même loi d'espérance m .

$$\text{Soit } \tilde{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

On a

$$\tilde{X}_n \rightarrow m \times 1_\Omega \text{ presque sûrement}$$

Lorsque que l'on répète n fois de façon indépendante une même expérience, la moyenne obtenue par l'expérience tend vers la moyenne théorique quand n tend vers ∞ .

Méthode de Monte Carlo appliquée au calcul d'intégrale

Application de la loi forte des grands nombres

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$,
et soit A un réel tel que $A > \sup_{x \in [a; b]} (f(x))$.

On utilise la loi forte des grands nombres pour calculer
 $\int_a^b f(t)dt$:

Si on prend un point au hasard dans le rectangle délimité par
les droites d'équation $x = a$, $x = b$, $y = 0$ et $y = A$, la
probabilité qu'il soit sous la courbe de f est :

$$p = \frac{\int_a^b f(t)dt}{A(b-a)}$$

Méthode de Monte-Carlo

On choisit au hasard n points soit X_i la VA telle que

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si la } i\text{ème point est sous } \mathcal{C}_f \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\text{On a } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \rightarrow p 1_{\Omega}$$

Définition : convergence en loi

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de VAR et X une VAR définies sur le même espace probabilisé (Ω, \mathcal{A}, P) .

Soient $(F_{X_n})_{n \in \mathbb{N}}$ et F_X leur fonction de répartition.

On dit que X_n tend en loi vers X si et seulement si :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \lim F_{X_n}(t) = F_X(t)$$

Remarque : Dans le cas discret, cette convergence en loi se traduit par la convergence des probabilités $P(X_n = k)$.

Approximation d'un loi Binomiale par un loi de Poisson

Théorème

Soit $\lambda \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit X_n une suite de V.A.R. de loi binomiale $\mathcal{B}(n, \frac{\lambda}{n})$. X_n converge en loi vers une V.A.R. X de loi de Poisson de paramètre λ , c'est à dire :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k) = P(X = k)$$

En pratique Si X suit une loi binomiale de paramètre (n, p) .
Si $n \geq 30$, $p \leq 0,1$ et $np < 15$
alors on prendra comme approximation de X la V.A.R. Y qui suit un loi de Poisson de paramètre np ($Y \rightsquigarrow \mathcal{P}(np)$).

Soit $k \in \mathbb{N}^*$, pour tout $n \geq k$,

$$\begin{aligned} P(X_n = k) &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \quad \text{Or} \\ &= \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k} \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k} &= 1 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = e^{-\lambda}. \end{aligned}$$

Ainsi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Théorème central limite

Soit (X_n) une suite de VAR indépendantes de même loi, d'espérance m et d'écart type σ .

Soit

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k$$

$Z_n = \frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}}$ converge en loi vers une VAR $X^* \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1)$,
c'est à dire :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(a \leq Z_n \leq b) = \int_a^b \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$

Remarque : $\frac{\tilde{X}_n - m}{\sigma/\sqrt{n}}$ tend en loi vers une loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$.

Ainsi \tilde{X}_n tend en loi vers une VAR qui suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma/\sqrt{n})$.

Exemple : Théorème de Moivre Laplace

Soit (X_n) une suite de VAR indépendantes et de loi de Bernoulli de paramètre p .

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k \rightsquigarrow \mathcal{B}(n, p)$$

$$Z_n = \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

converge en loi vers $X^* \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, 1)$.

En pratique, la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ peut être approchée par un loi normale $\mathcal{N}(np, \sqrt{np(1-p)})$ lorsque :

- ❶ $n \geq 30$
- ❷ $np \geq 15$
- ❸ $np(1-p) \geq 5$

Exercice

Un vol Lyon - Strasbourg est assuré par un airbus de 140 places. La réservation est obligatoire. L'expérience a montré que la probabilité qu'une personne confirme sa réservation et retire son billet est 0,8.

On note X la variable aléatoire représentant le nombre de personnes ayant confirmé leur réservation et retiré leur billet.

- ❶ La compagnie a accepté 160 réservations.
 - ❶ Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire X ?
Pour $k \leq 160$, exprimer $P(X = k)$ en fonction de k .
Déterminer l'espérance mathématique et l'écart type de X .
 - ❷ Justifier que X peut être approchée par une loi normale que l'on déterminera.
Calculer la probabilité que plus de 135 personnes confirment leur réservation et retirent leur billet.