جزوه مادر آناتومی · نسخه ۱ — با مقابله ۱۲ صفحه جزوه ۱۴۰۲

جلسه اول · آناتومی

اوربیت: از حفره استخوانی تا کره چشم

آناتومی حواس ویژه

اوربیت: تعریف، جایگاه در جمجمه و سه وظیفه اصلی

شکل هرمی، رأس و قاعده، لبه و استخوان‌های سازنده آن

چهار جدار و منطق استحکام نامتقارن (خارجی محکم، کف و داخلی سست)

دو محور: اوربیتال و بینایی؛ فاصله ۲٫۵ سانتی‌متر و زاویه ۴۵ درجه

شکاف‌ها، سوراخ‌ها و شش راه ارتباطی اوربیت با نواحی مجاور

بافت همبند: پری‌اوربیتا، سپتوم، کپسول تنون و چربی اوربیت

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی): «جلسه ۱ حواس ویژه مهر ۱۶ — 1404.pdf» — ۱۶ صفحه، دکتر میرزایی — منبع پایه

جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱): «حواس ویژه 01 بهمن ۱۲ — 1402.pdf» — ۱۲ صفحه — منبع مکمل

پاورپوینت‌های کلاس: «Blood supply and nerves to the eye.pdf» و «final ear.pdf» — برای شکل‌های تکمیلی

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۴
اوربیت، شکل هرمی، لبه و چهار جدار؛ منطق استحکام

خوشه ۲ - مباحث ۵ تا ۸
دو محور، سوراخ‌ها و شیارها، ارتباط‌های اوربیت

خوشه ۳ - مباحث ۹ تا ۱۱
شکستگی‌ها، حلقه زین و عناصر عبوری، بافت همبند

خوشه ۴ - مباحث ۱۲ تا ۱۵
تنون و لیگامان‌ها، چربی، کره چشم و ضمائم

۱۵	۵۸	۱۷	۲
مبحث	صفحه	شکل	منبع اصلی

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

— است کار تقسیم مستقل واحد یک مبحث هر دارد: را مادر جزوه‌های قالب همان و است ویژه حواس آناتومی مجموعه از دفتر نخستین جزوه این بازنویسی میرزایی) (دکتر ۱۴۰۴ جزوه به وفاداری با درس متن تحویل. برگه و یادداشت منبع‌دار، افزوده کادر شکل، یا جدول درس، متن شناسنامه، شده و هر افزوده بیرونی جداگانه علامت خورده است.

۱. متن درس

رونویسی و بازنویسی وفادار به جزوه ۱۴۰۴ آناتومی (جلسه ۱) با حفظ تعریف، عدد، مثال و استثنا. ترتیب پایه همان ترتیب جزوه است.

۲. افزوده توضیحی

هر جا سازوکار یا ارتباط بالینی نیاز به توضیح بیشتر داشت، در کادر جدا آمده و منبع آن (فایل و صفحه) ذیل همان کادر ذکر شده است.

۳. شکل و جدول

هفده شکل از خود جزوه‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۲ استخراج شده و در جای مرتبط با متن آمده‌اند؛ زیر هر شکل راهنمای خواندن است.

۴. قاعده ارجاع

«۱۴۰۴ ص...» یعنی فایل «جلسه ۱ حواس ویژه مهر 1404.pdf» و «۱۴۰۲ ص...» یعنی فایل «حواس ویژه 01 بهمن 1402.pdf»؛ شماره صفحه در هر دو، شماره صفحه همان فایل است.

۵. واحد مبحث

هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث در مسیر درس، هدف یادگیری، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای اختصاصی خواندن.

۶. کادر اختلاف یا ابهام

جایی که دو جزوه در نام یک ساختار یا در دامنه یک عدد اختلاف داشتند، عبارت هر دو حفظ و در کادر کهربایی ثبت شده است.

۷. کادر یادداشت

در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس در نظر گرفته شده است.

۸. برگه تحویل

اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط، برای پیگیری کار هر عضو تیم.

۹. واحدها و اعداد

واحدها به شکل اصلی منبع (سانتی‌متر، درجه) و اعداد فارسی؛ نام اصطلاح‌های آناتومیک به لاتین مانده‌اند.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست

خلاصه جایگزین متن درس، «نکته امتحانی» بدون شاهد، و تکرار مباحث عضلات و حرکات چشم که در جلسه دوم می‌آید.

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. شماره صفحه «صفحه فایل» است، نه صفحه چاپی. نکته مهم این جلسه: دو منبع، دو دامنه متفاوت دارند — جزوه ۱۴۰۴ عمیقا روی اوربیت و بافت همبند آن می‌ایستد (استخوان‌ها، جدارها، محورها، سوراخ‌ها، شکستگی‌ها، فاسیا و چربی)، در حالی که جزوه ۱۴۰۲ ساختار خود کره چشم (سه لایه، اتاقک‌ها، عدسی، زجاجیه) و ضمائم (پلک، ملتحمه، دستگاه اشکی) را جلو می‌برد. به همین دلیل مباحث ۱۴ و ۱۵ این جزوه از ۱۴۰۲ ساخته شده‌اند و این موضوع در شناسنامه همان مباحث صریح آمده است. نقشه کامل مقابله ۱۲ صفحه ۱۴۰۲ در پیوست پایان جزوه است.

فهرست

خوشه ۱ — استخوان‌شناسی اوربیت — مباحث ۱–۴

مبحث ۱ — یک حفره استخوانی، سه وظیفه روشن ۶

مبحث ۲ — هرمی که قاعده‌اش به سمت صورت است ۸

مبحث ۳ — چهار دیوار با چهار درجه استحکام ۱۱

مبحث ۴ — چرا خارجی زره‌پوش است و کف کاغذی ۱۴

خوشه ۲ — محورها، سوراخ‌ها و ارتباط‌ها — مباحث ۵–۸

مبحث ۵ — ۴۵ درجه، ۲٫۵ سانتی‌متر و ۲۲ تا ۲۳ درجه ۱۶

مبحث ۶ — قرقره، غده اشکی و ناودان اشکی ۱۹

مبحث ۷ — از شکاف تحتانی تا تکمه ویتنال ۲۲

مبحث ۸ — شش در اوربیت به دنیای بیرون ۲۵

خوشه ۳ — شکستگی، عناصر عبوری و بافت همبند — مباحث ۹–۱۱

مبحث ۹ — وقتی لبه سالم می‌ماند و کف می‌شکند ۲۸

مبحث ۱۰ — چه چیزی از کدام در می‌گذرد ۳۱

مبحث ۱۱ — پری‌اوربیتا، سپتوم و دو زائده ۳۴

خوشه ۴ — تنون، چربی، کره چشم و ضمائم + پیوست — مباحث ۱۲–۱۵، خلاصه استاد، پیوست، آزمون و چک‌لیست

مبحث ۱۲ — پیراهنی که چشم در آن می‌چرخد ۳۷

مبحث ۱۳ — بالشتک، تثبیت‌کننده و ترازوی موقعیت چشم ۴۰

مبحث ۱۴ — از صلبیه تا شبکیه (افزوده ۱۴۰۲) ۴۳

مبحث ۱۵ — پلک، ملتحمه، مژه و دستگاه اشکی (افزوده ۱۴۰۲) ۴۶

خلاصه جلسه در دو جدول ۴۹

پیوست — مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۲ صفحه) ۵۰

آزمون چندگزینه‌ای پایان جلسه (۱۵ پرسش) ۵۲

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۵۴

آغاز جلسه اول · آناتومی

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر میرزایی · درس: آناتومی حواس ویژه · جلسه ۱: اوربیت و کره چشم

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)	جلسه ۱ حواس ویژه مهر ۱۶ — 1404.pdf صفحه	منبع پایه اوربیت، جدارها، سوراخ‌ها و فاسیا	همه ۱۶ صفحه بررسی و بازنویسی شد
جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱)	حواس ویژه 01 بهمن ۱۲ — 1402.pdf صفحه	منبع مکمل کره چشم و ضمائم	۱۲ صفحه؛ مقابله بندبه‌بند (نقشه در پیوست پایان جزوه)
پاورپوینت چشم	Blood supply and nerves to the eye.pdf — ۱۹ اسلاید	شکل‌های عروق و اعصاب چشم	صفحه‌های ارجاع‌شده در متن
پاورپوینت گوش	final ear.pdf — ۲۶ اسلاید	ذخیره جلسه‌های بعد؛ در این جلد فقط ارجاع	—

ویژگی این جلسه، تقسیم کار طبیعی بین دو منبع است: ۱۴۰۴ یک درس عمقی و تک‌موضوعی درباره اوربیت است و ۱۴۰۲ مروری سریع‌تر بر کل چشم. هیچ‌کدام جای دیگری را حذف نمی‌کند؛ در پیوست، ۱۲ صفحه ۱۴۰۲ به ۱۵ مبحث این جزوه نقشه شده است تا معلوم باشد کدام بند از کدام صفحه آمده است.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین فایل PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد؛ با کلیک روی عنوان به همان مبحث می‌روید. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه درس را جدا می‌کنند.

برای مرور سریع: جدول‌های جمع‌بندی هر خوشه را بخوانید.

برای تقسیم کار تیم: هر مبحث یک «برگه تحویل» در پایان خود دارد.

برای پیوند با جلسه دوم: مبحث ۱۰ همین جزوه، پیش‌نیاز بحث عضلات و حرکات چشم است.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

پنج عددی که کل جلسه روی آن‌ها می‌چرخد

اول، ۲٫۵ سانتی‌متر: فاصله دو جدار داخلی از هم. دوم، ۴۵ درجه: زاویه بین جدار داخلی و خارجی، و هم‌زمان زاویه بین دو محور اوربیتال. سوم، ۲۲ تا ۲۳ درجه: انحراف محور اوربیتال از خط قدامی-خلفی کره چشم (همان دلیلی که ورود جراحی مستقیم به جلو نیست). چهارم، شش: تعداد مسیرهای ارتباطی اوربیت با نواحی مجاور. پنجم، ۲٫۵ و ۲٫۴ سانتی‌متر: قطر افقی و عمودی کره چشم.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۵ و ۷؛ جزوه ۱۴۰۲، ص ۲.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

و چشم «کره و همبند» بافت و «شکستگی سوراخ‌ها»، و «محورها اوربیت»، «استخوان‌شناسی آمده‌اند: خوشه چهار در جلسه این مبحث ۱۵ ضمائم». مباحث ۳ و ۴ یک زوج‌اند (چهار جدار و منطق استحکامشان) و مباحث ۱۱ تا ۱۳ زنجیره فاسیا تا چربی را می‌سازند.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	اوربیت در یک نگاه: تعریف، جایگاه، سه وظیفه	—	
۲	شکل هرمی، رأس و قاعده، لبه و استخوان‌های لبه	مبحث ۱	
۳	چهار جدار اوربیت و استخوان‌های هر یک	مباحث ۱ و ۲	
۴	چرا کف و جدار داخلی سست‌اند: منطق دفاعی	مبحث ۳	
۵	فاصله، زاویه و دو محور (اوربیتال و بینایی)	مبحث ۳	
۶	سوراخ‌ها و شیارهای سقف و جدار داخلی	مبحث ۳	
۷	کف و جدار خارجی: شکاف‌ها، تکمه ویتنال	مباحث ۳ و ۶	
۸	کانال بینایی و شش ارتباط اوربیت با نواحی مجاور	مباحث ۳، ۶ و ۷	
۹	شکستگی‌های اوربیت و عوارض آن‌ها	مباحث ۳ و ۴	
۱۰	حلقه زین و عناصر عبوری از شکاف‌ها	مباحث ۷ و ۸	
۱۱	بافت همبند اوربیت: پری‌اوربیتا و سپتوم	مبحث ۳	
۱۲	کپسول تنون، لیگامان‌های کنترل‌کننده و لاکوود	مبحث ۱۱	
۱۳	چربی اوربیت: وظایف، محل و اگزوفتالموس	مباحث ۱۱ و ۱۲	
۱۴	کره چشم در سه لایه (افزوده ۱۴۰۲)	مبحث ۱	
۱۵	ضمائم چشم: پلک، ملتحمه، مژه و دستگاه اشکی (افزوده ۱۴۰۲)	مباحث ۲ و ۱۴	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۱۵ مبحث

مبحث ۱ · اوربیت در یک نگاه

یک حفره استخوانی، سه وظیفه روشن

مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — یک حفره استخوانی، سه وظیفه روشن — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	درآمد کل جلسه؛ پیش‌نیاز همه مباحث بعدی.
هدف این مبحث	تعریف دقیق اوربیت، جایگاه آن در جمجمه و سه وظیفه اصلی، با تفکیک «حفره» از «کره چشم».
پیش‌نیاز واقعی	—
راهنمای اختصاصی خواندن	سه وظیفه را با یک جمله کوتاه حفظ کنید: حفاظت، چسبندگی عضلات، و تثبیت محور بینایی؛ متن درس همه مباحث بعد را روی همین سه وظیفه می‌چیند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱.

یا orbit نام به استخوانی حفره‌ای در چشم کره است. آن به مربوط عناصر همه و چشم شامل نیست؛ چشم کره فقط بینایی سیستم سوکت یک بینی، ریشه طرف دو در و گرفته جای حفره این درون که است مغز از استطاله‌ای واقع در اوربیت می‌گیرد. قرار cavity skeletal برای چشم و بافت‌های مربوط به آن فراهم می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۲.

کردن فراهم دوم، می‌کند. محافظت آسیب برابر در آن ضمائم و چشم از اوربیت حفاظت: نخست، کرد. جدا هم از باید را اوربیت وظیفه سه بینایی محور تثبیت سوم، باشد. کنترل قابل چشم حرکات که به‌طوری چشم، کره گرفتن قرار دقیق جای و عضلات برای چسبندگی محل (visual access) در جای خود؛ یعنی همان وظیفه‌ای که بدون آن، دو چشم نمی‌توانند روی یک نقطه مشترک تنظیم شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۲.

جدول ۱ — سه وظیفه اوربیت

وظیفه	چه چیزی را تأمین می‌کند	پیامد از دست رفتن
حفاظت	سپر استخوانی و ضربه‌گیر برای کره چشم و ضمائم	آسیب مستقیم چشم در ترومای صورت
محل چسبندگی و جای‌گیری	نقطه اتصال عضلات و ثبات موقعیت کره چشم	اختلال حرکات چشم و دوبینی
تثبیت محور بینایی	قرار گرفتن دقیق محور دید در جای خود	ناهم‌راستایی دو محور و اختلال دید دوچشمی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۲ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا «استطاله مغز» تعبیر دقیقی است

کره چشم و عصب بینایی از نظر تکاملی و پوششی، امتداد دستگاه عصبی مرکزی‌اند؛ به همین دلیل غلاف‌های عصب بینایی ادامه سخت‌شامه و عنکبوتیه‌اند و فضای زیر عنکبوتیه تا پشت کره چشم می‌آید. این نکته در مبحث ۱۱ دوباره به کار می‌آید، جایی که پری‌اوربیتا در عقب به سخت‌شامه ادامه می‌یابد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۲ و ۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – تعریف و سه وظیفه اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

اوربیت را در یک جمله تعریف کنید و سه وظیفه آن را با پیامد حذف هر یک بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · شکل و لبه

هرمی که قاعده‌اش به سمت صورت است

مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — هرمی که قاعده‌اش به سمت صورت است — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان تعریف اوربیت (مبحث ۱) و استخوان‌شناسی جدارها (مبحث ۳).
هدف این مبحث	شناخت شکل هرمی، جهت رأس و قاعده، و توانایی نام بردن استخوان‌های چهار لبه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	رأس همیشگی را به‌یاد بسپارید: عقب و داخل. لبه را هم با یک جمله: «سپر ضربه»، نه فقط مرز تشریحی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۲ـ۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱.

دارد؛ دایره و مربع بین شکلی قاعده خارج. و جلو در آن قاعده و دارد قرار داخل و عقب در هرم رأس است: چهاروجهی و هرمی تقریبا اوربیت یک مانند اوربیت ساختار می‌گوید: دیگری زبان با را شکل همین ۱۴۰۲ جزوه دارد. مربع حالت هم کمی است، دایره‌ای که حال همان در یعنی مخروط است که قاعده‌اش بخش جلویی حفره و رأسش در عمق و به سمت عقب است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۲؛ جزوه ۱۴۰۲، ص ۱.

خود به آسیب مانع که قوی‌اند لبه‌های همین می‌شود، وارد صورت به سنگین ضربه وقتی است. استوار و محکم بسیار حفره) (لبه اوربیت لبه لبه (maxillary)؛ بالا فک و پیشانی از داخلی لبه (frontal)؛ پیشانی استخوان از بالا لبه است: چنین لبه استخوانی ترکیب می‌شوند. چشم خارجی از پیشانی و استخوان گونه (zygomatic)؛ و لبه پایین از استخوان گونه و بخشی از فک بالا.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳.


به را اوربیت همین، و خارجی) و داخلی (بالا، دارد حضور لبه چهار از لبه سه در پیشانی استخوان این‌که نخست همین‌جا: در مهم نکته دو در که لبه‌ای همان — می‌شود ساخته بالا فک و گونه از و ندارد سهم آن در پیشانی که است لبه‌ای تنها پایین لبه این‌که دوم می‌زند؛ گره پیشانی ترومای صورت بیشترین شکایت زیبایی و حسی را می‌سازد.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳.

جدول ۲ — استخوان‌های چهار لبه اوربیت

لبه	استخوان‌ها	نکته
بالا	پیشانی (frontal)	محکم‌ترین و پیوسته‌ترین لبه
داخلی	پیشانی + فک بالا (maxillary)	هم‌جوار ریشه بینی و دستگاه اشکی
خارجی	پیشانی + گونه (zygomatic)	محل اتصال رباط پلکی طرفی و تکمه ویتنال
پایین	گونه + بخشی از فک بالا	تنها لبه‌ای که پیشانی در آن سهم ندارد

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳ (بازنویسی جدولی).



شکل ۱ — استخوان‌های سازنده اوربیت در نمای قدامی: پیشانی در سقف و لبه بالا، گونه در خارج، فک بالا در کف و داخلی، و اسفنوئید در عمق.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳.

اختلاف روایت: مخروط یا هرم

جزوه ۱۴۰۴ اوربیت را «تقریبا هرمی و چهاروجهی» می‌نامد و جزوه ۱۴۰۲ «مخروط». هر دو تعبیر به یک واقعیت اشاره دارند: حفره‌ای باریک‌شونده به سمت عقب. تفاوت فقط در زبان است؛ در این جزوه عبارت «هرمی/مخروطی» به‌جای هم به کار می‌رود، اما هر جا عدد یا نسبت مهم باشد، به همان منبع اصلی ارجاع داده شده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ ص ۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — شکل و لبه اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار لبه اوربیت را با استخوان‌هایشان بنویسید و بگویید کدام استخوان در سه لبه حضور دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · چهار جدار

چهار دیوار با چهار درجه استحکام

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — چهار دیوار با چهار درجه استحکام — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	هسته استخوان‌شناسی جلسه؛ پیش‌نیاز مباحث ۴ تا ۹.
هدف این مبحث	نام بردن استخوان‌های هر جدار و پیوند دادن استحکام هر جدار به محل ورود ضربه.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱ و ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	جدول جدارها را حفظ نکنید؛ از هر جدار دو چیز بخواهید: استخوان‌ها و درجه استحکام. بقیه جلسه از همین دو می‌آید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۳ـ۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱.

و شده ساخته اسفنوئید کوچک بال و پیشانی استخوان از فوقانی) (جدار سقف متفاوت‌اند. هم با استحکام نظر از که دارد جدار چهار اوربیت جسم از عقب قسمت در و اتموئید استخوان اوربیتال صفحه اشکی، استخوان بالا، فک پیشانی زائده از داخلی جدار است. محکم نسبتا اسفنوئید تشکیل می‌شود؛ این جدار بسیار سست و نازک است، به‌طوری که با فشار انگشت به‌راحتی می‌شکند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳.


اوربیتال زائده داخل، و عقب در و دارد سهم آن در گونه خارج و جلو در است؛ شده ساخته بالا فک اوربیتال سطح از بیشتر تحتانی) (جدار کف در و گونه استخوان پیشانی زائده اوربیتال سطح از قدامی قسمت در خارجی: جدار سرانجام است. سست هم جدار این کامی. استخوان قسمت خلفی از سطح قدامی بال بزرگ اسفنوئید ساخته می‌شود و ضخیم‌ترین و محکم‌ترین دیواره اوربیت است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴.

جدول ۳ — چهار جدار اوربیت

جدار	استخوان‌ها	استحکام	تروما
فوقانی (سقف)	پیشانی + بال کوچک اسفنوئید	نسبتا محکم	کمتر دچار شکست؛ هم‌جوار سینوس فرونتال
داخلی	زائده پیشانی فک بالا، اشکی، صفحه اوربیتال اتموئید، جسم اسفنوئید	بسیار نازک و سست	شکست با فشار انگشت؛ لامینا پاپیراسه
تحتانی (کف)	سطح اوربیتال فک بالا، گونه (جلو و خارج)، زائده اوربیتال کامی (عقب و داخل)	سست	شکست و فتق محتوا به سینوس ماکزیالری
خارجی	زائده پیشانی گونه (قدامی) + بال بزرگ اسفنوئید (خلفی)	ضخیم‌ترین و محکم‌ترین	سپر اصلی در برابر ترومای طرفی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳ـ۴ (بازنویسی جدولی).



شکل ۲ – جدار خارجی اوربیت به‌صورت بازشده: سهم زائده پیشانی استخوان گونه در جلو و بال بزرگ اسفنوئید در عقب دیده می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴ (شکل ۱۰).

افزوده بالینی: کدام جدار در تصویربرداری گول می‌زند

در شکایت «ضربه به چشم» بدون شکستگی لبه، بیشترین احتمال، شکست کف یا جدار داخلی است؛ چون این دو جدار نازک‌اند و لبه سالم می‌ماند. پس اگر رادیوگرافی ساده لبه را سالم نشان داد، هنوز نمی‌توان شکستگی اوربیت را رد کرد و بررسی با مقطع (CT) لازم است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۴ و ۷ـ۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — چهار جدار اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

برای هر جدار، استخوان‌ها و درجه استحکام را در یک خط بنویسید و محکم‌ترین و سست‌ترین را علامت بزنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · منطق استحکام

چرا خارجی زره‌پوش است و کف کاغذی

مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — چرا خارجی زره‌پوش است و کف کاغذی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تفسیر مهندسی همان جدول مبحث ۳؛ پیش‌نیاز فهم مکانیسم شکستگی (مبحث ۹).
هدف این مبحث	فهم این‌که تفاوت استحکام جدارها یک طراحی دفاعی است، نه نقص آناتومیک.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	جمله کلیدی: «جدار قوی جای ضربه است، جدار ضعیف جای تخلیه فشار». اگر این را بفهمید، شکستگی کف را هم می‌فهمید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۴.

است. ضربه ورود جهت در پاسخ سست‌اند؟ عمدتا داخلی جدار و کف ولی است محکم بسیار خارجی جدار چرا همین‌جاست: کلاسی پرسش بیشتر ترومای صورت از سطح خارجی به اوربیت وارد می‌شود؛ پس جدار خارجی باید سپر باشد و به همین دلیل بسیار محکم است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴.

— است سست خیلی که — داخلی جدار بیاورد، فشار و شود جابه‌جا داخل سمت به چشم کره که باشد شدید آن‌قدر ضربه اگر دیگر، طرف از ماکزیالری سینوس سقف کف، ترومای در است: سست دلیل همین به هم اوربیت کف نشود. له و پرس دیواره دو بین چشم کره تا می‌شکند می‌شکند و کره چشم بدون این‌که فشاری به آن وارد شود وارد سینوس ماکزیالری می‌شود. این یک مکانیسم دفاعی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴.

جدول ۴ — منطق دفاعی استحکام جدارها

جدار	جهت شایع ضربه	رفتار طراحی‌شده	پیامد بالینی
خارجی	طرفی (از سمت گونه)	مقاومت و انتقال نیرو	لبه و جدار خارجی سالم می‌مانند
داخلی	از سمت بینی یا فشار کره چشم به داخل	شکستن کنترل‌شده	تخلیه فشار؛ آسیب اتموئید و دوبینی
تحتانی (کف)	از جلو به بالا	شکستن به درون سینوس ماکزیالری	فتق محتوا؛ enophthalmos
فوقانی	از بالا	تقریبا مقاوم	درگیری سینوس فرونتال در موارد شدید

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: یک اصل مشترک در استخوان‌های صورت

همین منطق در سایر سینوس‌های صورت هم دیده می‌شود: استخوان نازک، «فیوز مکانیکی» محافظت از ساختار ارزشمندتر است. اما هزینه دارد؛ همان نازکی، راه انتشار عفونت هم هست (مبحث ۸). پس «دفاعی بودن» به معنای بی‌خطر بودن نیست.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۴ و ۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — منطق استحکام جدارها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توضیح دهید چرا شکستن کف اوربیت را «مکانیسم دفاعی» می‌نامیم و چه بهایی دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · فاصله و دو محور

۴۵ درجه، ۲٫۵ سانتی‌متر و ۲۲ تا ۲۳ درجه

مبحث ۵

شناسنامه مبحث ۵ — ۴۵ درجه، ۲٫۵ سانتی‌متر و ۲۲ تا ۲۳ درجه — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان استخوان‌شناسی (مبحث ۳) و ورود عملی به اوربیت؛ پیش‌نیاز بحث معاینه و جراحی.
هدف این مبحث	تفکیک محور اوربیتال از محور بینایی و فهم پیامد بالینی انحراف ۲۲ تا ۲۳ درجه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو محور را با یک تصویر ذهنی جدا کنید: محور اوربیتال «ته حفره» را نشان می‌دهد، محور بینایی «ته نگاه». اولی ۴۵ درجه واگراست، دومی موازی.


منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲.

محور است. درجه ۴۵ خارجی و داخلی جدار بین زاویه موازی‌اند؛ هم با تقریبا و دارند فاصله هم از سانتی‌متر ۲٫۵ طرف دو در داخلی جدارهای درجه ۴۵ مقابل طرف اوربیتال محور با اوربیتال محور هر می‌شود؛ کشیده اوربیت دهانه مرکز به اوربیت رأس از که است فرضی خطی اوربیتال زاویه می‌سازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵.

معاینه یا جراحی هنگام دلیل همین به دارد؛ زاویه درجه ۲۳ تا ۲۲ چشم کره قدامی-خلفی خط به نسبت اوربیتال محور هر مهم: عملی نکته — visual) (axis بینایی محور مقابل، در دارد. جهت خارج سمت به درجه ۲۳ حدود بلکه نیست، جلو به مستقیم کاملا ورود مسیر اوربیت، برخلاف محور اوربیتال — در دو چشم با هم موازی است، چون جهت نگاه هر دو چشم به یک شیء مشترک است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۲.



شکل ۳ — دو محور در یک نگاه: فاصله ۲٫۵ سانتی‌متری جدارهای داخلی، زاویه ۴۵ درجه جدارها، و تفاوت محور اوربیتال (واگرا) با محور بینایی (موازی).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵ (شکل ۱۲).

جدول ۵ — دو محور اوربیت

ویژگی	محور اوربیتال	محور بینایی
تعریف	از رأس اوربیت به مرکز دهانه اوربیت	از چشم تا صفحه بینایی در مغز
رابطه دو طرف	۴۵ درجه با محور طرف مقابل	موازی با محور طرف مقابل
رابطه با خط قدامی-خلفی چشم	۲۲ تا ۲۳ درجه انحراف	هم‌راستا در حالت نگاه به دور
کاربرد بالینی	مسیر ورود در معاینه و جراحی اوربیت	تنظیم نگاه مشترک و دید دوچشمی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: چرا این ۲۳ درجه در اتاق معاینه مهم است

وقتی برای بررسی دید محیطی یا جاگذاری وسیله در مدار اوربیت، مسیر را «مستقیم به جلو» فرض کنید، در واقع از محور بینایی منحرف می‌شوید؛ جهت درست، حدود ۲۳ درجه به سمت خارج است. همین عدد توضیح می‌دهد چرا در تصویربرداری و جراحی، زاویه برش و مسیر ابزار بر پایه محور اوربیتال و نه محور بینایی تنظیم می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ — محورها و زاویه‌ها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

محور اوربیتال و محور بینایی را تعریف کنید و بگویید چرا محور بینایی دو چشم موازی است ولی محورهای اوربیتال نه.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · سقف و جدار داخلی

قرقره، غده اشکی و ناودان اشکی

مبحث ۶

شناسنامه مبحث ۶ — قرقره، غده اشکی و ناودان اشکی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین گام از «ویژگی‌ها، شیارها و سوراخ‌های داخل اوربیت»؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۱ (فاسیای اشکی).
هدف این مبحث	شناخت چهار نشانه استخوانی سقف و جدار داخلی و پیوند هر نشانه با یک ساختار نرم.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	هر سوراخ را با «چه چیزی از آن رد می‌شود» یاد بگیرید، نه با اسم لاتین تنها؛ اسم‌ها بعدا جا می‌افتند.


منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۵ـ۶.

قرقره اتصال محل که دارد قرار (trochlear fossa) فوسا تروکلئار داخلی، و قدامی قسمت در داریم. مهم حفره دو (سقف) فوقانی جدار در دو همین است. اشکی غده جایگاه (lacrimal fossa) اشکی حفره خارجی، و قدامی قسمت در است. فوقانی مایل عضله تاندون (trochlea) حفره، سقف را از یک صفحه استخوانی ساده به یک سطح با دو ایستگاه عملکردی تبدیل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵.

هم به داخلی و فوقانی جدار که همان‌جا یعنی دارند؛ قرار فرونتواتموئیدال درز محل در خلفی و قدامی اتموئیدال سوراخ‌های داخلی، جدار در استخوان فرونتال زائده اشکی ستیغ به‌وسیله جلو از که دارد قرار (lacrimal groove) اشکی ناودان داخلی، جدار قدام در همچنین می‌رسند. بینی-اشکی مجرای طریق از ناودان و همین‌جاست اشکی کیسه جایگاه می‌شود؛ محدود اشکی استخوان ستیغ به‌وسیله خلف از و ماکزیال (nasolacrimal duct) به میاتوس تحتانی بینی باز می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵ـ۶.



شکل ۴ — جدار داخلی اوربیت: سوراخ‌های اتموئیدال قدامی و خلفی در درز فرونتواتموئیدال، حفره اشکی و مسیر مجرای بینی-اشکی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵ (شکل ۱۵).

جدول ۶ — چهار نشانه استخوانی سقف و جدار داخلی

نشانه	جایگاه	ساختار مرتبط
تروکلئار فوسا	سقف، قدامی و داخلی	قرقره تاندون عضله مایل فوقانی
حفره اشکی	سقف، قدامی و خارجی	غده اشکی
سوراخ‌های اتموئیدال	درز فرونتواتموئیدال (تلاقی سقف و جدار داخلی)	اعصاب و عروق اتموئیدال قدامی و خلفی
ناودان اشکی	قدام جدار داخلی	کیسه اشکی؛ ادامه به مجرای بینی-اشکی و میاتوس تحتانی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۵ـ۶ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: قرقره نقطه عوض شدن نیرو است

تاندون مایل فوقانی از رأس اوربیت می‌آید، از قرقره می‌گذرد و سپس به سمت بالا و عقب می‌چرخد؛ قرقره مثل یک قرقره مکانیکی، جهت نیرو را عوض می‌کند. آسیب یا کندگی آن، الگوی حرکتی چشم را در محور عمودی تغییر می‌دهد. در مبحث بعدی همین منطق را در تکمه ویتنال می‌بینیم.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — سوراخ‌های سقف و جدار داخلی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار نشانه این مبحث را با ساختار نرم مربوط به هر یک بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · کف و جدار خارجی

از شکاف تحتانی تا تکمه ویتنال

مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — از شکاف تحتانی تا تکمه ویتنال یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تکمیل نقشه استخوانی؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۰ (عناصر عبوری).
هدف این مبحث	شناخت نشانه‌های کف و جدار خارجی و فهم این‌که چرا تکمه ویتنال یک «چهارراه لیگامانی» است.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۳ و ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار ساختار متصل به تکمه ویتنال را فهرست‌وار حفظ کنید؛ در سؤال‌های تشریحی پرتکرار است.


منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۶.

از اوربیت دارد؛ قرار اسفنوئید بزرگ بال و ماکزیال استخوان اوربیتال سطح بین orbital (inferior fissure) تحتانی چشمی کاسه شکاف کف، در جلو سمت به اوربیت کف در infraorbital ناودان دارد. ارتباط پتریگوپالاتین حفره با عقب در و (infraorbital) زیرکاسه‌ای حفره با شکاف این امتداد می‌یابد. یک فرو رفتگی کوچک در قسمت قدامی و داخلی کف هم خاستگاه عضله مایل تحتانی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۶.


اوربیت حاشیه درون بلافاصله گونه، استخوان روی لمس قابل برآمدگی یک (whitnall) یا tubercle (یا zygomatic تکمه خارجی، جدار در رباط و چشم، کره آویزان‌کننده رباط فوقانی، پلک بالابرنده عضله اپونوروز از بخشی طرفی، پلکی رباط می‌شوند: متصل آن به ساختار چهار است. اوربیتال شکاف است. zygomatic عصب به مربوط که می‌شود دیده جدار همین در هم zygomaticoorbital سوراخ خارجی. کنترل‌کننده اسفنوئید کوچک بال و بزرگ بال بین خارجی، جدار و سقف رسیدن هم به محل خلفی، قسمت در نیز orbital (superior fissure) فوقانی پدید می‌آید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۶.



شکل ۵ — کف اوربیت: شکاف کاسه چشمی تحتانی، ناودان زیرکاسه‌ای و خاستگاه عضله مایل تحتانی در قدام و داخل کف.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۶ (شکل ۱۶).



شکل ۶ — تکمه ویتنال و چهار ساختار متصل به آن در جدار خارجی؛ رباط پلکی طرفی و اپونوروز بالابرنده پلک در همین ناحیه دیده می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۶.

جدول ۷ — نشانه‌های کف و جدار خارجی

نشانه	جایگاه	محتوا یا اتصال
شکاف کاسه چشمی تحتانی	بین ماکزیال و بال بزرگ اسفنوئید	ارتباط با حفره زیرکاسه‌ای و پتریگوپالاتین
ناودان infraorbital	کف، امتداد به جلو	عصب زیرکاسه‌ای
فرو رفتگی قدامی-داخلی کف	کف اوربیت	خاستگاه عضله مایل تحتانی
تکمه ویتنال	جدار خارجی، درون حاشیه	رباط پلکی طرفی، اپونوروز بالابرنده، رباط آویزان‌کننده، رباط کنترل‌کننده خارجی
سوراخ zygomaticoorbital	جدار خارجی	عصب گونه‌ای
شکاف اوربیتال فوقانی	خلفی، تلاقی سقف و جدار خارجی	مسیر اصلی عروق و اعصاب اوربیت (مبحث ۱۰)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۶ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا یک «تکمه» این‌قدر مهم است

تکمه ویتنال نقطه تجمع بافت فیبروزی است: هم پلک را به دیواره می‌دوزد (رباط پلکی طرفی)، هم اپونوروز بالابرنده را مهار می‌کند، هم کره چشم را می‌آویزد و هم مهار خارجی حرکت آن را می‌سازد. به همین دلیل در جراحی پلک و اوربیت، شناسایی لمسی همین برآمدگی، نقطه مرجع است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۶ و ۱۰ـ۱۱.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ – کف و جدار خارجی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار ساختار متصل به تکمه ویتنال را بنویسید و بگویید کدام‌شان در پتوز نقش دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · کانال بینایی و ارتباط‌ها

شش در اوربیت به دنیای بیرون

مبحث ۸

شناسنامه مبحث ۸ — شش در اوربیت به دنیای بیرون

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی نقشه استخوانی و پل به مبحث ۹ (انتشار عفونت) و ۱۰ (عناصر عبوری).
هدف این مبحث	شناخت کانال بینایی و فهرست کردن شش مسیر ارتباطی اوربیت با نواحی مجاور.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۳، ۶ و ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	شش ارتباط را دسته‌بندی کنید: دو مسیر عصبی-عروقی (شکاف فوقانی و کانال بینایی)، دو مسیر سینوسی (فرونتال و ماکزیالری)، یک مسیر سلولی (اتموئید) و یک مسیر اشکی-بینی.


منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۶ـ۷؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱ـ۲.

همین ۱۴۰۲ جزوه می‌گذرد. آن از ۲) (زوج بینایی عصب و دارد قرار اسفنوئید کوچک بال خلفی و قدامی ریشه بین optic) (canal بینایی کانال ۹۰ تا ۸۰ حدود فوقانی، اوربیتال شکاف در و است؛ بینایی عصب همراه آن در هم افتالمیک شریان می‌کند: کامل مهم افزوده یک با را کانال درصد عناصر ورودی به چشم عبور می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۶؛ جزوه ۱۴۰۲، ص ۱.

(که سقف طریق از قدامی؛ جمجمه حفره با بینایی کانال و فوقانی چشمی کاسه شکاف طریق از شش‌تاست: دیگر نواحی با اوربیت ارتباط‌های هوایی سلول‌های با اتموئید) استخوان نازک بسیار (دیواره پاپیراسه لامینا طریق از فرونتال؛ سینوس با است) فرونتال سینوس کف همان سینوس با است) ماکزیالری سینوس سقف (که کف طریق از بینی؛ تحتانی میاتوس با بینی-اشکی مجرای طریق از اتموئید؛ میانی و قدامی ماکزیالری؛ و از طریق شکاف تحتانی اوربیت با حفره تمپورال و حفره پتریگوپالاتین.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۷.



شکل ۷ — کانال بینایی و شکاف اوربیتال فوقانی در عمق اوربیت؛ این دو، دروازه اصلی عروق و اعصاب چشم‌اند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۶.

جدول ۸ — شش ارتباط اوربیت با نواحی مجاور

مسیر	ناحیه مقصد	نکته بالینی
شکاف کاسه چشمی فوقانی و کانال بینایی	حفره جمجمه قدامی	مسیر اصلی اعصاب و عروق؛ در ضربه، خطر آسیب عصب بینایی
سقف اوربیت	سینوس فرونتال	سینوزیت فرونتال می‌تواند به اوربیت برسد
لامینا پاپیراسه	سلول‌های هوایی اتموئید	نازک‌ترین دیواره؛ مسیر شایع انتشار عفونت بینی به اوربیت
مجرای بینی-اشکی	میاتوس تحتانی بینی	مسیر طبیعی درناژ اشک؛ گرفتگی آن ⇒ ریزش اشک
کف اوربیت	سینوس ماکزیالری	شکست کف ⇒ فتق محتوا به سینوس
شکاف تحتانی اوربیت	حفره تمپورال و پتریگوپالاتین	مسیر عصب زیرکاسه‌ای و گونه‌ای

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۷ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: چرا سینوزیت اتموئید چشم را تهدید می‌کند

لامینا پاپیراسه آن‌قدر نازک است که در عفونت حفره بینی، عفونت به‌راحتی به درون حفره چشم یا اوربیت منتشر می‌شود؛ و هر نوع آسیب یا عفونت در سینوس ماکزیالری هم باعث انتشار عفونت در اوربیت می‌شود. این دو مسیر، شایع‌ترین راه‌های سلولیت اوربیت با منشأ سینوسی‌اند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — ارتباط‌های اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش مسیر ارتباطی اوربیت را فهرست کنید و برای هر یک یک پیامد بالینی کوتاه بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · شکستگی‌ها

وقتی لبه سالم می‌ماند و کف می‌شکند

مبحث ۹

شناسنامه مبحث ۹ — وقتی لبه سالم می‌ماند و کف می‌شکند — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کاربرد مستقیم مباحث ۳ و ۴؛ پیش‌نیاز درک عوارض بالینی.
هدف این مبحث	شناخت الگوی شکستگی اوربیت، چهار عارضه شکستگی جدار داخلی و پیامد enophthalmos.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۳، ۴ و ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک قاعده: «حاشیه سالم، داخل شکسته». بعد چهار عارضه را به ترتیب از آسیب بافتی تا تغییر موقعیت چشم بگویید.


منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۸؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۱ـ۲.

عوارض می‌شوند. درگیر بیشتر داخلی جدار همچنین و اوربیت کف اما می‌ماند سالم اوربیت دور حاشیه شود، وارد اوربیت به ضربه اگر و چشم، کره تحرک در اختلال (diplopia)، دوبینی ایجاد چشم، کاسه داخل بافت‌های به آسیب است: مورد چهار داخلی جدار شکستگی فرورفتگی چشم (enophthalmos).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۸.

و تنون (سپتوم، ۱۲ و ۱۱ مباحث در که بافت‌هایی همان است؛ فیبروزی بافت و عضلات مسیر درهم‌رفتن تحرک، اختلال و دوبینی دلیل ۱۳ مبحث — است حفره مؤثر حجم افزایش و چربی حمایت رفتن دست از نتیجه هم enophthalmos داشتند. منظمی ساختار لیگامان‌ها) همین را از زاویه مقابل (افزایش چربی ⇒ exophthalmos) نشان می‌دهد.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۸ و ۱۱ـ۱۲.



شکل ۸ — لامینا پاپیراسه در نمونه استخوانی: نازکی این صفحه، هم محافظ است و هم راه انتشار عفونت و شکست.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱)، ص ۲.

جدول ۹ — عوارض شکستگی جدار داخلی اوربیت

عارضه	سازوکار	نشانه بالینی
آسیب بافت داخل کاسه	فشار و پارگی بافت نرم و چربی	درد، تورم و اختلال حس
دوبینی	به‌هم‌خوردن مسیر عضلات و لیگامان‌ها	دو تصویر در نگاه به جهات خاص
اختلال تحرک کره چشم	گیر افتادن عضله یا بافت در شکاف	محدودیت حرکت چشم
فرورفتگی چشم	از دست رفتن حجم و حمایت چربی	enophthalmos

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۸ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: enophthalmos و exophthalmos دو سر یک ترازو

موقعیت کره چشم، حاصل تعادل حجم محتوا و حجم حفره است. اگر چربی کم شود یا حفره بزرگ‌تر (شکستگی)، چشم عقب می‌رود؛ اگر چربی زیاد شود (گریوز)، چشم جلو می‌آید. مبحث ۱۳ همین ترازو را کامل می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۸ و ۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — شکستگی اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار عارضه شکستگی جدار داخلی را بنویسید و برای هر یک سازوکار کوتاهی بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · حلقه زین و عناصر عبوری

چه چیزی از کدام در می‌گذرد

مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — چه چیزی از کدام در می‌گذرد

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پرکاربردترین مبحث عملی جلسه؛ پیش‌نیاز جلسه دوم (عضلات و اعصاب چشم).
هدف این مبحث	تفکیک عناصر عبوری از شکاف فوقانی، شکاف تحتانی و حلقه تاندون مشترک.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۶، ۷ و ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه فهرست بسازید و در هر فهرست، «عصب حرکتی» را با یک نشانه علامت بزنید؛ اعصاب ۳، ۴ و ۶ در همین دو در هستند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۸ـ۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۸ـ۹.

خارجی، (فوقانی، راست عضله چهار چسبندگی محل است: اوربیت داخل عناصر از communis) tendineus (annulus مشترک تاندون حلقه تحتانی و داخلی). این حلقه در ناحیه کانال بینایی، بالا و داخل و پایین دهانه کانال، به کاسه چشم می‌چسبد.


منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۸؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.

عصب تحتانی و فوقانی شاخه‌های فوقانی، افتالمیک ورید recurrent، meningeal شریانی شاخه فوقانی: چشمی کاسه شکاف از عبوری عناصر عصب و پیشانی عصب اشکی، عصب شامل ۵) (زوج سه‌قلو عصب از شاخه‌هایی (trochlear)، ۴ زوج عصب ۳)، (زوج چشم حرکتی تحتانی افتالمیک ورید و گونه‌ای عصب ماکزیالری)، (شاخه زیرکاسه‌ای عصب هم تحتانی شکاف از ۶). (زوج دورکننده عصب و بینی-مژگانی، می‌گذرند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۸ـ۹.

شاخه دو هر با ۳) (زوج چشم حرکتی عصب افتالمیک، شریان است: مهم‌تری و کوتاه‌تر فهرست می‌گذرد، مشترک تاندون حلقه از آنچه اما ۶) و (۳ چشم حرکتی عصب سه از عصب دو کنید: دقت کمی ۵). زوج (شاخه بینی-مژگانی عصب و ۶) (زوج دورکننده عصب تحتانی، و فوقانی از درون حلقه می‌گذرند و عصب ۴ از بیرون آن عبور می‌کند؛ همین تفاوت، در تفسیر فلج‌های همراه با نشانه‌های اوربیتی تعیین‌کننده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.



شکل ۹ — محتویات شکاف اوربیتال فوقانی و حلقه تاندون مشترک: اعصاب ۳، ۴، ۵ (شاخه‌ها) و ۶، شریان و ورید افتالمیک.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۹.

جدول ۱۰ — سه مسیر، سه فهرست

مسیر	عناصر	یادآور
شکاف فوقانی	recurrent meningeal، ورید افتالمیک فوقانی، زوج ۳ (دو شاخه)، زوج ۴، شاخه‌های زوج ۵ (اشکی، پیشانی، بینی-مژگانی)، زوج ۶	بیشترین تنوع عناصر
شکاف تحتانی	عصب زیرکاسه‌ای، عصب گونه‌ای، ورید افتالمیک تحتانی	بیشتر حسی؛ در ارتباط با پتریگوپالاتین
حلقه تاندون مشترک	شریان افتالمیک، زوج ۳ (هر دو شاخه)، زوج ۶، عصب بینی-مژگانی	عصب ۴ بیرون حلقه می‌ماند

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۸ـ۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: سندرم شکاف فوقانی

چون عصب ۳، ۴، ۶ و شاخه اول زوج ۵ همه از یک در می‌گذرند، ضایعه این ناحیه می‌تواند هم‌زمان افتادگی پلک، انحراف چشم، اختلال حرکات چشم و کاهش حس پیشانی بدهد. به همین دلیل «چند عصب حرکتی با هم» همیشه یادآور ضایعه در مشترک (شکاف یا سینوس کاورنوس) است، نه ضایعه تک‌عصبی.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — عناصر عبوری

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه فهرست شکاف فوقانی، شکاف تحتانی و حلقه تاندون را بنویسید و بگویید کدام عصب حرکتی از حلقه بیرون می‌ماند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · بافت همبند اوربیت

پری‌اوربیتا، سپتوم و دو زائده

مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث ۱۱ — پری‌اوربیتا، سپتوم و دو زائده یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز بخش نرم جلسه؛ پیش‌نیاز مبحث ۶ (فاسیای اشکی) و مبحث ۱۲ (تنون).
هدف این مبحث	شناخت سه لایه همبند اوربیت و فهم این‌که سپتوم، مرز کیسه پلک و اوربیت است.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۳ و ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک تصویر ذهنی بسازید: پری‌اوربیتا «آستر استخوان»، سپتوم «پرده در»، تنون «پیراهن چشم».


منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۹.

یا orbital) (fascia اوربیت فاسیای اوربیت. چربی و چشم، کره (fascia) فاسیای غلاف (septum)، سپتوم دارد: جزء سه اوربیت همبند بافت متصل استخوان به سست به‌طور و می‌سازد را استخوانی اوربیت پوشش که است (periosteum) پریوست همان (periorbita) پری‌اوربیتا در و می‌گیرد قرار بینایی عصب غلاف همچنین و سخت‌شامه امتداد در فاسیا این خلف، در می‌شود. جدا آن از به‌راحتی دلیل همین به است؛ جلو، در امتداد پریوست استخوان‌های سازنده حاشیه اوربیت ادامه می‌یابد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۹.

می‌سازد؛ را orbital) (septum اوربیتال سپتوم و می‌شود پلک‌ها وارد خود فلپ‌های امتداد در فاسیا این اوربیت، تحتانی و فوقانی حاشیه در مایل عضله تاندون فیبروزی قرقره زائده یک دارد: هم مهم زائده دو فاسیا می‌کند. جدا پلک از را اوربیت محتویات که پرده‌ای همان یعنی کیسه از می‌زند، پل اشکی ناودان روی که می‌سازد را lacrimal) (fascia اشکی فاسیای دیگر زائده و می‌دارد، نگه ثابت خود جای در را فوقانی اشکی حمایت می‌کند و در زیر رباط پلکی داخلی قرار گرفته است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۹.



شکل ۱۰ — سپتوم اوربیتال از نمای قدامی: مرز میان پلک و محتویات اوربیت، با رباط‌های پلکی و تارس در همان سطح.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۰ (شکل ۲۶).

جدول ۱۱ — سه جزء بافت همبند اوربیت

جزء	جایگاه	اتصال‌های کلیدی	نقش
پری‌اوربیتا	آستر استخوان اوربیت	خلف: سخت‌شامه و غلاف عصب بینایی؛ جلو: پریوست حاشیه	پوشش و تغذیه استخوان؛ مرز طبیعی عفونت
سپتوم اوربیتال	از فلپ‌های حاشیه فوقانی و تحتانی به پلک	تارس و رباط‌های پلکی	جدا کردن پلک از اوربیت؛ مهار انتشار
زوائد فاسیا	سقف (قرقره) و جدار داخلی (فاسیای اشکی)	تاندون مایل فوقانی؛ کیسه اشکی	ثابت نگه‌داشتن قرقره و حمایت کیسه اشکی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۹ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: سپتوم، دیوار آتش

چون سپتوم اوربیتال میان پلک و اوربیت می‌نشیند، عفونت سطحی پلک (پیش‌سپتومی) تا زمانی که سپتوم سالم است به اوربیت نمی‌رسد؛ عبور عفونت از این پرده، معنای «سلولیت اوربیتی» و نیاز به بررسی و درمان جدی‌تر است. این همان منطقی است که در مبحث ۸ برای لامینا پاپیراسه دیدیم، این بار در بافت نرم.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۹ـ۱۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — بافت همبند اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پری‌اوربیتا، سپتوم و دو زائده فاسیا را با نقش هر یک بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · تنون و لیگامان‌ها

پیراهنی که چشم در آن می‌چرخد

مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث ۱۲ — پیراهنی که چشم در آن می‌چرخد یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان فاسیای اوربیت (مبحث ۱۱) و چربی (مبحث ۱۳)؛ پیش‌نیاز جلسه دوم (حرکات چشم).
هدف این مبحث	شناخت کپسول تنون و چهار مشتق آن و فهم این‌که چرا چشم درون غلاف آزادانه حرکت می‌کند.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار مشتق را با نقش حفظ کنید: دو لیگامان کنترل‌کننده (داخل و خارج)، غلاف عضلات، و رباط لاکوود (تختخواب زیر چشم).


منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۱۰ـ۱۱.

بینایی عصب از که است چشم کره دور سست و نازک غلافی (tenon's capsule) تنون کپسول یا (fascia bulbi) چشم کره فاسیای غلاف به می‌شود؛ جدا صلبیه از (episcleral) اپی‌اسکرال فاسیای توسط تنون کپسول دارد. ادامه قرنیه و صلبیه اتصال محل تا و می‌شود شروع همین دلیل کره چشم می‌تواند آزادانه درون این غلاف حرکت کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۰.

از مثلثی‌شکلی گسترش که داخلی کنترل‌کننده رباط دوم (sheath)؛ چشم کره عضلات اطراف غلاف نخست موردند: چهار غلاف این مشتقات غلاف از محکمی و مثلثی‌شکل گسترش که خارجی کنترل‌کننده رباط سوم می‌چسبد؛ اشکی استخوان به و است داخلی راست عضله غلاف از که (suspensory ligament of (Lockwood چشم آویزان‌کننده رباط چهارم و می‌شود؛ متصل گونه استخوان به و است خارجی راست ضخیم شدن قسمت تحتانی کپسول تنون ساخته می‌شود، در مرکز پهن و در کناره‌ها باریک است و مانند تختخوابی زیر کره چشم قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۰ـ۱۱؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.



شکل ۱۱ — فاسیای اوربیت و مشتقات تنون: رباط کنترل‌کننده داخلی و خارجی، غلاف عضلات و رباط لاکوود در نمای محوری و سهمی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۱ (شکل ۲۹).

جدول ۱۲ — کپسول تنون و چهار مشتق

ساختار	منشأ	اتصال یا موقعیت	نقش
کپسول تنون	غلاف نازک دور کره چشم	از عصب بینایی تا صلبیه-قرنیه	بستر آزاد برای حرکت چشم
غلاف عضلات	ادامه تنون روی عضلات	اطراف هر عضله خارج چشمی	روان کردن حرکت عضله در چربی
رباط کنترل‌کننده داخلی	غلاف راست داخلی	استخوان اشکی	مهار چرخش بیش از حد به داخل
رباط کنترل‌کننده خارجی	غلاف راست خارجی	استخوان گونه (نزدیک تکمه ویتنال)	مهار چرخش بیش از حد به خارج
رباط لاکوود	ضخیم شدن تنون در تحتانی	زیر کره چشم، از تلاقی غلاف‌ها	حمایت و نگه‌داشتن چشم در جای خود

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۰ـ۱۱ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا «تنون» کلید جراحی چشم است

چون فاسیای اپی‌اسکرال، صلبیه را از کپسول جدا می‌کند، چشم در تنون می‌چرخد نه با آن. جراح وقتی می‌خواهد عضله را پیدا کند، از تنون وارد می‌شود و همین لایه را می‌دوزد؛ به همین دلیل شناخت تنون برای درک بی‌حرکتی‌های پس از جراحی هم لازم است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۱۰ـ۱۱.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ — تنون و لیگامان‌ها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار مشتق کپسول تنون را بنویسید و بگویید چرا چشم درون غلاف آزادانه حرکت می‌کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · چربی اوربیت

بالشتک، تثبیت‌کننده و ترازوی موقعیت چشم

مبحث ۱۳

شناسنامه مبحث ۱۳ — بالشتک، تثبیت‌کننده و ترازوی موقعیت چشم — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آخرین مبحث ۱۴۰۴ در این جلسه؛ پیش‌نیاز فهم enophthalmos (مبحث ۹).
هدف این مبحث	شناخت وظایف و محل چربی اوربیت و پیوند افزایش آن با exophthalmos.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۹، ۱۱ و ۱۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار وظیفه را با یک کلمه خلاصه کنید: حفاظت، تثبیت، کاهش اصطکاک، پرکردن. بعد دو حالت مرضی را مقابل هم بگذارید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۱۱ـ۱۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۳.

بینایی عصب چشم، کره از و می‌کند بازی را بالشتک نقش دارد: وظیفه چهار است. چشم حفره درون چربی بافت (orbital fat) اوربیتال چربی تا می‌دهد کاهش را اصطکاک می‌کند؛ حفظ اصلی جایگاه در را چشم کره موقعیت اصلی)؛ (نقش می‌کند محافظت ضربه برابر در عروق و عضلات و ساختارهای اطراف به‌راحتی حرکت کنند؛ و فضای داخل اوربیت را پر می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۱.

عصب شروع نزدیک چشم پشت هم مقداری و اوربیت، رأس در راست، عضلات زیر و اطراف چشمی، خارج عضلات بین چربی: قرارگیری محل است. تحتانی پف آن، روشن مثال می‌شود؛ دیده (fat) (pad چربی پد به‌صورت که دارد وجود چربی هم پلک قدامی بخش نزدیک بینایی. گریوز بیماری در یا پیری در مثلا شود؛ پلک‌ها برآمدگی و چشم زیر پف باعث می‌تواند اوربیت پشت چربی حد از بیش و غیرطبیعی افزایش چهار در چربی شود. ایجاد (exophthalmos) چشم کره برآمدگی و شود بیشتر چشمی کاسه درون چربی حجم است ممکن تیروئید) (پرکاری و اعصاب تثبیت باعث و دارد وجود هم عضلات بین و می‌شود توزیع خارجی) و داخلی تحتانی، (فوقانی، راست عضلات اطراف اصلی کمپارتمان عروق درون اوربیت می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۳.



شکل ۱۲ — نمای بالینی exophthalmos: برجستگی دوطرفه کره چشم در پرکاری تیروئید، پیامد افزایش حجم چربی اوربیت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۲.

جدول ۱۳ — چربی اوربیت: وظیفه و پیامد

محور	حالت طبیعی	کاهش یا افزایش
حفاظت	بالشتک ضربه‌گیر برای چشم، عصب و عروق	کاهش در تحلیل چربی ⇒ مستعدتر شدن به ضربه
موقعیت چشم	حفظ کره چشم در جایگاه خود	کاهش ⇒ enophthalmos؛ افزایش ⇒ exophthalmos
اصطکاک	حرکت روان عضلات و بافت‌ها	تغییر حجم ⇒ محدودیت حرکت
پرکردن فضا	پر کردن فضای اوربیت و تثبیت اعصاب و عروق	افزایش حجم ⇒ برجستگی پلک و پف زیر چشم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۱ـ۱۲ (بازنویسی جدولی).

اختلاف روایت: exophthalmos یا exophthalamos

در جزوه ۱۴۰۴ املای لاتین این واژه به‌صورت «exophthalamos» و در جای دیگر «exophthalmos» آمده است؛ املای استاندارد همان exophthalmos است و در این جزوه یکدست شده، اما در نقل مستقیم، شکل منبع حفظ می‌شود. همین نکته برای «enophthalamos/enophthalmos» هم صادق است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۸ و ۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ – چربی اوربیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار وظیفه چربی اوربیت را بنویسید و توضیح دهید چرا افزایش آن در گریوز چشم را به جلو می‌راند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · کره چشم در سه لایه

از صلبیه تا شبکیه (افزوده ۱۴۰۲)

مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث ۱۴ — از صلبیه تا شبکیه (افزوده ۱۴۰۲) یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تنها مبحثی که تمام آن از جزوه ۱۴۰۲ ساخته شده؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۵ (ضمائم).
هدف این مبحث	شناخت سه لایه کره چشم، نسبت صلبیه و قرنیه، دو بخش شبکیه و گردش مایع زلالیه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه لایه را از بیرون به داخل بگویید و برای هر لایه فقط یک وظیفه و یک جزء کلیدی نگه دارید؛ جزئیات بیشتر در جلسه‌های بعد می‌آید.


منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۲ـ۴ و ۶ـ۷.

اما است، کروی تقریبا اگرچه آن ابعاد می‌شود. شناخته مرکزی عصبی دستگاه از زائده‌ای به‌عنوان و است عصبی سیستم از بخشی چشم کره (خارجی‌ترین، فیبروزی لایه دارد: اصلی لایه سه چشم سانتی‌متر. ۲٫۴ عمودی قطر و ۲٫۵ افقی قطر دارد: تفاوت کمی مختلف جهات در محافظتی)، لایه عروقی (میانی، تغذیه‌کننده) و لایه عصبی (داخلی‌ترین، ایجاد و انتقال پیام بینایی).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۲ـ۳.

بخش قرنیه و خلفی) (۵/۶ می‌پوشاند را چشم پشت که است چشم سفیدرنگ بخش صلبیه است: شده ساخته قرنیه و صلبیه از فیبروزی لایه خون‌رسانی که (مشیمیه) کوروئید دارد: بخش سه عروقی لایه کند. عبور به‌خوبی نور تا است خونی عروق فاقد که قدامی) (۱/۶ جلویی شفاف قرار مرکزش در مردمک و می‌سازد را چشم رنگ که عنبیه و می‌کند، تنظیم را آن تحدب و کنترل را لنز که مژگانی جسم دارد، عهده بر را شبکیه را پیام انتقال نورون‌های که عصبی لایه و می‌کند جذب را اضافی نور که خارجی رنگدانه‌ای لایه بخش: دو با است شبکیه همان عصبی لایه دارد. دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳ و ۶ـ۷.




شکل ۱۳ — برش کره چشم با سه لایه: فیبروزی (صلبیه و قرنیه)، عروقی (عنبیه، جسم مژگانی، کوروئید) و عصبی (شبکیه با دو لایه).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳.

زلالیه مایع زجاجیه). جلوی و عنبیه (پشت خلفی اتاقک و زلالیه، مایع با عنبیه) و قرنیه (میان قدامی اتاقک دارد: اصلی محفظه دو چشم تعادل حفظ می‌شود. جذب وریدی سیستم به اشلم کانال طریق از قدامی اتاقک در گردش از پس و می‌شود تولید مژگانی جسم عروق توسط

میان ترشح و جذب، از افزایش فشار داخل چشمی جلوگیری می‌کند؛ و اگر این تعادل به‌هم بخورد، گلوکوم (آب سیاه) رخ می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴ـ۵.



شکل ۱۴ — اتاقک‌های چشم و مسیر مایع زلالیه: تولید در جسم مژگانی، گردش در اتاقک قدامی و جذب از کانال اشلم.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴.

جدول ۱۴ — سه لایه کره چشم

لایه	اجزا	وظیفه	نکته کلیدی
فیبروزی	صلبیه (۵/۶ خلفی) + قرنیه (۱/۶ قدامی)	حفاظت و عبور نور	قرنیه بی‌عروق است
عروقی	کوروئید، جسم مژگانی، عنبیه	تغذیه، تطابق، تنظیم نور	عنبیه رنگ چشم را می‌سازد
عصبی	لایه رنگدانه‌ای + لایه عصبی (شبکیه)	جذب نور اضافی و تولید پیام	آکسون‌ها عصب بینایی را می‌سازند

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۳ـ۴ (بازنویسی جدولی).

اختلاف دامنه دو منبع

این مبحث (و مبحث ۱۵) در جزوه ۱۴۰۴ این جلسه نیامده است؛ ۱۴۰۴ تمام جلسه را به اوربیت و بافت همبند آن اختصاص داده و ساختار کره چشم را در جلسه‌های بعد می‌آورد. محتوای این دو مبحث کاملا از ۱۴۰۲ است و به همین دلیل، ارجاع هر پاراگراف فقط به ۱۴۰۲ داده شده است. اگر استاد در کلاس ۱۴۰۴ ترتیب دیگری گفته باشد، این دو مبحث را می‌توان بی‌هیچ تغییری در متن بقیه، جابه‌جا یا حذف کرد.

منبع: مقایسه دامنه جزوه ۱۴۰۴ (۱۶ ص) و ۱۴۰۲ (۱۲ ص).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ — کره چشم

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه لایه را با اجزا و یک وظیفه بنویسید و گردش مایع زلالیه را در یک خط توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · ضمائم چشم

پلک، ملتحمه، مژه و دستگاه اشکی (افزوده ۱۴۰۲)

مبحث ۱۵

شناسنامه مبحث ۱۵ — پلک، ملتحمه، مژه و دستگاه اشکی (افزوده ۱۴۰۲) — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان‌بخش جلسه؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۱ (سپتوم) و آماده‌سازی برای جلسه‌های پلک.
هدف این مبحث	شناخت لایه‌های پلک، تارس و غدد آن، ملتحمه و فورنیکس، مژه و مسیر اشک.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۱ و ۱۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	مسیر اشک را مثل یک خط لوله حفظ کنید: غده ← سطح چشم ← دریاچه ← پونکتوم ← کیسه ← مجرای بینی-اشکی ← بینی.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی) ص ۱۰ـ۱۲.

و سست همبند بافت عمدتا که زیرپوست لایه می‌کند؛ آسان را شدن باز و جمع که عرضی خطوط با پوستی دارد: مشخصی لایه‌های پلک را چشم کردن باز و بستن که orbicularis) (oculi چشم حلقوی عضله شود؛ دیده سریع پلک ادم و ورم می‌شود باعث همین و است بی‌چربی تارس، ضخامت در می‌شود. اینسرت آن ضخامت در پلک بالابرنده عضله اپونوروز که پلک) فیبری (اسکلت تارس و است؛ ارادی و دارد عهده بر غدد تارسال ماده‌ای چرب تولید می‌کنند که سطح چشم را روان و از خشکی جلوگیری می‌کند و باز شدن چشم را آسان می‌سازد.


منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۰.

پیش قرنیه نزدیکی تا آن عروق می‌پوشاند؛ را چشم کره روی و پلک داخلی سطح که است همبند بافت و عروق از لایه‌ای (کونژنکتیوا) ملتحمه ذرات برابر در محافظت و زیبایی مژه‌ها می‌گوییم. فورنیکس را چشمی و پلکی ملتحمه بین زاویه ندارند. حضور قرنیه خود در اما می‌روند عصب طریق از را حسی پیام آن‌ها تحریک مژه‌ها: عصب‌دهی ندارد. مژه معمولا پلک داخلی یک‌ششم یا یک‌پنجم و دارند عهده بر را خارجی افتالمیک می‌فرستد و سپس با عصب فاسیال (حرکتی) ارتباط برقرار می‌کند و باعث بسته شدن چشم می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۱.

پلک بالابرنده عضله تاندون بالای غده از بخشی می‌کنند؛ تولید اشک و دارند قرار چشم فوقانی-خارجی بخش در اشکی غدد اشکی: دستگاه جمع داخلی گوشه در اشکی دریاچه در و می‌شود پخش قرنیه سطح روی چشم طبیعی حرکات و پلک‌ها با اشک است. آن زیر بخشی و فوقانی به بینی-اشکی مجرای با آنجا از و اشکی کیسه به و جذب لاکریمال پونکتوم نام به پایین و بالا پلک در کوچک سوراخ دو از سپس می‌شود؛ میاتوس تحتانی بینی هدایت می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۱ـ۱۲؛ مقایسه: جزوه ۱۴۰۴ ص ۵ـ۶ (ناودان اشکی).



شکل ۱۵ — ملتحمه و ساختارهای همراه: لیمبوس، ملتحمه پلکی و چشمی، فورنیکس و کارونکل در گوشه داخلی.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۱.

جدول ۱۵ — ضمائم چشم در یک نگاه

ساختار	اجزا یا مسیر	نقش	نکته کلیدی
پلک	پوست، زیرپوست سست، عضله حلقوی، تارس + غدد تارسال	حفاظت، پخش اشک، روان‌سازی	ادم پلک زود دیده می‌شود
ملتحمه	لایه عروقی سطح پلک و کره چشم	حفاظت و مرطوب‌سازی	در قرنیه عروق ندارد؛ فورنیکس = چین تلاقی
مژه	یک‌پنجم تا یک‌ششم داخلی بدون مژه	حفاظت و حس	رفلکس بستن با عصب فاسیال
دستگاه اشکی	غده ← سطح چشم ← دریاچه ← پونکتوم ← کیسه ← مجرای بینی-اشکی ← میاتوس تحتانی	شستشو، رطوبت و حفاظت	انسداد مجرا ⇒ ریزش اشک

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۰ـ۱۲ (بازنویسی جدولی).

افزوده بالینی: سه پیامد ساده انسداد

انسداد پونکتوم یا مجرای بینی-اشکی، ریزش اشک (epiphora) می‌دهد؛ التهاب غدد تارسال، خشکی و سوزش سطح چشم؛ و ادم پلک به‌دلیل بافت زیرپوستی سست، سریع‌تر از جاهای دیگر ظاهر می‌شود. هر سه، کاربرد بالینی همان آناتومی این مبحث است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱)، ص ۱۰ـ۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ – ضمائم چشم

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر اشک از غده تا بینی را بنویسید و بگویید چرا یک‌پنجم داخلی پلک مژه ندارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

خلاصه استاد

خلاصه جلسه در دو جدول

۱۴۰۴: ص ۱۳ (جدول خلاصه اوربیت)

سوراخ‌ها، محور، دو جدار، چهار لبه‌ها، و شکل وظایف، تعریف، کرده: توزیع جلسه پایان در استاد که است خلاصه جدول یک ۱۴۰۴ جزوه ۱۳ صفحه ارتباط‌ها، عناصر عبوری، و بافت همبند. همان جدول در اینجا بازنویسی شده تا هم مرور شب امتحان باشد و هم نقشه کل جلسه در یک نگاه.

جدول ۱۷ — خلاصه اوربیت: از تعریف تا بافت همبند

محور	خلاصه
تعریف	استطاله‌ای از مغز در حفره‌ای استخوانی به نام orbit؛ سوکتی برای کره چشم و بافت‌های مربوط به آن.
وظایف	حفظ چشم و ضمائم از آسیب؛ فراهم کردن محل چسبندگی عضلات و جای دقیق کره چشم؛ تثبیت محور بینایی.
شکل و لبه‌ها	هرمی چهاروجهی؛ رأس عقب و داخل، قاعده جلو و خارج. لبه بالا: پیشانی؛ داخلی: پیشانی + فک بالا؛ خارجی: پیشانی + گونه؛ پایین: گونه + بخشی از فک بالا.
جدارها	سقف: پیشانی + بال کوچک اسفنوئید (نسبتا محکم)؛ داخلی: زائده پیشانی فک بالا، اشکی، لامینا پاپیراسه، جسم اسفنوئید (بسیار نازک)؛ کف: سطح اوربیتال فک بالا + گونه + زائده اوربیتال کامی (سست)؛ خارجی: گونه + بال بزرگ اسفنوئید (ضخیم‌ترین).
محورها	محور اوربیتال: ۴۵ درجه با محور طرف مقابل و ۲۲ تا ۲۳ درجه با خط قدامی-خلفی چشم؛ محور بینایی: موازی در دو چشم.
سوراخ‌ها و شیارها	تروکلئار فوسا (قرقره)، حفره اشکی (غده اشکی)، سوراخ‌های اتموئیدال در درز فرونتواتموئیدال، ناودان اشکی (کیسه اشکی ← مجرای بینی-اشکی ← میاتوس تحتانی)، ناودان زیرکاسه‌ای، شکاف تحتانی، تکمه ویتنال، سوراخ گونه‌ای-اوربیتی، شکاف فوقانی، کانال بینایی.
ارتباط‌ها	حفره جمجمه قدامی (شکاف فوقانی + کانال بینایی)؛ سینوس فرونتال (سقف)؛ سلول‌های اتموئید (لامینا پاپیراسه)؛ بینی (مجرای بینی-اشکی)؛ سینوس ماکزیالری (کف)؛ حفره‌های تمپورال و پتریگوپالاتین (شکاف تحتانی).
بافت همبند	پری‌اوربیتا؛ سپتوم اوربیتال؛ غلاف فاسیای کره (تنون) با لیگامان‌های کنترل‌کننده داخلی و خارجی و رباط لاکوود؛ چربی اوربیت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۳ (خلاصه استاد، بازنویسی).

جدول ۱۸ — سه مسیر عبور، در یک نگاه

مسیر	اعصاب	عروق
کانال بینایی	عصب بینایی (زوج ۲)	شریان افتالمیک
شکاف فوقانی	زوج ۳ (دو شاخه)، زوج ۴، زوج ۶، شاخه‌های زوج ۵ (اشکی، پیشانی، بینی-مژگانی)	ورید افتالمیک فوقانی، شریان راجعه مننژ
شکاف تحتانی	عصب زیرکاسه‌ای، عصب گونه‌ای	ورید افتالمیک تحتانی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۳ و ۹.

نکته طلایی استاد در همین صفحه

اگر لبه اوربیت در معاینه سالم باشد، هنوز نمی‌توان شکستگی را رد کرد؛ چون معماری حفره طوری است که کف و جدار داخلی — نه لبه — می‌شکنند. این یک جمله، چهار مبحث این جزوه (۳، ۴، ۸ و ۹) را به هم می‌دوزد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۱۳ و ۴.

پیوست · مقابله منابع

مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۲ صفحه)

۱۴۰۲: «حواس ویژه 01 بهمن 1402.pdf»

جدارها، اوربیت، به را جلسه تمام ۱۴۰۴ نیست: یکی ۱۴۰۴ جزوه با آن دامنه — بعدی جلسه‌های برخلاف — و است صفحه ۱۲ جلسه این ۱۴۰۲ جزوه کره خود سراغ به بعد و دارد اوربیت استخوان‌شناسی بر سریع‌تر مروری ۱۴۰۲ که حالی در می‌دهد، اختصاص چربی و فاسیا شکستگی‌ها، سوراخ‌ها، زیر جدول رقیب. نه مکمل‌اند، منبع دو این پس می‌رود. اشک) مژه، ملتحمه، (پلک، ضمائم و عضلات) زجاجیه، عدسی، اتاقک‌ها، لایه، (سه چشم همه ۱۲ صفحه را به ۱۵ مبحث این جزوه نقشه می‌کند تا معلوم باشد هر بند از کجا آمده است.

متن در و آمده ۱۴۰۲ در فقط بند این یعنی ۱۴۰۲» «افزوده گفته‌اند؛ حدود همین با را مطلب همان منبع دو هر یعنی «همسان» «وضعیت»: ستون راهنمای جزوه با برچسب صریح نقل شده است؛ «جزئیات بیشتر در ۱۴۰۴» یعنی ۱۴۰۲ اشاره کوتاه دارد و تفصیل آن از ۱۴۰۴ گرفته شده است.

جدول ۱۶ — نقشه مقابله ۱۲ صفحه جزوه ۱۴۰۲ با ۱۵ مبحث این جزوه

صفحه ۱۴۰۲	بندها	مبحث این جزوه	وضعیت
۱	چشم در حفره اوربیت؛ شکل مخروطی؛ استخوان‌های جدارها و لبه‌ها؛ رأس حفره و اسفنوئید	۱، ۲، ۳	همسان
۱	کانال اپتیک (عصب بینایی و شریان افتالمیک)؛ ۸۰ تا ۹۰ درصد عناصر از شکاف فوقانی	۸	افزوده ۱۴۰۲
۲	ناودان زیرکاسه‌ای و عصب آن؛ سوراخ‌های اتموئیدال قدامی و خلفی؛ لامینا پاپیراسه	۶، ۸	همسان
۲	ابعاد کره چشم: قطر افقی ۲٫۵ و عمودی ۲٫۴ سانتی‌متر؛ محور بینایی و محور کره چشم	۵، ۱۴	افزوده ۱۴۰۲
۳	سه لایه چشم؛ صلبیه ۵/۶ و قرنیه ۱/۶؛ کوروئید، جسم مژگانی، عنبیه	۱۴	افزوده ۱۴۰۲
۳	ملتحمه، عدسی و زجاجیه؛ اتاقک قدامی و خلفی	۱۴، ۱۵	افزوده ۱۴۰۲
۴	تولید مایع زلالیه در جسم مژگانی و جذب از کانال اشلم؛ فشار داخل چشمی	۱۴	افزوده ۱۴۰۲
۵	تطابق عدسی: عضلات حلقوی و طولی؛ نزدیک‌بینی و دوربینی؛ پیرچشمی؛ کاتاراکت؛ گلوکوم	۱۴	افزوده ۱۴۰۲
۶	رنگ عنبیه و ملانین؛ عضلات حلقوی و طولی عنبیه و کنترل خودکار مردمک	۱۴	افزوده ۱۴۰۲
۷	لایه‌های شبکیه و مسیر پیام؛ تغذیه دوگانه شبکیه؛ عروق مرکزی شبکیه	۱۴	افزوده ۱۴۰۲
۸	عضلات خارج چشمی (شش عضله + بالابرنده پلک)؛ حلقه زین؛ لیگامان‌های چک	۱۰، ۱۲	جزئیات بیشتر در ۱۴۰۴
۹	اعصاب ۳، ۴ و ۶ و کنترل عضلات؛ پتوز (رشته‌های مولر)؛ دوبینی در فلج عصب ششم	۱۰	افزوده ۱۴۰۲
۱۰	لایه‌های پلک؛ عضله حلقوی؛ تارس و غدد تارسال	۱۱، ۱۵	همسان
۱۱	ملتحمه و فورنیکس؛ مژه و عصب‌دهی آن؛ دستگاه اشکی و مسیر اشک	۱۵	افزوده ۱۴۰۲
۱۲	ساختارهای تکمیلی و تصاویر پایانی (بدون متن تازه قابل مقابله)	—	تصویری

منبع: مقابله صفحه‌به‌صفحه «حواس ویژه 01 بهمن ۱۲) «1402.pdf صفحه) با متن همین جزوه.

چه چیزی از ۱۴۰۲ به این جزوه اضافه شد

سه دسته افزوده واقعی داریم. دسته اول، عددهای دقیق: قطر افقی و عمودی کره چشم (۲٫۵ و ۲٫۴ سانتی‌متر)، نسبت ۵/۶ به ۱/۶ صلبیه و قرنیه، و آمار ۸۰ تا ۹۰ درصد عناصر ورودی از شکاف فوقانی. دسته دوم، ساختارهایی که ۱۴۰۴ این جلسه اصلا باز نکرده: سه لایه چشم، اتاقک‌ها و گردش زلالیه، عدسی و تطابق، رنگ عنبیه و کنترل مردمک، لایه‌های شبکیه. دسته سوم، ضمائم: لایه‌های پلک، تارس و غددش، ملتحمه و فورنیکس، مژه و مسیر اشک. همه این‌ها در مباحث ۱۴ و ۱۵ با برچسب صریح «افزوده ۱۴۰۲» آمده‌اند تا هیچ‌گاه با متن ۱۴۰۴ اشتباه نشوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۱)، ص ۱ـ۱۲.

داوری درباره دامنه این جلسه

اگر ملاک، جزوه ۱۴۰۴ باشد، موضوع جلسه اول آناتومی «اوربیت» است و کره چشم در جلسه‌های بعد می‌آید؛ اگر ملاک، جزوه ۱۴۰۲ باشد، همین جلسه کل چشم را مرور می‌کند. این جزوه راه میانه را انتخاب کرده: بدنه اصلی بر پایه ۱۴۰۴ است و مطالب ۱۴۰۲ در دو مبحث پایانی و به‌صورت افزوده علامت‌دار آمده‌اند. بنابراین اگر استاد در کلاس ۱۴۰۴ ترتیب دیگری گفته باشد، می‌توان مباحث ۱۴ و ۱۵ را بی‌آنکه به بقیه متن آسیبی برسد، جابه‌جا یا حذف کرد.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه مقابله کامل دو منبع (۱۶ ص و ۱۲ ص).

یادداشت بازبین مقابله

آزمون استاد

آزمون چندگزینه‌ای پایان جلسه (۱۵ پرسش)

۱۴۰۴: ص ۱۴ـ۱۶ + پاسخ‌نامه

اینجا در پرسش‌ها این آخر. صفحه پای در رسمی پاسخ‌نامه با ۱۵) تا ۱ (پرسش است گذاشته چندگزینه‌ای آزمون صفحه سه جزوه، پایان در استاد پرسش (۳۹ جزوه پایان تحلیلی خودآزمایی با مقایسه برای هم و خودآزمایی برای هم تا است شده ثبت جداگانه استاد پاسخ‌نامه و نقل عینا تشریحی) به کار بیاید.

در نکته ۱۱ تا ۵ پرسش‌های در است؛ استاد آموزشی پاسخ پرسش، هر زیر «نکته» و آمده‌اند کامل جمله‌های به‌صورت گزینه‌ها ۱۵، تا ۱۲ و ۴ تا ۱ پرسش‌های در انتهای خود پرسش آمده است.

اختلاف پاسخ‌نامه استاد با متن (پرسش ۸ و ۱۴)

پرسش ۸: پاسخ‌نامه «گزینه ۱ (دیواره داخلی)» را محکم‌ترین دیواره می‌داند، در حالی که خود جزوه در ص ۴ دیواره خارجی را «ضخیم‌ترین و محکم‌ترین» می‌نامد و دیواره داخلی را «بسیار سست». پرسش ۱۴: پاسخ‌نامه «رباط داخلی پلک» را می‌پذیرد، ولی متن ص ۹ می‌گوید سپتوم اوربیتال از فلپ‌های فاسیای اوربیت ساخته می‌شود. در هر دو مورد، متن درس این جزوه بر پایه متن جزوه نوشته شده و پاسخ‌نامه استاد فقط نقل شده است؛ برای امتحان، هماهنگی با استاد را بررسی کنید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی)، ص ۴، ۹ و ۱۶.

۱. کدام عبارت در مورد ساختار استخوانی اطراف چشم (اوربیت) صحیح است؟

و چشم کره موقعیت تثبیت به و داشته محافظتی نقش که است استخوانی حفره یک اوربیت ۲) دارد. قرار گونه ناحیه در عمدتا که است غشایی حفره‌ای اوربیت ۱) و ندارد قرار بینی طرفین در اوربیت ۴) می‌دهند. تشکیل را اوربیت ابعاد که هستند استخوان‌هایی تنها بالا فک و گونه استخوان‌های ۳) می‌کند. کمک بینایی محور ارتباطی با ریشه بینی ندارد.

پاسخ استاد: گزینه ۲ — تعریف کامل سه‌گانه اوربیت.

۲. چشم انسان از دیدگاه آناتومیک چگونه توصیف می‌شود؟

بافت یک ۳) است. گرفته قرار استخوانی حفره‌های در که است عصبی سیستم از بخشی ۲) ندارد. مرکزی عصبی سیستم با ارتباطی هیچ که مجزا اندام یک ۱) ماهیچه‌ای باقی‌مانده با منشأ غیرعصبی. ۴) یک ساختار کاملا مستقل که عملکرد آن صرفا به وترها وابسته است.

پاسخ استاد: گزینه ۲ — چشم زائده‌ای از دستگاه عصبی مرکزی است.

۳. ساختار هندسی اوربیت چگونه توصیف شده است؟

۱) کروی و متقارن. ۲) هرمی شکل با رأس در قسمت جلویی. ۳) هرمی چهاروجهی با رأس در قسمت خلفی (عقبی) و داخلی. ۴) استوانه‌ای شکل.

پاسخ استاد: گزینه ۳ — رأس در عقب و داخل، قاعده در جلو و خارج.

۴. شکل قاعده اوربیت به کدام صورت نزدیک‌تر است؟

۱) کاملا مربع. ۲) دایره کامل. ۳) حالتی بین مربع و دایره. ۴) بیضی نامنظم.

پاسخ استاد: گزینه ۳ — قاعده هم دایره‌مانند است و هم کمی حالت مربع دارد.

۵. وظیفه اصلی ابعاد اوربیت چیست؟

به مستقیم اتصال ۴) آسان. شکستن قابلیت و دیوار نازکی ۳) شدید. ضربات برابر در بالا مقاومت و استحکام ۲) چشم. از محافظت برای بالا انطباق‌پذیری و عرض ۱) عضلات حرکتی چشم.

پاسخ استاد: گزینه ۲ — لبه‌های محکم، سپر ضربه‌اند.

۶. کدام استخوان عمدتا در تشکیل لبه بالایی اوربیت نقش دارد؟

۱) استخوان گونه (Zygomatic). ۲) استخوان فک بالا (Maxilla). ۳) استخوان پیشانی (Frontal). ۴) استخوان اشکی (Lacrimal).

پاسخ استاد: گزینه ۳ — پیشانی، و در سه لبه از چهار لبه حضور دارد.

۷. لبه خارجی اوربیت از ترکیب کدام استخوان‌ها شکل گرفته است؟

۱) استخوان پیشانی و استخوان گونه. ۲) استخوان پیشانی و استخوان فک بالا. ۳) استخوان گونه و استخوان فک بالا. ۴) استخوان گیجگاهی و استخوان پیشانی.

پاسخ استاد: گزینه ۳ در پاسخ‌نامه؛ نکته آموزشی: پیشانی و گونه در لبه خارجی شریک‌اند و همین ترکیب، سپر خارجی اوربیت را می‌سازد.

۸. محکم‌ترین و ضخیم‌ترین دیواره اوربیت کدام است؟

۱) دیواره داخلی. ۲) دیواره خارجی. ۳) سقف اوربیت. ۴) کف اوربیت.

با (اختلاف دارد طرفی ضربات برابر در را مقاومت بیشترین و است ضخیم‌ترین خارجی دیواره آناتومیک، نظر از آموزشی: نکته صفحه؛ پاسخ‌نامه در ۱ گزینه استاد: پاسخ پاسخ‌نامه در کادر کهربایی ثبت شد).

۹. در صورت وقوع ضربه شدید، دیواره داخلی اوربیت چه واکنشی نشان می‌دهد؟

خارج سمت به ۴) می‌شود. کاسه داخل به چشم کره فرورفتگی باعث ۳) کند. جلوگیری چشم کره به مستقیم آسیب از تا می‌شکند ۲) می‌ماند. باقی تغییر بدون ۱) برجسته می‌شود.

پاسخ استاد: گزینه ۲ — شکستن کنترل‌شده، مکانیسم دفاعی است.

۱۰. کدام اوربیت چه ویژگی عملکردی در شرایط ضربه دارد؟

بالا فک سینوس داخل به چشم کره ضربه، صورت در تا شده طراحی ضعیف‌تر عمدا ۲) کند. جلوگیری خارجی جسم هرگونه ورود از تا است مقاوم شدت به ۱) (ماکزیالری) منتقل شود. ۳) محل اصلی قرارگیری عدسی است. ۴) مسیر خروجی اصلی عصب بینایی است.

پاسخ استاد: گزینه ۲ — همان منطق کف سست.

۱۱. محل غده اشکی در اوربیت کجاست؟

۱) در قسمت قدامی (جلویی) و داخلی اوربیت. ۲) در قسمت خلفی (عقبی) و خارجی اوربیت. ۳) در قسمت قدامی (جلویی) و خارجی اوربیت. ۴) در کف اوربیت.

پاسخ استاد: گزینه ۳ — حفره اشکی در قدام و خارج سقف.

۱۲. کدام جمله در مورد سیستم تخلیه اشک در اوربیت صحیح است؟

به اشکی غده از مستقیما اشک ۳) می‌کند. عبور اوربیت داخلی دیواره در اشکی کانال زیر از بینی-اشکی مجرای ۲) دارد. قرار اوربیت خارجی قسمت در اشکی کیسه ۱) سمت پلک‌ها تخلیه می‌شود. ۴) ناودان اشکی در بخش خارجی اوربیت قرار دارد.

پاسخ استاد: گزینه ۲ — مسیر ناودان اشکی → مجرای بینی-اشکی → میاتوس تحتانی.

۱۳. کدام گروه از اعصاب مغزی، شاخه‌هایی در ناحیه اطراف اوربیت دارند؟

۶). (زوج حرکتی ششم عصب و پنجم) (زوج سافلی عصب ۳) ۳). (زوج سوم عصب و پنجم) (زوج سافلی عصاب ۲) ۲). (زوج بینایی عصب و ۱) (زوج بویایی عصب ۱) ۴) عصب سافلی (زوج پنجم).

پاسخ استاد: گزینه ۴ — عصب سه‌قلو (زوج ۵) با شاخه‌های اشکی، پیشانی و بینی-مژگانی.

۱۴. ساختاری که از ورود فاسیای اوربیتال به پلک‌ها تشکیل می‌شود چیست؟

(Tarsal تارس صفحه Common) tendinous. (Orbital حلقه زین ۴) ring) septum. (Medial سپتوم اوربیتال ۳) ligament. palpebral (۲ پلک داخلی رباط ۱) .(plate

کادر در (اختلاف می‌سازند را اوربیتال سپتوم تحتانی، و فوقانی حاشیه در اوربیت فاسیای فلپ‌های همان بافتی، نظر از آموزشی: نکته پاسخ‌نامه؛ در ۱ گزینه استاد: پاسخ کهربایی ثبت شد).

۱۵. کدام توصیف در مورد بافت چربی در ناحیه اوربیت و پلک‌ها صحیح است؟

قدام چربی که حالی در شود، چشم برجستگی و پلک‌ها برجستگی باعث می‌تواند اوربیت پشت چربی افزایش ۲) می‌شود. یافت چشم داخلی قسمت در فقط چربی ۱) بر توجهی قابل تأثیرات ناحیه این در چربی بافت تغییرات و نوع ۴) ندارد. وجود چشم اطراف در چربی هیچ ۳) نمی‌کند. تغییر و است خالی ناحیه در پلک‌ها ناحیه در عملکرد و ظاهر دارد.

پاسخ استاد: گزینه ۲ — افزایش چربی پشت اوربیت ⇒ exophthalmos.

پاسخ‌نامه رسمی استاد

۱ ← ۲ · ۲ ← ۲ · ۳ ← ۳ · ۴ ← ۳ · ۵ ← ۲

۶ ← ۳ · ۷ ← ۳ · ۸ ← ۱ · ۹ ← ۲ · ۱۰ ← ۲

۱۱ ← ۳ · ۱۲ ← ۲ · ۱۳ ← ۴ · ۱۴ ← ۱ · ۱۵ ← ۲

پاسخ‌نامه عینا از پای صفحه ۱۶ جزوه ۱۴۰۴ نقل شده است. در دو پرسش (۸ و ۱۴) پاسخ‌نامه استاد با متن همان صفحه ناسازگار است؛ اختلاف در کادر کهربایی ثبت شده و متن درس بر پایه متن، نه پاسخ‌نامه، نوشته شده است.

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

یا فایل همین در آن شاهد که می‌خورد تیک وقتی فقط بند هر است. شده نوشته تیم به تحویل از پیش جزوه همین پذیرش برای چک‌لیست این در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

محتوا و منابع

- ☐ همه ۱۶ صفحه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱ آناتومی) دیده و بازنویسی شده است.
- ☐ همه ۱۲ صفحه جزوه ۱۴۰۲ خوانده و در پیوست نقشه شده است.
- ☐ هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد.
- ☐ هفده شکل از خود جزوه‌ها استخراج و در جای مرتبط با متن آمده‌اند.
- ☐ برای هر نکته افزوده، منبع واقعی و متمایز ذکر شده است.
- ☐ مباحثی که فقط در ۱۴۰۲ آمده‌اند (کره چشم و ضمائم) در شناسنامه صریح علامت خورده‌اند.

قالب و صفحه‌آرایی

- ☐ جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، مباحث، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- ☐ هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- ☐ هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه نیمه‌خالی بی‌دلیل وجود ندارد.
- ☐ فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

کنترل فنی

- ☐ شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- ☐ همه صفحه‌های PDF به‌صورت تصویری دیده شده‌اند.
- ☐ آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و شمارش شکل‌ها اجرا و نتیجه ثبت شده است.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. اوربیت را تعریف کنید و سه وظیفه آن را بنویسید.

۲. شکل کلی اوربیت چیست و رأس و قاعده آن کجا قرار دارد؟

۳. چهار استخوان سازنده لبه اوربیت را با موقعیت هر لبه بنویسید.

۴. سقف اوربیت از کدام استخوان‌ها ساخته می‌شود؟

۵. جدار داخلی از چه استخوان‌هایی تشکیل می‌شود و ویژگی استحکامی آن چیست؟

۶. کف اوربیت از چه بخش‌هایی ساخته می‌شود؟

۷. چرا جدار خارجی محکم‌ترین دیواره اوربیت است؟

۸. شکستن کف اوربیت چه مکانیسم دفاعی‌ای دارد؟

۹. فاصله دو جدار داخلی و زاویه جدار داخلی با خارجی چقدر است؟

۱۰. محور اوربیتال را تعریف کنید و زاویه آن با خط قدامی-خلفی چشم را بگویید.

۱۱. تفاوت محور اوربیتال و محور بینایی چیست؟

۱۲. تروکلئار فوسا کجاست و چه چیزی به آن می‌چسبد؟

۱۳. حفره اشکی (lacrimal fossa) جایگاه چیست؟

۱۴. ناودان اشکی از دو طرف با چه ستیغ‌هایی محدود می‌شود؟

۱۵. محل خاستگاه عضله مایل تحتانی کجاست؟

۱۶. تکمه ویتنال کجاست و چهار ساختار متصل به آن را نام ببرید.

۱۷. کانال بینایی بین کدام دو ساختار استخوانی قرار دارد و چه چیزی از آن می‌گذرد؟

۱۸. شش ارتباط اوربیت با نواحی مجاور را فهرست کنید.

۱۹. چرا عفونت بینی به‌راحتی به اوربیت می‌رسد؟

۲۰. چهار عارضه شکستگی جدار داخلی اوربیت را بنویسید.

۲۱. حلقه تاندون مشترک (زین) کجا قرار دارد و کدام عضلات از آن منشأ می‌گیرند؟

۲۲. پنج عنصر عبوری از شکاف کاسه چشمی فوقانی را نام ببرید.

۲۳. از شکاف کاسه چشمی تحتانی چه اعصابی می‌گذرند؟

۲۴. پری‌اوربیتا چیست و در عقب به چه ساختمانی ادامه می‌یابد؟

۲۵. سپتوم اوربیتال چگونه ساخته می‌شود؟

۲۶. دو زائده مهم فاسیای اوربیت را بنویسید.

۲۷. کپسول تنون از کجا تا کجا امتداد دارد و چرا چشم درون آن آزادانه حرکت می‌کند؟

۲۸. لیگامان‌های کنترل‌کننده داخلی و خارجی به کدام استخوان‌ها می‌چسبند؟

۲۹. رباط لاکوود چگونه ساخته می‌شود و چه نقشی دارد؟

۳۰. چهار وظیفه چربی اوربیت را بنویسید.

۳۱. اگزوفتالموس در بیماری گریوز چگونه ایجاد می‌شود؟

۳۲. سه لایه کره چشم را نام ببرید و سهم صلبیه و قرنیه را بنویسید.

۳۳. دو بخش شبکیه و وظیفه هر یک را بنویسید.

۳۴. مایع زلالیه کجا ساخته و از کجا جذب می‌شود؟

۳۵. تغییر تحدب عدسی در دید نزدیک و دور چگونه است؟

۳۶. سه لایه پلک را به ترتیب از سطح بنویسید.

۳۷. فورنیکس چیست و در کجا قرار دارد؟

۳۸. چرا یک‌پنجم داخلی پلک مژه ندارد؟

۳۹. مسیر حرکت اشک از غده تا بینی را بنویسید.

پاسخ‌های کوتاه

۱. استطاله‌ای از مغز در حفره استخوانی orbit؛ حفظ چشم و ضمائم از آسیب، فراهم کردن محل چسبندگی عضلات، و قرار دادن دقیق محور بینایی در جای خود.

۲. هرمی و چهاروجهی؛ رأس در عقب و داخل، قاعده در جلو و خارج (شکلی بین مربع و دایره).

۳. بالا: پیشانی؛ داخلی: پیشانی و فک بالا؛ خارجی: پیشانی و گونه؛ پایین: گونه و بخشی از فک بالا.

۴. پیشانی (frontal) و بال کوچک اسفنوئید؛ نسبتا محکم است.

۵. زائده پیشانی فک بالا، استخوان اشکی، صفحه اوربیتال اتموئید و جسم اسفنوئید؛ بسیار نازک و با فشار انگشت می‌شکند.

۶. بخش اعظم سطح اوربیتال فک بالا، جلو و خارج گونه، و عقب و داخل زائده اوربیتال استخوان کامی؛ سست است.

۷. چون بیشتر ترومای صورت از سطح خارجی وارد می‌شود؛ جدار خارجی سپر اول است.

۸. کره چشم به سمت داخل جابه‌جا می‌شود و جدار داخلی سست می‌شکند تا چشم بین دو دیواره له نشود؛ همچنین در ترومای کف، سقف سینوس ماکزیالری می‌شکند و چشم بدون فشار وارد سینوس می‌شود.

۹. ۲٫۵ سانتی‌متر؛ زاویه ۴۵ درجه.

۱۰. خط فرضی از رأس اوربیت به مرکز دهانه آن؛ هر محور اوربیتال با دیگری ۴۵ درجه و با خط قدامی-خلفی چشم ۲۲ تا ۲۳ درجه زاویه دارد.

۱۱. محور اوربیتال با هم ۴۵ درجه زاویه می‌سازند ولی دو محور بینایی با هم موازی‌اند، چون هر دو چشم به یک شیء نگاه می‌کنند.

۱۲. در قدام و داخل سقف؛ محل اتصال قرقره (trochlea) تاندون عضله مایل فوقانی.

۱۳. جایگاه غده اشکی، در قدام و خارج سقف.

۱۴. از جلو با ستیغ اشکی زائده پیشانی فک بالا و از خلف با ستیغ استخوان اشکی؛ جایگاه کیسه اشکی است.

۱۵. فرو رفتگی کوچک در قسمت قدامی و داخلی کف اوربیت.

۱۶. برآمدگی قابل لمس روی استخوان گونه در درون حاشیه اوربیت؛ رباط پلکی طرفی، بخشی از اپونوروز عضله بالابرنده پلک، رباط آویزان‌کننده کره چشم و رباط کنترل‌کننده خارجی.

۱۷. بین ریشه قدامی و خلفی بال کوچک اسفنوئید؛ عصب بینایی (زوج ۲) از آن می‌گذرد.

۱۸. شکاف فوقانی و کانال بینایی به حفره جمجمه قدامی؛ سقف به سینوس فرونتال؛ لامینا پاپیراسه به سلول‌های اتموئید؛ مجرای بینی-اشکی به میاتوس تحتانی بینی؛ کف به سینوس ماکزیالری؛ شکاف تحتانی به حفره‌های تمپورال و پتریگوپالاتین.

۱۹. چون لامینا پاپیراسه (دیواره استخوانی اتموئید) بسیار نازک است.

۲۰. آسیب بافت داخل کاسه چشم، دوبینی، اختلال تحرک کره چشم، و فرورفتگی چشم (enophthalmos).

۲۱. در ناحیه کانال بینایی، بالا و داخل و پایین دهانه آن؛ چهار عضله راست فوقانی، خارجی، تحتانی و داخلی از آن منشأ می‌گیرند.

۲۲. شاخه شریانی recurrent meningeal، ورید افتالمیک فوقانی، شاخه‌های فوقانی و تحتانی عصب حرکتی چشم (زوج ۳)، عصب زوج ۴، شاخه‌های عصب سه‌قلو (اشکی، پیشانی و بینی-مژگانی) و عصب زوج ۶.

۲۳. عصب زیرکاسه‌ای (شاخه ماکزیالری) و عصب گونه‌ای، و ورید افتالمیک تحتانی.

۲۴. پریوست پوشش اوربیت استخوانی که سست به استخوان می‌چسبد؛ در عقب به سخت‌شامه و غلاف عصب بینایی ادامه می‌یابد و در جلو به پریوست استخوان‌های حاشیه.

۲۵. از ادامه فلپ‌های فاسیای اوربیت در حاشیه فوقانی و تحتانی که وارد پلک‌ها می‌شود.

۲۶. زائده‌ای که قرقره فیبروزی تاندون مایل فوقانی را ثابت نگه می‌دارد، و فاسیای اشکی که روی ناودان اشکی پل می‌زند و کیسه اشکی را حمایت می‌کند.

۲۷. از عصب بینایی تا محل اتصال صلبیه و قرنیه؛ چون فاسیای اپی‌اسکرال آن را از صلبیه جدا می‌کند، چشم درون آن آزادانه حرکت می‌کند.

۲۸. داخلی به استخوان اشکی و خارجی به استخوان گونه.

۲۹. از ضخیم شدن قسمت تحتانی کپسول تنون و یکی شدن غلاف عضلات راست تحتانی و مایل تحتانی و دو رباط کنترل‌کننده؛ مانند تختخوابی زیر کره چشم قرار می‌گیرد و آن را نگه می‌دارد.

۳۰. بالشتک محافظ چشم و عصب بینایی و عروق؛ حفظ موقعیت کره چشم؛ کاهش اصطکاک برای حرکت عضلات؛ پر کردن فضای اوربیت.

۳۱. افزایش حجم چربی درون کاسه چشم در پرکاری تیروئید، کره چشم را به جلو می‌راند.

۳۲. فیبروزی (صلبیه ۵/۶ خلفی و قرنیه ۱/۶ قدامی)، عروقی (کوروئید، جسم مژگانی، عنبیه) و عصبی (شبکیه).

۳۳. لایه رنگدانه‌ای که نور اضافی را جذب و از نورون‌ها نگهداری می‌کند، و لایه عصبی که گیرنده‌ها و نورون‌های انتقال پیام را دارد.

۳۴. تولید در عروق جسم مژگانی، جذب از کانال اشلم به سیستم وریدی.

۳۵. نزدیک: انقباض عضلات مژگانی، شل شدن رشته‌های آویزان و افزایش تحدب؛ دور: شل شدن عضلات، کشیده شدن رشته‌ها و کاهش تحدب.

۳۶. پوست، لایه زیرپوست (بافت همبند سست و بی‌چربی)، عضله حلقوی چشم؛ سپس تارس و ملتحمه.

۳۷. چین محل تلاقی ملتحمه پلکی و چشمی.

۳۸. چون مژه‌ها در آن ناحیه رشد نمی‌کنند و همان یک‌پنجم، محل درناژ اشک به پونکتوم است.

۳۹. غده اشکی (فوقانی-خارجی) ← پخش روی قرنیه با پلک‌زدن ← دریاچه اشکی در گوشه داخلی ← پونکتوم فوقانی و تحتانی ← کیسه اشکی ← مجرای بینی-اشکی ← میاتوس تحتانی بینی.

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه اول · آناتومی

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

هفده شکل از جزوه‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۲ استخراج و ۱۵ جدول تازه‌چین به آن افزوده شده است.

نقشه مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۲ صفحه) در پیوست پایان جزوه آمده است.

گزارش کامل دامنه بررسی منابع، موارد اختلاف و کنترل‌های انجام‌شده همراه جزوه است.