HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن
جلسه ۱۱ – صورت

عضلات صورت، عصب هفتم و شاخه‌ها، شریان صورت، پاروتید و غدد بزاقی

جلسه ۱۱ از ۱۳ – جزوه درس (جلسه ۱۱)، دکتر میرزایی
متن: جزوه درس · توضیح‌های تکمیلی با ارجاع جداگانه
تصویر: جزوه درس · نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳
نسخه به‌روزشده جزوه‌نویسی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

متن درس و توضیح‌های تکمیلی با عنوان و ارجاع مشخص در مبحث‌ها آمده‌اند. هر مبحث شناسنامه، متن، شکل و برگه تحویل دارد.

جای شکل‌ها

قاب‌ها در مبحث مرتبط قرار گرفته‌اند؛ ممکن است قاب بزرگ به صفحه بعد منتقل شود. شرح هر تصویر در کنار همان قاب آمده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۱۱)، دکتر میرزایی؛ متن درس و توضیح‌های افزوده با ارجاع مجزا آمده‌اند. نتر و گری برای تصاویر و توضیح‌های مستند به همان منبع استفاده شده‌اند.

منابع تصویر

۱۴ قاب از جزوه درس · ۱۰ قاب از نتر · ۱۴ قاب از گری. منبع هر قاب در همان مبحث مشخص شده است.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد؛ ارجاع‌دهی و ویرایش بر همین شماره انجام می‌شود.

جزوه مادر برای کار جزوه‌نویسان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ شماره صفحه جزوه، شماره صفحه فایل منبع است؛ شماره صفحه چاپی، شماره پلیت و شماره شکل کتاب با برچسب خودشان مشخص می‌شوند.

۲ هر قاب تصویر عنوان و ارجاع منبع دارد؛ شرح فارسی، تصویر را به متن مبحث مرتبط می‌کند و عنوان اصلی در صورت وجود آمده است.

۳ برچسب‌های دوزبانه نام ساختارها یا راهنمای جهت‌یابی‌اند؛ در تصویر بدون برچسب، راهنما را جای برچسب چاپ‌شده فرض نکنید.

۴ متن درس و توضیح‌های آموزشی یا مقایسه منابع به‌صورت جداگانه و با ارجاع همان بخش خوانده می‌شوند.

۵ کادر یادداشت و برگه تحویل پایان هر مبحث برای ثبت نکته، پرسش، منابع و مشخصات جزوه‌نویس در نظر گرفته شده‌اند.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۱۱ فصل ۱۱ — جلسه ۱۱: عضلات صورت، عصب هفتم و شاخه‌ها، شریان صورت، پاروتید و غدد بزاقی ۴
۰۱ حدود صورت و عضلات سطحی ۵
۰۲ عضلات عمقی و گروه‌های سطحی ۹
۰۳ عضلات چشم و بینی ۱۲
۰۴ عضلات دهان: بخش اول ۱۵
۰۵ عضلات دهان و گوشی ۱۸
۰۶ عضلات گوشی و شریان فاسیال ۲۳
۰۷ شاخه‌های صورتی و شریان گیجگاهی سطحی ۲۶
۰۸ شریان اینفرااوربیتال و آغاز وریدها ۳۱
۰۹ وریدهای صورت ۳۶
۱۰ عصب فاسیال و شاخه‌های آن ۴۲
۱۱ عصب حسی سه‌قلو در صورت ۵۰
۱۲ ناحیه و غده پاروتید ۵۶
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۶۲
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۶۲

فصل ۱۱ · جلسه ۱۱

صورت

جزوه درس · نتر · گری

- ۱۲ مبحث · ۳۸ قاب تصویر
- متن هر مبحث با ارجاع، و هر تصویر با مشخصات منبع
- متن درس · شکل · جدول · راهنمای جزوه‌نویس

جلسه یازدهم

صورت و ناحیه پاروتید

منبع درس: دکتر میرزایی، گروه تشریح دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل ۱

حدود صورت و عضلات سطحی

مبحث ۱ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱ · پیش‌نیاز: حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

حدود صورت و عضلات سطحی

هدف یادگیری

حدود صورت در متن را روی نمای قدامی و طرفی دنبال کنید؛ اتصال پوستی عضلات حالت‌دهنده را از مبدأ استخوانی آن‌ها جدا کنید؟

پیش‌نیاز

حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

حدود صورت در متن را روی نمای قدامی و طرفی دنبال کنید.

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 1

بسمه تعالی

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 1

ناحیه صورت:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 1

شکل (۱) عضلات صورت

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 1

تصویر جزوه — حدود صورت و عضلات سطحی

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 1، شکل ۱



لایه‌های عضلات صورت را از پیشانی تا چانه دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 1، شکل ۱

ناحیه صورت ناحیه‌ای است که در پایین محدود می‌شود به خطی که این خط از symphis menti شروع و در امتداد کنار تحتانی فک تا زاویه فک و از زاویه فک تا زائده ماستوئید و از آنجا از طریق خط پس سری فوقانی به برجستگی پس سری بیرونی می‌رسد. حد فوقانی صورت خطی است که در جلو از قوس‌های ابرویی شروع و ادامه آن از انتهای خارجی قوس ابرویی به برجستگی پس سری بیرونی استخوان پس سری کشیده می‌شود. این خط در واقع ناحیه صورت را از اسکالپ جدا می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 1

عضلات ناحیه صورت عضلات ناحیه صورت را به دو دسته تقسیم می‌کنند:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 1

superficial یا سطحی:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 1

عضلاتی هستند که یک سر آنها به استخوان‌های صورت متصل و یک سر دیگر آنها به پوست صورت در نواحی مختلف متصل شده است. انقباض این عضلات سطحی حالاتی را مثل تبسم اخم و حالات شاد و اندوه در صورت ایجاد کرده بنابراین در کل موجب تغییر حالت صورت می‌شوند بنابراین به این عضلات عضلات حالت‌دهنده صورت یا muscle expression گفته می‌شود. این عضلات چون از کمان دوم برونشیال منشأ می‌گیرند بنابراین تماما توسط شاخه‌های عصب Facial عصب‌دهی می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 1

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

نمای طرفی گری نام عضلات سطحی و گوشی را در رابطه با پوست و لاله گوش نشان می‌دهد.

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۲ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۴، شکل ۸.۵۳

نمای مرجع — حدود صورت و عضلات سطحی

گری، ویراست ۳، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۲ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۴، شکل ۸.۵۳



عضلات سطحی را از پیشانی تا گردن با نمای اصل مقایسه کنید.

ارجاع متن: گری، ویراست ۳، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۲ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۴، شکل ۸.۵۳

نمای مرجع — حدود صورت و عضلات سطحی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۸، صفحه فایل ۱۰۰



عضلات سطحی، فاسیا و محل اتصال پوست را در نمای جانبی بیابید.

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۴۸، صفحه فایل ۱۰۰

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1 — حدود صورت و عضلات سطحی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 1؛ گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۲ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۴، شکل ۸.۵۳

- ☐ حدود صورت در متن را روی نمای قدامی و طرفی دنبال کنید.
- ☐ اتصال پوستی عضلات حالت‌دهنده را از مبدأ استخوانی آن‌ها جدا کنید.
- ☐ نام عضلات شکل اصل را با نمای جانبی مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نمای طرفی گری نام عضلات سطحی و گوشی را در رابطه با پوست و لاله گوش نشان می‌دهد.

پرسش باز: حدود صورت در متن را روی نمای قدامی و طرفی دنبال کنید؛ اتصال پوستی عضلات حالت‌دهنده را از مبدأ استخوانی آن‌ها جدا کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عضلات عمقی و گروه‌های سطحی

مبحث ۲ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۲ · پیش‌نیاز: حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عضلات عمقی و گروه‌های سطحی

هدف یادگیری

دو گروه عضلانی و عصب هر گروه را از هم تفکیک کنید؛ عضلات اطراف چشم، بینی و دهان را گروه‌بندی کنید؟

پیش‌نیاز

حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

دو گروه عضلانی و عصب هر گروه را از هم تفکیک کنید.

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 2

deep یا عمقی:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 2

عضلات عمقی تمام عضلات جونده یا muscle of mastigation که در عمل جویدن نقش دارند توسط شاخه حرکتی عصب مندیبولار شاخه‌ای از عصب سه قلو است تغذیه می‌کند. این عضلات از کمان دوم حلقی مشتق می‌شوند. شکل (۲)

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 2

تصویر جزوه — عضلات عمقی و گروه‌های سطحی

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 2، شکل ۲



نمای سطحی و عمقی را از نظر تمپورالیس، ماستر و پتریگوئیدها مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 2، شکل ۲

شکل (۲) عضلات عمقی صورت

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 2

عضلات سطحی: در سه ناحیه متمرکز و عبارتند از:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 2

۱) عضلات اطراف چشم شامل عضله مدور چشم یا orbicularis occuli و عضله درهم کشنده ابرو یا corrugator supercilli می‌باشند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 2

۲) عضلات اطراف بینی شامل nasalis-procerous یا عضله دقت یا عضله بینی و depressor septi یا پایین آورنده سپتوم بینی است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 2

۳) عضلات اطراف دهان که این عضلات شامل: aorbicularis oris یا عضله دور دهان، Levator Labi superior بالا برنده لب بالا و Levator Anguli oris یا بالا برنده گوشه دهان، Levator Labi superior and Aequenasi یا عضله بالا برنده لب بالا و کشنده پره بینی، Zygo-matic Major and Minor یا گونه‌ای بزرگ و کوچک، Depressor anguli oris یا پایین آورنده گوشه دهان، Depressor Labi inferior یا پایین آورنده لب پایین، mentalis یا عضله چانه‌ای [ادامه در صفحه ۳].

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 2

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

در نتر تمپورالیس و ماستر را نسبت به قوس گونه و راموس فک دنبال کنید؛ بوکسیناتور در مجاورت آن‌ها دیده می‌شود.

منبع: نتر، ویراست ۸، پلیت ۷۲، صفحه فایل ۱۲۴

پرسش باز برای بازبین

متن درس درباره کمان حلقی عضلات جونده عبارتی دارد که باید جداگانه با منابع جنین‌شناسی مقابله شود؛ آن عبارت در متن درس بدون اصلاح پنهان حفظ شده است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل ۲

نمای مرجع — عضلات عمقی و گروه‌های سطحی

نتر، پلیت ۷۲، صفحه فایل ۱۲۴



دو نمای تمپورالیس و ماستر را با یکدیگر و با شکل درس مقایسه کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۷۲، صفحه فایل ۱۲۴

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2 — عضلات عمقی و گروه‌های سطحی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 2؛ نتر، ویراست ۸، پلیت ۷۲، صفحه فایل ۱۲۴

- ☐ دو گروه عضلانی و عصب هر گروه را از هم تفکیک کنید.
- ☐ عضلات اطراف چشم، بینی و دهان را گروه‌بندی کنید.
- ☐ ماستر و تمپورالیس را در دو نمای شکل پیدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در نتر تمپورالیس و ماستر را نسبت به قوس گونه و راموس فک دنبال کنید؛ بوکسیناتور در مجاورت آن‌ها دیده می‌شود.

پرسش باز: دو گروه عضلانی و عصب هر گروه را از هم تفکیک کنید؛ عضلات اطراف چشم، بینی و دهان را گروه‌بندی کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عضلات چشم و بینی

مبحث ۳ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۳ · پیش‌نیاز: حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عضلات چشم و بینی

هدف یادگیری

سه بخش عضله دور چشم را با پلک و مجرای اشکی مقایسه کنید؛ بخش‌های عرضی و پره‌ای نازالیس را در تصویر دنبال کنید؟

پیش‌نیاز

حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

سه بخش عضله دور چشم را با پلک و مجرای اشکی مقایسه کنید.

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

Risorius یا عضله خندان

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

Buccinator یا عضله شیپوری می‌باشند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

• Orbicularis occuli

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

این عضله دارای سه بخش Orbital یا کاسه چشمی پلکی یا palpebral و اشکی یا Lacrimal است شکل (۱).

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

بخش orbital آن در گوشه داخلی چشم از زائده بینی استخوان پیشانی شروع شده و پس از دور زدن محیط قاعده اربیت به زائده پیشانی استخوان ماگزیلا ختم می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

بخش پلکی آن از رباط پلکی داخلی شروع و در سمت خارج به رباط پلکی خارجی اتصال پیدا می‌کند. (رباط پلکی داخلی پلک را به ستیغ اشکی قدامی و رباط پلکی خارجی پلک را در خارج به استخوان گونه وصل می‌کند)

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

بخش اشکی یا Lacrimal از ستیغ اشکی خلفی شروع شده و به جدار خارجی کیسه اشکی می‌چسبد. عضله مدور چشم در برابر نور خورشید چشم را محافظت کرده و بخش اشکی آن موجب وارد شدن اشک بداخل کیسه اشک شده تا از طریق مجرای nasolacrimal به مئاتوس تحتانی تخلیه شود. این عضله از شاخه گیجگاهی و گونه‌ای عصب فاسیال عصب می‌گیرد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

• Corrugators supercilli

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

این عضله از قسمت داخلی قوس ابرویی شروع شده و به پوست نیمه داخلی ابرو اتصال پیدا می‌کند. شکل (۱).

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

این عضله موجب چین در ابرو می‌شود. عصب این عضله از شاخه گیجگاهی عصب Facial است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

• Nazalis

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

این عضله دارای دو بخش Transverse و Alar است بخش transverse آن از برآمدگی canine فک بالا شروع شده و در روی بینی با transverse سمت مقابل مخلوط می‌شود. بخش Alar عضله از برآمدگی Insisive lateral شروع شده و به غضروف پره بینی اتصال پیدا می‌کند شکل (۱). عضله nasalis توسط شاخه Buccal عصب فاسیال تغذیه می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

• Depressor septi

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

از برجستگی Incisive میانی شروع شده و سپتوم بینی می‌چسبد و عمل آن این است که سپتوم بینی را به سمت پایین می‌کشد. عصب آن از عصب Buccal فاسیال است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

Procerous یا عضله دقت:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

از ریشه استخوان‌های بینی شروع شده و در بالا به پوست بینی دو ابرو می‌چسبد. انقباض این عضله موجب ایجاد یک خط عرضی بین دو ابرو می‌شود و شبیه حالتی که در دقت پدیدار می‌گردد. این عضله توسط شاخه Buccal عصب فاسیال تغذیه می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

دو نمای گری گروه چشمی و بینی را جداگانه نشان می‌دهند.

منبع: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۵ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۷، شکل‌های ۸.۵۴ و ۸.۵۵

نمای مرجع — عضلات چشم و بینی

گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۵ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۷، شکل ۸.۵۴



بخش پلکی و کاسه‌ای عضله و چین‌دهنده ابرو را در نمای چشم مقایسه کنید.

ارجاع متن: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۵ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۷، شکل ۸.۵۴

نمای مرجع — عضلات چشم و بینی

گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۵ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۷، شکل ۸.۵۵



بخش عرضی و پره‌ای عضله بینی و پایین‌آورنده تیغه را بیابید.

ارجاع متن: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۵ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۷، شکل ۸.۵۵

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3 — عضلات چشم و بینی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 3؛ گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۵ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۷، شکل‌های ۸.۵۴ و ۸.۵۵

- ☐ سه بخش عضله دور چشم را با پلک و مجرای اشکی مقایسه کنید.
- ☐ بخش‌های عرضی و پره‌ای نازالیس را در تصویر دنبال کنید.
- ☐ کارکرد و عصب عضلات بینی را جداگانه مرور کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

دو نمای گری گروه چشمی و بینی را جداگانه نشان می‌دهند.

پرسش باز: سه بخش عضله دور چشم را با پلک و مجرای اشکی مقایسه کنید؛ بخش‌های عرضی و پره‌ای نازالیس را در تصویر دنبال کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عضلات دهان: بخش اول

مبحث ۴ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۴ · پیش‌نیاز: حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عضلات دهان: بخش اول

هدف یادگیری

عضله دور دهان و عضلات بالابرنده را در تصویر مشخص کنید؛ مبدأ، محل اتصال و شاخه عصبی هر عضله را با متن مقایسه کنید؟

پیش‌نیاز

حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

عضله دور دهان و عضلات بالابرنده را در تصویر مشخص کنید.

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 4

Orbicularis oris:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 4

این عضله یک عضله مدور است که در ضخامت لبها قرار دارد. انقباض این عضله موجب جمع شدن دهان و غنچه شدن لبها می‌شود. عصب آن از شاخه Buccal عصب فاسیال است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 4

Levator Labi superior:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 4

این عضله از بالای سوراخ Infra orbital از لبه اربیت منشأ می‌گیرد و در پایین به لب فوقانی خاتمه پیدا می‌کند. عصب آن از شاخه Buccal عصب فاسیال است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 4

Levator Anguli oris:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 4

این عضله نسبت به عضله قبلی عمقی‌تر و از پایین سوراخ اینفرا اربیتال و برجستگی canine منشأ می‌گیرد و در پایین به گوشه لب خاتمه می‌یابد. عصب این عضله از شاخه Buccal عصب فاسیال است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 4

Levator labi superior and alaeque nasi:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 4

این عضله از زائده Frontal استخوان ماگزیلا منشأ می‌گیرد. در پایین بدو شاخه داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. شاخه خارجی به لب بالا و شاخه داخلی به پره بینی می‌چسبد. عصب آن از شاخه Buccal عصب فاسیال است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 4

Zygomaticus major and minor

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 4

عبارت فنی مندرج در اصل جزوه، عینا:
من برای خواندن دقیق و استخراج کامل متن از تصویر جدید آپلود شده(photo_1783690310606.jpeg)، از ابزار بازیابی فایل استفاده می‌کنم تا متن آن را بدون هیچ تغییری برای شما استخراج کنم.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 4

این عضلات در بالا از استخوان گونه منشأ می‌گیرند و در پایین به گوشه‌های خاتمه می‌یابند. عمل این عضلات این است که گوشه دهان را به سمت بالا خارج می‌برند عضله Zygomatic major از شاخه Zygomatic عصب فاسیال و Zygomatic Minor از شاخه buccal عصب فاسیال عصب می‌گیرد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 4

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

در تصویر عضلات به دور دهان و گره گوشه دهان نزدیک می‌شوند؛ جهت الیاف را دنبال کنید.

منبع: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۶ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۸، شکل ۸.۵۶

نمای مرجع — عضلات دهان: بخش اول

گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۶ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۸، شکل ۸.۵۶



عضله دور دهان و عضلات بالابرنده را نسبت به گوشه دهان دنبال کنید.

ارجاع متن: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۶ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۸، شکل ۸.۵۶

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4 — عضلات دهان: بخش اول

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 4؛ گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۶ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۸، شکل ۸.۵۶

- ☐ عضله دور دهان و عضلات بالابرنده را در تصویر مشخص کنید.
- ☐ مبدأ، محل اتصال و شاخه عصبی هر عضله را با متن مقایسه کنید.
- ☐ گونه‌ای بزرگ و کوچک را نسبت به گوشه دهان دنبال کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در تصویر عضلات به دور دهان و گره گوشه دهان نزدیک می‌شوند؛ جهت الیاف را دنبال کنید.

پرسش باز: عضله دور دهان و عضلات بالابرنده را در تصویر مشخص کنید؛ مبدأ، محل اتصال و شاخه عصبی هر عضله را با متن مقایسه کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عضلات دهان و گوشی

مبحث ۵ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۵–۶ · پیش‌نیاز: حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عضلات دهان و گوشی

هدف یادگیری

عضلات پایین‌آورنده، چانه‌ای و خندان را از بوکسیناتور تفکیک کنید؛ الیاف بوکسیناتور را نسبت به دهان و مجرای پاروتید ببینید؟

پیش‌نیاز

حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

عضلات پایین‌آورنده، چانه‌ای و خندان را از بوکسیناتور تفکیک کنید.

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 5 و 6

Depressor Anguli oris:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 5

این عضله در پایین به قسمت خارجی خط مایل استخوان مندیبل و در بالا به گوشه دهان می‌چسبد. عمل عضله گوشه دهان را به سمت پایین می‌کشاند عصب این عضله توسط شاخه Buccal عصب فاسیال و همچنین شاخه Marginal mandibular حاشیه‌ای فکی عصب فاسیال عصب می‌گیرد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 5

Depressor Labi inferior:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 5

از قسمت داخلی خط مایل شروع شده و در بالا به لب تحتانی خاتمه پیدا می‌کند. عصب آن از عصب Marginal Mandibular عصب فاسیال است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 5

Mentalis:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 5

این عضله از برجستگی Incisive فک پایین شروع شده و در پایین به پوست چانه اتصال پیدا می‌کند. عصب آن از Marginal mandibular عصب فاسیال است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 5

Resorious:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 5

این عضله از فاسیای غده پاروتید شروع شده و به سمت جلو و داخل می‌آید و به گوشه دهان خاتمه پیدا می‌کند انقباض عضله گوشه دهان را به طرفین کشیده و حالت تبسم در انسان ایجاد می‌کند. عصب از شاخه Buccal عصب فاسیال است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 5

Buccintor:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 5

شکل (۳) عضله بوکسیناتور

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 5

تصویر جزوه — عضلات دهان و گوشی

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 5، شکل ۳



بوکسیناتور را نسبت به مجرای پاروتید و ماستر پیدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 5، شکل ۳

الیاف این عضله در بالا به سطح خارجی زائده Alveolar استخوان فک بالا و در پایین به سطح خارجی زائده Alveolar مندیبل و در عقب الیاف به رباط pterygo Mandibular اتصال می‌یابد. که این رباط از زائده تریگوئید تا زاویه مندیبل کشیده می‌شود الیاف عضلانی این عضله به سه دسته فوقانی - میانی و تحتانی تقسیم می‌شوند. الیاف فوقانی به لب پایین و الیاف میانی به گوشه لب و الیاف تحتانی به لب بالا خاتمه پیدا می‌کند عمل این عضله در سوت زدن و فوت کردن است. و در شیپور زدن این عضله قوی است. این عضله توسط مجرای غده پاروتید سوراخ می‌شود. عصب این عضله از شاخه buccal عصب فاسیال است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 6

عضلات گوشی:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 6

شکل (۴) عضلات گوشی

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 6

تصویر جزوه — عضلات دهان و گوشی

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 6، شکل ۴



عضلات گوشی قدامی، فوقانی و خلفی را نسبت به لاله گوش تشخیص دهید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 6، شکل ۴

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

عضلات گوشی قدامی، فوقانی و خلفی را نسبت به لاله گوش در نما مقایسه کنید.

منبع: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۸ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۰، شکل ۸.۵۸

نمای مرجع – عضلات دهان و گوشی

گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۷ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۹، شکل ۸.۵۷



بوکسیناتور، رافه پتریگومندیبولار و مجرای پاروتید را نسبت به فک مقایسه کنید.

ارجاع متن: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۷ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۰۹، شکل ۸.۵۷

نمای مرجع – عضلات دهان و گوشی

گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۸ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۰، شکل ۸.۵۸



عضلات گوشی را در جلو، بالا و پشت لاله گوش بیابید.

ارجاع متن: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۸ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۰، شکل ۸.۵۸

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5 — عضلات دهان و گوشی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 5 و 6؛ گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۸ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۰، شکل ۸.۵۸

- [ ] عضلات پایین‌آورنده، چانه‌ای و خندان را از بوکسیناتور تفکیک کنید.
- [ ] الیاف بوکسیناتور را نسبت به دهان و مجرای پاروتید ببینید.
- [ ] سه عضله گوشی را در بالا، جلو و پشت گوش پیدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

عضلات گوشی قدامی، فوقانی و خلفی را نسبت به لاله گوش در نما مقایسه کنید.

پرسش باز: عضلات پایین‌آورنده، چانه‌ای و خندان را از بوکسیناتور تفکیک کنید؛ الیاف بوکسیناتور را نسبت به دهان و مجرای پاروتید ببینید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عضلات گوشی و شریان فاسیال

مبحث ۶ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۷–۸ · پیش‌نیاز: حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عضلات گوشی و شریان فاسیال

هدف یادگیری

مبدأ شریان فاسیال را از کاروتید خارجی و مسیر آن دور فک دنبال کنید؛ شاخه‌های گردنی ذکرشده را در شکل شناسایی کنید؟

پیش‌نیاز

حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

مبدأ شریان فاسیال را از کاروتید خارجی و مسیر آن دور فک دنبال کنید.

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 7 و 8

علاوه بر عضلات حالت‌دهنده صورت عضلاتی در اطراف گوش قرار دارند که از دومین کمان حلقی مشتق می‌شوند و شامل سه عضله گوشی فوقانی - قدامی و خلفی است عضله گوشی فوقانی و قدامی از کلاه خود نیامی یا galea apponeurotica منشأ گرفته و به قسمت جلو و بالای لاله گوش خاتمه پیدا می‌کند. اما عضله گوشی خلفی از زائده ماستوئید استخوان تمپورال منشأ می‌گیرد و به قسمت خلفی لاله گوش متصل می‌گردد این عضلات در انسان عمل ناچیزی دارند اما در حیواناتی مثل سگ و گربه موجب تغییر جهت لاله گوش به سمت منبع صوت می‌شود. عضلات گوشی قدامی و فوقانی از شاخه گیجگاهی عصب فاسیال و عضله گوشی خلفی از شاخه خلفی عصب فاسیال عصب‌دهی می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 7

عروق صورت:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 7

شریان‌های تغذیه‌کننده صورت شامل:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 7

۱. شریان فاسیال: این شریان شریان اصلی تغذیه‌کننده صورت است در بالای شاخ بزرگ استخوان هیوئید از شریان کاروتید خارجی جدا شده و از عمق غده بزاقی sub Mandibular عبور کرده و حدود چهار سانتیمتر جلوتر از زاویه مندیبل کنار تحتانی فک را دور زده و وارد صورت می‌شود و بطور مایل صورت را به سمت زاویه داخلی چشم طی می‌کند و در زاویه داخلی چشم با شاخه‌های انتهایی شریان کاروتید داخلی آناستوموز پیدا می‌کند. این شریان در صورت در جلو ورید فاسیال قرار می‌گیرد. و نسبت به آن عمقی‌تر است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 7

شاخه‌های شریان فاسیال:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 7

این شاخه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند ۱- شاخه‌های گردنی شامل شریان‌های sub، Tonsilar، Ascending palatine mental، sub mandibular می‌باشند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 7

شکل (۵) شاخه‌های گردنی عروق صورت

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 8

تصویر جزوه — عضلات گوشی و شریان فاسیال

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 8، شکل ۵



شاخه‌های گردنی فاسیال را نسبت به کاروتید خارجی و فک دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 8، شکل ۵

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

شریان فاسیال و شاخه‌های گردنی را نسبت به مندیبل و کاروتید خارجی دنبال کنید.

منبع: نتر، پلیت ۹۹، صفحه فایل ۱۵۱

نمای مرجع — عضلات گوشی و شریان فاسیال

نتر، پلیت ۹۹، صفحه فایل ۱۵۱



شاخه‌های گردنی فاسیال را نسبت به مندیبل و کاروتید بیرونی دنبال کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۹۹، صفحه فایل ۱۵۱

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6 — عضلات گوشی و شریان فاسیال

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 7 و 8؛ نتر، پلیت ۹۹، صفحه فایل ۱۵۱

- ☐ مبدأ شریان فاسیال را از کاروتید خارجی و مسیر آن دور فک دنبال کنید.
- ☐ شاخه‌های گردنی ذکرشده را در شکل شناسایی کنید.
- ☐ عضلات گوشی و شاخه‌های عصب فاسیال را مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

شریان فاسیال و شاخه‌های گردنی را نسبت به مندیبل و کاروتید خارجی دنبال کنید.

پرسش باز: مبدأ شریان فاسیال را از کاروتید خارجی و مسیر آن دور فک دنبال کنید؛ شاخه‌های گردنی ذکرشده را در شکل شناسایی کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شاخه‌های صورتی و شریان گیجگاهی سطحی

مبحث ۷ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۹–۱۰ · پیش‌نیاز: حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

شاخه‌های صورتی و شریان گیجگاهی سطحی

هدف یادگیری

شاخه‌های لبی، بینی و زاویه‌ای را از شریان فاسیال دنبال کنید؛ شریان گیجگاهی سطحی را در جلوی گوش و شاخه‌هایش را مقایسه کنید؟

پیش‌نیاز

حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

شاخه‌های لبی، بینی و زاویه‌ای را از شریان فاسیال دنبال کنید.

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 9 و 10

۲- شاخه صورتی شامل شریان‌های:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 9

شکل (۶) شاخه‌های صورتی عروق صورت

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 9

تصویر جزوه – شاخه‌های صورتی و شریان گیجگاهی سطحی

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 9، شکل ۶



شاخه‌های بینی، لبی و زاویه‌ای را نسبت به شریان فاسیال بیابید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 9، شکل ۶

Lateral nasal، Angular، Inferoir labial، superior labial می‌باشند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 9

شریان inferior labial این شریان پس از جدا شدن از شریان فاسیال در زیر مخاط لب تحتانی قرار می‌گیرد و با شریان لبی تحتانی سمت مقابل آناستوموز می‌دهد. این شریان نسبت به عضله مدور دهان عمقی‌تر است و لب پایین را تغذیه می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 9

شریان superiorlabial پس از جدا شدن از شریان فاسیال در زیر مخاط لب فوقانی قرار می‌گیرد و نسبت به عضله مدور دهان عمقی‌تر است. این شریان با شریان لبی فوقانی سمت مقابل آناستوموز می‌دهد و لب بالا را تغذیه می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 9

شریان‌های Lateral nasal این شاخه‌ها در شیار بین بینی و گونه از شریان فاسیال جدا شده و قسمت‌های خارجی بینی را تغذیه می‌کنند و با شریان dorsal nasal شاخه شریان ophthalmic پیوند می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 10

Angular branch این شریان شاخه انتهایی شریان فاسیال است که در گوشه داخلی چشم قرار می‌گیرد و با شاخه‌های شریان کاروتید داخلی پیوند می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 10

۲) شریان گیجگاهی سطحی: یکی از شاخه‌های انتهایی شریان کاروتید خارجی است که در داخل غده پاروتید در مجاورت کنار خلفی گردن مندیبل جدا می‌شود. این شریان از جلوی لاله گوش عبور کرده و وارد ناحیه اسکالپ می‌شود. شاخه‌های این شریان عبارتند از: شکل (۶)

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 10

(a) شریان عرضی صورتی یا Trans verse facial a.: این شریان بصورت عرضی و در زیر قوس گونه به سمت جلو می‌آید و با شریان Infra orbital شاخه شریان Maxillary و شاخه‌های شریان فاسیال آناستوموز می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 10

(b) شریان گوشی قدامی یا Anterior Auricular a: این شریان قسمت جلو لاله گوش را تغذیه می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 10

(c) شریان گونه‌ای - کاسه چشمی a Zygomatico orbital: این شریان بطور مایل از روی استخوان گونه عبور کرده و متوجه اربیت می‌گردد و عناصر اطراف استخوان گونه را تغذیه می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 10

(d) شریان تمپورال عمقی میانی یا a. deep middle temporal شاخه‌ای است که پس از جدا شدن از شریان گیجگاهی سطحی عضله temporalis را سوراخ می‌کند و در قسمت عمقی عضله با شریان‌های گیجگاهی عمقی قدامی و خلفی شاخه‌های شریان ماگزیلاری آناستوموز پیدا می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 10

(e) شریان پیشانی یا frontal.a

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 10

(t) شریان آهیانه یا aparietal.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 10

دو شاخه بعدی شریان گیجگاهی سطحی شاخه فرونتال و پاریتال وارد ناحیه اسکالپ شده و قسمت‌های طرفی اسکالپ را تا درز ساژیتال فوقانی تغذیه می‌کنند نبض شریان گیجگاهی سطحی بلافاصله در جلو لاله گوش قابل لمس است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 10

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

نمای عروقی، شریان‌ها و وریدهای هم‌نام را نسبت به صورت نشان می‌دهد.

منبع: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۶ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۸، شکل ۸.۶۴

نمای مرجع — شاخه‌های صورتی و شریان گیجگاهی سطحی

نتر، پلیت ۶۰، صفحه فایل ۱۱۲



شاخه‌های لبی، بینی و زاویه‌ای را نسبت به عضلات و اعصاب ببینید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۶۰، صفحه فایل ۱۱۲

نمای مرجع – شاخه‌های صورتی و شریان گیجگاهی سطحی

گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۶ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۸، شکل ۸.۶۴



نمای سطحی عروق صورت و نمای شاخه‌های ماگزیلاری را مقایسه کنید.

ارجاع متن: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۶ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۸، شکل ۸.۶۴

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7 — شاخه‌های صورتی و شریان گیجگاهی سطحی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 9 و 10؛ گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۶ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۸، شکل ۸.۶۴

- ☐ شاخه‌های لبی، بینی و زاویه‌ای را از شریان فاسیال دنبال کنید.
- ☐ شریان گیجگاهی سطحی را در جلوی گوش و شاخه‌هایش را مقایسه کنید.
- ☐ آناستوموزها را نسبت به شریان افتالمیک و ماگزیلاری بخوانید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نمای عروقی، شریان‌ها و وریدهای هم‌نام را نسبت به صورت نشان می‌دهد.

پرسش باز: شاخه‌های لبی، بینی و زاویه‌ای را از شریان فاسیال دنبال کنید؛ شریان گیجگاهی سطحی را در جلوی گوش و شاخه‌هایش را مقایسه کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شریان اینفرااوربیتال و آغاز وریدها

مبحث ۸ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۱–۱۲ · پیش‌نیاز: حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

شریان اینفرااوربیتال و آغاز وریدها

هدف یادگیری

شریان اینفرااوربیتال را از شکاف تا سوراخ و سطح صورت دنبال کنید؛ شاخه‌های افتالمیک را نسبت به پلک و پیشانی بیابید؟

پیش‌نیاز

حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

شریان اینفرااوربیتال را از شکاف تا سوراخ و سطح صورت دنبال کنید.

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 11 و 12

Infra orbital (۳

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 11

شکل (۷) شریان اینفرا اوربیتال

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 11

تصویر جزوه — شریان اینفرااوربیتال و آغاز وریدها

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 11، شکل ۷



شریان اینفرااوربیتال را در نمای عمقی و نسبت به اربیت ببینید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 11، شکل ۷

شکل (۸) شریان اینفرا اربیتال در صورت

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 11

تصویر جزوه — شریان اینفرااوربیتال و آغاز وریدها

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 11، شکل ۸



شریان اینفرااوربیتال را نسبت به پلک و گوشه داخلی چشم در نمای قدامی بیابید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 11، شکل ۸

شاخه‌ای است که از سومین قسمت شریان ماگزیلاری جدا می‌شود شکل (۷) از طریق شکاف کاسه چشمی تحتانی همراه با عصب Infra onbital وارد اربیت شده و پس از طریق ناودان - مجرا و سوراخ infra orbital عبور کرده و وارد صورت می‌شود. شاخه‌های این شریان در پلک تحتانی، ناحیه گونه، خارج بینی و لب فوقانی پخش می‌گردد شکل (۸).

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 12

۴) Supra orbital, supra Trochlear

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 12

ایندو شریان شاخه‌های شریان افتالمیک هستند که از اربیت و از طریق بریدگی فوق کاسه چشمی و بریدگی فرونتال عبور کرده و وارد ناحیه پیشانی می‌شوند. ایندو شریان پلک فوقانی و ناحیه قدامی اسکالپ تا vertex جمجمه را تغذیه می‌کنند. شکل (۸).

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 12

وریدهای صورت:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 12

شکل (۹) وریدهای صورت

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 12

تصویر جزوه — شریان اینفرااوربیتال و آغاز وریدها

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 12، شکل ۹



وریدهای فاسیال و رترومندیبولار را تا ژوگولار دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 12، شکل ۹

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

نمای قدامی و جانبی عروق پلک و کاسه چشم را با شاخه‌های بالای و زیر اربیت مقایسه کنید.

منبع: نتر، پلیت ۱۱۵، صفحه فایل ۱۶۷

نمای مرجع — شریان اینفرااوربیتال و آغاز وریدها

نتر، پلیت ۱۱۵، صفحه فایل ۱۶۷



سه نمای عروق اربیت و پلک را با شاخه‌های اینفرااوربیتال و افتالمیک مقایسه کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۱۱۵، صفحه فایل ۱۶۷

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8 — شریان اینفرااوربیتال و آغاز وریدها

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 11 و 12؛ نتر، پلیت ۱۱۵، صفحه فایل ۱۶۷

- ☐ شریان اینفرااوربیتال را از شکاف تا سوراخ و سطح صورت دنبال کنید.
- ☐ شاخه‌های افتالمیک را نسبت به پلک و پیشانی بیابید.
- ☐ در شکل وریدها از گوشه چشم به پایین مسیر را دنبال کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نمای قدامی و جانبی عروق پلک و کاسه چشم را با شاخه‌های بالای و زیر اربیت مقایسه کنید.

پرسش باز: شریان اینفرااوربیتال را از شکاف تا سوراخ و سطح صورت دنبال کنید؛ شاخه‌های افتالمیک را نسبت به پلک و پیشانی بیابید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

وریدهای صورت

مبحث ۹ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۳ · پیش‌نیاز: حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

وریدهای صورت

هدف یادگیری

ورید زاویه‌ای و فاسیال را نسبت به گوشه چشم و شریان مقایسه کنید؛ دو شاخه رترومندیبولار و مقصد ژوگولار آن‌ها را تفکیک کنید؟

پیش‌نیاز

حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

ورید زاویه‌ای و فاسیال را نسبت به گوشه چشم و شریان مقایسه کنید.

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 13

وریدهای صورت شامل ورید فاسیال و ورید گیجگاهی سطحی است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 13

۱- ورید فاسیال: در گوشه داخلی چشم ورید فاسیال از بهم پیوستن وریدهای supra Trochlear, supra orbital ورید Angulur تشکیل و در شیار بین بینی و گونه به سمت پایین می‌آید وریدهای خارجی بینی - ورید لبی فوقانی و تحتانی را دریافت می‌کند. در صورت ورید فاسیال نسبت به شریان فاسیال عقب‌تر و سطحی‌تر است. ورید فاسیال پس از وارد شدن به گردن با شاخه قدامی ورید رترومندیبولار ورید common facial را تشکیل می‌دهند که این ورید به ورید ژوگولار داخلی تخلیه می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 13

۲- ورید گیجگاهی سطحی: این ورید تمام وریدهای همراه شاخه‌های شریان گیجگاهی سطحی را دریافت می‌کند و در داخل غده پاروتید به ورید ماگزیلاری متصل شده و تشکیل ورید رترو مندیبولار را می‌دهد. ورید رترو مندیبولار در عقب گردن مندیبل به دو شاخه خلفی و قدامی تقسیم می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 13

شاخه خلفی آن به ورید گوشی خلفی متصل شده و ورید ژوگولار خارجی را تشکیل و شاخه قدامی آن به ورید فاسیال ملحق شده و ورید فاسیال مشترک را می‌سازد که نهایتا به ورید ژوگولار داخلی می‌ریزد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 13

• اعصاب ناحیه صورت:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 13

شکل (۱۰) اعصاب صورت

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 13

تصویر جزوه — وریدهای صورت

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 13، شکل ۱۰



شاخه‌های عصب فاسیال را پس از خروج و نسبت به پاروتید و مجرا دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 13، شکل ۱۰

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

نمای تکمیلی، ارتباطات وریدی عمقی و نقشه لنفی را به‌صورت دو مسیر متفاوت نشان می‌دهد.

منبع: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۸ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۲۰، شکل‌های ۸.۶۵ و ۸.۶۶

تفکیک تصویر تکمیلی

نقشه لنفی و مسیرهای وریدی دو دستگاه متفاوت‌اند؛ تصویر لنفی افزوده‌ای آموزشی است، نه بخشی از فهرست وریدهای اصل.

منبع: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۸ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۲۰، شکل ۸.۶۶

نمای مرجع — وریدهای صورت

نتر، پلیت ۱۰۰، صفحه فایل ۱۵۲



ورید فاسیال، رترومندیبولار و ژوگولارها را در نمای طرفی دنبال کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۱۰۰، صفحه فایل ۱۵۲

نمای مرجع — وریدهای صورت

گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۸ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۲۰، شکل ۸.۶۵



ارتباط ورید صورت با ورید افتالمیک و شبکه پتریگوئیدی را دنبال کنید.

ارجاع متن: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۸ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۲۰، شکل ۸.۶۵

نمای مرجع – وریدهای صورت

گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۸ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۲۰، شکل ۸.۶۶



گره‌های لنفی زیرچانه‌ای، تحت فکی و پاروتید را ببینید؛ این مسیر لنفی است، نه وریدی.

ارجاع متن: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۸ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۲۰، شکل ۸.۶۶

- **نمودار رابطه‌ها — تخلیه وریدی صورت و رترومندیبولار**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. سوپراتروکلئار و سوپرااوربیتال ← ورید زاویه‌ای | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتحاد
2. ورید زاویه‌ای ← ورید فاسیال | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ادامه
3. ورید فاسیال ← ورید صورتی مشترک | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتحاد
4. شاخه قدامی رترومندیبولار ← ورید صورتی مشترک | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتحاد
5. ورید صورتی مشترک ← ژوگولار داخلی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تخلیه
6. شاخه خلفی و اوریکولار خلفی ← ژوگولار خارجی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتحاد

تمرین خواندن نمودار: پیکان‌ها را با متن و تصویر همین مبحث تطبیق دهید.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل ۱۳؛ نتر، پلیت ۱۰۰، صفحه فایل ۱۵۲

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9 — وریدهای صورت

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 13؛ گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۸ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۲۰، شکل‌های ۸.۶۵ و ۸.۶۶

- ☐ ورید زاویه‌ای و فاسیال را نسبت به گوشه چشم و شریان مقایسه کنید.
- ☐ دو شاخه رترومندیبولار و مقصد ژوگولار آن‌ها را تفکیک کنید.
- ☐ رابطه ورید صورت با شبکه عمقی و سینوس را در نمای تکمیلی ببینید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نمای تکمیلی، ارتباطات وریدی عمقی و نقشه لنفی را به‌صورت دو مسیر متفاوت نشان می‌دهد.

پرسش باز: ورید زاویه‌ای و فاسیال را نسبت به گوشه چشم و شریان مقایسه کنید؛ دو شاخه رترومندیبولار و مقصد ژوگولار آن‌ها را تفکیک کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عصب فاسیال و شاخه‌های آن

مبحث ۱۰ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۴–۱۶ · پیش‌نیاز: حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عصب فاسیال و شاخه‌های آن

هدف یادگیری

عصب هفتم و شاخه‌های داخل و خارج استخوان را جدا کنید؛ رشته‌های حرکتی، چشایی و خودکار را در شماتیک تفکیک کنید؟

پیش‌نیاز

حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

عصب هفتم و شاخه‌های داخل و خارج استخوان را جدا کنید.

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 14 و 15 و 16

عصب حرکتی ناحیه صورت عصب فاسیال و عصب حسی آن سه شاخه عصب سه قلو یا Trigeminal می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 14

۱- عصب فاسیال: شکل (۱۰)

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 14

این عصب دارای دو ریشه حسی و حرکتی می‌باشد. شاخه حرکتی آن از هسته حرکتی زوج ۷ مشتق و نهایتا به عضلات حالت‌دهنده صورت عصب می‌دهد. اما شاخه حسی آن، حس چشایی ۲/۳ قدامی زبان را به هسته solitary منتقل می‌کند. قسمت حرکتی آن همچنین حاوی رشته‌های پاراسمپاتیک است که برخی از این رشته‌های پاراسمپاتیک از هسته بزاقی فوقانی منشأ و موجب ترشح غده بزاقی تحت فکی و زیرزبانی می‌گردد و برخی دیگر از رشته‌های پاراسمپاتیک از هسته Lacrimomuconasal منشأ می‌گیرند. که نهایتا موجب ترشح غدد مخاطی ناحیه بینی کام نرم و غده اشکی می‌گردد. دو ریشه عصب زوج هفت بهم دیگر متصل شده و وارد مجرای گوش درونی می‌گردد و در عمق مجرای گوش داخلی ایجاد گانگلیونی بنام geniculate یا زانویی می‌کند سپس عصب وارد استخوان پتروز تمپورال شده و با یک مسیر افقی در زیر مخاط جدار داخلی صندوق صماخ و یک مسیر عمودی در ضخامت جدار خلفی صندوق صماخ طی مسیر کرده و نهایتا از سوراخ stylomastoid از جمجمه خارج می‌گردد و وارد غده پاروتید می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 14

در درون غده پاروتید عصب به دو تنه گیجگاهی - صورتی temp ro facial و گردنی - صورتی cervico facial تقسیم می‌شود که هر یک از این تنه‌ها به سه شاخه تقسیم می‌گردند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 14

شاخه‌های تنه گیجگاهی - صورتی عبارتند از:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 14

(a) شاخه تمپورال (b) شاخه گونه‌ای (C) شاخه بوکال فوقانی

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 14

شاخه‌های تنه گردنی - صورتی عبارتند از:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 14

(a) بوکال تحتانی (b) مارجینال مندیبولار (c) شاخه سرویکال

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 14

شاخه‌های عصب فاسیال:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 14

به دو دسته داخل استخوانی و خارج استخوانی تقسیم می‌شوند:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 14

۱- شاخه‌های داخل استخوانی چهار شاخه‌اند:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 14

(a grater petrosal nerve یا عصب خاره‌ای بزرگتر: این عصب از گانگلیون زانویی جدا شده پس از عبور هیاتوس فالوپ وارد سطح قدامی پتروز می‌شود و در شیار مخصوص خود حرکت می‌کند. از طریق سوراخ lacerum از جمجمه خارج می‌گردد. سپس به عصب deep petrosal متصل شده و عصب can al vidian را تشکیل می‌دهد و این عصب از طریق کانال vidian یا مجرای تریگوئید عبور کرده وارد حفره تریگوپالاتین می‌شود و در گانگلیون تریگوپالاتین سیناپس می‌کند. و رشته‌های پس عقده‌ای آن از طریق شاخه‌های عصب Maxillary نهایتا موجب ترشح غده مخاطی کام نرم و حفره بینی و غده اشک می‌گردد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 14

(b) Geniculo tympanic: این عصب به شاخه تمپانیک زوج ۹ متصل شده و عصب lesser petrosal را تشکیل می‌دهد. عصب lesser petrosal از طریق هیاتوس فالوپ فرعی وارد سطح قدامی پتروز شده و پس از عبور از سوراخ بیضی در گانگلیون otic سیناپس می‌کند. رشته‌های پس عقده‌ای این عصب همراه عصب گوشی گیجگاهی یا Auriculo Temporal که شاخه‌ای از تنه خلفی عصب مندیبولار است وارد غده پاروتید شده و موجب ترشح این غده می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 15

(C) عصب برای عضله رکابی (Nerve to stapedius muscle) :

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 15

این عصب زمانیکه عصب فاسیال در جدار خلفی صندوق صماخ قرار گرفته از عصب فاسیال جدا می‌گردد و از کانال مخصوص خود که در جدار خلفی صندوق صماخ است به عضله رکابی رسیده و این عضله را عصب می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 15

(d) عصب طناب صماخی یا chorda tympani: این عصب پنج میلیمتر بالاتر از سوراخ stylomastoid از عصب فاسیال جدا شده وارد کانال مخصوص خود در جدار خلفی صندوق صماخ می‌شود. این عصب از مرز بین جدار خارجی و جدار خلفی صندوق صماخ وارد صندوق صماخ شده و در زیر مخاط جدار خارجی صندوق صماخ و در بالای پرده صماخ و در سمت داخل دسته استخوان چکشی به سمت جلو حرکت کرده و از شیار پتروتیمپانیک از صندوق صماخ خارج می‌شود. این عصب دارای دو نوع رشته بوده یکسری از رشته‌هایش رشته‌های پیش عقده‌ای پاراسمپاتیک است که پس از سیناپس در گانگلیون ساب مندیبولار موجب ترشح غدد بزاقی تحت فکی و زیر زبانی می‌گردد و یکسری از رشته‌هایش مربوط به حس چشایی ۲/۳ قدامی می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 15

اگر این عصب قطع گردد موجب اختلال ترشح غدد بزاقی Sub mandibular و sub lingual و موجب از بین رفتن حس چشایی ۲/۳ قدامی زبان می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 15

۲) شاخه‌های خارج استخوانی شامل چهار شاخه‌اند:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 15

شکل (۱۱) شاخه‌های خارج استخوانی عصب فاسیال

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 15

تصویر جزوه — عصب فاسیال و شاخه‌های آن

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 15، شکل ۱۱



شاخه‌های عصب فاسیال و شاخه گوشی خلفی را نسبت به غده پیدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 15، شکل ۱۱

الف) Posterior Auricular nerve یا عصب گوشی خلفی به بطن پس سری عضله پیشانی پس سری و عضله گوشی خلفی عصب می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 16

ب) عصب بطن خلفی دیگاستریک و استیلوهیوئید پایین‌تر از شاخ قبلی جدا شده و بطن خلفی عضلات دیگاستریک و استیلوهیوئید را عصب می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 16

ج) تنه Tempofacial: این تنه به سه شاخه گیجگاهی، گونه‌ای و شاخه بوکال فوقانی تقسیم می‌شود شاخه گیجگاهی آن به عضلات گوشی قدامی - گوشی فوقانی - مدور چشم - بطن پیشانی عضله پیشانی- پس سری و عضله چین‌دهنده ابرو عصب می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 16

شاخه zygomatic: این شاخه به عضلات گونه‌ای بزرگ و عضله مدور چشم عصب می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 16

شاخه بوکال فوقانی: با عصب بوکال تحتانی تنه گردنی صورتی با هم عصب بوکال را ایجاد می‌کنند که این عصب به عضلات گونه‌ای کوچک - بالا برنده لب بالا - بالا برنده گوشه دهان - بالابرنده لب بالا و پره بینی - عضله هرمی - عضله مدور دهان - عضله شیپوری - عضله خندان - عضله بینی - عضله پایین‌آورنده سپتوم بینی و عضله پایین‌آورنده گوشه دهان عصب می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 16

تنه- سرویکوفاسیال Cervico facial

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 16

به سه شاخه عصبی بوکال تحتانی- مارجینال مندیبولار و سرویکال تقسیم می‌شود. عصب حاشیه فکی در حاشیه فک در زیر عضله پلاتیسما حرکت می‌کند و به عضلات پایین‌آورنده لب پایین و چانه‌ای عصب می‌دهد. شاخه گردنی عصب فاسیال پس از عبور از عقب زاویه مندیبل وارد گردن شده و به عضله پلاتیسما عصب می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 16

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

در نتر مسیر عصب هفتم و مسیر زوج نهم تا گانگلیون گوشی با رنگ‌های متفاوت مشخص شده‌اند.

منبع: نتر، پلیت ۱۵۰، صفحه فایل ۲۰۲؛ پلیت ۱۶۱، صفحه فایل ۲۱۳

تفاوت برای بازبین

در متن درس پیوند شاخه ژنیکولوتیمپانیک با پتروزال کوچک بیان شده است. در شماتیک نتر، عصب تمپانیک از زوج نهم به شبکه تمپانیک و پتروزال کوچک می‌رسد؛ نسبت و منشأ رشته‌ها را برای بازبین به‌طور مستقل مقایسه کنید.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل ۱۵؛ نتر، پلیت ۱۶۱، صفحه فایل ۲۱۳

نمای مرجع – عصب فاسیال و شاخه‌های آن

نتر، پلیت ۱۵۰، صفحه فایل ۲۰۲



شاخه‌های VII، رشته چشایی و مسیرهای خودکار را از هم تفکیک کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۱۵۰، صفحه فایل ۲۰۲

نمای مرجع – عصب فاسیال و شاخه‌های آن

نتر، پلیت ۱۶۱، صفحه فایل ۲۱۳



مسیر زوج IX، شبکه تمپانیک، پتروزال کوچک و گانگلیون گوشی تا پاروتید را دنبال کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۱۶۱، صفحه فایل ۲۱۳

نمای مرجع – عصب فاسیال و شاخه‌های آن

گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۵ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۷، شکل ۸.۶۳



شاخه‌های قبل از ورود به پاروتید و شاخه‌های انتهایی عصب هفتم را در دو نما مقایسه کنید.

ارجاع متن: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۵ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۷، شکل ۸.۶۳

- **نمودار رابطه‌ها — تنه‌ها و شاخه‌های عصب فاسیال در صورت**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. عصب فاسیال ← تنه گیجگاهی‌صورتی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تقسیم
2. عصب فاسیال ← تنه گردنی‌صورتی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تقسیم
3. تنه گیجگاهی‌صورتی ← گیجگاهی و گونه‌ای | رابطه پیکان از گره اول به دوم: شاخه
4. تنه گیجگاهی‌صورتی ← بوکال فوقانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: شاخه
5. تنه گردنی‌صورتی ← بوکال تحتانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: شاخه
6. تنه گردنی‌صورتی ← مارژینال مندیبولار و گردنی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: شاخه

تمرین خواندن نمودار: پیکان‌ها را با متن و تصویر همین مبحث تطبیق دهید.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل ۱۴ و ۱۶؛ گری، شکل ۸.۶۳، صفحه فایل ۱۴۵، چاپی ۹۱۷

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10 — عصب فاسیال و شاخه‌های آن

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 14 و 15 و 16؛ نتر، پلیت ۱۵۰، صفحه فایل ۲۰۲؛ پلیت ۱۶۱، صفحه فایل ۲۱۳

- ☐ عصب هفتم و شاخه‌های داخل و خارج استخوان را جدا کنید.
- ☐ رشته‌های حرکتی، چشایی و خودکار را در شماتیک تفکیک کنید.
- ☐ مسیر ترشح پاروتید را با نمودار گانگلیون گوشی مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در نتر مسیر عصب هفتم و مسیر زوج نهم تا گانگلیون گوشی با رنگ‌های متفاوت مشخص شده‌اند.

پرسش باز: عصب هفتم و شاخه‌های داخل و خارج استخوان را جدا کنید؛ رشته‌های حرکتی، چشایی و خودکار را در شماتیک تفکیک کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عصب حسی سه‌قلو در صورت

مبحث ۱۱ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۷–۱۸ · پیش‌نیاز: حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عصب حسی سه‌قلو در صورت

هدف یادگیری

V1، V2 و V3 را با قلمرو پوستی صورت مقایسه کنید؛ عصب بوکال حسی مندیبولار را از شاخه بوکال حرکتی فاسیال جدا کنید؟

پیش‌نیاز

حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

V1، V2 و V3 را با قلمرو پوستی صورت مقایسه کنید.

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 17 و 18

اعصاب حسی صورت:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 17

شکل (۱۲) اعصاب حسی و حرکتی صورت

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 17

تصویر جزوه — عصب حسی سه‌قلو در صورت

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 17، شکل ۱۲



در نمای طرفی شاخه حسی گوشی‌گیجگاهی را از شاخه‌های حرکتی فاسیال جدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 17، شکل ۱۲

حس صورت توسط سه شاخه عصب سه قلو تأمین می‌شود و شاخه‌های آن عبارتند از:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 17

۱) شاخه ophthalmic: این عصب توسط چهار شاخه خود که شامل اعصاب سوپرا ترکلئار و سوپرا اربیتال شکل (۸) حس ناحیه پیشانی و پلک فوقانی و عصب اینفرا ترکلئار حس گوشه داخلی چشم - قسمت داخلی پلک‌ها و حس کیسه اشک و عصب نازوفرونتال حس ریشه بینی پشت بینی تا نوک بینی را تأمین می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 17

۲) شاخه Maxillary: شاخه دوم عصب زوج ۵ توسط شاخه‌های zygomaticatemporal و Infra orbital، zygomaticafacial به ترتیب حس قسمت قدامی ناحیه گیجگاهی - حس ناحیه گونه - حس پلک تحتانی و حس صورت پایین شکاف پلکی تا شکاف دهانی و حس پره‌های بینی را تأمین می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 17

۳) عصب Mandibular: توسط شاخه‌های Auriculotemporal حس ناحیه گیجگاهی به جز ناحیه قدامی و inferior alveolar حس آرواره پایین و لب تحتانی و بوکال حس قسمتی از ناحیه گونه را تأمین می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 18

نکته: عصب بوکال مندیبولار حسی ولی عصب بوکال فاسیال حرکتی است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 18

شکل (۱۳) اعصاب حسی صورت

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 18

تصویر جزوه — عصب حسی سه‌قلو در صورت

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 18، شکل ۱۳



عصب ماگزیلاری و شاخه‌های اینفرااوربیتال و زایگوماتیک را در عمق دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 18، شکل ۱۳

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

قلمرو سه شاخه سه‌قلو در نما رنگ‌بندی شده است؛ شاخه‌های حرکتی عصب هفتم را با آن یکی نگیرید.

منبع: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۳ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۵، شکل ۸.۶۲

نمای مرجع — عصب حسی سه‌قلو در صورت

نتر، پلیت ۷۹، صفحه فایل ۱۳۱



شاخه‌های افتالمیک و ماگزیلاری را نسبت به اربیت و سوراخ‌ها دنبال کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۷۹، صفحه فایل ۱۳۱

نمای مرجع – عصب حسی سه‌قلو در صورت

گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۲ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۴، شکل ۸.۶۱



خروج شاخه‌های سه‌قلو و شاخه‌های سطح صورت را نسبت به جمجمه دنبال کنید.

ارجاع متن: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۲ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۴، شکل ۸.۶۱

نمای مرجع – عصب حسی سه‌قلو در صورت

گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۳ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۵، شکل ۸.۶۲



قلمرو سه شاخه حسی را با نواحی گردنی و گوش مقایسه کنید.

ارجاع متن: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۳ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۵، شکل ۸.۶۲

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11 — عصب حسی سه‌قلو در صورت

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 17 و 18؛ گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۳ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۵، شکل ۸.۶۲

- [ ] V1، V2 و V3 را با قلمرو پوستی صورت مقایسه کنید.
- [ ] عصب بوکال حسی مندیبولار را از شاخه بوکال حرکتی فاسیال جدا کنید.
- [ ] عصب اینفرااوربیتال و زایگوماتیک را در رابطه با اربیت دنبال کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

قلمرو سه شاخه سه‌قلو در نما رنگ‌بندی شده است؛ شاخه‌های حرکتی عصب هفتم را با آن یکی نگیرید.

پرسش باز: V1، V2 و V3 را با قلمرو پوستی صورت مقایسه کنید؛ عصب بوکال حسی مندیبولار را از شاخه بوکال حرکتی فاسیال جدا کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ناحیه و غده پاروتید

مبحث ۱۲ از ۱۲ · صفحه‌های جزوه: ۱۹–۲۰ · پیش‌نیاز: حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

ناحیه و غده پاروتید

هدف یادگیری

حدود ناحیه پاروتید را نسبت به گوش، فک و عضلات تعیین کنید؛ عصب، ورید رترومندیبولار و شریان کاروتید خارجی را در غده از سطح به عمق مقایسه کنید؟

پیش‌نیاز

حدود جمجمه، عضلات گردن و مسیر عروق و اعصاب سر و گردن

راهنمای خواندن شکل

حدود ناحیه پاروتید را نسبت به گوش، فک و عضلات تعیین کنید.

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 19 و 20

ناحیه پاروتید:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 19

شکل (۱۴) ناحیه و غده پاروتید

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 19

تصویر جزوه — ناحیه و غده پاروتید

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 19، شکل ۱۴



غده و مجرای پاروتید را با عضلات، رگ‌ها و عصب صورت مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 19، شکل ۱۴

ناحیه‌ای است در صورت که جایگاه قرارگیری غده بزاقی پاروتید است. محدوده پاروتید شامل:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 19

محدوده فوقانی آن external acoustic meatus (سوراخ گوش بیرونی) و مفصل T.M.j و محدوده تحتانی آن زاویه مندیبل و محدوده خلفی آن کنار قدامی عضله استر نوکلیدو ماستوئید و بطن خلفی دیگاستریک و محدوده قدامی آن عضله Masseteric- راموس مندیبل و عضله تریگوئید داخلی می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 19

غده پاروتید:

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 20

این غده توسط لایه سطحی و عمقی فاسیای Investing غلاف شده و مجاورت خارجی آن با فاسیای و پوست صورت است.

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 20

مجاورت سطحی داخلی آن با غلاف کاروتید و با واسطه فضای طرفی حلق با عضله تنگ‌کننده فوقانی حلق است. در ضخامت غده سه عنصر عصب فاسیال-ورید رترو مندیبولار و شریان کاروتید بیرونی از سطح به عمق عبور می‌کنند شکل (۱۴).

منبع: جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 20

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

نمای جانبی مجرا و مقطع عرضی رابطه عناصر درون پاروتید را با فک و ماستر نشان می‌دهد.

منبع: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۹ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۱، شکل ۸.۵۹

نمای مرجع — ناحیه و غده پاروتید

گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۱ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۳، شکل ۸.۶۰

برش محوری آموزشی را برای مقایسه محل پاروتید، فک و کاروتید بخوانید؛ عنوان کتاب وجود ضایعه را در این نمونه نشان می‌دهد و جای تشخیص مستقل نیست.

ارجاع متن: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۴۱ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۳، شکل ۸.۶۰

نمای مرجع — ناحیه و غده پاروتید

نتر، پلیت ۷۰، صفحه فایل ۱۲۲



غده، مجرا، بوکسیناتور و عروق را در نمای طرفی مقایسه کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۷۰، صفحه فایل ۱۲۲

نمای مرجع — ناحیه و غده پاروتید

گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۹ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۱، شکل ۸.۵۹



عصب، ورید و شریان درون غده را در مقطع عرضی با نمای جانبی مقایسه کنید.

ارجاع متن: گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۹ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۱، شکل ۸.۵۹

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12 — ناحیه و غده پاروتید

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۱، صفحه فایل 19 و 20؛ گری، فصل ۸، صفحه فایل ۱۳۹ از بخش ۸۰۱–۱۰۰۰، چاپی ۹۱۱، شکل ۸.۵۹

- ☐ حدود ناحیه پاروتید را نسبت به گوش، فک و عضلات تعیین کنید.
- ☐ عصب، ورید رترومندیبولار و شریان کاروتید خارجی را در غده از سطح به عمق مقایسه کنید.
- ☐ مجرا را نسبت به ماستر و بوکسیناتور دنبال کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نمای جانبی مجرا و مقطع عرضی رابطه عناصر درون پاروتید را با فک و ماستر نشان می‌دهد.

پرسش باز: حدود ناحیه پاروتید را نسبت به گوش، فک و عضلات تعیین کنید؛ عصب، ورید رترومندیبولار و شریان کاروتید خارجی را در غده از سطح به عمق مقایسه کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی و چک‌لیست

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — حدود صورت و عضلات سطحی	حدود صورت در متن را روی نمای قدامی و طرفی دنبال کنید.	☐
مبحث ۲ — عضلات عمقی و گروه‌های سطحی	دو گروه عضلانی و عصب هر گروه را از هم تفکیک کنید.	☐
مبحث ۳ — عضلات چشم و بینی	سه بخش عضله دور چشم را با پلک و مجرای اشکی مقایسه کنید.	☐
مبحث ۴ — عضلات دهان: بخش اول	عضله دور دهان و عضلات بالابرنده را در تصویر مشخص کنید.	☐
مبحث ۵ — عضلات دهان و گوشی	عضلات پایین‌آورنده، چانه‌ای و خندان را از بوکسیناتور تفکیک کنید.	☐
مبحث ۶ — عضلات گوشی و شریان فاسیال	مبدأ شریان فاسیال را از کاروتید خارجی و مسیر آن دور فک دنبال کنید.	☐
مبحث ۷ — شاخه‌های صورتی و شریان گیجگاهی سطحی	شاخه‌های لبی، بینی و زاویه‌ای را از شریان فاسیال دنبال کنید.	☐
مبحث ۸ — شریان اینفرااوربیتال و آغاز وریدها	شریان اینفرااوربیتال را از شکاف تا سوراخ و سطح صورت دنبال کنید.	☐
مبحث ۹ — وریدهای صورت	ورید زاویه‌ای و فاسیال را نسبت به گوشه چشم و شریان مقایسه کنید.	☐
مبحث ۱۰ — عصب فاسیال و شاخه‌های آن	عصب هفتم و شاخه‌های داخل و خارج استخوان را جدا کنید.	☐
مبحث ۱۱ — عصب حسی سه‌قلو در صورت	V1، V2 و V3 را با قلمرو پوستی صورت مقایسه کنید.	☐
مبحث ۱۲ — ناحیه و غده پاروتید	حدود ناحیه پاروتید را نسبت به گوش، فک و عضلات تعیین کنید.	☐

چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۱۱

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

ادامه این مجموعه در جلسه بعد دنبال می‌شود:

- جلسه ۱۲: جنین‌شناسی جمجمه.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۱۱ از ۱۳ — صورت: عضلات، عصب صورت و غدد بزاقی

تصویرها از جزوه، نتر و گری · متن از جزوه درس