

Den gylne sonen

1. Den gode nyheten om terskeltrening

De fleste mosjonister tror de må trene hardere for å bli bedre – hardere intervaller, høyere intensitet. I praksis fører dette ofte til stagnasjon, vedvarende sårhet i muskulaturen og en følelse av at treningen stadig blir tyngre uten at formen følger med.

Løsningen er ikke å øke, men å treffe riktig. Når du senker intensiteten litt og finner den kontrollerbare, bærekraftige belastningen, gir kroppen tilpasning uke etter uke. Dette er ikke teori – det er en erfaring fra over 25 års praksis.

2. Bakgrunnen – Frognerparken, 1998

Vinteren 1998–99 trente forfatteren med gruppen til Ingrid Kristiansen – tidligere verdensrekordholder på 5000 m, 10 000 m og maraton – i Frognerparken. Han lå alltid midt i flokken, aldri foran.

Sommeren etter løp han 5000 meter på 13:22, over ett minutt raskere enn de andre fra de samme vintertreningene. Ingrid kommenterte at hun ikke hadde sett dette komme. Svaret var enkelt: han var den eneste som trente med riktig intensitet. De andre kjempet seg gjennom øktene. Han holdt igjen.

For du trenger ikke streve og lide deg gjennom løpeøktene for å bli en bedre løper.

3. Hva er terskeltrening?

Terskeltrening er trening med fokus på et helt spesifikt, men smalt treningsområde. Kjernen er enkel:

Terskelfarten er den farten du kan opprettholde i omtrent én time på en dag der alt klaffer.

For de fleste løpere befinner dette seg i landskapet mellom 10 km-farten og halvmaratonfarten. På denne intensiteten:

- Klarer du å si tre til fem ord om gangen – korte fraser, ikke hele setninger
- Vil det for mange si at du trener i en treningssone mellom 80–87 % av makspuls
- Føles som arbeid, men ikke overanstrengende
- Opplever du at du kan holde på lenge med samme kontroll
- Er du dagen etter fin i kroppen, ikke utslitt

Mange som trener med fokus på terskeltrening kjenner igjen denne følelsen: I stedet for å kjempe mot kroppen, jobber du med den.

4. Kenya versus Norge – en illustrerende kontrast

I Kenya var atmosfæren rundt trening helt annerledes enn i Norge. Hjemme var hardøker synonymt med tung pust, knallhard konkurranse og grenser som ble presset til bristepunktet. I Kenya trente de lokale løperne med en kontroll og selvbevissthet som virket nesten mystisk.

Forfatteren trente aldri i nærheten av total utmattelse i Kenya. Han jobbet hardt, men innenfor en ramme som virket bærekraftig. Målinger viste etterpå at norske løperes treningsintensitet lå betydelig lavere – dette inspirerte ham til å justere sin egen intensitet enda bedre.

5. Laktatbalansen – to piler

Frank Evertsen forklarte fysiologien med en enkel tegning: Kroppen produserer og fjerner laktat konstant. Ved lavt tempo produseres lite laktat og det fjernes lett. Øker du tempoet, produseres mer, men kroppen fjerner også mer.

Det fine er at evnen til å fjerne og bruke laktat kan trenes – og det er nettopp en av grunnene til at trening i den gylne sonen fungerer så godt.

Spørsmålet ble tydeligere: Hvordan strukturere treningen for å teste ulike tilnærminger på seg selv, måle responsen og raffinere over tid.

6. Den gylne sonen – ditt optimale terskelområde

Etter mange år med testing og justering fant forfatteren at han fikk klart best effekt når størstedelen av den harde treningen lå litt på den trygge siden av terskelen. Dette treningsområdet kalte han den gylne sonen – det vil si terskeltrening, men med en bevisst konservativ tilnærming.

Når jeg bruker ordet terskeltrening her, mener jeg i praksis trening opp til, men ikke for mye rett på eller over terskelen.

Figur 1.1 – Intensitetsskala med den gylne sonen (80–87 % av HRmax)

60 % Lett	70 % Rolig	80 % Terskel start	87 % Terskel slutt	100 % Maks
---------------------	----------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------

Den gylne sonen er markert i gult (80–87 % av HRmax)

Snakketesten: Du er i den gylne sonen når du kan si en setning på 3–5 ord før du må trekke pusten. Kan du prate fritt, er du for rolig. Klarer du bare enkelord, er du for hard.

7. Hva skjer i kroppen i den gylne sonen?

I den gylne sonen skjer mange ting samtidig og passe mye, men ikke for mye:

Fysiologiske tilpasninger

System	Hva som skjer
Mitokondrier	Energifabrikkene får nok stimuli til å bli flere og bedre
Glykogen	Forbruket er betydelig, men du tærer deg ikke fullstendig
Hormoner	Responsen utfordres, men uten overdreven nedbryting
Laktat	Kroppen trenes i å produsere laktat og håndtere det effektivt

Belastningen er dessuten betydelig mer mekanisk skånsom på muskulatur og sener enn ved høyere intensiteter, noe som reduserer skaderisikoen. Farten er likevel høy nok til å forbedre løpsøkonomien – nær konkurransefart.

8. Hva betyr den gylne sonen i praksis?

Fra et praktisk perspektiv åpner treningsbelastningen i den gylne sonen dører som ellers ville vært stengt:

- Erfarne løpere kan noen dager gjennomføre kvalitetsøkter samme dag – essensen av dobbel terskel
- Restitusjonen går så raskt at du er klar for ny kvalitetstrening med friske bein kort tid etterpå
- Ferske løpere kan trene med stabil fremgang uke for uke, uten kjedelige perioder med skader eller overbelastning

Du blir sliten av volumet, ikke intensiteten.

Dette er grunnen til at mange løpere opplever gjennombrudd: De er ikke overbelastet, alltid klar for mer. Du bygger uten å bryte ned og får en reell treningseffekt uten den brennende følelsen i beina.

Figur 1.2 – Sammenligning av treningssoner

	Rolig	Grå sone	Den gylne sonen	Høyintensiv
Snakketesten	Kan prate fritt	Hele setninger	3-5 ord før pust	Bare enkelord
Intensitet (HRmax)	<70 %	70–80 %	80–87 %	>90 %
Laktatnivå	Lavt	Moderat	2–3 mmol/L	Akkumulerer
Treningseffekt	Lav	Begrenset	Høy ✓	Høy
Muskulær belastning	Lav ✓	Moderat	Moderat ✓	Høy
Restitusjonstid	Kort ✓	Middels	Middels ✓	Lang
Egnet for hyppig trening	Ja ✓	Nei	Ja ✓	Nei

9. Teknisk forklaring – den gylne sonen og laktat

For godt trente løpere tilsvarer den gylne sonen omtrent 2,3–3,0 mmol/L laktat, med individuelle variasjoner mellom 2,0 og 3,5 mmol/L. Dette er under den tradisjonelle «4-terskelen» som mange lærebøker refererer til. Verdien 4,0 mmol/L har vært brukt som standard terskel siden 1970-tallet – et pedagogisk verktøy, men et forenklet tall.

Gjennom tusenvis av treningsøkter, målinger og evalueringer endte forfatteren opp i et smalt, men svært effektivt treningsområde – den gylne sonen.

10. Oppsummering

IKKE HARDERE, MEN RIKTIG. De fleste tror de må trene hardere. Problemet er at det sjelden fungerer over tid. Terskeltrening handler om å treffe riktig intensitet, ikke maksimal.

TERSKELFARTEN DIN. Farten du kan holde i omtrent én time. For de fleste et sted mellom 10 km-fart og halvmaratonfart.

DEN GYLNE SONEN. Litt under terskelen, ikke rett på. Du får tilpasningene, men med lavere risiko og raskere restitusjon.

SLIK KJENNER DU DEN IGJEN. Du kan si tre til fem ord om gangen. Pulsene ligger mellom 80–87 % av makspuls. Det føles som arbeid, men ikke overanstrengende. Du er fin i kroppen dagen etter.

HVA SOM SKJER I KROPPEN. Mitokondriene stimuleres. Laktatbalansen trenes. Muskulaturen belastes betydelig mindre enn ved høyere intensitet.

BYGG UTEN Å BRYTE NED. Du blir sliten av volumet, ikke intensiteten. Kroppen tilpasser seg fordi den får muligheten til det.

Neste steg – finn din terskel

I kommende kapitler presenteres konkrete treningsøkter med terskeltrening, dobbel terskel og 45/15-intervaller. Men først må du finne ut hvor denne spesielle sonen befinner seg for akkurat deg. Det finnes flere gode metoder for å finne terskeldintensitet uten laboratorieutstyr, og når metodene kombineres og du forstår hvordan resultatene tolkes, er de absolutt gode nok for praktisk bruk.

Det første steget er alltid å finne ut hvor du faktisk står i dag.

Fire rammer for terskeltrening

Da forfatteren trente mot sin personlige rekord på 5000 meter (13:06), lå farten på rolige turer rundt 4:10-4:20 min/km - langsommere enn mange lopere med svakere personlige rekorder. Fotballspillere fra Valerenga hengte seg på og syntes det var flaut sakte. Men hver gang han lot farten krype oppover på hviledagene, merket han det på de harde øktene: tyngre bein, terskelintervallene i ubalanse. Så han holdt igjen - under 70 % av makspuls, hele turen.

Kapitlet presenterer fire konkrete rammer som gjør terskeltreningen optimal.

Ramme 1 - Løp helt rolig på de rolige treningsturene

Alle tiltenkte rolige treningsdager bør løpes i sin helhet under 70 % av makspuls, enten du løper noen ganger i uken eller daglig. For mange mosjonister betyr det 5:00-6:30 min/km, kanskje saktere. Fristelsen til å presse tempoet fordi det føles lett er farlig: konsekvensen er tyngre bein på kvalitetsøkene og økt risiko for skader.

Figur 3.1 - Alle rolige treningsdager bør løpes under 70 % av maksimalpuls



Respekter rolige treningsdager

Effekten av trening i sonen rett over rolig er begrenset, mens belastningen øker relativt mye. Det er en dårlig byttehandel. Er du i tvil, senk alltid farten.

Praktisk tips

Bruk pulsklokke på de rolige turene for å ha kontroll på nettopp pulsen. Dette er fundamentet som gjør at du klarer å absorbere terskeltrening med tilstrekkelig overskudd og bygger en trygg kondisjonsbase samtidig.

Effekten av trening i sonen rett over rolig er begrenset, mens belastningen øker relativt mye - en dårlig byttehandel. Muskeltonus er grunnleggende spenningsnivå i muskulaturen. Høy muskeltonus betyr mer indre motstand og stivere muskulatur. Du ønsker at muskeltonus går ned mellom harde treningsdager - dagene mellom harde øker bør skjermes helt for å få til dette.

Da er det heller fritt frem for virkelig å eksperimentere og plassere inn ekstra trening på terskeldagene.

Ramme 2 - Skjerm dagene mellom de harde øktene

En stor fordel med terskeltrening er at mange opplever flere gode treningsdager med mer overskudd og bedre generell treningsfølelse. For å få til dette må du respektere dagene mellom belastningene - dette handler i stor grad om muskulatur. Muskeltonus må få gå ned mellom harde treningsdager.

Spenning i muskeltonus gir sprekere bein på de harde treningsøktene. Begrens hurtighet, styrke og annen type belastning på rolige dager - anbefal rolig løping, ingenting annet. Da er det fritt frem for å eksperimentere og plassere inn ekstra trening på terskeldagene.

Ramme 3 - Varier innenfor terskelområdet

Kroppen tilpasser seg forbløffende raskt til ensformig belastning - dette gjelder spesielt for terskeltrening. Gi den samme belastningen uke etter uke, og kroppen finner den mest økonomiske måten å håndtere det på. Resultatet er frustrerende platåer i resultater og progresjon.

Variasjon forhindrer tilvenning, stimulerer ulike energisystemer, reduserer mental kjedsomhet og minimerer skaderisiko fra repetitiv belastning. Variasjonen trenger ikke å være veldig stor, men heller ikke for stor.

Variasjonstyper

Intervallengdevariasjon: Veksle mellom korte, mellomlange og lange intervaller gjennom uken eller fra uke til uke

Intensitetsvariasjon: Fra under terskel (maratontempo) til rett på terskel (halvmaratontempo) til litt over terskel (15 km-tempo)

Pausevariasjon: Pauselengden påvirker hvordan kroppen responderer, spesielt på de kortere intervallene

Underlagsvariasjon: Variasjon mellom bane, asfalt, grus og tredemølle

Intervaller slår kontinuerlig terskeløping

Etter å ha testet begge tilnærminger grundig i arevis er forfatteren overbevist om at intervaller er overlegne sammenlignet med sammenhengende løping for de fleste formål og nivåer.

Mikrorestitusjon

Når du løper sammenhengende terskeløkt (eks. 30 min), ser vi gradvis økning i muskeltonus gjennom økten. Musklene blir stivere, og samspillet mellom nerver og muskler påvirkes.

De korte pausene i intervalltrening gir det som kalles mikrorestitusjon. På bare 30-90 sekunder skjer en kaskade av tilpasninger: Muskeltonus normaliseres delvis, pH-balansen forbedres, nervesystemet får en kort hvile.

Resultatet er at du løper betydelig mer tid ved lavintensiteten med lavere total stress på kroppen - og 5-15 sekunder raskere per kilometer sammenlignet med kontinuerlig løping på samme belastningsnivå.

I dag vet vi mer. Intervallbasert terskeltrening gir et fartselement uten å ofre kontroll eller effekt.

Intervallbasert trening øker gjennomsnittsfarten i økten uten å ødelegge intensjonen med terskeltreningen. Du får med deg både terskeltreningen og fartselementet i samme økt, og kan inkludere progressive 45/15-intervaller for å oppnå enda høyere fart.

Maraton som unntak

For halvmaraton og maraton kan lengre, kontinuerlige lopsdrag på 20-40 minutter gi tilpasninger som er vanskelig å oppnå gjennom intervaller alene. Du utvikler mental utholdenhet ved konstant tempo, trener på fartsberegning til konkurranse og bygger spesifikk utholdenhet. For maratonspesifikke uker brukes kontinuerlige terskelvarianter systematisk og i stort omfang.

For halvmaraton og maraton kan lengre kontinuerlige lopsdrag på 20-40 minutter gi tilpasninger som er vanskelig å oppnå gjennom intervaller alene.

Intervallengde og variasjon

Hvilken intervallengde bør du velge? Alle har sin plass, men den største feilen er å bare holde seg til en type:

- * **Korte intervaller (1-3 min):** Lar deg holde høyere kvalitet. En økt på 30 x 1 minutt gir 30 minutters terskelarbeid, fordelt slik at hver repetisjon føles overkommelig.
- * **Mellomlange intervaller (4-10 min):** Kjernen i terskeltreningen. Klassikere: 6 x 6 min med 1 min pause, 4 x 10 min med 90 sek pause, 6 x 5 min med 45 sek pause.
- * **Lange intervaller (11-20 min):** Laerer kroppen å opprettholde stabilt tempo. Brukes sparsomt, kanskje en gang per 10.-14. dag.
- * **Veldig korte intervaller (20-45 sek):** Helt annerledes - behandles grundig i kapitlet om 45/15.

Blandede økter

Noen av de beste øktene kombinerer flere lengder i samme økt - særlig for mosjonister med begrenset antall treningsøkter i uken:

- * 3 x 10 min med 90 sek pause, etterfulgt av 10 x 45/15 etter noen minutters lett jogg
- * Pyramideøkt: 3-6-9-6-3 min med 90 sek pause, gjerne avsluttet med 5-10 x 20/20
- * Nedtrappingsøkt: 10-8-6-4-2-1 min med gradvis høyere hastighet

Forste og siste intervall

Praktisk tips

Pass på at første og siste intervall ikke er for intensive. Start litt for forsiktig - kanskje 5-7 sekunder saktere enn malfart. Avslutt gjerne med de korteste intervallene - det hjelper med å senke muskeltonus for neste dag.

Nokkelpoeng: Resultatet ved stor variasjon innenfor terskelsonen er at du nettopp fanger opp denne variasjonen og gir viktige tilpasninger som ensformige økter ikke kan oppnå alene.

Pauselengde

Poenget med pausen er å gi systemet en kort normalisering mellom intervallene. Disse er utgangspunkt, ikke absolutte regler:

PAUSELENGDE
1-2 min intervaller: 30 sek-1 min pause
3-6 min intervaller: 1-1:30 min pause
10+ min intervaller: 1:30-2 min pause

Ramme 4 - Oppvarming og nedjogg

For de fleste løpere vil en kort oppvarming og eventuelt kort nedjogg være tilstrekkelig. Oppvarmingen varmer opp ledd, sener og muskulatur og reduserer skaderisikoen.


Under oppvarmingen kan du kartlegge kroppen: følelse i lår, oppvarmingspuls, kjenner etter smaskaidet. Dette gir informasjon om dagsform og hjelper deg justere økten deretter.

To metoder for oppvarming

- * **Klassisk:** Jogge 5-10 minutter for økten eller konkurransen.
- * **Terskelintervall som oppvarming:** Starte med 5 min rolig jogge, etterfulgt av ett enkelt terskeloppgang på 3-6 min. Spesielt gunstig for konkurranser. Jakob Ingebrigtsen gjør det tilsvarende i dag.

Ved å løpe dette på omtrent samme tempo hver gang og gjerne nøyaktig samme intervalllengde, får du verdifull informasjon om dagsformen din.

Figur 3.2 - Trafikklysmode: testintervall bestemmer og justerer dagens økt



Nedjogg

Ved en vanlig terskeløkt holder det med svært kort nedjogg - noen få minutter. Unntaket er dersom du vil bruke nedjogg for å samle treningsvolum - da kan du legge inn ekstra kilometer etter treningsøkten.

Smart Strides etter harde øker

Etter alle harde treningsøker anbefales Smart Strides - jevne lopsdrag som går litt over terskelen, med en lengde på cirka 100 meter. Gjennomfør 5-8 slike drag etter en hard økt, og du senker muskeltonus raskere enn normalt.

SMART STRIDES - PROTOKOLL

Etter avsluttet intervalløkt: lopp først 2-3 minutter rolig jogg

Lopp deretter 5-8 drag på cirka 100 meter i et tempo litt over terskel

Hold dragene jevne og kontrollerte, ikke sprint

Gå eller jogg lett mellom hvert drag

Fokus er på å normalisere muskulaturen, ikke på fart

Tre utfordringer og veien videre

Forste utfordring - Tidseffektivitet: Mange mosjonister sliter med å få nok volum. 30-50 minutter i uken med terskeltraining kan gi god fremgang - kroppen har kapasitet til å respondere på mer dersom trainingen er smart nok.

Andre utfordring - Tilpasning til fart: Terskeltraining foregår i et relativt begrenset fartsregister. Over tid kan dette føre til fartsmessig stagnasjon.

Tredje utfordring - Mental: Selv den mest entusiastiske løper kan bli lei av endeløse runder med 6 x 6 minutter. Variasjon i intervallengder hjelper, men er ikke alltid nok til å holde motivasjonen oppe over måneder og år.

Svaret kom fra grenseområdet mellom fysiologi, nevrologi og metabolsk fleksibilitet - inspirert av forskning på fotballspillere og professor Veronique Billats arbeid med å maksimere tid ved VO₂ maks.

Det handler om kortere intervaller, mye kortere enn du kanskje er vant til, og med tilsvarende kortere pauser.

Svaret er en metode som løser alle tre utfordringene samtidig: tidseffektiv, versatil og den bryter den mentale monotonien. Velkommen til 45/15-oktene.

Oppsummering - Fire rammer for terskeltraining

- * **LOP HELT ROLIG PÅ DE ROLIGE DAGENE.** Under 70 % av makspuls, hele turen. Fristelsen til å presse tempoet gir tyngre bein på kvalitetsøkene og økt skaderisiko.
- * **SKJERM DAGENE MELLOM DE HARDE OKTENE.** Muskeltonus må få gå ned. Begrens hurtighet, styrke og annen belastning på rolige dager. Først da får du full effekt av terskeltrainingen.
- * **INTERVALLER SLAR KONTINUERLIG LOPING.** Mikrorestitusjon i pausene lar deg løpe 5-15 sekunder raskere per kilometer på samme belastningsnivå. Du får både terskeltraining og fartselement i samme økt.
- * **VARIER INNENFOR TERSKELOMRADET.** Kroppen tilpasser seg raskt til ensformig belastning. Veksle mellom korte, mellomlange og lange intervaller. Blandede øker gir tilpasninger som ensformige øker ikke kan oppnå.
- * **START OG AVSLUTT MYKT.** Første intervall litt konservativt, siste intervall ikke for intensivt. Avslutt gjerne med de korteste intervallene.
- * **SMART STRIDES ETTER HARDE OKER.** 5-8 drag på cirka 100 meter, litt over terskel. Bryter med den ensidige belastningen og hjelper kroppen å restituere raskere.

Nybegynner og trening 1–3 ganger i uken

Bakgrunn og forskning

En stor studie fra København inviterte tusenvis av vanlige mennesker til helsesjekk og fulgte dem over år. De som kom best ut var ikke de som presset mest, men de som jogget lett til moderat 2–3 ganger i uka. En U-kurve viste at litt løping ga betydelig lavere dødelighet enn å være inaktiv – men veldig hardt og veldig ofte ga ikke ekstra gevinst.

Konklusjon: 1–3 ganger i uka treffer du en av de mest bærekraftige dosene som finnes.

Vanlige feil blant nybegynnere

De fleste nybegynnere starter for hardt og med for rask progresjon. I tillegg løper mange for fort på lette dager og for hardt på harde dager. Struktur og planlegging er ekstra viktig for nybegynnere – kroppen tåler ikke å løpe på følelse.

Kapittelets tre hoveddeler

Dette kapitlet dekker:

- Bli en løper: fra nybegynner til terskelløper (uke 1–12)
- Videre plan og trening fast 1–3 dager i uken
- Livsfaser og tilpasninger

Fase 1: Bli en løper – fra nybegynner til terskelløper (uke 1–12)

Figur 6.1 – Tre faser på veien til terskelløper

Programmet er delt inn i tre faser som bygger på hverandre:

Introduksjon Uke 1–4 30 s intervaller	Oppbygging Uke 5–8 2–8 min intervaller	Stabilisering Uke 9–12 15 min terskel
--	---	--

Hvorfor bruke intervaller fra dag én? Ikke fordi det er tøffere, men fordi intervalløping er mer skånsomt – 30 sekunder løping etterfulgt av 90 sekunder hvile gir sener og muskler en mikropause. Kontinuerlig jogging i 20 minutter gir første dag alltid akkumulerte problemer.

Figur 6.2 – Hver fase bygger på den forrige

Fundamentet må være solid før du bygger høyere:

15 min terskel	Uke 9–12
2–8 min intervaller / Snakketest verktøy	Uke 5–8
30 sek intervaller / Lytting til kroppen / Tilpasning i fokus	Uke 1

To viktige regler før du starter

Regel 1 – Lytt til kroppen

Kjenner du muskulære eller sene-relaterte smerter umiddelbart – stopp. Gjennom alle ukene gjelder et viktig prinsipp: Kjenner du muskler eller sener som begynner å gjøre vondt under løpeturen, avslutt øktene avbryt. Skader tidlig kan gjøre reisen tilbake til bilen mye lengre enn du ønsker.

Regel 2 – Bruk snakketesten

Det refereres til terskelen i hele programmet. Snakketesten er et enkelt verktøy: Du skal kunne snakke i hele setninger mens du løper. Dersom du ikke klarer dette, er du over terskelen. Andre tester fins, men snakketesten treffer den tidligere nevnte terskelen for å slike løpere anbefaler jeg.

Detaljert treningsplan – Uke 1–12

UKE 1 – Start forsiktig: det som føles som ingenting

Mandagens 30 sekunder skal faktisk føles som ingenting. Fredagen introduserer litt raskere gange. Det er helt greit.

Mandag	5 min rask gange + 6 × (30 sek lett jogg / 90 sek gange) + 5 min rolig gange
Mail	Total løpstid dette økt ca 7 min fordelt på 6 korte turer i uken
Fredag	5 min rask gange + 8 × (30 sek lett jogg / 90 sek gange) + 5 min rolig gange

UKE 2 – Litt mer mengde, kortere pauser

Kroppen har nå opplevd jogging i mange små, korte bolker. Fortsett på samme skjer.

Mandag	5 min rask gange + 10 × (20 sek jogg / 60 sek gange) + 5 min rolig gange
Onsdag	5 min rask gange + 10 × (20 sek jogg / 60 sek gange) + 5 min rolig gange
Fredag	5 min rask gange + 10 × (20 sek terskel / 60 sek gange) + 5 min rolig gange

UKE 3 – Første ordentlige intervaller

Nå begynner det å ligne på løping. Et minutt av gangen.

Mandag	5 min svært lett jogg + 6 × (60 sek jogg / 90 sek gange eller gange) + 5 min rolig gange
Onsdag	5 min svært lett jogg + 4 × (30 sek jogg / 90 sek gange eller gange) + 5 min rolig gange
Fredag	5 min svært lett jogg + 6 × (60 sek jogg / 60 sek lett jogg eller gange) + 5 min rolig gange

UKE 4 – Siste innspjæk

Fredagen tester vi terskel i hele minutter for første gang. To minutters pause virker kanskje lang, men dette er det beste for første gang; å holde denne intensiteten er bedre enn å fullføre alle seks med god kvalitet enn å måtte gi seg på nummer fire.

Mandag	5 min svært lett jogg + 8 × (x45 sek terskel / 15 sek pause) + 5 min lett jogg
Onsdag	5 min svært lett jogg + 3 × 3 min rask jogg / 2 min lett jogg
Fredag	5 min svært lett jogg + 12–15 min kontinuerlig jogg + 5 min svært lett jogg

UKE 5 – Introduksjon til strukturert terskeltrening

Fra nå av blir mandagene hoveddøkten, onsdager støtteøkt, fredagene er rolige. Denne strukturen holder seg gjennom resten av programmet.

Mandag (struktur)	10 min svært lett jogg + 3 × (2 min terskel / 2 min lett jogg) + 5 min svært lett jogg
Onsdag	10 min svært lett jogg + 90 sek terskel / 90 sek jogg eller gange) + 4 × ...
Fredag	6 × (45 sek terskel / 15 sek gange) + 5 min lett jogg

Lett terskelutvikling – uke 5–9

Nå begynner du det virkelige arbeidet. Kroppen har vent seg til å løpe, og senene tåler forskjellen mellom lett og litt raskere. Neste steg er å bygge terskelkapasiteten systematisk. 2 minutter lett terskel er valgt med omhu. Puls stabiliseres ofte innen 60–90 sekunder, og belastningen begynner å etablere seg, men et stabilt nivå krever lengre drag. Ved to minutter terskel begynner du å akkumulere tid til å kjenner hvordan dan riktig terskel føles. Ikke for mye tretthet, og ikke for å klemme lang belastning – og tanke på skaderisiko.

UKE 6 – Samme struktur litt mer volum

Mandag	10 min oppvarming + 4 × (2 min terskel / 2 min lett jogg eller gange) + 4–6 × ...
Onsdag	25 min kontinuerlig lett jogg + 5 min nedjogg
Fredag	(45 sek terskel / 15 sek gange) + 6 × (2 min terskel) + 5 min nedjogg

UKE 7 – Terskeløkning

Legg merke til at fredagen er kortere, men kor for økt intensitet. Kroppen skal progressivt øke belastning i praksis jobb lite hardere for kortere intervaller, men innenfor en fornuftig ramme.

Mandag	10 min oppvarming + 2 × (7 min terskel / 3 min lett jogg eller gange) + 4–6 × ...
Onsdag	10 min oppvarming + 5 × (3 min terskel / 1 min lett jogg) + 5 min nedjogg
Fredag (ny)	35–40 min rolig løp
Sandag	+ 4–6 × (60 sek terskel / 30 sek pause) + 5 min nedjogg

UKE 8 – Konsolidering

7 minutter terskel er et relativt stort hopp fra 2–3 minutter. Men kroppen din har brukt 6 uker på å forberede seg.

Mandag	10 min oppvarming + 2 × (8 min terskel / 2 min lett jogg eller gange) + 5 min nedjogg
Onsdag (valgfri)	30 min kontinuerlig lett jogg / 1 min lett jogg
Fredag	10 min oppvarming + 4 × (45 sek terskel / 15 sek gange) + 5 min nedjogg
Sandag	40 minutter lett jogg

8 minutter terskel krever mental styrke – og her lærer du virkelig hva terskel er: det ubehagelige som ikke er helt ubehagelig, og det harde som ikke er helt hardt.

Stabilisering – uke 9–12

Siste fase er ikke lenger oppbygging, men sammensetning av alt du har lært. Vi går derfor ikke lenger fra intervaller til lengre sammenhengende arbeid, fra struktur til flytt.

UKE 9 – Første sammenhengende terskel

Belastningen øker nå. Pausen kan nå være lett jogg, gange eller hvil. Dette er valgfritt fra nå av, gang eller hvile stillestående pause.

Mandag	10 min oppvarming + 3 × (6 min terskel / 2 min pause) + 5 minutter nedjogg
Onsdag	+ 5–10 × (45 sek terskel / 15 sek gange) + 5 min nedjogg
Fredag	+ 10 min nedjogg
Sandag	45 minutter lett jogg

UKE 10 – Repetisjon og stabilisering

15 minutter terskel i samme økt. Dette er testen på om du virkelig har lært å holde riktig intensitet. Start 5–10 sekunder per kilometer under det du tror er riktig. Jeg anbefaler at du aktivt bruker snakketesten, som du bør ha god erfaring med nå.

Mandag	10 min oppvarming + 4 × (5 min terskel / 10 × (30 sek terskel / 30 sek gange))
Onsdag	+ 10 min oppvarming + 4 × (5 min terskel / 10 × (30 sek terskel / 15 sek gange))
Fredag	45–50 minutter lett jogg
Sandag	+ 10 × (45 sek terskel / 15 sek gange) + 5 min nedjogg

UKE 11 – Videre økning

Her stabiliseres tidligere økter, og en tydelig struktur begynner å sette seg.

Mandag	10 min oppvarming + 20 min sammenhengende terskel + 10 min nedjogg
Onsdag	+ 10 × (30 sek terskel / 90 sek gange) + 10 min nedjogg
Fredag	50–60 min lett jogg
Sandag	+ 4 × (5 min terskel / 5 min pause)

UKE 12 – Avslutning og klar for neste fase

Siste uke: nå reduserer du volum med test. Mandagen holder intensiteten oppe. Onsdag og er lett. Fredag og sandag er enten lett eller hvile.

Mandag	10 min oppvarming + 3 × (7 min terskel / 2 min pause) + 5 min nedjogg
Onsdag/Lørdag	20 min lett jogg eller hvile
Fredag/Sandag	5 km test eller terskeltest

Videre plan etter 12 uker

Etter 12 uker har du bygget en solid kondisjonsbaser, og du har lært kroppen å håndtere terskelintensitet – og ikke minst haper jeg at du forstår prinsippene bak effektiv trening. Videre skiller veiene seg og hvordan kroppen din har respondert på treningens ambisjoner-, tilgjengelig tid og din preferanse.

Videre plan – 3 veier etter 12 uker

Vei 1	Hold deg løpende med 1–3 økter i uka. For mange er dette den permanente løsningen. Systematisk progresjon uten å ta for store steg.
Vei 2	Trygg overgang med 3–4 økter per uke. Systematisk progresjon. Gi kroppen tid til å venne seg til belastningen.
Vei 3	Økning mot 4–5 økter per uke. For deg som har tid, motivasjon og en kropp som responderer godt.

Hold deg løpende med 1–3 økter i uka

Du har fullført 12 uker, og kroppen har tilpasset seg løping. Du kjenner forskjellen på rolig og terskel, men livet ditt tillater ikke 5–6 økter i uken. Kanskje aldri. Og det er helt greit.

For mange er det viktigste ikke å øke, men å bygge en struktur som fungerer – ikke bare 12 uker, men år etter år.

1 økt per uke

En økt per uke er nok til å opprettholde det meste av formen din. En økt per uke med 1 fast treningsdag per uke. Generelt gjelder følgende prinsipper: færre økter, høyere kvalitet. For deg med 1 fast treningsdag per uke, anbefales «jogging rundt kvartalet». Denne økten bør den være av god kvalitet. Ingen «jogging rundt kvartalet». Dette bidrar til å bevare god form. Hold intensiteten riktig og sørg for god oppvarming og nedjogg.

Grunnstruktur 2-øktuke

Økt 1 (hoveddøkt)	Terskelintervaller, 30–40 min totalt. Kortintervaller, kombinasjonsøkt eller uvanlig rolig.
Økt 2 (støtteøkt)	Kortintervaller, kombinasjonsøkt eller uvanlig rolig. 30–40 min totalt.

Konkret eksempel – 2-øktuke:

Tirsdag	10–20 min oppvarming + 4–7 × (5 min terskel / 90 sek pause progressiv fra under til over terskel) + 10–20 min nedjogg
----------------	---

Lørdag/Sandag	10–20 min oppvarming + 15–25 × (45 sek (45 sek terskel / 15 sek gange)) + 10–20 min nedjogg
----------------------	---

Grunnstruktur 3-øktuke	
Økt 1 (hoveddøkt)	Terskelintervaller eller kortintervaller (30–40 min)
Økt 2 (støtteøkt/hoveddøkt)	Kortintervaller (25–30 min totalt)
Økt 3 (lang)	Rolig, kontinuerlig løp (60–70 min)

Med 3 økter i uken kan du bygge mer treningsvolum. Den lange løkten senker muskelspenningen, bygger aerob base, og ikke minst – den gir deg lengre og lettere intervaller.

Periodisering gjennom året

Periodisering gjennom året	
Vinter (nov–feb)	Bygg volum. Bland løping med 40 min løp for 10–15 × (30 sek løp/30 sek pause). Veldig kontrollert.
Vår (mars–mai)	Spis intensitet. 5–6 × 4–5 min terskel (litt raskere) eller 15–25 × 45/15 (progressiv fast eller raskere).
Sommer (juni–aug)	Konkurranse/testfase. Konkurrenter eller pyramidevarianter nevnt i kapittel 4. Alternere med lette kortintervaller.
Høst/vinter (typisk)	Behold søndag hvis du prioriterer 3-øktsuker (60–70 % av ukene). Prioriterer noe mer volum og utholdenhet.

Livsfaser og tilpasninger

Småbarnsfasen

Du har 4 timer i natt og babyen skriker. Partneren er utmattet og løping kan gå ned til ett per uke uten at du skyldes. Mental situasjon og belastning under løpeøktene også settes opp, men trening er ikke alltid gjennombart. For de som likevel finner tid, bør du styre mot kortere, høyere intensitetsøkter. Bruk snakketesten og testøkter fra kapittel til kartlegge din nøyaktige terskel.

Bygg opp gradvis. Ikke hopp rett til 35–40-minuters terskelbelastning.

Hektiske arbeidsperioder

Noen scenarioer for hektiske perioder kan være 3 måneders med 60-timers uker, viktige prosjektleveranser eller mye reising. En god strategi er å tenke på å opprettholde treningen på minimal effektiv dose – det vil si hva er det absolutt minste du kan gjøre for å opprettholde treningen.

Minimal effektiv dose
• 1 terskelintervall per måned (3 steder for 8–10), holder 75–80 % av formen ved like

- 30 minutter totalt
- Gjør den hard du kan, ikke på en fast dag
- Prøv å få til en progressiv avslutning på de aktene med noen kortere
- Resultat: 3–5 terskelakter per måned (3 steder for 8–10) holder 75–80 % av formen. Det er nok til å komme raskt tilbake når den hektiske perioden er over.

Ferier og avbrudd

2 uker helt uten trening

Du mister noe rent muskulært, men kondisjon-sbasen holder seg overraskende godt. Den største risikoen er økt skaderisiko: Kondisjonsforsken er at du deg raskt inn i en skadespiral. Andre økt kan vokse. For å holde risikoen lav, bør du gå noe mer lett jogg og eventuelt litt mer nedjogg. Jeg anbefaler:

- 2–3 × 5 minutter (for eksempel 2–3 × 5 minutter) og eventuelt, noen stigningsløp
- 1 uke 2–3 mer lett terskel (for eksempel 30/30 (30 sekunder løp, 30 sekunder pause), 1 uke 2–3 er målet å være

4–6 uker uten trening

Etter 4–6 uker uten trening får du ofte en merkbar reduksjon i terskelkapasitet. Start deretter med 2–4 uker som et mini-nybegynnerprogram. Begynn med 2–3 uker som et mini-nybegynnerprogram for raktest og trygghet. Bygg gradvis opp igjen over 6–8 uker.

Mental holdning

Jeg opprettholder identiteten min som løper: Når dette går over, har jeg et fundament å bygge på. Mange ser tilbake på sommerpausen og sier: hold deg løpende med 1–3 økter i uka, men livet mitt tillater ikke 5–6 økter i uken – kom raskt.

Mange bruker disse strukturene i årevis med god, stabil løping og lite skader. Hvis du aldri går videre lykkes.

Avsluttende tanker

Jeg har trent med OL-utøvere som løper ganger i uken, og er like dedikerte som meg. Jeg gjennom alt fra 3 ganger til at skader har begrenset dem. De løper – uavhengig av volum og neste – en ting til felles: de løper fra null til full til kontinuiteten. De som lykkes langsiktig er de som aksepterer hva kroppen deres kan håndtere, og som er skådfri for lange perioder med kontroll.

OPPSUMMERING

- 1–3 ØKTER I UKEN ER IKKE ET MELLOMSTEG. For mange er dette den permanente løsningen, den permanente løsningen, den permanente løsningen 2–3 ganger i uken ga stor helseeffekt.

- **FÆRRE ØKTER BETYR HØYERE KVALITET.** Med bare to økter i uken bør begge ha substans. Bygg inn rolig løping gjennom lengre oppvarming og nedjogg.
- **DE FLESTE NYBEGYNNERE STARTER FOR HARDT.** Intervaller fra dag én er mer skånsomt enn kontinuerlig jogging. Mikropauser lar sener og muskler hente seg inn.
- **FREKVENSLÅR LENGDE.** Små drypp flere ganger i uken er mye bedre enn lange økter med lange pauser mellom. Kroppen trenger frekvens for å tilpasse seg.
- **SNAKKETESTEN ER VERKTØYET DITT.** Tre til fem ord for du må trekke pusten. Andre tester kan vente til du har funnet rytmen.
- **KONTINUITET ER ALT.** De som lykkes løper uke og neste, og neste igjen.

Mosjonisten som vil mer

Tilpasning til 4–6 timers ukevolum

Innledning

Forfatteren Haruki Murakami har løpt maraton i over tretti år. Han beskriver en nøktern identitet: han løper ikke fordi han «sker å løpe» i romantisk forstand, men fordi det er slik han holder seg stabil – mentalt og fysisk.

Når løping blir en fast del av uka, skjer det noe med livskvaliteten som er vanskelig å forklare med bare kondisjon: hodet blir ryddigere, stress tåles bedre, og man får en følelse av retning. Med økt trening kommer ønsket om mer – bedre flyt, høyere fart på terskel, mer «trøkk» når man trenger det.

Belastning og hvile må balanseres bedre ved 4–6 timer trening i uken enn ved 1–3 økter.

80/20-regelen justert

Den nye omtalte 80/20-regelen fungerer ikke optimalt når man bare har 4–6 timer per uke. Matematikken viser at man bør skalere ned til 5 timer. Eliteutøvere gjennomfører 90 % av treningene i lav intensitetszone.

For mosjonister som kanskje gjør 250 timer fattig, blir bildet annerledes. Med et ukentlig treningsvolum på 5 timer gir 80/20-fordelingen deg 4 timer lavintensiv løping og 1 time med mer intensiv trening. På papiret er dette fornuftig. Men et ukjentlig treningsvolum på 5 timer gir 80/20-fordelingen deg 4 timer lavintensiv løping og 1 time med mer intensiv trening.

Terskeltraining og varmeoppduende gjennom før og gjennom før og etter 2 kvalitetsøkter på 30 minutter hver. Det er knapt nok til å gjennomføre et meningsfylt intervallsett. Behovet er løp-basert trening alene med rom for justeringer.

Den justerte formelen for 4–6 timers ukevolum

- 60–65 % rolig løping
- 20–30 % terskelarbeid
- 5–10 % høy intensitet
- Hvis du har 5 timer per uke, bør du sikte mot 3–3:25 timer rolig løping, 20–30 % terskelarbeid og opptil 20–30 minutter høyere intensitet
- 1:25–1:5 timer terskelarbeid og konkurransetempo

Prioriteringer

1. Terskeltraining og utvikling

Dette gir mest «gevinst for innsatsen». Du trener fire til seks timer per uke, bør fokus være på optimalisert terskeltraining – progressivt opp til full belastning.

2. Samle «mengde» løping

Over tid med «sanking» av kilometer med terskeltraining, gradvis strammes grødis. Leddband strammes gradvis, og bevegelsesmønsteret blir mer effektivt. Du får mer økonomi for hver løpesteg, og det er helt sentralt for å bygge nødvendig kondisjonsbasse.

3. Mer spesifikk økt – X-økten

X-økten er din mest spissede, variable treningsøkt – derav X. Den kan justeres eller tilpasses dine spesifikke mål. Den har sin plass, men ikke alltid og ikke for alle.

Formel for bruk:

- Konkurransen kan brukes på to måter
- Variasjon med litt høyere intensitet enn terskeltrening

Ukesstruktur

1. Hovedkvalitetsøkt

Din primære terkel-økt. Her anbefales lengre løpsdrag som for eksempel 10 minutter, alternativt med kontinuerlig løping varierte drag. Erfaringsmål er denne typen økt begrenses til en gang per uke.

2. Støttekvantitetsøkt

Varianter med løpsdrag som ikke er for lange, med maksimal varighet på 3 minutter, kanskje opptil 6 minutter. Disse kan gjerne være 45/15.

Eksempel: 5-timers uke i grunntreningsperioden

Dag	Trening
Mandag	Hvile. Full restitusjon fra helgens trening, dersom helgen har gjort ekstra
Tirsdag	Hovedkvalitetsøkt: 6 × 6 min med terskel eller 10–12 × 3 min med 1 min pause kan være slik at tempoet justeres opp omtrent 10 slag hjerteøkt per pause innimellom
Onsdag	Støttekvantitetsøkt: oppdagende økter varierte med omtrent 10 slag hjerteøkt per 2 min
Torsdag	Rolig 40–50 min. Disse øktene bør løpes så sakte at det testen føles feil. Du skal kunne prate uanstrengt. Forbered løpsøkonomi og ev. lett utklukkende uke etter å same treningsvolum, forbedre løpsøkonomi og grev å utklukkende uke etter å same treningsvolum
Fredag	Hvile. Strategisk hvile for at muskulaturen generelt
Lørdag	Lang tur (varighet justeres etter helgens treningsbelastning)
Søndag	Rolig 1 mer intensiv X-økt med intervaller (3 30–40 min)

Dobbel terskel

I kapittelet om dobbel terskel forklares jeg mer om hvordan disse prinsippene kan integreres foreksempel også for de mosjonister som har lyst, over, skudd til det og er hel skadefrie. Les også radene der om gradvis inngang med blant annet en rolig økt og en terskeløkt samme dag først.

Hvorfor annenhver uke fungerer

- Restitusjon: Med lavere totalvolum har du større slingrom for å hårdere belastningen

- Variasjon: ved å alternere får du både fordelingen av dobbel terskel og andre typer kvalitetsarbeid
- Livspussel/spill: Realistisk sett er det lettere å få til en dobbeltdag annenhver uke
- Progresjon: Du kan gradvis øke frekvensen hvis kroppen responderer bra
- Langsiktighet: En type stimulus bør som minimum gjøres hver 10. dag for langsiktig effekt

Alternativer for belastningsøkning: 4 modeller

Modell	Beskrivelse
1. Forsiktig dobbel terskel i helgen eller til/fra jobb	Den mest effektive om du kan restituere godt og må gjøres riktig og nøyaktig. Du får det spesielt gunstige noe av det mest effektive du kan gjøre.
2. Ren volumskning over hele linjen	Periodisk øke det rolige treningsvolumet ved å legge inn en ekstra rolig løping der det er mulig. Det er nest beste og åke lengden på de allerede eksisterende lette treningsøktene.
3. Øke lengden på terskeløktene	En metode hvor du gradvis skalerer opp progresjon av terskelvolumet i treningsuker. Nyere planlaget for en konkurranse eller konkurranse dage pl plassert til å avsluttes omtrent fire uker for en konkurranse.
4. Prøv ut spesialvarianter	Spesifikke kombinasjonsøkter uten pause. Gå rett etter 5 km-tempo. Denne typen økter gir en helt annen type belastning og fokus kan prove disse øktene uten pause.

Fleksibilitet og justering

Prioriteringer ved tidsklemme

Her er prioriteringsrekkefølgen når man må kutte:

1. Hovedkvalitetsøkt – alltid med!
2. Støttekvantitetsøkt – alltid med
3. Langtur (kan kortes ned)
4. Rolige økter (kan reduseres)

Når økten ryker

- Ikke prøv å ta igjen – øka senere
- Hold fast ved neste planlagte økt
- Hvis flere økter ryker, vurder gradvis øka bakøver
- Styr konsekvent fremover, aldri bakøver
- Ta igjen ved hyppig bruk av 45/15 ved siden av gradvis tilnærming til normal trening igjen ved gradvis progresjon

Presis intensitetsstyring

Optimal terskeltraining foregår som nevnt for det meste rett nedenfor selve terskelpunktet. Ikke ved å ligge på eller over den. Anbefaler deg å ikke den «gylne sonen» som konsekvens. På nivået du trener på, med høyere totalbelastning, blir dette kritisk.

Ved overskudd på økta:

- Ikke øk intensiteten
- Ikke øk heller på noe volum på øktene, slik at øktene blir lengre
- Legg heller på noe volum
- Ikke øk intensiteten

Tempogåide for intervalltreningseksempel (løper med 18 min på 5 km)

Tempo	Varighet per km	Beskrivelse
45 sek/1 min	Cirka 5–7 sekunder per km raskere enn kalkulert terskel	Typisk 7–10 sek per km raskere enn terskel
4–5 minutter	Tilsvarende kalkulert terskel	Cirka 5–7 sek per km langsommere enn kalkulert terskel
6–8 minutter	Cirka 5–7 sek/km raskere enn kalkulert terskel	
10–15 minutter	Typisk 7–10 sek per km raskere enn terskel	

År og helhet – periodisering forklart

For å gi inn på konkrete strukturer i løpet av en lengre treningsperiode, er det viktig å forstå konseptet periodisering. Dette er rett og slett kunsten å planlegge treningen over lengre tidperioder – det vil si uker, måneder og år, slik at kroppen får best mulig tilpasning uten overbelastning.

Nøkkelpoing:

Til syvende og sist kommer alt an på totalbelastningen. Hver kostnad med mengde omhu og den desidert vanligste feilen her er å ikke forstå prioriteringene med om. Du bør velge og balansere den totale belastningen mot gevinstene av kondisjonstrening mot terskelen.

Variasjonsprinsipper

- Velg treningsfordelingen din: leksempel over byer det for terskeltrening eller måling av intensitetssoke over tid, velg en av periodiseringsuken der det flater ut
- Varier innimellom hver økt: Juster pauser, intervalløkter. Sette treningsøkten over tid
- Gjør på intensitetskontroll: Konsentrer deg om å treffe riktig intensitet og underlag rutid over treningsøkten over tid
- Periodiser når det flater ut: Person prestasjonen flater ut, velg en av periodiseringsmulighetene skissert under

Figur 7.2 – Tre periodiseringsmodeller

Nedenfor vises en skjematisk oversikt over de tre modellene basert på mål og hverdag:

FLAT STRUKTUR	BLOKK-PERIODISERING	PROGRESSIV X-ØKT
Samme struktur hver uke. Kroppen venner seg til rytmen. ✓ Fordeler: • Færre overganger • Lavere skaderisiko • Passer travel hverdag	2 harde uker → 1 lett uke. Krever presisjon. ✓ Fordeler: • Variasjon i belastning • Lett uke gir lett • Krever presisjon	Terskel stabil. X-økt tilpasses gradvis mot konkurransen. ✓ Fordeler: • Trø progresjon • Konkurransespåsfikk • Enkle å følge
<i>Best for: jevn hverdag, mosjonister uten skarpe mål</i>	<i>Best for: erfarne løpere som tåler variasjon</i>	<i>Best for: de som trenger forsiktighet + har begrenset tid</i>

Eksempel: Flat struktur med periodisk konkurransefart

Ukesmal når man kjører den flat strukturen:

Dag	Trening
Mandag	6 × 6 min (sub)terskel
Tirsdag	1 × rolig
Onsdag	3–4 × 10 min (sub)terskel
Torsdag	1 × rolig (under 70 % av puls, slik jeg også anbefaler)
Fredag	Rolig
Lørdag	10 × 3–4 min (sub)terskel
Søndag	Rolig

Eksempel på progresjon av X-økten (periodeplan)

Periode	Trening (X-økt)
Uke 1–4	10 × 200 meter bakkekørt som gradvis økes til 10 × 300 meter bakkekørt i. Start ved 9 sek per km, øk progressivt. Pause er lett jogging. Alternativt: den nærmeste økten med videre: men gradvis oppdattes med disse med videre: men gradvis oppdattes
Uke 5–8	5 km tempo. Overgang til 800–1000-meter-intervaller med 3 min pause. Alternativt: 45/15, 10. Disse bør gjøres på det samme tempoet på 45/15 seg selv.
Uke 8–12	Alternering med videre: men gradvis oppdattes med disse med økt med videre: men gradvis oppdattes med disse
Uke 13	Lengden kan være distansespesifikk. For halvmaraton/ maratonløper, langtur progressivt akselerere uke for uke. For distanser under 10 km: 60–90 min

Når periodiseringen svikter

Midt mellom Games og VM skjedde noe jeg ikke hadde fortsatt. Konkurransøkning begynte terskelfarten å falle. Ikke nye, men hklø] at målingene viste en tydelig trend, og må betale før sikkerhetskyldøn i fem dager.

Løsningen ble desperate: høydretrening ved Galdhøpiggen. Vi hadde fått med for mange som ikke hadde trening ledig rom. Problemet var ikke terskeltrening i seg selv – det var at jeg hadde fortært den for tidlig og for bratt da konkurransesesongen startet.

Overgangen fra terskelbase til intensiv trening hadde vert for hard, og kroppen mistet fotfestet. Heldigvis fungerte løsningen.

Periodiseringstrappen

Mitt eksempel viser grunnen til at jeg anbefaler gradvis overganger mellom planlagte faser. Alltid. Og det er også grunnen til at periodiseringstrappen under kan være et trygt utgangspunkt for mange, nettopp for å unngå det jeg opplevde.

Fornuftig terskeltrening kan være med på å normalisere muskulaturen over tid, og kan derfor for å være fornuftig også i risikokurven. Starte helt nederst, på risikokurven for å få dette til:

5. Hold inn terskelspunktet med rolig trening mellom. Målet er å bygge og best mulig muskulaturen i 4–8 måneder med terskeltrening.
6. Legg inn en flat struktur. Gradvis kan du øke intensitetene i X-økt litt raskere enn du er vant. Gradvis i X-økt, kan du så prøve ut terskel 45/15, gjerne enn på der forrige.
7. Begynn med systematisk løp og så mer varierte flatstrukturen, og gå så hva du faktisk responserer bedre på.
8. Velg modellen som passer deg best, og se hva du holder deg risikoen, der modellen sikrer deg.

OPPSUMMERING

80/20 er ikke optimal med lite tid.

Regelen bør lages for uthovere som trener 15–25 timer i uken. Med 4–6 timer blir matematikken annerledes. Juster til 60–65 % rolig, 20–30 % terskelarbeid.

Tre økter er grunnmuren.

Hovedøkt (terskel), støtteøkt (kortere drag eller 45/15), og X-økt (progressiv variert). Alt annet er påfyll.

Terskel og volum er de lavhengende fruktene.

Spor (terskel), støttekvantitetsøkt (kortere drag eller 45/15). Kan tilpasses mål (eller droppes). Alt annet er påfyll.

Kortere intervaller taler høyere fart.

45 sekunder kan du løpe med 5–7 sek/km raskere enn kalkulert terskel. 45 sek/km kan du nærmest alltid være litt raskere enn kalkulert terskel. 10 minutter bør gå 5–7 sek/km langsommere.

Flat struktur er undervurdert.

Spesielt hvis du er tøff med overganger, mindre risiko. Variasjon kan legges inn gradvis når formen litt flater. En enkel plan du faktisk følger, er bedre enn en perfekt plan som blir for krevende å gjennomføre.

Kontinuitet trumfer kompleksitet.

En enkel plan du faktisk følger er bedre enn en perfekt plan som blir for krevende å gjennomføre.

Ressurser og verktøy: Skann QR-koden i boken for tilleggsmateriale, oppdaterte lenker og støtteresurser til dette kapittelet.

Legens råd om helse og skader

Innledning

Kapitlet er skrevet av en lege som selv har vært elitesløper og tatt over fem tusen laktatprøver. Overgangen fra toppidrett til fastlegepraksisen lærte ham en viktig leksjon: prinsippene for effektiv trening er de samme for alle, men prioriteringene er stikk motsatte. Der elitesløperen jakter grenser og maksimal kapasitet, handler fastlegeperspektivet om bærekraftighet, balanse og langsiktig helse. Med over 30 års erfaring med å følge pasienter gjennom trening, skader, tilbakeslag og fremgang, trekker han opp praktiske råd om hva som faktisk fungerer.

1. Belastning og tilpasning

Løping er fortsatt utgangspunktet i boken, men kapitlet handler om rammene rundt: hva som avgjør om man faktisk tåler å trene over tid. Kroppen er designet for tilpasning, men tilpasningen krever tid.

«Kroppen er fantastisk på tilpasning, men den trenger tid.»

Hva skjer ved overganger?

De fleste skader skjer ikke midt i en treningsperiode, men i overganger: nytt sko, ny treningsform, ny overgang fra lavintensitet til intervaller, eller plutselige styrke- og spenningstreningssøker. Muskulatur, sener, ledd og nervesystemet trenger ulike lang tid på å tilpasse seg. Noen elementer tilpasser seg raskt, andre – særlig sener og bein – trenger måneder.

Håndtering av overganger

Nøkkelen er å alltid implementere nye elementer gradvis. Legen anbefaler 45/15-prinsippet (45 % progressivt) der treningselementer bygges på hverandre over tid. I praksis betyr det:

- Introduser aldri mer enn ett nytt element om gangen.
- Test nye sko, ny intensitet eller ny form isolert – ikke alt på én gang.
- Regn med at kroppen trenger 4–8 uker på å virkelig absorbere en endring.
- Vær ekstremt forsiktig i overgangen fra rolig til intensiv trening, spesielt etter pause.

Strategien ved overgang er ikke "avbryt og start på nytt", men en gradvis tilpasning av treningsbelastning og form.

«Avbryt aksjonen når noe murrer – ikke heltemodig, men effektivt. Ingen halvhjertede grep.»

2. Skadeforebygging og håndtering

Skaderisikoen i løping er knyttet direkte til ukesvolum. En stor studie dokumenterte at skaderisikoen øker med 64 % ved dobling av distansen. Ved 30–100 % lengre løp enn de

siste 30 dagene øker risikoen med 28–52 %. Kortere, hyppigere løp er tryggere enn færre, lange.

Tre kjerneråd for å unngå skader

- Ikke bare gradvis økning i volum – introduser aldri nye elementer brått.
- Terskelbasert trening og nedbrytende slitasje har ulike signaler. Lær dem.
- Massasje, tøying, kalde bad og varme bad hjelper, men er ikke substitutter for god treningsstruktur.

Legen understreker at det ikke finnes revolusjonerende tiltak ved skade, men at kombinasjonen av progresjon, kontinuitet og høy terskelbruk av energien er det viktigste.

Figur 9.2 – Fem steg som styrker skademotstanden

Hvert steg styrker sjansen for en skadefri hverdag:

#	Tiltak	Beskrivelse
1	Sko	Bytt til moderne sko med skum og karbonsåle. Skift merke ved skade.
2	Flat treningsmodell	Unngå intervalløkter 4–8 måneder etter skade. Normaliser formen gradvis.
3	Senk intensiteten	Aldri mer enn 10–20 % økning per uke. Vær påpasselig med terskelintensitet.
4	Gradvis progresjon	Aldri mer enn 10–20 % økning per uke, verken i volum eller intensitet.
5	Lytt og avbryt	Ved murring – stopp umiddelbart.

Figur 9.2: Fem-stegs skadeforebyggingstrapp. Hvert steg bygger på forrige og styrker den totale motstanden mot skader.

Flat treningsmodell i praksis

En flat treningsstruktur – dvs. unngå intense intervalløkter i lange perioder etter skade – er en av de viktigste prinsippene. En slik modell har lav skadesrisiko og høy robusthet. Modellen innebærer rolig variasjon med lav terskelbelastning, og gradvis gjeninnføring av intensitet i takt med at kroppen responderer positivt.

3. Sykdomshåndtering

Sykdom er en av de viktigste risikofaktorene for treningsavbrudd og etterfulgt skade. Mange løpere begynner for raskt etter sykdom.

Legen anbefaler fullstendig gjennomgang av alle former for sykdom, spesielt etter hjerneyrskarditt. Nøkkelpriippet er: respekter signalene kroppen gir under oppvarming og de første kilometerne.

Smart tilbakekomst etter febersykdom

Protokollen under viser en anbefalt trinnvis retur til trening etter febersykdom:

Dag	Reaktivering
Dag 1–2	Ingen trening. Vektlegg hvile, hydrering og søvn.
Dag 3	10–15 min lett jogg og 2–5 stigningsløp over 80–100 meter.
Dag 4	20 min lett jogg og 2–5 stigningsløp. Evaluer energinivå nøye.
Dag 5	25 min lett jogg og 6–10 stigningsløp hvis dag 3 gikk bra.
Dag 6	40 min rolig jogg og 6–10 moderat intensitet.
Dag 7	10–15 x 45/15 på moderat intensitet.

Retningslinje for gradvis tilbakekomst etter febersykdom. Juster basert på kroppens respons hver dag.

Returkriterier til helt normal trening

- Normal hvilehertepuls 3 dager på rad.
- God søvnkvalitet.
- Ingen restssymptomer.
- Energi gjennom hele dagen.
- Trappgang på morgenen føles normalt igjen.
- Positiv innstilling til trening.

Praktisk tips: Symptomer over halsen (lett nese, litt hoste) kan si halvt grønt lys med ekstra oppmerksomhet. Symptomer under halsen (brystsmerter, mage) krever stopp. Mål aldri puls over 38,0 grader kroppstemperatur. Treningsaksjonen bør være kort: 10–15 minutter jogg og lette elementer.

4. Helsekontroller for løpere

Blodprøver er et viktig verktøy – ikke som erstatning for trenersansen, men som et supplement. Legen anbefaler regelmessige kontroller for de som trener hardt, og spesielt kontroll av B12 og D-vitamin.

Anbefalte blodverdier for løpere (Figur 9.1)

Parameter	Normalverdi*	Anbefalt for løpere	Optimalt for løpere	Sjekk frekvens	Kommentar
Ferritin (µg/L)	>10 µg/L	>30	50–60	1–2 ganger/år	Kritisk for oksygentransport
Ferritin (kvinner, µg/L)	>10 µg/L	>50	60–70	1–2 ganger/år	Kritisk for oksygentransport
B12	>150 pmol/L	>250–300 pmol/L	–	1 gang/år	Energiproduksjon og nervefunksjon

D-vitamin	>50 nmol/L	75–100 nmol/L	–	1 gang/år	Viktig for immunsystem og restitusjon
-----------	------------	---------------	---	-----------	---------------------------------------

Figur 9.1: Anbefalte blodverdier for løpere. *Normalverdier er definert for normalbefolkningen – optimale verdier for løpere er ofte høyere.

Ferritin og jernmangel

Ferritin er et protein i blodet som lagrer jern og er avgjørende for oksygentransport. Normalverdier for befolkningen er for lave for løpere. Mange idrettsforbund anbefaler ferritin over 30–40 µg/L, men 50 µg/L er tryggere. En studie av 1190 utøvere viste at 19,7 % hadde jernmangel uten anemi.

Jernmangel uten anemi gir diffuse symptomer: redusert oksygentransport, tretthet, svakhet, økt risiko for skader og nedsatt ytelse. Vegetarianere og veganere er særlig utsatt.

B12

B12-mangel er vanlig blant løpere som trener mye og spiser ensidig, særlig vegetarianere. Mangelen er snikende og kan gi redusert muskelfunksjon, nevrologiske symptomer og økt sårbarhet. Det er vanskelig å teste for funksjonell B12-mangel via standard blodprøver. Legen anbefaler supplementering ved verdier under 250 pmol/L, og alltid kontroll av homocystein og eventuelt MMA.

D-vitamin

D-vitamin er sentralt for immunforsvar, benforsvar, muskelstyrke, hormoner og muskelfunksjon. Løpere i Norge har gjennomgående lave D-vitaminnivåer, spesielt om sommeren etter mange måneder med lite sollys. Legen anbefaler tilskudd fra september til mai, og helst et D-vitaminnivå på 75–100 nmol/L. For å oppnå dette er 1–2 mg per dag i korte perioder anbefalt.

Anbefalte verdier for løpere (sammendrag):

- Ferritin: Over 50 µg/L for menn, over 60 µg/L for kvinner (for optimal funksjon).
- B12: Målmåte over 250–300 pmol/L, kontroller én gang per år.
- D-vitamin: Målområde 75–100 nmol/L. Kontroller én til to ganger per år.

5. Jeg er ofte skadet – hvordan bør jeg tenke?

For de som gjentagende sliter med skader, tilbyr legen en systematisk tilnærming. Skader er sjelden tilfeldige – de følger mønstre.

Type 1 og Type 2 muskelfibre

Kroppens muskelfibre har ulike egenskaper som påvirker treningsvalg og skaderrisiko:

Type	Karakteristikk
Type 1 (slow-twitch)	Brukes ved rolig langkjøring og terskelfart. Tåler lang belastning.

Type 2 (fast-twitch)	Aktiveres ved høy intensitet. Tar lengre tid å restituere, trenger raske og korte intervaller med kortere pauser.
----------------------	---

Oversikt over muskelfibretyper og treningsimplikasjoner.

Tilpasning av treningsstrukturen til fibersammensetningen er viktig. Type 2-løpere (hurtige, eksplosive) bør bruke lange terskelturer med korte pauser, mens type 1-løpere trives bedre med lange rolige turer og moderate intervaller.

Vær ekstremt observant på overganger og stopp

«Systematisk «superlette» turer hver tredje til fjerde uke kan kombineres med gradvis økning av frekvens. Hvis du velger å øke fra tredje til fjerde uke, kan det hjelpe å forbygge overgangsreaksjoner over tid.»

Legen advarer spesielt mot "high-risk running sessions" – treningsøkter der belastningen er for høy relativt til den oppdaterte terskelen. En sikker grense er å aldri øke ukесvolum med mer enn 10 % per uke, og å hoppe av økt om det murrer.

Langsiktig perspektiv

Det ultimate målet med alt det legen beskriver er å kunne løpe gjennom hele livet – ikke bare frem til neste konkurranse. Den største seieren er ikke å løpe et maraton på personlig rekord, men å kunne løpe trygt og regelmessig om ti år.

«Men her stopper vi på noe viktig: Langsiktigheter er ikke bare fysisk, det er minst like mye mentalt.»

Løpere som holder seg skadefrie over tid er ikke nødvendigvis de mest motiverte eller de med sterkest vilje – de er de som har bygget systemer som fungerer. De tar de riktige valgene og dropper treningsøkter når det trengs, og er overraskende dyktige på å legge massasjebordet og skadefri hverdag foran VM-finalen.

Oppsummering

Nøkkelpunkter fra kapitlet:

- SKADER SKJER OFTE I OVERGANGENE. Ikke under toppbelastning. Nye sko, ny underlag, ny intensitetsøkning – alle er involvert.
- ENKELTØKTER ER HØYERE RISIKO ENN UKESVOLUM. Løpere tar større risiko ved enkeltøkter enn ved gradvis økning av total ukесinnsats.
- KONTINUITET BESKYTTER. Kroppen som aldri mister tilpasningen, slipper de farlige nye tilpasningene. Løper fortsatt 45/15 progressivt hvert uke, hele året.
- SMÅ DRYPP AV LØPING KAN VÆRE REHABILITERING. Under best mulig forutsetning kan 2–3 minutter jogg noen ganger i uken være del av behandlingen.
- SJEKK FERRITIN, D-VITAMIN OG B12. Ferritin bør ligge over 50 µg/L, D-vitamin mellom 75–100 nmol/L.

- **LANGSIKTIGHET TRUMFER ALLTID.** Den største seieren er ikke personlig rekord. Det er å være skadefri nok til å løpe etter det.

Motivasjonstriks på veien

Innledning

Rett før VM-finalen i 2001 innrømmet forfatteren – en toppidrettsutøver – at han egentlig ikke var glad i å løpe. Han likte ikke den daglige slitasjen, de ensomme turene i regnet eller følelsen av melkesyre i beina. Det han derimot likte var prosjektet: jakten på det perfekte løpet, følelsen av mestring, systematikken i treningsdagboken og identiteten som løper.

Over tid hadde han bygget systemer som gjorde at han trente uansett motivasjon. Denne erkjennelsen dannet grunnlaget for hele hans filosofi om motivasjon.

For hvis en VM-finalist ikke alltid er motivert for å løpe, hvorfor skulle du være det?

Sannheten er at motivasjon ofte er overvurdert, mens gode systemer er undervurdert. Mange leter etter motivasjon som om det er noe de har mistet – som om det ligger gjemt et sted og venter på å bli funnet. Men motivasjon er ikke noe du finner. Det er noe du bygger, økt for økt, vane for vane, system for system.

Når realiteten treffer: Dopamin og motivasjon

Den første uken i et nytt treningsprogram er gjerne den letteste – kroppen pumper ut dopamin i forventning om belønning. Men etter hvert som kroppen tilpasser seg, reduseres dopaminslippen dramatisk. Dette er et kjent fenomen fra forskning på motivasjon, blant annet dokumentert av Teixeira og kolleger (2012) gjennom studier av fysisk aktivitet og selvbestemmelsesteori.

Figur 10.1 – Dopamin-nivå over tid (ved oppstart av treningsprogram)

Fase	Dopamin-nivå	Beskrivelse
Uke 1–2 <i>Oppstart</i>	● ● ● ● ●	Dopamin er høyt – forventning og nyhet driver motivasjonen opp dramatisk.
Uke 3–4 <i>Tilpasning</i>	● ● ●	Dopamin normaliserer seg. Kroppen tilpasser seg og spenningen avtar. Kritisk fase – mange slutter her.
Uke 5+ <i>Normalisering</i>	● ● ● ● ●	Dopamin stabiliserer seg på et lavere, bærekraftig nivå. Trening blir vane og rutine.

Forståelsen av denne dynamikken er nøkkelen: kroppen vil alltid normalisere seg over tid. Løsningen er ikke å jage etter motivasjonstoppen – men å bygge systemer som fungerer også i normaliserings- og tilpasningsfasene.

Fire teknikker for varig motivasjon

Disse fire teknikkene er enkle og praktisk gjennomførbare for de fleste. De fungerer ikke fordi de krever et komplisert system, men fordi de er robuste nok til å holde seg over lang tid.

Fire teknikker for varig motivasjon	
1 10-minuttersregelen	Forplikter deg kun til 10 minutters trening. Alle planlagte treningsøkter gjennomføres minst 10 minutter.
2 Anking til rutiner	Koble treningen til en allerede eksisterende aktivitet eller rutine i hverdagen (f.eks. morgenkaffe → treningssko på).
3 Motivasjon er noe du får, ikke noe du har	Motivasjon bygges gjennom handling, ikke omvendt. Aktive valg og gjentakelse skaper motivasjon over tid.
4 Sikkerhetsplanen	Ha en forhåndsbestemt plan for hektiske perioder, ferie eller sykdom. Minimal effektiv dose holder identiteten intakt.

Teknikk 1: 10-minuttersregelen

10-minuttersregelen er enkel: alle planlagte treningsøkter skal gjennomføres i minst 10 minutter. Du velger ikke å hoppe over treningen – du velger å gå ut og trene, og etter 10 minutter kan du velge å stoppe. De fleste fortsetter.

Figur 10.2 – Start med minimal forpliktelse: de fleste fortsetter	
1	Stå deg ut av sengen
2	Kom deg ut døren
3	Etter 10 min: Vurder på nytt – Du holder ut!
4	Hvis du stopper: Det er OK. Du holdt avtalen.

Erfaringen viser at hvis du løper 10 minutter og ikke like or sykt, vil de fleste gjennomføre.

Vitenskapen bak teknikken: Noen ganger som aktiv løper rusler jeg alltid ha en slags utgang. Hvorfor virker dette så effektivt? Det var sjelden og samtidig befriende. Teknikken innebærer alltid ha en tilgjengelighet til å trene, noe dem kaller gjennomføringsintensjonen: «Hvis jeg ikke har lyst til å trene, vil jeg likevel starte med 10 minutter.»

Studier har vist at si at alle planer gjennomføres i gjennomsnitt, nok til å koble spesifikke situasjoner til handlingen – situasjoner til handlinger – situasjoner som for noe drivende er at starte til å trene. I stedet for å kjempe en mental kamp hver gang, har du allerede tatt beslutningen på forhånd.

Teknikk 2: Anking til rutiner

Anking handler om å knytte treningen til en annen type aktivitet eller planlagt rutine – slik at du ikke trenger å ta en ny beslutning hver dag. Du ankrer treningen til noe som allerede er fast i hverdagen.

Eksempler på ankring:

- Morgenkaffe → treningssko på → ute av døren
- Hjemkomst fra jobb → skifte til treningstøy direkte
- Barna på skolen → løping starter

I hjernens basalganglier (dypere områder som er viktige i striatum, danning av nevr(e) forbindelser) aktiverer du disse etablerte handlinger. Ankringsforskning fra Trenz & Keith (2024) viser at If-then-planer øker både frekvensen av ønsket atferd og vanskeligheten ved oppgaven, men utvikler liksom automatisk atferd og øker gjennomsnittet av økt frekvens.

Praktiske ankringsstrategier:

Morgenankring: Kaffe leder til løpesko. Du går inn i de og setter direkte til treningssted.

Hjemkomstankring: Handling skaper motivasjon.

Poenget er å knytte det nye til noe som allerede fungerer direkte til treningssted.

Teknikk 3: «Motivasjon er noe du får, ikke noe du har»

En av de vanligste innvendingene fra pasienter og løpere er: «Jeg er ikke motivert for å trene.» Responsen er enkel: motivasjon er ikke en forutsetning for handling – det er en konsekvens.

Jeg ønsker den daglige ankringen til morgen og trening fremfor å aktivt velge dag for dag om jeg skal trene – akkurat den dagen.

På fastlegekontoret er en vanlig innvending: «Jeg er ikke motivert.» Svaret er: «Du må finne motivasjonen.» Men motivasjon fungerer ikke slik. Motivasjon kommer ikke automatisk – du må skape betingelsene for den.

Ved å ta et aktivt valg om å trene, selv om du ikke har lyst, og ved å ta dette valget mange ganger i uken, bygges det over tid en sterkere prediksjonsevne og robustere treningsvaner. For de som løper ikke kommer automatisk fra en ordinær treningsbeslutning, men er et fundamentalt skille mellom de som holder seg aktive i løpet av lang tid, og de med ekstra punkt.

Teknikk 4: Sikkerhetsplanen

Sikkerhetsplanen er en forhåndsbestemt plan for perioder der livet er hektisk – ferie, sykdom, høy arbeidsbelastning, eller andre hindringer. Den er ikke en motivasjonsplan, men en risikostyringsplan.

I disse periodene anbefaler forfatteren å finne en minimal effektiv dose: den minste mengden trening som dokumentert skader risikoen for full stopp. Mange løpere uten sikkerhetsplan stopper helt, og det er vanskelig å komme i gang igjen.

Når du opprettholder identiteten som en som trener, holder du døra åpen for å returnere til høyere volum senere.

Forskning støtter dette (Marcora et al., 2009; Van Cutsem et al., 2017; Pageaux & Lepers, 2018): psykologisk slitasje er reell. Etter en krevende arbeidsdag opplever kroppen samme fysiske belastning som hardere. En løper kan da regulere intensitet og volum i perioder med høy mental belastning, framfor å stoppe helt.

Mental slitasje påvirker prestasjon: kroppen kan levere fysisk, men evnen til å regulere mentalt krevende aktiviteter svekkes. Jo hardere man arbeider mentalt i løpet av dagen, jo vanskeligere er det å holde det samme tempoet på trening kvelden.

Et robust motivasjonssystem

De fire teknikkene over er velkjente for mange og kanskje ikke overraskende. De fungerer likevel ikke for alle like godt – fordi de ikke er ett komplisert system med mange ulike strategier du må holde styr på. Men jeg mener at disse fire teknikkene er en praktisk gjennomførbar, robust motivasjonssystem som kan hjelpe deg over lang tid, også i perioder med svikt.

Det viktigste er at du utvikler dine egne systemer. De beste utøverne er ikke alltid avhengig av daglig motivasjon, eller kontinuitet utfordringer. De har forstått at de bygget robuste systemer som fungerer uavhengig av daglig humør eller motivasjonsnivå.

Motivasjon skal fungere, men man faktisk også trene. Når det sagt, for at motivasjon skal fungere, helst, men man faktisk også vant å gjøre.

Og så er det bare én ting igjen: å dele litt erfaring og forskning rundt det som er sentralt inn i neste kapittel.

OPPSUMMERING – Kapittel 10

MOTIVASJON ER OVERVURDERT. Gode systemer er undervurdert. De som holder seg, trener over tid – ikke de mest motiverte. De har bygget vaner som fungerer når motivasjonen svikter.

10-MINUTTERSREGELEN. Alle planlagte økter gjennomføres minst 10 minutter for du velger å droppe. De fleste økter fullføres.

ANKING TIL RUTINER. Kobl trening til noe som allerede fungerer automatisk. Kaffe leder til løpesko. Hjemkomst leder til treningsantøy. Poenget er å fjerne valget.

MOTIVASJON ER NOE DU FÅR, IKKE NOE DU HAR. Liker du å trene? Gjør du det likevel? Den gode nyheten er at ved å ta aktive valg om å trene selv om du ikke er motivert, bygges motivasjonen. Beslutningen er tatt på forhånd.

SIKKERHETPLANEN. En løper hver syvende dag når livet presser på. Minimal effektiv dose holder kroppen ved like og opprettholder identiteten intakt.

MENTAL SLITASJE ER REELL. Etter en krevende arbeidsdag oppleves samme tempo som hardere. Vurder morgenøkter eller lettere trening.

Restitusjon og forebygging

I dette kapittelet gjennomgås fem hovedområder:

1. Styrketrening og dens plass i løpetreningen
2. Tøying og fleksibilitet
3. Varme- og kuldeterapi
4. Moderne sko
5. Energibalanse

Kapittelets kjernepåstand er at det ofte er stor forskjell mellom hva som gir deg følelsen av å være en seriøs utøver, og hva som faktisk gjør deg raskere og mindre skadeutsatt. Erfaringer fra kenyanske eliteløpere viser at svært god løpsøkonomi og lave skadehyppigheter kan oppnås uten komplekse restitusjonsprotokoller – bare ved å trene løpsspesifikt og strukturert.

1. Styrketrening

Metaanalyser viser at moderate treningsforbedringer – typisk 2–8 % etter 6–12 uker med styrke- eller plyometrisk trening – kan gi økt løpsøkonomi og maksimal muskelkraft. Nyere forskning (2024) bekrefter at effekten er størst ved høy belastning (≥ 80 % av 1RM), særlig ved høyere fart.

Men min erfaring tilsier at styrketrening kommer med skjulte kostnader som sjelden diskuteres.

Styrketrening innebærer risiko for skader, krever treningsvolum som konkurrerer med løpstreningen, og fører til økt muskelmasse som faktisk kan gjøre deg tyngre. Forfatteren introduserte strukturerte styrketreningsprogrammer i sin karriere med klassiske øvelser (knebøy, markløft, løpespesifikke bevegelser), og resultater var stor muskelvekst uten nevneverdig forbedring av løpsprestasjonen.

Praktisk tilnærming til styrketrening

Forfatteren skiller mellom to mål:

- Oppbygging: 6–12 uker med styrkeøkter per uke, inkludert eksplosive/plyometriske øvelser og raske bevegelser
- Vedlikehold: 1 økt per uke som vedlikeholder kapasiteten
- Høy belastning (≥ 80 % 1RM) eller plyometrisk arbeid (eksplosive) gir best effekt
- Legg gjerne styrketrening til terskeldager eller etter løpsøkter – ikke på rolige dager

Treningsmodeller for styrketrening

Tre modeller presenteres, avhengig av treningsstruktur:

- Modell A – Etter terskeldager: Terskel morgen → styrke/hurtighet direkte etterpå
- Modell B – For terskeldager: Styrke/hurtighet kveld → terskeldag neste dag
- Modell C – Etter X-økt: Hard X-økt + styrke/hurtighet etterpå, men dette kan påvirke muskelkvalitet

Oppsummering – Trenger du styrketrening?

Veiledende tabell:

Sannsynligvis IKKE behov for styrketrening	Kanskje behov for styrketrening
• er under 40 år • er skadefri • har kapasitet til mer løping	• er over 50 år (muskeltap) • har hatt mange skader • nærmer deg ølplassen • absolutt hvis du har kjent asymmetri

Aldersrelaterte endringer

Fra ~30-årsalderen starter en gradvis reduksjon i muskelmasse. Prosessen akselererer etter 50 år, og uten tiltak kan man miste opptil fem prosent muskelmasse per tiår. Styrketrening kan redusere musklenes taping av elastisitet og kraft, og bremse aldersrelaterte skader. For løpere over 50 år anbefales styrketrening spesielt for å opprettholde muskelmasse og skaderesistens.

Viktig advarsel: Mange asymmetriske skader oppstår fordi treningsbalansen generelt har vært dårlig. I slike tilfeller vil styrketrening bare maskere det underliggende problemet.

2. Tøying og fleksibilitet

Det er en utbredt myte at løpere bør tøye mye. Intuitivt virker det riktig, men forskning forteller en annen historie.

Hva sier forskningen?

En stor metaanalyse publisert i Sports Medicine Open (2025) med 181 deltakere og data fra langvarige studier fant at statisk tøying verken hadde dokumentert effekt på løpsøkonomi eller skadeforebygging. Kenyanske eliteløpere – kjent for nydelig løpsteknikk og svært lave skadefrekvenser – er typisk svært stive i de fleste bevegelsesretninger, men elastiske og effektive i løpsspesifikke bevegelser.

Statisk vs. dynamisk tøying (Figur 11.1)

Tabellen nedenfor viser forskjellene mellom statisk tøying og dynamisk oppvarming, basert på forskning:

STATISK TØYING	DYNAMISK OPPVARMING
- Ingen effekt på løpsøkonomi - Begrenset effekt på skadeforebygging - Ingen redusert kraftproduksjon for løping Lav prioritet	- Nevromuskulær aktivering av muskler - Temperaturøkning og forberedelse til prestasjon - Kan brukes for hurtige akter Anbefalt for harde akter

Konklusjon: Velg dynamisk oppvarming fremfor statisk tøying. Statisk tøying kan redusere kraftproduksjon akutt, spesielt ved tung styrketrening. Sensitiviteten – følelsen av at tøying hjelper – er reell, men effekten er ikke løpsøkonomisk. Den fleksible muskel-sene-enheten som oppstår ved dynamisk oppvarming kan faktisk gi høyere løpsøkonomi.

Nærkamp: Hva holder myten i live?

Tøying føles bra fordi:

- Det gir en subjektiv følelse av å ha gjort noe nyttig
- Det er en enkel aktivitet som kan erstatte vanskelige treningsbeslutninger
- Det er kulturelt forankret i løpemiljøet

For det første: Tøying reduserer sjelden skader med mange manglende treningsvolum eller utilstrekkelig belastningsstyring. For det andre: Rotasjon og innfasing av belastning er mer effektivt for skadeforebygging.

3. Varme- og kuldeterapi

Selv om det ikke finnes ett enkelt vitenskapelig svar, har kuldeterapi god empirisk støtte og er godt integrert i elitesløperens hverdag. Kald eksponering (iskaldt vann, kaldtvannsbad) reduserer betennelse og hjelper til hurtigere restitusjon.

Kaldtvannsbadprotokoll (Figur 11.2)

	KALDTVANNSBAD		VARMTVANNSBAD
Temperatur	5–12 °C	Temperatur	38–40 °C
Varighet	10–15 min	Varighet	15–20 min
Hyppighet	2–3 ganger per uke	Hyppighet	Rolige dager
Timing	Innen 1 time etter hard økt	Timing	På hviledager; senker muskeltonus

Nøkkelpoeng: Hyppig bruk av kaldtvannsbad (2–3 ganger per uke) kan dempe styrketilpasningene. Anbefalt bruk: aldri rett etter styrkeøkter, men helst etter harde løpsøkter. Kaldtvannsbad brukes primært for å senke muskeltonus, ikke som generell restitusjonsstrategi.

Varmtvannsbad

Varmtvannsbad (38–40 °C) i 15–20 minutter er best egnet på hviledager. Det kan senke muskeltonus og hjelpe på passive måter. En interessant studie av Dabhlainville og kolleger (2025) viste at varme bad kan simulere muskelregenerering. Kombiner gjerne kald og varm eksponering for å justere muskeltonus i løpet av dagen.

Praktisk tips: Bruk gjerne varmtvannsbad etter trening som timing anmoder, og kaldtvannsbad i tråd med de harde treningsdagene og spesielt der du ønsker mer restitusjon. Varme bad fungerer best etter min erfaring mellom kalde bad på rolige dager.

4. Moderne løpesko

Det er ikke overdrevet å si at moderne karbonatsko representerer et teknologisk sprang i løpesportens historie. Siden 2018–19 har toppmodeller dramatisk forbedret løpsøkonomien.

Hva er effekten?

Metabolsk kostnad er energiforbruket per distanseenhet, altså hvor mye du brenner for å forflytte deg. Moderne sko med karbonplate og responsivt skum gir circa 2–4 % lavere metabolsk kostnad sammenlignet med tradisjonelle løpesko (Hoogkamer et al., 2018). Effekten er størst ved hastighetene over 16 km/t.

Belastning, biomekanikk og skaderisiko

Forskning på løpsøkonomi, biomekaniske endringer og skaderisiko gir et sammensatt bilde. Karbonskoen endrer løpeformen – ofte reduseres løpernes fotekontakt på bakken og kontakttiden. Men det øker ikke nødvendigvis skaderisikoen: Studier viser at karbonskoen kan redusere bakketreffene for mange løpere, noe som reduserer stressbelastningen på skjelettets trekkfrakturrisiko.

Likevel er treningsbelastning den mest avgjørende faktoren. Skader skjer oftest ikke pga. skotype alene, men ved plutselig endring i belastningsvolum, intensitet, underlag eller hastighet. Den totale belastningskurven er det viktigste å overvåke.

Individuelle forskjeller

Kanskje mest interessant er individuelle forskjeller i løpeteknikk og tilpasning over tid.

Det er dokumentert at løpere responderer svært ulikt på moderne sko. For noen gir de ikke noe positivt. Andre opplever umiddelbar forbedring. Forfatterens erfaring er at det er fornuftig å bruke moderne sko på rasle, intense treninger og konkurranser, men å kombinere dem med tradisjonelle sko på rolige dager for å unngå at kroppen blir avhengig av dem.

5. Energibalanse

Energibalanse er kanskje det mest undervurderte emnet i løpefaget. Mange løpere har riktig kalorikontroll, men glemmer at kroppen faktisk påvirkes kaloritelling alene ikke nok.

Anbefalinger for energitilgjengelighet (Anbefaling fra studie, 2024)

Parameter	Moderat belastning	Høy belastning
Karbohydrater	5–7 g/kg/dag	7–10 g/kg/dag
Protein	1,6–2,2 g/kg/dag	2,2 g/kg/dag (fordelt 3–4 måltider)
LEA (Low Energy Availability)	< 30 kcal/kg fettfri masse/dag	Økt risiko for sykdom og skader

Low Energy Availability (LEA)

LEA defineres som < 30 kcal/kg fettfri masse/dag og medfører:

- Økt risiko for sykdom og skader
- Redusert immunfunksjon
- Dårligere psykologiske funksjoner – trening og løping gjøres dårligere

- Redusert grunnleggende fysiologisk fungering, inkl. restitusjon

En studie fra 2024 i *Frontiers in Public Health* viste at en betydelig andel av utholdenhetsutøvere ikke spiser nok til å dekke energibehovet. Særlig gjelder dette kvinner.

Rotasjon og innfasing

Forfatteren anbefaler en balansert veksling mellom intensive og rolige perioder. Det å rotere mellom karbonskoen og tradisjonelle sko er et godt bilde på prinsippet: Du trenger variasjon – i belastning, underlag, hastighet og teknikkfokus. En gradvis og forutsigbar opptrapping av belastning er den beste skadeforebyggingen.

Bør faste fridager planlegges?

Fridager er viktige for restitusjon. Nøkkelpunktet fra kapittelet er at det sjeldenste fridagsmønsteret passer best for mange løpere – fordi kroppen gradvis tilpasser seg belastningen. Konkurranses- og treningssesongen innebærer perioder med mer intense treninger, men disse må planlegges med hensyn til helhetlig energibalanse og vedlikehold av immunforsvaret.

Integrert tilnærming – Helhetlig restitusjon

Restitusjon og forebygging handler ikke om å finne magiske løsninger, men om å bygge bærekraftige systemer som støtter den systematiske treningsstrukturen. Moderne sko kan gi prestasjonsgevinster, men styrketrening er ikke nødvendigvis avgjørende. Termisk terapi fungerer, men krever kunnskap om timing.

En smart og rasjonell løper er en som forstår disse sammenhengene og justerer tiltakene basert på faktiske behov – ikke hva som føles mest profesjonelt.

Oppsummering – Kapittelkonklusjoner:

RESTITUSJON AVGJØR HVOR MYE DU FÅR UT AV TRENINGEN. Søvn, kosthold, hviledager og små hverdagsvalg bestemmer om kroppen klarer å absorbere belastningene.

STYRKETRENING HAR SIN Plass FOR NOEN. Spesielt over 50 år. Økt 2–4 % ved lavere energiforbruk. Men vurder muskeltonus mellom løpeøkter.

MODERNE SKO ER DET STØRSTE TEKNOLOGISKE SPRANGET. Gir dramatisk færre akilleskader. Løpsspesifikt.

TERMISK TERAPI FUNGERER. Kalde bad (5–12 °C i 10–15 minutter) etter harde øk. Varme bad på rolige dager. En av få passive metoder å justere muskeltonus på.

TØYING ER IKKE SÅ VIKTIG SOM DU TROR. Forskning viser liten til skadeforebygging. Løpsspesifikk tøying kan erstatte det.

SPIS NOK. Lav energitilgjengelighet gir dårligere restitusjon og økt immunsuppresjon. Optimal treningssvekt og konkurransevekt kan være forskjellig.

Unngå overtrening

Varselsignaler og justeringer

Innledning – Varselsignaler og overtrening

Overtrening er et mye vanligere fenomen enn de fleste tror – det rammer ikke bare eliteutøvere, men alle som trener hardt og jevnlig. De tidligste symptomene er subtile: løpere og mosjonister kjenner gjerne en tretthet som virker normal, men som gradvis forverres. Kroppen sender signaler lenge før den stopper helt.

Et sentralt poeng er at kun noen få treningsøkter kombinert med lite søvn og infeksjon kan føre til overbelastning. Det er mye mer vanlig enn belastningstoleransen egentlig skulle tilsi.

De tidlige varselsignalene

De første tegnene på overtrening er ofte psykologiske og subjektive, ikke fysiske. De kommer gradvis, og det er lett å ignorere dem – nettopp fordi mosjonisters smerteterskel og treningsdrift gjerne overstyrer kroppens signaler.

Typiske tidlige varselsignaler inkluderer:

- Søvnforstyrrelser: Problemer med å sovne eller urolig søvn, oppvåkning mellom 03:00–05:00 (kortisol-topp)
- Rastløs søvn med hyppige posisjonsendringer
- Marerittaktig søvn eller intense drømmer
- Følelse av å ikke hvile seg – selv om du faktisk sover
- Imsoingsproblemer til tross for utmattelse

Mentale symptomer som motivasjonstap, økt irritabilitet og angst for planlagte treningsøkter er varselsignaler som dukker opp tidlig. Overtrening påvirker kroppens stressreaksjonssystem (HPA-aksen), noe som forstyrrer kortisol- og hormonnivåene.

Tap av motivasjon

Forskning viser at kronisk forhøyet kortisolnivå øker den normale treningstrøttenheten markant. Motivasjonstap er kroppens forsvarssystem: det er ikke latskap, men et tegn på at kroppen allerede har blitt overbelastet. Sjekk HRV-målinger og treningsdagbok for å vurdere kvaliteten på søvnen.

Hvilepuls – et sentralt verktøy

Hvilepuls er en av de enkleste og mest tilgjengelige parameterne for å oppdage begynnende overtrening. En gradvis økning i hvilepuls over dager og uker er et tydelig signal om at kroppen ikke restituerer seg tilfredsstillende.

Slik måler du hvilepuls korrekt

- Mål umiddelbart etter oppvåkning, før du står opp
- Mål puls i 30 sekunder x 2, eller bruk pulsklokke
- Noter verdien i treningsdagboken
- Vær i liggende posisjon, helt avslappet
- Se etter trender over 7–14 dager

Tolkning av endringer:

Hvilepuls: +/- 2–3 slag fra daglig snitt = normalt (grønt lys)

Alarmerande: +8–10 slag over gjennomsnittet

Bekymringsverdig: +10–15 slag som ikke normaliseres med hvile

Kritisk: +10–15 slag som ikke normaliseres

Viktig presisering: Det er ikke de absolutte tallene i seg selv som betyr noe – det er endringene over tid. En økning på 8–10 slag fra ens eget gjennomsnitt er et alvorlig varsel, selv om absoluttverdien fortsatt er innenfor «normalen».

Søvnssymptomer

Søvnforstyrrelser er ofte det aller første symptomet på overtreningssyndrom. Endokrine hormoner er essensielle for fysiologiske reaksjoner og tilpasninger etter fysisk arbeid – og søvnen er ofte første offer.

Søvnkvaliteten påvirkes direkte av hormonell ubalanse: kortisol i ubalanse forstyrrer den normale døgnrytmen, og kroppen klarer ikke å komme seg ned i dypere søvnfaser selv om utmattelsen er stor. Moderne pulsklokker med HRV-funksjon kan gi verdifull informasjon om søvnkvaliteten.

Prestasjonsstagnasjon

Når resultatene stagnerer eller faller – til tross for jevnlig og hardt treningsarbeid – er det et klassisk tegn på overtrening. Her reduseres pulsen ved underterskeltempo progressivt, og musklene klarer ikke å mobilisere normal stresskortisol-respons.

Restitusjon tar lengre tid enn normalt. Muskulaturen mobiliserer ekstra ressurser, men dette koster mer. I respons på en standardisert økt med høy intensitet viser underterskeltreningsøkter en reduksjon i den dynamiske utholdenhetsfunksjonen.

Tunge bein – et nøkkelsignal

Et av de mest karakteristiske tegnene på begynnende overtrening er følelsen av tunge bein. I løpet av en 10-dagers treningsperiode bør man kjenne minst én økt der beina føles skikkelig gode – ellers er det et tegn på for stor belastning.

Muskeltonus er en viktig faktor. Trappetesten fanger opp endringer i muskeltonus og elastisitet allerede før de psykologiske tegnene inntreffer. Muskler som er for harde (hypertone) eller for slappe, gir informasjon om restitusjonstatus.

Trappetesten – en smart og praktisk metode

Trappetesten er en av de mest praktiske og tilgjengelige verktøyene for å oppdage begynnende overtrening daglig. Den krever ingen spesialutstyr og tar bare noen minutter å gjennomføre.

Metoden baserer seg på at muskulær elastisitet og tonus endrer seg merkbart ved overbelastning – ofte FØR de subjektive symptomene (som tretthet eller motivasjonstap) gjør det. Trappetesten gir deg en tidlig og objektiv markør.

Daglig gjennomføring av trappetesten

- Velg deg ut et kort trappeløp som du kan gå daglig, samme trapper
- Gå opp trappene med bevisst oppmerksomhet på kroppen, konsenter deg på lårmusklene
- Over tid utvikler du en følsomhet for dine normale variasjoner
- Den muskulære opplevelsen i lårene – hvor lett de oppleves, stive eller trege
- Dager hvor trappene føles uvanlig tunge, hviler lårene seg stivere enn normalt
- Dager hvor trappene er tidlig signal om at restitusjonen ikke holder tritt med belastningen

Slik kjenner du trappetesten på kroppen: Legg og bredd grep rundt muskulaturen, kjenn på tonus ved å bevege musklene. Stiv muskel = høy tonus. Slapp muskel = lav tonus. Med erfaring lærer du din normale baseline – og avvik fra denne sier deg mye.

Ikke løping, ikke intervaller, bare det enkle å gå opp en vanlig trapp. Det er dette trappetesten handler om: å gi deg et verktøy for tidlig oppdagelse, basert på vitenskapelig forskning.

Muskulær status

Trappetesten fanger opp noe viktig: Muskulaturen reagerer for mye annet enn motivasjon. Den er faktisk den genuine indikatoren for restitusjonsstatus. For søvnmangel, motivasjonstap og lignende kan ha mange årsaker – men muskulaturen lyver sjelden.

Spesielt viktig: Løpere som trener med høy belastning utsetter seg for risiko for å overse muskeltonus-signalene. Tunge bein og økt stivhet etter vanlig trening er tegn på at kroppen er i ferd med å overskride sin kapasitet.

Objektive markører

HRV-måling (Heart Rate Variability)

HRV har blitt den nye «gullstandarden» for treningsovervåking. Moderne pulsklokker med HRV-funksjon gir progressiv overvåking, og måler nyansen i hjerterekkefølgen mellom hvert slag. Den vanlige responsen hos overtrekere er en progressiv reduksjon i HRV.

To typer overtrening – HRV-respons

Sympatisk overtrening (tidlig fase): Økt eller ustabil HRV, redusert søvnkvalitet og depressive symptomer.

Parasympatisk overtrening (sen fase): Redusert HRV, økt hvilepuls, lavere treningskapasitet og irritabilitet.

Protokoll: Anbefalt testprotokoll ved laktatbasert trening. Start med 10 min oppvarming. Sammenlign med submax standardtest hver 4. uke. 3–5 ganger 5 min ved terskelart lakt. opp mot hastighet for å fange opp mønstre. Ønsker du å korrelere laktat til puls og høy hastighet.

Laktatprofil

For dem som har tilgang til laktatmåling gir endringer i laktatprofilen uvurderlig innsikt i overtreningstilstander. Laktatprofil-endringer ved overtrening:

Fase	Beskrivelse
Fase 1 – Tidlig	Laktat øker 0,5–1,0 mmol/L ved standard hastigheter. Hjerterefrekvens er normal eller lett forhøyet. Subjektivt føles lett forhøyet anstrengelse.
Fase 2 – Overtrening	Laktat øker 1,5–2,0 mmol/L ved standard intensitet. Kraftig økt opplevd anstrengelse, vanskeligheter med å komme opp i fart.
Fase 3 – Alvorlig	Manglende evne til å produsere høye laktater. Flat laktatprofil selv ved maksimal intensitet. Hvilepuls er høy, laktatprofil er lav.

Blodprøver

Blodprøver gir supplerende informasjon, men er ikke alltid nødvendig. Viktige markører inkluderer:

- Kreatin kinase (CK): Hvile < 200 U/L = normalt. Bekymringsverdig > 300–600 U/L. Alvorlig > 800 U/L. Overtrening: Kronisk forhøyet selv etter hvile
- Testosteron og kortisol-ratio: Normal ratio 30–40. Overtrening: < 20. Bekymringsverdig: < 15
- Andre relevante parametere: TSH/T4 (stoffskifte), hemoglobin, B12, D-vitamin, trombocytter/leukocytter, jern/leveprøver

Justeringsstrategier – praktiske tiltak

Reduksjon av intensitet, ikke volum

Det er mer effektivt å redusere treningsintensiteten fremfor å redusere volumet drastisk. Forskning viser at det å kutte treningsvolumet kan gi feil tilnærming og øke risikoen for å bryte ned tilpasningsprosessen. Anbefalt tilnærming ved mistanke om overtrening:

- Reduser til 70 % av makspuls på de fleste øktene og gi kroppen tid til å bygge en solid base
- Hold volumet med 20–30 % redusert intensitet fremfor å kutte all trening
- Kombiner gjerne med 45/15-sekunders løp (lett jogging) som aktiv restitusjon

Supertrening (hver 4. uke)

Periodisering med en planlagt «supertrening» hver 4. uke er en strukturert metode for å bygge kondisjon uten å risikere overtrening. Denne strukturen ser slik ut:

- Intensitet: Maksimalt på kortere intervaller som 45/15
- Volum: 60–70 % av normal uke
- Kvalitet: Ikke mer enn 4–5 kortintervall-løp
- Vektøkter: Svært rolig, men økt volum kan økes på lengre muskler
- Gjerne innslag av massasje og varme/kalde bad for å øke muskulær restitusjon

Bufferukene

I tråd med prinsippet om at kortintervaller effektivt kan brukes for å nullstille en overbelastet muskulatur, kan det derfor være lurt å legge inn en liten buffer når du starter noe nytt eller etter en overtrenerperiode. Beina begynner å hunge igjen, men alle bremses settes på.

Figur 12.1 – Trafikklymodellen: Daglig justeringsverktøy

Trafikklymodellen er et praktisk verktøy for å justere dagens økt dynamisk basert på kroppens signaler. Den kombinerer objektive og subjektive parametre fra oppvarmingen for å avgjøre om du skal trene hardt, normalt eller ta det med ro.

	Hvilepuls Lav / Normal	HRV Høy / Normal / Lav	Trapper Lett / OK / Tungt	Oppvpuls Lav / Normal / Høy	Følelse Lett / OK / Tungt
GRØNT LYS	Lav hvilepuls + lav oppvarmingspuls	Høy / Normal	Lett i trapper	Lav / Normal	Lett / OK
<i>Handling</i>	Gjennomfør planlagt økt. Forleng øktens varighet gjerne 30–40 %				
GULT LYS	Alle parametre i gjennomsnittsmodus	Normal	Lav / Normal / Lav	Normal	OK
<i>Handling</i>	Gjennomfør planlagt økt, men ikke øk belastningen				
RØDT LYS	Høy hvilepuls + høy HRV, lav HRV, lav følelse/lav fart	Lav	Tungt	Høy	Tung
<i>Handling</i>	Avbryt økten. En eller flere avvikende parametre: høy oppvpuls, tung følelse/lav fart, høy hvilepuls, lav HRV. 1 dag fri.				

Eksempel fra praksis: En løper hadde 4 dager med min 13:06 tid på 5000 meter ved terskelgang på 181 slag per minutt (3 slag under makspuls). Ved 3,0 mmol/L laktat og lav hvilepuls var alt grønt lys for hard trening.

Slik bruker du trafikklymodellen

- Grønt lys: Lav hvilepuls og høy oppvarmingspuls = gjennomfør planlagt økt, forleng gjerne 30–40 %
- Gult lys: Alle parametere i gjennomsnittsmodus = gjennomfør, men øk ikke belastningen
- Rødt lys: En eller flere avvikende parametere = avbryt eller sterkt reduser. 1 dag fri

Konklusjon

Overtrening er ikke et tegn på svakhet – det er et tegn på ambisjon som har løpt fra virkeligheten. Det er essensielt å bruke varselsignalene og justeringsstrategiene systematisk over tid, slik at kroppen kan utvikle seg optimalt og prestere på sitt beste.

Husk at du kan gjøre litt mindre. Den beste treningen er den du kan gjøre lenge nok og effektivt nok. Varselsignalene og justeringsstrategiene er dine verktøy – bruk dem trygt og effektivt for å unngå skader og prestere bedre.

OPPSUMMERING

DE TIDLIGE SIGNALENE KOMMER ALLTID FØRST

- Søvnforstyrrelser, økt hvilepuls og prestasjonsstagnasjon er de første signalene. Gå deretter med tunge bein og motivasjonstap.

TRAPPETESTEN ER OVERRASKENDE PRESIS

- Trappetesten fanger opp muskulær tonus-endring tidlig. Toppform, dagsform, treningssmottakelighet, overtrening – i prinsippet ett trinn på trappa er du en hel ny dimensjon i treningen.

MUSKULÆR STATUS STYRER DET MESTE

- Trappetesten og muskeltonus er dine beste verktøy. Feels lavt tungt? Det er ofte det tidlige signalet om at restitusjonen ikke holder tritt med belastningen.

TRAFIKKLYMODELLEN. Juster øktens dynamikk ut fra kroppens signaler.

- Grønt lys: Forleng økten. Gult lys: Gjennomfør som planlagt. Rødt lys: Avbryt økten og ta 1 dag fri.

VED OVERTRENING, REDUSER INTENSITET, IKKE VOLUM.

- Hold beina og trening oppe, men legg beina inn på 45/15 og 30/30 for å stimulere muskulaturen tilbake. Hold rolig trening oppe; ellers risikerer du at muskulaturen vil bli vanskelig tung tilbake.

INNEN 10 DAGER BØR MINST ÉN ØKT FØLES SKIKKELIG GOD.

- Lette bein og irsettelse for å legge på mer. Ellers risikerer du at muskulaturen vil bli vanskelig tung tilbake. Kommer ikke den følelsen, bør alle bremses settes på.

Kjønn og alder

1. Innledning

Treningsforskning har lenge vært dominert av mannlige deltakere, noe som betyr at mange anbefalinger ikke fullt ut gjelder for kvinner. De fleste studier på terskeltrening, VO₂maks og laktaprofiler er gjort på menn i 20-, 30- og 40-årsalderen. Prinsippene er i stor grad de samme for begge kjønn, men det finnes viktige forskjeller – særlig knyttet til hormoner, jernstatus og energitilgjengelighet.

2. Kvinner – hormoner, jern og energi

2.1 Menstruasjonssyklus

Menstruasjonssyklus påvirker kvinners fysiologi på måter som kan merkes i trening. Effektene varierer enormt fra kvinne til kvinne, og noen opplever tydelige hormonsvingninger gjennom måneden. Syklusen kan deles inn i fire faser med ulik respons på belastning:

- Follikelfasen (dag 1–14): Østrogen stiger og mange kvinner opplever økt styrke, bedre koordinasjon og høyere forbrenning. Insulinfølsomheten er bedre.
- Tidlig lutealfase (dag 15–28): Progesteron øker. Kroppen er varm og noen opplever større trettbarhet.
- Sen lutealfase: Begge hormoner faller, og noen merker PMS-liknende symptomer som påvirker trening negativt.

2.2 Terskelverdier og energitilgjengelighet

Terskeltrening fungerer likt for kvinner som for menn – prinsippene er de samme. Det som skiller seg ut er terskelverdier for jern (serumferritin) og energitilgjengelighet som faktorer som spesielt påvirker kvinnelige løpere. Kapittelet tar for seg hvordan kvinner bør justere terskelmetoden gjennom løpingen og livet.

2.3 Periodisering for kvinner

Kvinner fungerer bedre i treningsblokker som er tilpasset syklusvariasjon. I stedet for å bruke samme blokker som menn, kan det å ta hensyn til syklusvariasjonen gi bedre respons og lavere risiko for overbelastning. Figur 13.1 viser et forslag til 4-ukers periodisering tilpasset menstruasjonssyklus.

Figur 13.1 – Mulig periodisering tilpasset menstruasjonssyklus

Fase	UKE 1 Menstruasjon	UKE 2 Sen follikel	UKE 3 Tidlig luteal	UKE 4 Sen luteal
Treningsvolum	Moderat volum. Kroppen ofte mer sliten. Respekter det.	Ok beste periode for harde okter.	Taler ofte mer volum.	Juster etter dagsform. Stor variasjon. Lytt til kroppen.

Fase	UKE 1 Menstruasjon	UKE 2 Sen follikel	UKE 3 Tidlig luteal	UKE 4 Sen luteal
Mulig periodisering	Lav intensitet, lavere volum	Ok intensitet	Høyere belastning	Juster volum

Praktisk tips:

Hvis du merker at du har gode og dårlige perioder som følger syklusen, legg de tøffeste øktene til perioden der du føler deg sterkest. Dagformen tumler rundt dag 10–14, men ikke la dette bli en tvangstrøye – juster etter hvordan du faktisk føler deg. Prøv å gi kroppen mest og best mulig trening når syklusen er tilpasset. Ikke la signalene der du ikke merker noen variasjon gjennom måneden bety at problemet ikke finnes.

3. Jernmangel

Jernmangel er et vanlig problem blant kvinnelige løpere, og det er en av de viktigste faktorene som kan begrense prestasjonsevnen. Ferritin under 18–30 µg/L er ikke uvanlig, men nivåer under 30 µg/L kan påvirke oksygentransport og restitusjon selv uten at du er klinisk anemisk.

Løpere taper jern gjennom:

- Menstruasjon (største kilde for kvinner)
- Svette og tarmblødninger fra løping (hæmolyse i fotsålen)
- Dårlig jernopptak fra kosten

Ferritin bør ligge over 30 µg/L, men helst over 50 µg/L for kvinnelige løpere. Ferritinmåling er enkel og bør gjøres regelmessig – spesielt ved vedvarende tretthet, tungt i beina og manglende fremgang.

4. Energertilgjengelighet og RED-S

4.1 Lav energertilgjengelighet

Lav energertilgjengelighet er trolig den mest undervurderte faktoren i kvinnelig klinisk løping. Det handler ikke om vilje eller enkle regnestykker, men om at kroppen ikke får nok energi til å drive både trening og normale kroppsfunksjoner. Mange løpere lever kronisk i dette området uten å vite det.

Eksempel: Slik ser energertilgjengelighet ut i praksis

Kvinne: 60 kg, 20 prosent kroppsfett

Spiser: 2200 kcal

Trening: 600 kcal

Fettfri masse: 48 kg

Energitilgjengelighet: $(2200 - 600) / 48 = 33$ kcal per kilo fettfri masse

Med litt mer trening eller litt mindre mat er hun plutselig under 30, som regnes som lav energitilgjengelighet (LEA).

4.2 RED-S – når kroppen slår på bremsen

RED-S (Relative Energy Deficiency in Sport) er konsekvensen av langvarig lav energitilgjengelighet. Menstruasjonsforstyrrelser er det mest synlige signalet, men kroppen prioriterer ressursene bort fra reproduksjon. Andre konsekvenser inkluderer:

- Økt risiko for stressfrakturer og osteoporose
- Svekket immunforsvar
- Hormonell ubalanse og nedgang i stoffskiftet
- Dårligere restitusjon og økt skaderisiko

Kroppen mangler byggeskteiner til den daglige renovasjonen av skjelett og muskler. Løpere med lav energitilgjengelighet gir ikke den kroppens normale mulighet til å tilpasse seg over tid. Forskning (Alfonso og kolleger, 2025) viste at daglig HRV og opplevd velvære kan fange opp disse faktorene.

4.3 Praktiske grep mot lav energitilgjengelighet

Nøkkelen er å øke den totale matinntaket, ikke redusere belastningen. Mange løpere som sliter med dette bør prioritere:

- Minst 45 kcal per kg fettfri masse per dag for å dekke behovet
- Minst 5–7 gram karbohydrat per kilo kroppsvekt ved moderat treningsbelastning
- Minst 2 700 kcal ved høyere belastning, men mengden er individuell
- Minimum 1,4–2,0 gram protein per kilo ved tilstrekkelig trening

5. Overgangsalder og løping

For mange kvinner mellom 45 og 55 er overgangsalderen en faktor som påvirker løpingen betydelig. Typiske symptomer inkluderer søvnforstyrrelser, hetebølger, vektendringer og humørsvingninger. Mange av disse påvirker trening direkte og indirekte. Styrketrening er viktig for å bremse muskeltap og beinsvinn.

Nakkepoenget: Hormonterapi (HRT)

Hormonterapi er et medisinsk valg man må ta med legen. Ikke tren treneren. I Norge har behandling vært tilgjengelig siden 2012, og opplevelsen har vært god for mange. Restitusjonsforbedring tar lengre tid, eller starter etter at restitusjonsfasen er fast.

5.1 Treningsjustering ved overgangsalder

Min erfaring er å justere totalbelastningen av trening generelt i denne perioden. Spesielt de lengste terskellintervallene bør reduseres til man klarer å regulere seg inn, tungere er enn mange lange intervaller fra 6–10 minutter til 1:30 minutter total intervalltid.

- Juster ned totalbelastningen gradvis
- Bruk kortere intervaller fra 30 sekunder til 1:30 minutter
- Totalintervallperioden bør totalt holdes mellom okt 20 minutter
- Bruk kortere intervallfrekvens mellom 6–10 minutter for å forbedre seg

6. Aldring – fysiologiske endringer med alder

Aldring påvirker alle aspekter av løpingen din, avhengig av fysiologi. Det er ingen vet utenom, men løpet som begynner å preges av alder taler rett og sleit – ikke overdriv treningen.

Fysiologiske endringer med alder

VO₂maks: Reduseres med cirka 5–10 prosent per tiår etter fylte 30. God veteran kan holde nedgangen nærmere 5 prosent.

Maksimal hjerterefrekvens: Synker i snitt litt under ett slag per år. Du får lavere makspuls om enn en 35-åring.

Muskelmasse: Reduseres. Mer seneere og mer sårbare. Bli stivere og mer sårbare.

Sener og leddbånd: Mister elastisitet. Kroppen bruker lengre tid på å bygge opp etter overbelastning.

Proteinsyntesen: Blir tregere. Kroppen trenger lengre tid etter nedbrytning.

6.1 Hvorfor terskeltrening er ideelt for eldre løpere

Restitusjonsbehov øker med alderen. Terskeltrenig gir høy effekt per minutt uten den ekstreme belastningen fra maksimale intervaller. Mange studier antyder at løpere over 50 trenger nærmere 48–72 timer for full restitusjon etter en hard økt.

7. Slik justeres terskeltreningen etter alder

7.1 40–50 år

Fra 40-årsalderen begynner restitusjonensbehovet å stige tydelig. Det er ingen dramatikk, men kroppens evne til å håndtere belastning endrer seg. Du vakner kanskje litt stivere dagen etter en hard økt. Treningsvolumet bør reduseres 20–30 %.

- Terskeltolktene holdes 3x10 minutter i stedet for 4x10 minutter
- Lengste terskeltolktene med 20–30 minutter
- 4 x terskeltreningsøkter anbefales
- Hvil opp til 4 terskeltolkter opp til 4 x per uke – det er et signal du bør ta på alvor

7.2 50–60 år

Terskelkjøring gir mye effekt for hvert minutt du taler, uten den ekstreme belastningen fra maksimale intervaller. Dersom du ønsker å øke intensiteten over terskelen, bruk gjerne 45/15-intervaller der du progressivt bygger det inn i belastningen. Da gir du gradvis inn i belastning med alderen, som også er viktig med tanke på skaderisiko.

- 2 terskeldager per uke maks – og god kontroll underveis
- 45/15-intervaller fungerer godt og er skånsomme
- Vurder å korte ned de enkle terskeltolktene ytterligere

7.3 60 år og oppover

Nå handler det primært om å holde på det du har. Kostnadene øker og risikoen for skader likeså. 45/15-intervaller er fortsatt mulige, men den beste konsekvent holdes nede i fart. For andre økte konsekvent holdes nede uten den store farten – det er selvregulerting.

- Lange drag ved rolig trening uten den store terskelblokken
- Muskulær elastisitet og nevro-muskulær funksjon er nedprioritert – men likevel viktig
- Vedlikehold og kontinuitet fremfor økt intensitet

Figur 13.2 – Hvordan justere terskeltreningen gjennom fasene

Kategori	40–50 år	50–60 år	60+ år
Terskelfart	Fint for de fleste	2 terskeldager/uke OK	Lange drag
Treningsvolum	Reduser 20–30 %	Viktigst	Vedlikehold
Intervaller	4×7–8 min vs 4×10	Bruk 45/15 progressivt	Færre/lettere okter
Rolige dager	2 per uke maks	Intensitet over terskel OK	Hold ta det du har
Beste format	45/15 under terskel Rolig + litt akt tempo	Unngå absolutt	Juster volum

Praktisk tips: 50–60 år

Vurder å korte ned de enkle terskeltolktene per økt, kan variere mellom 20–25 minutter terskelarbeid per økt. En typisk uke kan se slik ut: tirsdag og torsdag terskelarbeid, fredag og kanskje lørdag terskeldager. Noen teller måneden av terskeltolktene over tid, men samme aldersgruppen teller fra der man er – og du kan gjøre det igjen om noen år.

8. Styrketrening som vedlikehold etter 40

Styrketrening blir viktigere enn noen gang etter fylte 40, men det trenger ikke være komplisert. 15–20 minutter 1–2 ganger per uke er et minimumsprogram. Tre heller like gjennomført enn tung styrke, men gjennomfør dette:

- Tåhev med vekt – for leggmuskulatur og akillessener
- Rumensk markløft – for hoftemuskulatur og hamstrings
- Step-ups – for hoftebøyere, markløft eller etbens markløft– for hamstrings og balanse

Jeg anbefaler å konsentrere deg om få øvelser, gjort ordentlig. Gjennomfør disse helst i samme takt for fullstendig kontroll på bevegelsen.

Etter 40 trenger du ikke like mange repetisjoner som siste gang. Det er en treningsøvelse og vedlikehold. Du gjør det ikke fordi du er strevende, men fordi det er vedlikehold for deg selv. Det kan lønne seg å velge alternativer og skader og tap av funksjon over tid.

9. Oppsummering

Oppsummering

- SYKLUSVARIASJON ER INDIVIDUELL. Noen merker tydelig forskjell gjennom måneden, andre ingenting. Hvis du merker et mønster, legg de tøffeste øktene til periodene der du føler deg sterkest.
- FERRITIN PÅ 18 µg/L ER NORMALT, MEN IKKE NOK. For en løper som trener fem til seks ganger i uken, bør ferritin ligge over 30–50 µg/L. Riktig behandling fungerer bedre enn lange terskeltolktene i denne perioden.
- OVERGANGSALDEREN PÅVIRKER TRENINGEN. Søvnforstyrrelser, hetebølger og ledd smerter bidrar til å prege terskeltreningen. Kortere terskeltolktene og lavere restitusjonstid fungerer bedre enn lange maksimale intervaller. Ideelt for veteraner.
- MED ALDER TAR RESTITUSJON LENGRE TID. Terskeltrening gir høy effekt per minutt belastning, uten den ekstreme situasjonen gir høy intensitet pr. minutt belastning. Ideelt for veteraner.
- STYRKETRENING BLI VEDLIKEHOLD. 15–20 minutter 1–2 ganger per uke, ikke fordi det er spennende, men fordi kontinuitet er viktigere enn noen gang. Etter alder teller aldersgruppen mer på sikt – ikke fordi det er spennende, men fordi kontinuitet er viktig.

- ETTER 40: UNNGÅ AVBRUDD. Sener og muskler som preges av alder- og av-perioder mellom treninger innebærer. Så ønsker du å trene dette rett og sleit – trent strukturert, prioritert og jevnt.

MUSKELTONUS

1. Hva er muskeltonus?

Muskeltonus er den passive, kontinuerlige spenningen i muskulaturen – det som gjør at muskler verken er helt slappe eller aktiv sammentrekkende i hvile. Tonus handler ikke om styrke, men om musklens beredskap og elastisitet.

Muskulære faktorer (tonus, elastisitet) er grunnleggende for prestasjoner, og er minst like viktige som tekniske ferdigheter. Riktig muskeltonus gir bedre løpsøkonomi, kraftoverføring og skadeforebygging.

2. Tre sentrale begreper

2.1 Muskeltonus

Grunnleggende spenning i muskelen i hvile. Reguleres av nervesystemet og er utgangspunktet for all bevegelse. Påvirkes av både aktive og passive faktorer.

2.2 Muskelelastisitet

Muskelens evne til å returnere til sin opprinnelige form etter å ha blitt strukket. Elastisitet bidrar til kraft ved fraspark og øker den aktive stivheten mellom kollagen og myosin.

To typer bindevev:

- Kollagenfibre: Bidrar til stivhet og kraft
- Elastiske fibre: Bidrar til fjæring, timing og energilagring

2.3 Muskelstivhet

Muskelens motstand mot å bli strukket. Optimal stivhet komprimerer muskelen ved belastning og frigjør energi effektivt. For høy eller for lav stivhet reduserer prestasjonsevnen.

Stivhet henger tett sammen med tonus og elastisitet: en velbalansert muskel er stiv nok til å overføre kraft, men smidig nok til ikke å hemme bevegelsen.

Oversikt: Sammenhengen mellom de tre begrepene

Begrep	Definisjon	Praktisk betydning
Muskeltonus	Hvilespenning i muskelen	Beredskap og reaktivitet
Muskelelastisitet	Evne til å returnere etter strekk	Kraftoverføring og fjæring
Muskelstivhet	Motstand mot strekk	Løpeøkonomi og skadeforebygging

3. Praktisk optimalisering av muskeltonus

3.1 Aktiv påvirkning: Treningsstruktur

Høy treningsintensitet øker muskeltonus, mens statisk belastning og relaksjon senker den. Aktiv påvirkning skjer gjennom selve treningsøktene:

- Høy intensitet og fart øker tonus og relativ stivhet
- Tøffe bakkeøkter med høy intensitet gir økt tonus
- Statisk belastning og relaksjon senker tonus
- Restitusjon og lavintensive løp er nødvendig for å regulere ned

3.2 Strukturen i Den norske modellen for langdistanseløp

Den doble terskelen (to terskeltreninger per dag) er en sentral del av modellen og gir særlige effekter på muskeltonus ved at:

- Morgenøkten fungerer som priming – aktiverer muskeltonus til ettermiddagsøkten
- Korte intervaller gir kontrollert tonusøkning uten overbelastning
- Bakkeøktene (X-øktene) representerer maksimal tonusutfordring

Mellom harde og rolige dager gjelder prinsippet om dobbel terskel: rolig dag etter hard for å senke tonus maksimalt til neste harde dag.

3.3 Passive virkemidler utenfor trening

Passive faktorer kan redusere uønsket tonusøkning og fremme restitusjon:

Tiltak	Effekt og utførelse
Varme bad	Reduserer muskeltonus passivt. Kollagen og bindevev blir mer elastisk og reflektorisk motkontraksjon dempes.
Tvermassasje	Arbeider punkt for punkt langs hele kanten av muskelen systematisk. Frigjør spenning i fascia og senker tonus lokalt.
Rolige løpeturer (60-90 min)	En av de mest effektive metodene for tonus-senkning. Aktiverer lav belastning kontinuerlig og fremmer restitusjon.
Statisk belastning (unngå)	Øker tonus – bør ikke benyttes i perioder med mål om tonussenkning.

4. Hva muskulaturen trenger – oppsummert

Basert på trenerfaringer og treningsmodellen, er det fire nøkkelbehov for å opprettholde optimal muskeltonus:

#	Behov	Beskrivelse
1	Riktig belastning	Terskeltreninger som øker muskeltonus uten å overbelaste
2	Variasjon dag til dag	Veksling mellom hard og rolig belastning
3	Variasjon mellom treningsdager	Ulike typer trening for å tillate naturlig tonus-syklus

4	Forsiktighet ved overgang	Raskere økning av volum gir relativt sett sterkere tonusrespons
---	---------------------------	---

5. Formtopping og muskeltonus

5.1 Gradvis økning av muskeltonus mot konkurranse

Formtopping er en bevisst prosess der kroppen mottar ekstra stimulering mot konkurranse. Muskulaturen trenger å øke elastisiteten mot toppformen:

- Motta mottakelige muskler ved å øke tonusnivået kontrollert
- Gjøre noen raske, korte hopp eller løpedrags gjennom enkeltøkter
- Høyere HRV indikerer normalt god restitusjon og tonus-balanse

5.2 Hvordan formtoppe?

Muskulaturen er et homeostasesystem som alltid jobber mot likevekt. Praktiske prinsipper for formtopping:

- Reduser frekvensen av harde økter de siste to ukene
- Løp ikke raskere eller hardere de siste to ukene
- Reduser totalvolumet på øktene
- Behold muskulær spenst og trykk – ikke mist det

Disse prinsippene er ofte tilstrekkelig for en god formoppblomstring mot konkurransedagen.

6. Avslutning

Muskeltonus er mikroregulering. Det er detaljene som gjør forskjellen mellom god og meget god form. Lær deg å kjenne på muskulaturen din. Forstå sammenhengen mellom belastning, restitusjon og muskulær status. Det er her du finner de siste prosentene.

7. Viktige begreper – Terminologi

Nedenfor følger definisjoner på sentrale fagbegreper brukt i boken, sortert alfabetisk.

Begrep	Definisjon
10-minuttersregelen	Alle planlagte treningsøkter skal gjennomføres i minst 10 minutter. Hjelper mot å avvikle en økt for tidlig.
30-minutterstest	Løp i det høyeste jevne tempoet du kan opprettholde i 30 minutter. Estimerer terskelspuls.

45/15-intervaller	45 sekunder arbeid etterfulgt av 15 sekunders pause. Spesielt effektivt for laktatterskelstimulering ved høy intensitet.
Anaerob terskel	Det punktet der kroppen begynner å akkumulere laktat raskere enn den klarer å fjerne det. Kan brukes på høy aerob og anaerob stimulering.
Anking	Å knytte trening til en annen aktivitet eller rutine (f.eks. etter morgenkaffen). Gjør treningen mer automatisk og mindre avhengig av daglig motivasjon.
Blokkperiodisering	Intenst fokus på én egenskap om gangen i korte blokker (2–4 uker). Gir rask progresjon.
Bufferøkter (supercett økt)	Høyt volum, maksimalt på terskelaktø. 4 uker: 60–70 % av normal volum. Brukes ved overtrening og gir kroppen tid til å absorbere belastning.
Den norske modellen for langdistanseløp	Treningssystem utviklet fra 1990-tallet. Kjenetegnes av systematisk terskelintensitetsstyring, høyt volum, rolig trening og minimal tid i rasjonene.
Dobbel terskel (double threshold)	To separate terskeltreninger gjennomført samme dag. Typisk med 6–8 timer mellom. Priming om morgenen etterfulgt av høyere volum på ettermiddagen.
Ferritin	Protein som lagrer jern i kroppen. Lavt ferritin (under 30–50 µg/l for kvinner) kan gi redusert prestasjon, selv uten anemi. Spesielt viktig å overvåke for kvinner.
Hemolyse	Ødeleggelse av røde blodceller. Skjer hver gang foten treffer bakken (fotslag-hemolyse) og er en viktig faktor i løping.
HRV (Heart Rate Variability)	Variasjon i tid mellom hjerteslag. Høyere HRV indikerer normalt god restitusjon og balanse. Kan brukes som verktøy for å overvåke treningsstatus.
Karbosko / løpsøkonomi	Moderne løpesko med karbonplate og responsivt PEBA-skum gir 2–4 % forbedret løpsøkonomi og kan redusere belastning på muskulatur.
Laktat	Biprodukt som dannes når kroppen jobber intensivt. Ikke avfallsstoff – en viktig energikilde. Kan brukes av både hjerte og muskler.
Laktatakkumulering	Systematisk måling av laktatnivåer ved treningsterskeltrening. Gir presise kartlegginger og kan følge progresjon over tid.
Laktatproduksjon	Hastigheten kroppen fjerner og gjenbraker laktat. Kan trenes opp gjennom terskeltrening.
LEA (Low Energy Availability)	Definert som under 30 kcal/kg fettfri masse/dag. Øker risiko for sykdom, skader og dårlig prestasjon.

Løpsøkonomi	Hvor mye energi kroppen bruker ved en gitt løpshastighet. Bedre løpsøkonomi betyr lavere energiforbruk ved samme fart.
Mitokondrier	Cellenes kraftverk; små strukturer i muskelcellene som omgjør næring til energi. Jo flere og mer effektive mitokondrier, desto bedre utholdenhetskapasitet.
Muskelastisitet	Se muskelelastisitet – evnen til å returnere til opprinnelig form etter strekk.
Muskeltonus	Grunnleggende spenning i musklene. Optimal tonus betyr god dagsform og restitusjon. Sentral faktor i dagsform og skadeforebygging.
Overtrening (overtreningssyndrom)	Tilstand der kroppen har lange tilbake til tilpasse seg treningsbelastningen. Kjennetegnes av langvarig prestasjonsnedgang, tretthet, økt hvilepuls, dårlig søvn og redusert motivasjon.
Periodisering	Planlagt variasjon av treningsbelastning over tid. Optimaliserer tilpasning og unngår overtrening.
RPE (Rate of Perceived Exertion / Borg-skala)	Subjektiv vurdering av anstrengelse på en skala fra 6–20. Anaerob terskel inntreffer ved ca. 13–14, og går til oppil 15; beskrives som 'noe hardt' til 'hardt'.
Sikkerhetsplan	Minimumsplan for perioder med lite tid eller overskudd. Minimum én løpetur hver 7–10 dager for å opprettholde kontinuitet.
Smart strides (SS)	5–8 jerne løpesteg på ca. 100 meter, litt over terskelfart, gjennomført etter harde økter. Hjelper med å sende muskeltonus og fremskynde restitusjon.
Snakketesten	Enkel metode for å bestemme intensitet. Kan du si 3–5 ord for du må trekke pusten, er du under terskelen. Overraskende nøyaktig for mange.
Sub-terskel	Trening rett under den anaerobe terskelen, typisk 2–3 mmol/L laktat. Det er den optimale treningssonen for de fleste løpere.
Terskelart	Den farten du kan opprettholde i cirka én time på en god dag. For de fleste ligger denne et sted mellom 10 km-fart og halvmaratonfart.
Terskeltrening	Trening med en intensitet der kroppen befinner seg i balanse mellom laktatproduksjon og laktatminimering. Opplevs som 'komfortabelt hardt'.
Trappetest	Daglig test: du går samme trappesett og observerer hvordan løpsøkonomien reagerer over tid.
Tråkkdysmodellen	System for dynamisk treningsstyring basert på objektive parametre: hjelpepuls, oppvarmingspuls, laktat(al). Grønt = flott (kjøre), gult = ok (planlegg), rødt = stopp.

Type I muskelfibre (seige fibre)	Tregkontraherende fibre med høy utholdenhet. Dominerer hos eliteutøvere. Optimaliseres gjennom terskeltrening og høyt volum.
Type II muskelfibre (raske fibre)	Hurtigkontraherende fibre med høy utholdenhet, men høy kraft. Viktige for spurt og elitelastiviteter. Andelen type II er i stor grad genetisk bestemt.
VDOT-systemet	Jack Daniels' treningssystem som bruker nylige konkurranseresultater til å beregne treningssoner, treningstempo, og representerer terskelkurvene.
VO2-maks	Maksimalt volum oksygen kroppen kan ta opp og bruke per minutt under maksimal fysisk anstrengelse. Måles i ml/kg/min.
VO2-maks (maksimalt oksygenopptak)	Den maksimale løpshastigheten som tilsvarer ditt maksimale oksygenopptak. Brukes ofte som referanse i intervallplanlegging.
X-økt	En spesifikk eller intensiv økt som varierer; basert på mål, periode og treningsspesifikke/konkurransen-kravene. Kan representere bakkeøkt og andre krevende varianter.