

Sophi Germain .tasa de crecimiento

se proponen cuatro lenguajes:

L1 como universo $p=(6k-1):p, 2p+1$

Lsg como primos de Shopi

L3 como compuestos bajos de sophi. $p=(6k-1)=(6j-1)(6l+1)$

L4 como compuestos altos de sophi. $2p+1=(6k-1)=(6s-1)(6d+1)$

L2 como intersección de L3 y L4.

$$Lsg \cup L3 \cup L4 = L1$$

$$L3 \cap L4 = L2$$

$$Lsg \cup (L3 \cap L4) = \{0\}$$

$$|L1| + |L2| - |L3| - |L4| = |Lsg|$$

$$|L3 \cup L4| - |L3 \cap L4| + |Lsg|$$

$$|L4 \cup L3| - |L4 \cap L3| + |Lsg| = |L1|$$

L1 crece 1/6 Positivos

$$a|L1| = (b+c+d)|L3 \cup L4| - d|L3 \cap L4| + e|Lsg|$$

$$A^*a|L1| = B^*(b+c+d)|L3 \cup L4| - C^*d|L3 \cap L4| + D^*e|Lsg|$$

$$(A-\zeta)a|L1| = (B-s)((b+c+d)|L3 \cup L4| - (C-\tilde{n})d|L3 \cap L4|) + (C-z)e|Lsg|$$

$$\zeta \rightarrow z, \tilde{n}, s$$

$$|L1| - |L3 \cup L4| = |Lsg| - |L3 \cap L4|$$

$$s, \tilde{n} \rightarrow \epsilon$$

$$\zeta \rightarrow z, \epsilon$$

$$\text{infinito}(1-\zeta) \rightarrow$$

$$1. \text{Infinito}(1-z) - \text{infinito}(1-\epsilon)$$

$$2. \text{cte} - \text{infinito}(1-\epsilon)$$

dado que “2.” Es una contradicción, la talla de Lsg se relaciona con la de L1 que tiende a infinito.

Método V de resteo

$$V = v/m! \cdot n!$$

$v/m! \rightarrow$ porcentaje contra factorial

$n! \rightarrow$ representación del porcentaje en un factorial mayor

V es una familia de números en cierta forma parecidos a v.

$$p+1=v=q-1. \text{ P y q son primos}$$

tratamos de forzar la no predicción de primos o primos gemelos.

$$V+1 | V-1 = (6d+1)(6a+1)$$

$v \rightarrow V =$ familia donde no siempre todos en, $[V-1, V+1]$, pueden ser cuerdos

$$(v \cdot n!)/(m!(6a+1)) + 1/(6a+1) = (6(d+1))$$

$V \rightarrow v' : V = v' ; v' + 1 \text{ y } v' - 1 \text{ primos}$

$V \rightarrow v' \rightarrow V' \rightarrow |L(v)| = \text{infinito}$

$$V+1 | V-1 \text{ } j = (c^2 + d^2)^{1/2} : c \text{ y } d \text{ analógicos } V \text{ entero}$$

usando el método para otras propiedades buscando que siempre la inecuación sea cierta.

$$V \rightarrow |L(v)| \rightarrow V+1 | V-1 \text{ } j = (c^2 + d^2)^{1/2} : c \text{ y } d \text{ analógicos } V \text{ entero} \rightarrow \text{AMV}$$

$\text{hipotenusa}^2 = \text{cateto}^2 + \text{cateta}^2 \rightarrow \text{AMV}$ usando el teorema de Pitágoras (puedes variar co y ca para variar h lo deseado. ca y cd no tienen restricciones de variación.

$\text{AMV} \rightarrow L(g) = \text{infinito} \rightarrow \text{infinitas hipotenusas gaussianas}$

En $n!$

$\text{raíz}((n-1)!) \rightarrow \text{estabilizado}$

$\text{raíz}((n)!) \rightarrow \text{estabilizándose}$

cada vez que $\text{raíz}((n)!)$ supera un primo, aparece en $n!$ el patrón propio del primo que aún no puede ajustarse (inicio + múltiplo $\neq$ conjunto múltiplos anteriores) de momento, esto aún no se ha ajustado y antes no existía el patrón inicio no permitía aparecer

cada vez que $\text{raíz}((n)!)$ supera un primo $\rightarrow$ inicio

patrón simétrico = suma de patrones simétricos con inicio desfasado

$q \text{ y } p = 2^{\text{primo}+1}$

$v \rightarrow V \rightarrow c$

$\exists 2^{\text{primo}+1} \rightarrow (6k+1) \rightarrow c$

$c \rightarrow |2^{\text{primo}+1} = \text{primo}^k| = \text{infinito} \mid \text{cte}$

$v \rightarrow V \rightarrow v' \rightarrow v'^2 = a^2 + d^2 \rightarrow$ Gaus dice infinitos sistemas indeterminados

$$2^p - 1$$

$(2^p - 1)/3^v \rightarrow$ fracción

dado un primo $2^p - 1$ inventa una v para tener una semilla

$2^p - 1 \rightarrow a^b + c^d + \dots + w^z = 2^p + 1 : a, b, c, \dots, \text{mod } 3 \neq 0 \rightarrow$ numerador

expresa el numerador por factores que no sean 3 (al final puedes dejar un 3 o $\text{mod } 3 = 0$ pequeño).

$(2^p - 1)(a b c \dots w)/3^v = e + k/9 \rightarrow$ numerador sin exponentes/denominador $\rightarrow$ fracción eliminamos los exponentes e igualamos a entero $+ k/3^v$

$((e + k/9)9/k) - 1 \rightarrow$ anti-primo

$((e + k/9)9/k) \rightarrow$ primo wólffram

hemos generado una semilla de primos (parecidos a los de Mersenne véase $(2^p - 1)/9$ y $2^p - 1$

$p \rightarrow$ primos.

$v \rightarrow$ naturales.

$a, c, w \dots \neq 1 \rightarrow$ factores mínimos de $2^p - 1$

$b, d, z \dots \rightarrow$ exponentes máximos de los factores

$\text{mod } 3 \neq 0 \rightarrow$ evitamos 3^v o sus factores

$(2^p - 1)(a b c \dots w)/3^v = e + k/9 \rightarrow$ semilla

$((e + k/9)9/k) - 1 \rightarrow$ anti-primo $\rightarrow$ manteniendo la fracción que genera la semilla en esa forma $(9e+k)/9 \rightarrow \text{num/den} \rightarrow \text{Real} * \text{num/den} \rightarrow$ proporciona primos Wolfram

$((e + k/9)9/k) \rightarrow$ primo wólffram $\rightarrow$ siguiente entero a uno con máximo posible de factores pequeños a sus máximos posibles exponentes

$((e + k/3^v) 3^v / k) - 1 \rightarrow$ anti-primo

$((e + k/3^v) 3^v / k) \rightarrow$ primo wólffram

Forma $n^{\#}/\text{potencia} \rightarrow$ semilla

semilla $\times$ número $\rightarrow$ predicción

semilla $\times$ (número $\times$ entero) $\rightarrow$ múltiplo de predicción

esta semilla tiene decimales $\rightarrow$ numerador/denominador.

semilla $\times$ real1 $\rightarrow$ entero1 $\rightarrow$ semilla $\times$ real1 $\times$ positivo $\rightarrow$ múltiplo del entero1

semilla $\times$ real1 $\rightarrow$ entero1 $\rightarrow$ semilla $\times$ real1 $\times$ positivo $\rightarrow$ múltiplo del entero1

a más decimales (numerador) y más grande sea el denominador pueden haber más reales diferentes a real $\times$ positivo que generen un número mayor a entero1 menor a múltiplo

enteroX = último entero no múltiplo

último entero no múltiplo $\rightarrow$ cada vez mayor

lista enteros $\rightarrow$ cada vez mayor $\rightarrow$ cada vez más primos pequeños $\rightarrow$ cada vez menos

múltiplos pequeños de ese primo $\rightarrow$ cada vez más múltiplos grandes de más primos entre ellos.

dado un primo p inventa una v para tener una semilla

$2^p + 1 \rightarrow a^b + c^d + \dots + w^z = 2^p + 1 : a, b, c, \dots, \text{mod } 3 \neq 0 \rightarrow$ numerador

expresa el numerador por factores que no sean 3 (al final puedes dejar un 3 o $\text{mod } 3 = 0$ pequeño).

$(2^p + 1)(a b c \dots w)/3^v = e + k/9 \rightarrow$ numerador sin exponentes/denominador $\rightarrow$ fracción $\rightarrow$ semilla

semilla $\times 3^{(v - \text{entero})}$ / primorial

$(2^p - 1)/3^v \rightarrow$ fracción

$$2^p - 1$$

$$(2^p + 1)/3^v \rightarrow \text{fracción}$$

dado un primo $2^p - 1 + 2$ inventa una v para tener una semilla

$$2^p + 1 \rightarrow a^b + c^d + \dots + w^z = 2^p + 1 : a, b, c, \dots, \text{mod } 3 \neq 0 \rightarrow \text{numerador}$$

expresa el numerador por factores que no sean 3 (al final puedes dejar un 3 o $\text{mod } 3 = 0$ pequeño).

$$(2^p + 1)(a b c \dots w)/3^v = e + k/9 \rightarrow \text{numerador sin exponentes/denominador} \rightarrow \text{fracción}$$

eliminamos los exponentes e igualamos a entero $+ k/3^v$

$$((e + k/9)/k) - 1 \rightarrow \text{anti-primo}$$

$$((e + k/9)/k) \rightarrow \text{primo wólfram}$$

hemos generado una semilla de primos (parecidos a los de Mersenne véase $(2^p + 1)/9$ y $2^p + 1$)

$p \rightarrow$ primos.

$v \rightarrow$ naturales.

$a, c, w \dots \neq 1 \rightarrow$ factores mínimos de $2^p + 1$

$b, d, z \dots \rightarrow$ exponentes máximos de los factores

$\text{mod } 3 \neq 0 \rightarrow$ evitamos 3^v o sus factores

$$(2^p + 1)(a b c \dots w)/3^v = e + k/9 \rightarrow \text{semilla}$$

$((e + k/9)/k) - 1 \rightarrow$ anti-primo $\rightarrow$ manteniendo la fracción que genera la semilla en esa forma $(9e + k)/9 \rightarrow \text{num/den} \rightarrow \text{Real} * \text{num/den} \rightarrow$ proporciona primos Wolfram

$((e + k/9)/k) \rightarrow$ primo wólfram $\rightarrow$ siguiente entero a uno con máximo posible de factores pequeños a sus máximos posibles exponentes

$$((e + k/3^v) 3^v / k) - 1 \rightarrow \text{anti-primo}$$

$$((e + k/3^v) 3^v / k) \rightarrow \text{primo wólfram}$$

Forma $n^{\#}/\text{potencia} \rightarrow$ semilla

semilla $\times$ número $\rightarrow$ predicción

semilla $\times$ (número $\times$ entero) $\rightarrow$ múltiplo de predicción

3,6666 $\rightarrow$ semilla

$$1,5 + ,3333 = 3,66666/2$$

$$3 + 1,5 + 1 = 3 * 3,66666/2$$

$$5,5 * 2 = 11 = 3 * 2 * 3,66666/2$$

$$5 * 1 + 1 = 11$$

$$65/81 \rightarrow ((65 - 2^4 - 5^2 - 13 - 1 - 65)^{-1})/3^v \rightarrow 1/3^v + (2^4 + 5^2 + 13)/3^v$$

$$13^9/33$$

$$117/33$$

$$234/66$$

$$25/11 + 2/33 \rightarrow k(25/11 + 2/33) = \text{entero} \mid \text{múltiplo entero}$$

$$75 + 2/33 = 2 + 1/3 \rightarrow 3^a/2^b = 6 + 1 = 7 = (2 + 1/3) \cdot 3$$

$$(2^4 + 5^2 + 13) \rightarrow (2^4 + 5^2 + 13) \bmod 3^i = 0: i = [0, v]$$

$$1/3^v + (3^i (2^4 + 5^2 + 13) / 3^v \cdot 3^i)$$

$$(1 \cdot 3^i) / 3^v + (3^i (2^4 + 5^2 + 13) / 3^v)$$

$$1/3^v + ((2^4 + 5^2 + 13) / 3^v) \rightarrow \text{semilla}$$

esta semilla tiene decimales $\rightarrow$ numerador/denominador.

semilla * real1 $\rightarrow$ entero1 $\rightarrow$ semilla * real1 * positivo $\rightarrow$ múltiplo del entero1

$$2 \cdot (1 / (3^v - i) + ((2^4 + 5^2 + 13) / 3^v) \cdot (v - i)) \rightarrow$$

$$2 \cdot ((2^4 + 5^2) / 3^v + (27) / 3^v) \rightarrow 2 / 3^v + (27 + 81) / 3^v$$

$$2 / 3^v + (27 + 81) / 3^v$$

$$2 / 3^v \rightarrow (2^{p+1}) \% 3^{2^v}$$

$$27 + 81 \rightarrow 3^a \cdot k \rightarrow (4 + 3^a) / 3^v \rightarrow 3^a \cdot (4) / 3^v \rightarrow$$

$$2 / 3^v + 3^a \cdot (4) / 3^v \rightarrow 2 / 3^v + (2) / 3^v \rightarrow$$

$$(2 \cdot 3^v + 2 \cdot 3^v) / 3^v = (2v - 3(i + a))$$

$$(2 \cdot 3^v + 2 \cdot 3^v) = 2 \cdot 3^v / 3^k$$

$$(2 \cdot 3^v + 2 \cdot 3^v) (1 + 1/3^k) / 3^{(2v - 3(i + a))} \rightarrow$$

$$(2 \cdot 3^v + 2 \cdot 3^v) / 3^{(2v - 3(i + a))} - (2 \cdot 3^v + 2 \cdot 3^v) / 3^{(2v - 3(i + a) + k)} \rightarrow$$

$$2 \cdot 3^v + 2 \cdot 3^v \cdot (1/3^{(2v - 3(i + a))} - (2 \cdot 3^v + 2 \cdot 3^v) / (3^{(3v - 5(i + a) + k)} \cdot 2)) \rightarrow$$

$$w + (w \cdot w) / 3^s: w = 2 \cdot 3^v + 2 \cdot 3^v: s \rightarrow / 3^{(2v - 3(i + a))} - , / (3^{(3v - 5(i + a) + k)} \cdot 2) \cdot (1/3^{(2v - 3(i + a))})$$

semilla * real1 $\rightarrow$ entero1 $\rightarrow$ semilla * real1 * positivo $\rightarrow$ múltiplo del entero1

a más decimales (numerador) y más grande sea el denominador pueden haber más reales diferentes a real * positivo que generen un número mayor a entero1 menor a múltiplo enteroX = último entero no múltiplo

último entero no múltiplo $\rightarrow$ cada vez mayor

lista enteros $\rightarrow$ cada vez mayor $\rightarrow$ cada vez más primos pequeños $\rightarrow$ cada vez menos

múltiplos pequeños de ese primo $\rightarrow$ cada vez más múltiplos grandes de más primos entre ellos.

dado un primo p inventa una v para tener una semilla

$$2^p + 1 \rightarrow a^b + c^d + \dots + w^z = 2^p + 1: a, b, c, \dots, \bmod 3 \neq 0 \rightarrow \text{numerador}$$

expresa el numerador por factores que no sean 3 (al final puedes dejar un 3 o $\bmod 3 = 0$ pequeño).

$$(2^p + 1)(a b c \dots w) / 3^v = e + k/9 \rightarrow \text{numerador sin exponentes/denominador} \rightarrow$$

fracción $\rightarrow$ semilla

$$\text{semilla} \cdot 3^v \rightarrow \text{par} \rightarrow \text{par} / 2^i \rightarrow ?$$

$$(2^p + 1) / 3^v \rightarrow \text{fracción}$$

Dibujar un círculo con diferenciales.

centro+4(radio-centro)+4cuadrantes

$(2n+1)\text{centros}=4\text{radios}-3\text{centros}+4\text{cuadrantes}$

$x=d$

Por x en r , $x+=d$

$Y=\text{raíz}(r*r-x*x)$

$c+=Y*d$

$4c+3d+4r$

$r=k*d$

$c=\rightarrow$

$x=d$

Por x en r , $x+=d$

$Y=\text{raíz}(r*r-x*x)$

$c+=Y*d$

método de encriptación por convergencias.

defines segmento

elijes secuencia de talla de tales

Se elije secuencia de tipo de triangulo

mientras proceda

de la primera partición de tales

se acumulan lados del triángulo o relaciones de estas.

final = $(1+a)$ segmento

dado un cálculo puedes omitir si 0 o no una aportación

final $(1+a)(1+v)$ segmento= $(1+t)$ segmento $\rightarrow$ con $(1+t) \rightarrow$ incalculable $(1+v) \rightarrow$ sin $(1+a)$.

$1+v$ contiene información cualquiera.

$(1+j) = ((1+a) - (1+v)) / (-v+1)$

por n

$$c=(a*a + c*c)^{(1/2)}$$

$$a=1-((c/2)^2+1)^{(1/2)}$$

$$c*3*2^n \rightarrow \text{PI}$$

$$d=(c*c + (a+b)^2)^{(1/2)}$$

$$(1-a) = (1-c*c)^{(1/2)}$$

$$(e+d) = (1 + (1+b)^2)^{(1/2)}$$

$$f=(a*a + c*c)^{(1/2)}$$

por n

$$a=(1-(f/2)^2)^{(1/2)}$$

$$f = ((1 - a)^2 + (f/2)^2)^{(1/2)}$$

$$f=((1-(1-(f/2)^2)^{(1/2)} + (f/2)^2)^{(1/2)})$$

$$e=((1-(1-(e/2)^2)^{(1/2)} + (e/2)^2)^{(1/2)})$$

$$4*2^n*f*e \rightarrow \text{PI}$$

$$4*2^{(n-1)}*f*e*c^3 \rightarrow \text{PI}$$

radio 1

lado raíz 2

$$c=\text{lado}/2=l/2$$

por n

$$a=(1-c*c)^{(1/2)}$$

$$b=1-a$$

$$c = (b*b+(c/2)^2)^{(1/2)}$$

$$c*4*2^n \rightarrow \text{PI}$$

Sistema de numeración recursiva de cifras en distinta base.

unidad $\rightarrow 10 \rightarrow 2 \cdot 5$

decena $\rightarrow 77 \rightarrow 7 \cdot 11$

centena $\rightarrow 3 \cdot 13$

unidad de millar $\rightarrow 17 \cdot 19$

siguiente cifra $\rightarrow$ producto de dos siguientes primos

ejemplo

de $[0 \text{ a } 0;69;9,\text{decimales}]$

es idéntico en esta base y en base 10 porque las bases como $7 \cdot 11$ o producto dos primos se numeran en base 10 y se separan por punto y coma.

$3;1;1,0 \rightarrow$

$,0 \rightarrow$ entero

$1 \bmod 2, \bmod 5 \neq 0$

$1; \bmod 7, \bmod 11 \neq 0$

$3; \rightarrow \bmod 3 = 0$

$$n\%(n-(n\%p))= n\%p$$

por cada p en n , existe una recta

$$y = m x + n$$

que cruza una serie de restos de n con naturales consecutivos

$$m=n - \text{raiz}(n)$$

Mientras $\rightarrow$

$$m/=a$$

$$a++$$

$$c+=m$$

$$f(x)((1,5 + 1/x)^a)^A(x((1/2)^b)^B$$

$x \rightarrow \text{entero}: f(x) \rightarrow \text{entero}$

$$i = x/2$$

$$f_1(x) = 4^{(-1)} x(3,375 + (1/(2 \cdot i^3)))$$

$$f_2(x) = 4^{(-1)} x(2,25 + 1/(i \cdot i))$$

$$f_3(x) = 4^{(-1)} x(7,89 + 1/(4 + i^4))$$

$$f_4(x) = (2 \cdot 4)^{(-1)} x(7,89 + 1/i^4)$$

$$x = f_3(fx(f_3(x))) \mid x = f_3(fx(fx(f_3(x)))) \mid x = f_3(fx(fx(fx(f_3(x)))))$$

$$x = f_3(fx(f_3(x))) \mid x = f_3(fx(fx(f_3(x)))) \rightarrow \text{compatible con } f(x) > x$$

$$x = f_3(fx(fx(fx(f_3(x))))) \rightarrow \text{incompatible con } f(x) > x$$

cuadrados por cuadrados perfectos

$$h=(2(p-1)^2)^{(1/2)}$$

$(p-1)/2$ *sumatorio de i desde i=2 hasta

$$((p-1)^{2*2})^{(1/2)} - ((2(p-1)^{(1/2)})^{(2)})^{(1/2)} \leq (p-1)/2 \text{ *sumatorio de i}$$

$$(p-1)(p+1)+1=a$$

$$d*f(d*f+2)+1=a$$

$$(c*b-1)(c*b+1)+1=A$$

$$d*f(d*f+2)+1=A$$

$$1^0=\text{indeterminado} \rightarrow 2^0=\text{infinito} \rightarrow$$

$$3^0 \rightarrow (\text{productorio}(a)/(\text{productorio}(A)+\text{productorio}(a)))^{(-1)} \geq$$

raíz cuarta de talla entre cuatro

Fin de sección de matemáticas comienzo de ingeniería

ZypyZape

ahora vamos a explicar conceptos menos numéricos y más útiles.

Dados dos aerogeneradores, molinos de viento que transforman la mecánica en relación a la centrípeta que absorbe movimiento porque el viento impacta contra las aspas y las empuja provocando que roten contra el eje.

El proceso mas básico de este sistema es vertir a consumo.

Un proceso alternativo es usar la energía de un compañero un momento siempre mientras puedas devolvérsela para cambiar tu velocidad y por ende la “opacidad” del aspa en movimiento contra el viento.

Debido al principio de conservación de la energía, este proceso, no intenta gastar. Si no crear un ciclo batería virtual que consiste en mecánica centrípeta en movimiento.

molinoA → red y molinoV → red
cambio
molinoV → red y molinoA → red
cambio
...
molinoA → red y molinoV → red
cambio
molinoV → red y molinoA → red
cambio

Este ciclo modifica la velocidad media y la captación de viento de forma que permite contrarrestar pérdidas de rendimiento.

el sistema no afecta si no a la opacidad del aspa por variar su velocidad media.

La batería virtual sirve para poder regular la red eléctrica. Al poder mínimamente cargarse todos los generadores con este mismo control, permite reducir picos positivos y negativos. Convirtiendo estos generadores eléctricos pasivos en agentes de regulación y obtención de la red.

El tiempo que cada molino alimenta al otro no puede exceder unos límites de fabricación y variando diferencias en los tiempos de un ciclo.

molinoA → red y molinoV → red alargar
cambio
molinoV → red y molinoA → red
cambio

se puede almacenar más energía. Esta cantidad es mínima y positiva. La verdadera ventaja es el cambio de paradigma de agente generador pasivo a agente regulador y generador.

molinoA → red y molinoV → red cambio	alargar/disminuir
molinoV → red y molinoA → red cambio	
molinoA → red y molinoV → red cambio	
molinoV → red y molinoA → red cambio	alargar/disminuir

Dicho con una forma muy simple, mínimamente el sistema de aerogeneradores debido a su inercia no variable y a su conmutación de generación, simula un volante de inercia mecánico/eléctrico.

Quijote.

Una vez montado el sistema zypyzape:

beneficio inmediato → fácil de montar → control por software → ...

Usando una distancia no necesariamente grande del aspa y un peso deslizando se puede modificar la inercia o incluso la variación de inercia aplicando a este proceso de variación de inercia en aspas un sistema de control zypyzape, se convierte el sistema en una batería mecánica en caso de exceso de generación.

Kilometro

imagina un tubo en un eje por el que baja un objeto por gravedad.

Cuando al bajar el objeto del centro del recorrido / eje. Existe una fuerza dada que puede hacer rotar el recorrido mientras el objeto baja para convertir energía cinética del sistema recorrido/objeto en variación de inercia recorrido / posición objeto.

Pudiendo conseguir que.

suponiendo que la bajada hasta pasar el eje del objeto es equivalente 180° y el recorrido es empujado para dar 540° .

Para que el trabajo sea $W=0J$.

El sistema bola recorrido, mientras el roce sea menor que la gravedad, y sea empujado en un momento y fuerza considerado. Crea un movimiento de vuelta y media que en gran medida es alimentado por frenar u oponerse a la energía cinética que adquirió el objeto al descender desde el potencial inicial al del eje.

Este sistema montado con parámetros de un planeta en otro planeta funciona igual pero variando su tiempo de ciclo.

intuitivamente, podemos frenar (tener peor rozamiento) a base de convertir fricción o desplazamiento del objeto en electricidad.

mientras el rozamiento no supere la gravedad y la velocidad de bajada del objeto llegue a 0 cuando el recorrido de 540° . El sistema de movimiento perpetuo puede generar energía por ciclo con un movimiento auxiliar que debe aportarlo otro agente.

Dado un estudio en 6k grupos para un sistema zyzyzape estos mecanismos pueden moverse indefinidamente salvo por desgaste a pesar de a que gravedad este sometido.

variando su energía cinética y potencial y el tiempo de las variaciones.

mientras puedas aumentar el tiempo sin detener el ciclo puedes quedarte parte de la energía que la gravedad transfiere al sistema.

Para molestar a los que tendrán que hacer esto:

dado un sistema montado.

puedes simular o ejecutar una variación de demanda.

l energía se obtiene de m /s entre otras,

por lo que digamos, al ser trabajo $W=0$ y generar energía por variar el tiempo del ciclo donde $W=0$, se genera energía por desplazar un objeto y se devuelve el objeto por gastar parte de la energía generada para frenarlo lo mínimo por inercia devolviendo el objeto y recorrido en dos ejecuciones de ciclo a posición inicio.

Tiempo a restar depende de campo gravitatorio y máquina.

de dos diferencia de tiempo obtenemos una variación de energía por tiempo y gravedad dada una maquina

esa variación de energía viene dada por distancia y gravedad $\rightarrow$ tiempo aumenta cinética $\rightarrow$ cinética colapsa recorrido.

al restar velocidad $\rightarrow$ recorrida se colapsa después $\rightarrow$ cinética menor $\rightarrow$ gravedad cte $\rightarrow$ sobra energía $\rightarrow$ solo si esta todo bien montado y mientras no se pida mas de lo que la gravedad sobre la maquina permite

(j m/s)/(j m/s) $\rightarrow$ puede variar y esa variación es en función de la demanda al generador y la gravedad y un suelo anclaje /objeto de diferente interacción gravitatoria.

Bajo del mar.

que toca antes que un avión roto al caer la superficie del mar desde la misma distancia.

que pasa si el mar es de mercurio 😞

pobres peces.

es broma la energía de flotación puede ser un campo de una dimensión distancia y otra de diferencia de densidades en relación con la gravedad.

prácticamente es la suma de dos fuerzas, el medio quiere bajar y el objeto subir.

todo lo que le queda al objeto por subir es distancia a favor del momento estable y la gravedad es cuadrática por la distancia.

para que me entendáis recorrer un kilometro bajo del mar cuesta más, tarda lo mismo o menos si no te apetece y potencialmente, debe ser un amplificador de energía con la que se interacciona tanto estar bajo del mar (invento rota por no estar en superficie) o en un cráter de la luna (invento rota más rápido por estar mas cerca del centro de la luna.

energía flotación →(
energía gravedad,
distancia →-energía por distancia (potencial de diferentes situaciones estables),
diferencia densidades →diferencia de potenciales a distancia=0(capacidad de acelerar el tiempo en estabilizarse)
)

gravedad→180º flotación


Fotos y trabajos previos a este documento.



Viento $\rightarrow$ Molinos. $\left\{ \begin{array}{l} \uparrow \\ \text{depende de} \\ \text{cuán opaco} \\ \text{es el molino} \\ \text{en movimiento} \end{array} \right.$

Afecta a la
relación viento
velocidad molino.
 $\rightarrow$ Afecta a la
opacidad, cuán
opaco es el
molino en
movimiento
contra la
densidad de
aire que en
movimiento que
lo atraviesa.

Intercambio
= Pérdidas / ganancias
Conservación




fed $\rightarrow$ "onda (20)"
"transmisión variable"
* Como $\rightarrow$ Grupo α
= de $\rightarrow$ opacidad
= NO VARIA

Como Grupo β
aumenta en
velocidad,
opacidad β =
velocidad viento +
velocidad aporte $\rightarrow$
 $\left| \begin{array}{l} \text{Opacidad sistema} \end{array} \right|$

3. intercambiar α por β
en cada iteración.
se puede regular
tiempos.

Sophi German tasa de crecimiento



Se proponen cuatro lenguajes.

$L1$ como universo.

$L2$ como primos de Sophi.

$L3$ como compuestos bajos.

$$\text{donde } 6k-1 = (6z+1)(6j-1)$$

$$12k-1 = \text{primo.}$$

$L4$ como compuestos altos,

$$12k-1 = (6z+1)(6j-1)$$

$$6k-1 = \text{primo.}$$

$L2$ como la intersección de
 $L3$ y $L4$.

$$L_{sg} \cup L_3 \cup L_4 = L_1$$

$$L_3 \cap L_4 = L_2$$

$$L_{sg} \cup (L_3 \cup L_4) = \{\emptyset\}$$

$$|L_1| + |L_2| - |L_3| - |L_4| = |L_{sg}|$$

$$|L_3 \cup L_4| - |L_3 \cap L_4| + |L_{sg}| = |L_1|$$

$$L_1 \text{ crece } 1/6 \cdot k = \underbrace{|x|}_{\text{parte de } x} + \underbrace{|a \cdot x|}_{\text{parte de } x}$$

$$a|L_1| = (b+c+d)|L_3 \cup L_4| - d|L_3 \cap L_4| + c|L_{sg}|$$

$$Aa|L_1| = B(b+c+d)|L_3 \cup L_4| - C d|L_3 \cap L_4| + E c|L_{sg}|$$

$$(A-a)|L_1| = (B-C)|L_3 \cup L_4| + (E-a)c|L_{sg}| \rightarrow \boxed{E = S + E}$$

$$B(b+c+d)|L_3 \cup L_4| \text{ tiene como } b = p-d, c = q-d, |L_2| = d$$

$$\text{crecimiento máximo } 1/6 k$$

$$C d|L_3 \cap L_4| \text{ resta a este}$$

$$|L_1| = (|L_3| - |L_2|) \text{ imposible y teorico máximo}$$

$$-(|L_4| - |L_2|), \text{ crecimiento.}$$

$$-|L_2| =$$

$$= +|L_{sg}| \quad \bullet E c|L_{sg}| \text{ se ve obligado a}$$

$$L_3++ \rightarrow |L_1| - |L_{sg}| = \text{compensar el crecimiento.}$$

$$L_4++ \rightarrow |L_1| - |L_{sg}| + 1 \cdot C d|L_3 \cap L_4| \text{ esta 2 veces}$$

$$L_3, L_4, L_2++ \rightarrow |L_1| - |L_{sg}| + \frac{1}{6} B(d+c+d), \text{ por eso se}$$

$$q \rightarrow 2$$

$$\text{resta.}$$

$$E c|L_{sg}| = b c d e$$

$$|L_1| - |L_3 \cup L_4| = |L_{sg}| - |L_3 \cap L_4|$$

$$\infty(1-a) = 1. \infty(1-b) - \infty(1-c) \rightarrow 1. \infty = d e$$

$$2. \text{cte} - \infty(1-c)$$

$$\boxed{E = S + E}$$

$$E c|L_{sg}| = b c d e$$

$$- b c d e$$

$$- b a q e$$

$$- e b c e$$

$$- d e$$

$$- g e$$

Método V de testeo.

$$V = v/u! = u!$$

$v/u! \rightarrow$ porcentaje contra factorial
 $u! \rightarrow$ representamos el porcentaje en un factorial posterior.

V predice números con forma parecida a v

$p+1 = v+q-1$ p y q primos

$$V+1 \mid V-1 = (6k+1) \mid (6k-1) (6j+1) \mid (6j-1)$$

$v \rightarrow V \rightarrow$ familia donde no todos pueden ser compuestos.


$$\left| \frac{v \cdot u!}{u! (6k+1)} \pm \frac{1}{(6k+1)} = (6j \pm 1) \right|$$

$$V \rightarrow v' = 6k \pm 1 ; v' \text{ primo.}$$

$$v \rightarrow V \rightarrow v' \rightarrow V \quad |v| = \infty$$

$$\left| (6k \pm 1)! = \sqrt{c^2 + d^2} \right| \rightarrow \text{siempre no puede pasar.}$$

$\pm 1 + k$: primo $v \rightarrow V \rightarrow v' \rightarrow$ hipotenusas gaussianas



$$x^2 + x$$

$$6k+1 \rightarrow 4((2k+1)+3)^2 + ((2k+1)+3) \pm 1$$

$$6k+1 \rightarrow 2((2k+1)+3)((2k+1)+3) \pm 1$$

$$k \rightarrow 3(x^2+x) \pm 1$$

$(k+1)!$ $\rightarrow$ estableciéndose $u!$

en $u!$ $\rightarrow$ estabilizado

$\rightarrow \sqrt{(k+1)!} \rightarrow$ simetría ajustada.

- cada vez que $\sqrt{(k+1)!}$ supera un primo, se empieza a 'acoplar' el patron simetrico de los $(6k \pm 1)$ primo
- patron es suma de patrones simetricos.

$$V = 2^p \pm 1$$

$$V \rightarrow V \rightarrow V = (6k \pm 1) \Rightarrow V = v'$$

$$\Rightarrow |2^p \pm 1| = \infty \Leftarrow 6k \pm 1 \Leftarrow 2^p \pm 1$$

$$V \rightarrow V \rightarrow v' \rightarrow v'^2 = a^2 + b^2 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Gaus dice infinitos sistemas indeterminados.

$$\cdot \frac{2^p + 1}{3^v} \rightarrow$$

$$2^p + 1 \rightarrow a^k + c^d + \dots w^e = 2^p + 1 \rightarrow a, c, \dots, w$$

$$\cdot \frac{(2^p + 1)(a \cdot c \cdot \dots \cdot w)}{3^v} = e + \frac{k}{q} \quad \text{mod } 3, l=0$$

$$((c + k/q) q/k) - 1 = \text{anti primo}$$

$$((c + k/q) q/k) = \text{primo wolfram}$$

$$f(u) = 2^{2^u} + 1$$

$$g(u) = (f(u)(f(u)+1))! \rightarrow \text{iterando}$$

los primos se organizan, como los de fermat que se establecen en ciertas formas compuestas seguras.

"columnas en una tabla de base $g(u)$ para hacer la criba de eratostenes"

El patron alarga con u .

vease Base[2-productores(primos {fermat})]


Supon que a base de dibuixos diferenciales
quieres colorear un círculo.

centro + 4 · (radio-centro) + 4 cuadrantes

$(2n+1)$ centros = 4 radios + 4 cuadrantes
- 3 centros.

Método de encriptación por convergencias
y diferencias.


• Defines segmento.



• Se elige talla de tales.



• Se elige secuencia de tipo de
triángulo.



• Se acumula c, b, a o sus
sumas

• Se aplica tales; calculas; c y b ; acumulas

$f_{\text{real}} = (s \pm a)$ segmento
depende: 1, 2, 3, 4 → el mismo dibujo
quita (a, b, c o
sumas) → 0 o 1

$$\frac{(1 \pm A) - (1 \pm V)}{(1 \pm V) (1 \pm a)} \leftarrow \text{lógico}$$


que pueden

Por u


$$c = \sqrt{a^2 + c^2}$$

$$a = \frac{1}{2} - \sqrt{\left(\frac{c}{2}\right)^2 + 1}$$

$$c \cdot 2 \cdot 2^n \rightarrow \pi$$



21



$$d = (c^2 + (a+b)^2)^{1/2}$$

$$(1-a) = (1-c^2)^{1/2}$$

$$(e+d) = (1 + (1+b)^2)^{1/2}$$

$$J = (a^2 + c^2)^{1/2}$$

Por u

$$a = \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right)^{1/2}$$

$$J = \left(\left(\frac{1}{2} - a \right)^2 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right)^{1/2}$$

$$J = \left[\left[\left[1 - \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right]^{1/2} \right]^2 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right]^{1/2} \right]^2$$

$$e = \left[\left[\left[1 - \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right]^{1/2} \right]^2 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right]^{1/2} \right]^2$$

$$4 \cdot 2^u \cdot J \cdot e \rightarrow PI$$

$$| 2^{u+1} \cdot J \cdot e \cdot c \cdot 3 \rightarrow PI |$$

radio 1

lado $\sqrt{2}$

$$d = \sqrt{2}/c$$

Por u

$$a = (1 - d^2)^{1/2}$$

$$b = 1 - a$$

Por u $d = (b^2 + (\frac{d}{2})^2)^{1/2}$

$$|d \cdot 4 \cdot z^u = \pi I|$$

... puede -) Si que puede!

Debido a las costumbres

Sistema de numeración con cifras
en Distinta base. Base de la cifra
unidad $\rightarrow$ costumbre $\rightarrow$ $2 \cdot 5$
decena $\rightarrow$ barto $\rightarrow$ $7 \cdot 3 \cdot 2$
centena $\rightarrow$ ajule $\rightarrow$ $3 \cdot 13 \cdot 2$
siguientes $\rightarrow$ patiou $\rightarrow$ primo[x] - primo[x+c]
 $\{x+z; \}$

ej $\left. \begin{array}{l} 0 \dots 9 \\ 10 \dots 99 \\ 99 \dots 699,2 \end{array} \right\} \rightarrow \text{tradicional}$
 $\uparrow$
2.699.239,69,9, decimales
2.39,69,9...51719,239,69,9 $\downarrow$
:
:
:
...


propuesta de
identificación

cada cifra cuenta en el sistema
fraccionario.
las matematicas se mantienen, cambia
la representacion numerica del valor.
las cifras para representaciones de
cierta talla, afirman si el valor
es multiplo de un factor de la
base de numeración correspondiente
a la cifra.

ej 15

ej 15

ej $x; 0; \dots$




Pares de restos

$$u \% (u \% p - (u \% p)) = u \% p$$

Por cada p en u , existe una recta

$$y = mx + u$$

que cruza una serie de restos de u con naturales consecutivos.



$$u = u - u''$$

Mientras $\rightarrow$

$$m/a$$

$$a++$$

Si puede - Si que pueden!

$$f(x) = \left(x \left(3,5 + 1/x \right)^2 \cdot \left(x \left(\frac{1}{2} \right)^5 \right)^{1/3} \right)$$

$x \rightarrow$ entero : $f(x) \rightarrow$ entero.
 $x=y \rightarrow \tilde{c} = y/c$

$$f_1(x) = 4^{-1} x \left(3,375 + 1/(2 \cdot 4^3) \right)$$

$$f_2(x) = 4^{-1} x \left(2,25 + 1/(2^2 \cdot 4^2) \right)$$

$$f_3(x) = 4^{-1} x \left(7,89 + 1/(2^2 \cdot 4^4) \right)$$


$$f_4(x) = 8^{-1} x \left(7,89 + 1/4^4 \right)$$

Mientras $\rightarrow$
 $x = f_3(f_2(f_1(x)))$
 Mientras $\rightarrow$
 $x = f_3(f_4(x))$
 Mientras $\rightarrow$
 $x = f_3(f_4(x))$

¿Es imposible
 anulando siempre
 estas funciones
 ser siempre
 dialógico?

control aporte a red.
 capacidad almacenamiento/s
 captación mejorada

- Submarinos. - (Se puede? - si que pueden!



este ciclo crea una "batería virtual"

la cinética/potencial que tiene B,
 Viento $\rightarrow$ mueve A $\rightarrow$ electricidad $\rightarrow$ mueve B $\rightarrow$ alternar $\Rightarrow$
 será devuelta a A. viento $\uparrow$

Energía recarga B $\rightarrow$ A $\Rightarrow$ se carga antes.
 viento $\rightarrow$ A $\Rightarrow$ se almacena energía
 viento $\rightarrow$ B $\rightarrow$ eléctrica $\Rightarrow$ Durante todo el proceso A y B pueden verter a real

Complementos

- Software y control.
- Regulación de los aerogeneradores.

Vantajas:

- Admite nuestros aerogeneradores.
- Con un gran número se puede controlar la red eléctrica.
- Sin necesidad de desconexión
"siempre se aprovecha el viento"

$$2 m v^2 + 2 m \frac{v v}{g} y = cte$$

$1. v_v \cdot f(x) / p(x) \times 2$
 $2. (v_v + f(x) + p(x) \cdot v_v) / p(x)$
 $x = g(v_v, p(x))$
 equivalente viento

Energía cinética: Energía potencial
 - Viento aporta energía al sistema.
 - La energía se transforma / puede medirse en forma de potencial.


Se suele verter este potencial a la red o disiparlo


$$E_c \approx v_v^2 \cdot g$$

$$E_m \uparrow \uparrow$$

$$E_p \approx g \cdot h$$

Ciclo mecánico




$$\begin{aligned} &0-0 \\ &90-0 \\ &270^\circ-90 \\ &\cancel{360}-180^\circ \\ &720^\circ-540^\circ \end{aligned}$$

$$\int P \rightarrow d$$
$$16 \rightarrow d$$

→ 2 partes.

$$\left. \begin{array}{l} C_1 \\ C_2 \end{array} \right\} C_1/C_2$$
$$) C_1 / C_2$$

(3)

$C_4 =$
 $\rightarrow$

$$C_7 =$$


64

$$C_E <$$

social y va
Queda? -i

Force.





- J1. Caída
- J2. Empujan fuerte → sistema con poca fuerza. gravedad en contra.
- J3. gravedad a favor, giro y movimiento peso en sincronía.
- J4. Nadia cñima vuelta, gravedad en contra. peso acota de bajar con amortiguación → rotación Juega el peso que se ha acelerado.


Juega $W \rightarrow cte \rightarrow \frac{W}{c + \frac{1}{4}} = cte$ Se puede haber

$g \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{W}{3} \rightarrow t(ciclo) \neq cte$ No abuses.


$g \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{W}{3} \rightarrow t(ciclo) \neq cte$ Te dejara, pero.

$g \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{W}{3} \rightarrow t(ciclo) \neq cte$ No senta

Chelo
sóc del
Josep de Ribera
Pobla del Duc



$0^\circ - 0$
 $90^\circ - 0$
 $210^\circ - 90$
 $360 - 180^\circ$
 $720^\circ - 540^\circ$



- 1 $\rightarrow$ cae libre - $\perp$
 - 2 $\rightarrow \vec{g} - \vec{c} \perp = \rightarrow$ 2 partes.
 - 3 $\rightarrow \vec{g} - (\vec{c}_1 + \vec{c}_2) = \perp^{180}$
 - 4 $\rightarrow \pm(3) \neq \perp^{180} =$
 - 5 $\rightarrow \vec{g} - (\vec{c}_2 - \vec{c}_3) \neq \perp$
 - 6 $\rightarrow \vec{g} - (\vec{c}_3 - \vec{c}_4) \perp =$
 - 7 $\rightarrow \vec{g} - (\vec{c}_5 - \vec{c}_7) = \perp^{180}$
- $C_3 / C_2 \downarrow$
 $C_3 / C_2 \uparrow$
 $C_3 > C_2$
 $\vec{C}_4 = \vec{C}_3 - \vec{C}_5$
 $\vec{C}_4 = \vec{C}_4 + \vec{C}_6 \rightarrow$ partes
 $\vec{C}_3 > \vec{C}_5$
 $C_6 < C_6$


Vago . vago . vago .
 , ique vol, eficiente .
 ¿hace algo? - se asoma y vuelve . - ¿falta?
 - Submarinos . - ¿se puede? - ¿si que pueden!

Ciclo mecánico

Viento


generador A

- Transfiere al grupo compresor.



generador B

- Capta del viento.
- Se acelera por aporte eléctrico



- Devuelve al potencial centrífugo
- Sigue siendo acelerado por el viento.

Alto la viento compresor

V → operad sistema → V
Viento

- Pérdidas:

- Rotación.

- Gaseificas:

control aporte a red.

Capacidad almacenamiento/s

Capacidad mejorada

ifera una con $2C = \sqrt{2}$

Cuerpo:

$$2C = ((1 - (1 - C^2)^{1/2})^2 + C^2)^{1/2}$$

Solucion

$$4 \cdot 2^{una} \cdot 2C$$

$\{x\}_{5,2,3,4}$

¿puedes aliventar $\{x\}_{1,2,3,4}$

con $\{x\}_{1,2,3,4}$
indefinidamente?

$$\begin{aligned} &4^{-1}x(3,375 + 1/(2a^3)) \\ &4^{-1}x(2,25 + 1/a^2) \\ &4^{-1}x(7,89 + 1/(2^2 \cdot a^4)) \\ &8^{-1}x(7,89 + 1/(2^2 \cdot a^4)) \end{aligned}$$

$$\int_3/4 \int_2/3 (x)$$

$$\int_3/4 \int_1/2 (x)$$

$$\int_4/3 \int_1/2 (x)$$

$$\int_1/3 \int_4/2 (x)$$

$$\int_1/4 \int_2/3 (x)$$

$$\int_4/1 \int_3/2 (x)$$

$$\int_4/3 \int_2 \int 3 (x)$$

$$\left(\int_1 \left(\int_1 \left(\int_1 \left(\int_1 (x) \right) \right) \right) \right)^* \rightarrow \begin{matrix} 4a.w. \\ 9-25 \end{matrix}$$

$$\int_3 \int_2 \int_3 (\int_4(x))$$

$$\int_1 \int_3 \int_2 (\int_4(x))$$

ifera una con $2c = \sqrt{2}$

Cuerpo:

$$2c = ((1 - (1 - c^2)^{1/2})^2 + c^2)^{1/2}$$

Solucion

$$4 \cdot 2^{una} \cdot 2c$$

$\{x\}_{5,2,3,4}$

¿puedes aliventar $\{x\}_{1,2,3,4}$

con $\{x\}_{1,2,3,4}$
indefinidamente?

$$\begin{aligned} &4^{-1}x(3,375 + 1/(2a^3)) \\ &4^{-1}x(2,25 + 1/a^2) \\ &4^{-1}x(7,89 + 1/(2^2 \cdot a^4)) \\ &8^{-1}x(7,89 + 1/(2^2 \cdot a^4)) \end{aligned}$$



$$\int_3/4 \int_2 \int_5 (x)$$

$$\begin{aligned} &\int_3/4 \int_1/2 (x) \\ &\int_4/3 \int_1/2 (x) \\ &\int_1/3 \int_4/2 (x) \\ &\int_1 \int_4/2 \int_3 (x) \\ &\int_1/4 \int_3 \int_2 (x) \\ &\int_4/1 \int_3 \int_2 (x) \\ &\int_4/3 \int_2 \int_5 (x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &(\{(\{(\{(\{(\{x\})))\})\})\})\})^* \rightarrow \boxed{4a.w.} \\ &\int_5 \int_2 \int_3 (\int_4(x)) \\ &\int_1 \int_3 \int_2 (\int_4(x)) \end{aligned}$$

$$\boxed{9-25}$$

Mecanismo de Modulación de Inercia por Masa Desplazable



Alternancia de roles
Rotar A/B cada X min o por estado de energía cinética $>80-90\%$ manteniéndolo en λ_{opt} .

Control y coordinación

- Consigna central decide según red y viento
- Local: cada turbina sigue par/pitch
- Latencia de 100-500 ms suficiente

Cuándo usar qué

- Exceso de viento o baja demanda: subir "% batería"
- Déficit o caída frecuencia: descargar "batería"

Ventanas y límites

- Velocidad: ω dentro $[\omega_{min}, \omega_{max}]$
- SoE: operar entre 20-80%
- Rampas: límites a dT/dt y $d\omega/dt$

Eficiencia y expectativas

- Objetivo principal: evitar vertidos y dar servicios de red
- Ganancia ligera, sobre todo en transitorios
- Pérdidas pequeñas frente a flexibilidad


Volante opcional

- Fijo o, inteligente: J' ain salir de ω segura
- Más E_{on} disponible y resp. mas larga

Métrica guía

- Cumplimiento de consigna de red
- Reducción de curtailment

En estacionario no se supera el límite aerodinámico, pero se aprovecha mejor cada ráfaga.







deepseek_python_20 deepseek_python_20 deepseek_python_20 abogado.docx segunda parte.docx
250905_49a1be_4.py250905_1bc009_9.py250905_0b1955_6.py