

Me cargué a Fermat en base 15×17 . $16^2 + 1$ cae en la columna del 2, tachada en línea recta según una criba de Eratóstenes en una tabla, y las columnas de los números de Fermat serán las de 5 y 17, con la 3 tachada según la criba de Eratóstenes en base 15×17 en línea recta (diagonal). ¿No? ¿Acaso caben en otra columna?

¡Huy, aún no, elevemos la base! ($16^2 + 1$, 2, 3, 5 y 17). Debido a que los fermines crecen más rápido que el “multiplicatorio” de fermines, es decir, cada fermín es mayor que el anterior; el anterior por el siguiente fermín es menor que el siguiente fermín, que a su vez es el último fermín por el mismo, más uno ambos. XD

Pues este proceso me da igual las iteraciones: si son finitos, lo demostraré entonces, ¿no? Los fermines caen en las columnas de un primo factor de la base.

Dime que Fermat era de Pamplona; te paso el de Sofí. Debes definir los conjuntos por lo que NO hay en ellos.

Sea L_1 el conjunto de las parejas de números

$$a = 6k - 1$$

$$b = 12k - 1$$

con k entero.

Y los lenguajes derivados L_2 , L_3 y L_4 :

- L_2 : parejas con
 $a = (6k - 1)(6h + 1)$
 b cumpliendo $2 \cdot a + 1 = (6j - 1)(6g + 1)$
- L_3 y L_4 son análogos y contienen cada uno una de las limitaciones impuestas a L_2 .
 - L_3 : $a = (6k - 1)(6h + 1)$ y b cumpliendo $2 \cdot a + 1$.
 - L_4 : $a = 6k - 1$ y b cumpliendo $2 \cdot a + 1 = (6j - 1)(6g + 1)$.

¿Es $L_1 + L_2 - L_3 - L_4 = \text{LSG infinito?}$

$$l_1 = U$$

$$l_2 = U - U_3 - U_2 - U_4$$

$$l_3 = U - U_3 - U_2$$

$$l_4 = U - U_2 - U_4$$

¿Son U_3 , U_2 , U_4 en cantidad si U es infinito, infinitos?

Esto: un método que resuelve primos gemelos y gaussianos:

$$h = x! + a$$

$$G = (h / m!) \cdot v!$$

...

$$v = p + 1 = q - 1; p \text{ y } q \text{ primos}$$

$$V = (v / m!) \cdot n!$$

$V \pm 1$ son infinitas condiciones, tanto ciertas como falsas, de primos gemelos y de gaussianos. G y V , por si acaso, en una inecuación con Pitágoras y por no todos los infinitos casos de multiplicaciones de $6k \pm 1$.

$V \pm 1 = (6k \pm 1)(6j \pm 1)$. ¿Esto es siempre posible?

$G \neq a^2 + b^2$. ¿Esto es siempre posible?