

Parámetro	media	varianza	estadístico	Intervalo de confianza
$\mu$ con $\sigma$ conocida	$\mu$	$\sigma_1^2$	$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
$\mu$ con $\sigma$ desconocida	$\mu$	$s_1^2$	$t_{n-1} = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$	$\bar{x} \pm t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$
Proporción	P	$\frac{Pq}{n}$	$z = \frac{\hat{p} - P}{\sqrt{\frac{Pq}{n}}}$	$\hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$
Varianza			$\chi^2_{(n-1)} \sim \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$	$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}, n-1}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}}$
$\mu_1 - \mu_2$ con $\sigma_1^2$ y $\sigma_2^2$ conocidas	$\mu_1 - \mu_2$	$\left(\frac{\sigma_1^2}{n_1}\right) + \left(\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$	$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\left(\frac{\sigma_1^2}{n_1}\right) + \left(\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)}}$	$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\left(\frac{\sigma_1^2}{n_1}\right) + \left(\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)}$
$\mu_1 - \mu_2$ con $\sigma_1^2$ y $\sigma_2^2$ Desconocidas pero iguales	$\mu_1 - \mu_2$	$s_p^2 = \left[ \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_2 + n_1 - 2} \right]$	$t_{(n_1+n_2-2)} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$	$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\frac{\alpha}{2}, v} s_p \sqrt{\left(\frac{1}{n_1}\right) + \left(\frac{1}{n_2}\right)}$
$\mu_1 - \mu_2$ con $\sigma_1^2$ y $\sigma_2^2$ Desconocidas y diferentes	$\mu_1 - \mu_2$	$\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right) + \left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)$	$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right) + \left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)}}$	$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm t_{\frac{\alpha}{2}, v} \sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right) + \left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)}$ $v = \frac{\left(\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right) + \left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$
Diferencias pareadas $\mu_d$	$\bar{d}$		$t_{(n-1)} = \frac{\bar{d} - \mu_d}{sd/\sqrt{n}}$	$\bar{d} \pm t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \frac{s_d}{\sqrt{n}}$
Diferencia de proporciones	$\widehat{p}_x - \widehat{p}_y$	$\left(\frac{p_x q_x}{n_x}\right) + \left(\frac{p_y q_y}{n_y}\right)$	$Z = \frac{(\widehat{p}_x - \widehat{p}_y) - (p_x - p_y)}{\sqrt{\left(\frac{p_x q_x}{n_x}\right) + \left(\frac{p_y q_y}{n_y}\right)}}$	$(\widehat{p}_x - \widehat{p}_y) \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\left(\frac{\widehat{p}_x \widehat{q}_x}{n_x}\right) + \left(\frac{\widehat{p}_y \widehat{q}_y}{n_y}\right)}$
Razón de varianzas			$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$\frac{S_1^2}{S_2^2} * f_{\frac{\alpha}{2}, n_1-1, n_2-1} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{S_1^2}{S_2^2} * f_{1-\frac{\alpha}{2}, n_2-1, n_1-1}$

## Tamaños de muestra

Tamaño de muestra	finita	infinita
media	$n = \frac{Z^2 \sigma^2}{e^2}$	$n = \frac{NZ^2 \sigma^2}{(N-1)e^2 + Z^2 \sigma^2}$
Proporción	$n = \frac{Z^2 pq}{e^2}$	$n = \frac{NZ^2 pq}{(N-1)e^2 + Z^2 pq}$

## Funciones de distribución de probabilidad en software

Distribución	Forma	Rstudio	Excel
t	$P(x > c)$	=pt(cuantil;gl,lower.tail = F)	DISTR.T.CD(cuantil;gl)
F	$P(x > c)$	=DISTR.F.CD(cuantil;gl1;gl2)	pf(q=2.73, df1=15,df2=17, lower.tail=FALSE)
Normal	$P(x \leq c)$	=DISTR.NORM.ESTAND.N(C;VERDADERO)	pnorm(c,mean=0,sd=1)
Chi <sup>2</sup>	$P(x > c)$	=DISTR.CHICUAD.CD(c;gl)	pchisq(C,GL, lower.tail = FALSE)

## Resumen de algunas pruebas de hipótesis

Pruebas de hipótesis	Nula $H_0$	Alternativa $H_1$
Normalidad	$x_i$ variables aleatorias normales	$x_i$ variables aleatorias no normales
Significancia de los parámetros	$\beta_i = 0$	$\beta_i \neq 0$
Correlación	$r = 0$	$r \neq 0$
Carencia de ajuste	$E(Y X) = \beta_0 + \beta_1 X$	$E(Y X) \neq \beta_0 + \beta_1 X$
Prueba de independencia	Datos son independientes	Datos no son independientes
Varianza constante	Varianza constante	No varianza constante