Protocolo de manejo del cólico equino en clínica ambulante: experiencia de 212 casos

Pablo Navarro Sanz, Diego Herrera Campos
Grupo de trabajo Équidos (ficticio) · Junio 2025

Resumen

El cólico es la urgencia más frecuente en la clínica equina ambulante. Presentamos un protocolo de valoración inicial aplicado a 212 caballos atendidos en campo entre 2022 y 2024. El protocolo combina frecuencia cardiaca, dolor, reflujo nasogástrico, hallazgos de palpación rectal y ecografía abdominal rápida para decidir entre tratamiento médico en campo o derivación hospitalaria. El 81 % de los casos se resolvió con tratamiento médico; la derivación precoz de los casos con criterios de gravedad se asoció a una mayor supervivencia quirúrgica.

Palabras clave: équidos, caballo, cólico, urgencias, clínica ambulante, ecografía abdominal

1. Introducción

La decisión de derivar un caballo con cólico a un centro quirúrgico es crítica y a menudo debe tomarse en condiciones de campo, con recursos limitados. Un retraso en la derivación empeora el pronóstico de las lesiones estrangulantes.

2. Material y métodos

Se revisaron retrospectivamente 212 casos de cólico atendidos por dos veterinarios ambulantes. Se registraron la frecuencia cardiaca, la escala de dolor, la presencia de reflujo, los hallazgos rectales y la ecografía abdominal abreviada (protocolo de 7 ventanas).

Se consideró criterio de derivación la presencia de dos o más de los siguientes: frecuencia cardiaca superior a 60 lpm, dolor persistente tras analgesia, reflujo superior a 2 litros o asas de intestino delgado distendidas y amotiles.

3. Resultados

De los 212 casos, 172 (81 %) se resolvieron en campo. Se derivaron 40 caballos, de los cuales 26 requirieron cirugía. La supervivencia al alta de los casos quirúrgicos derivados en menos de 4 horas fue del 77 %, frente al 45 % en los derivados más tarde.

Tabla 1. Resultado de los casos según el destino

Destino	Casos	Supervivencia (%)
Tratamiento médico en campo	172	98
Derivación, tratamiento médico	14	93
Derivación, cirugía < 4 h	13	77
Derivación, cirugía > 4 h	13	45

4. Discusión y conclusiones

Un protocolo sencillo y reproducible en campo permite identificar con rapidez los casos que se benefician de la derivación. La ecografía abdominal abreviada resultó especialmente útil para detectar lesiones de intestino delgado.

Nota: documento ficticio generado para la demostración de vetsDB. Autores, centros, datos y resultados son inventados y no deben utilizarse con fines clínicos ni científicos.