DOCUMENTO FICTICIO - DEMO vetsDB - datos inventados

Resistencias antimicrobianas en aislados de Escherichia coli de terneros con diarrea neonatal en explotaciones de Sevilla

Diego Herrera Campos, Sergio Blanco Rey
Colegio de Veterinarios de Sevilla (ficticio) · Marzo 2025

Resumen

La diarrea neonatal es la principal causa de mortalidad en terneros durante sus primeras semanas de vida. Este estudio describe el perfil de resistencia antimicrobiana de 164 aislados de Escherichia coli obtenidos de terneros con diarrea en 23 explotaciones de vacuno de la provincia de Sevilla entre 2023 y 2024. El 61 % de los aislados fue resistente a tres o más familias de antimicrobianos. Las resistencias más frecuentes se observaron frente a tetraciclinas, ampicilina y sulfamidas, mientras que la sensibilidad a gentamicina se mantuvo elevada. Los resultados refuerzan la necesidad de realizar antibiogramas antes de instaurar tratamientos y de revisar los protocolos de encalostrado.

Palabras clave: vacuno, terneros, diarrea neonatal, Escherichia coli, resistencia antimicrobiana, antibiograma

1. Introducción

El uso prudente de antimicrobianos en producción animal es una prioridad dentro del enfoque One Health. En las explotaciones de vacuno, los terneros lactantes reciben con frecuencia tratamientos empíricos frente a cuadros digestivos, lo que favorece la selección de bacterias resistentes.

Existen pocos datos recientes sobre la situación en las explotaciones del sur peninsular. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el perfil de sensibilidad de E. coli en terneros con diarrea neonatal en la provincia de Sevilla.

2. Material y métodos

Se tomaron muestras de heces de 164 terneros de entre 1 y 21 días de edad con diarrea clínica, procedentes de 23 explotaciones (14 de aptitud cárnica y 9 de aptitud láctea). Los aislados se identificaron mediante pruebas bioquímicas estándar y se evaluó su sensibilidad a 12 antimicrobianos mediante difusión en disco siguiendo criterios CLSI.

Se consideró multirresistente todo aislado resistente a tres o más familias de antimicrobianos. Se recogieron además datos sobre el manejo del calostro y los tratamientos previos mediante un cuestionario al ganadero.

3. Resultados

El 61 % de los aislados (100/164) fue multirresistente. Las explotaciones que administraban tratamientos preventivos sistemáticos presentaron una proporción de multirresistencia significativamente mayor (72 % frente a 44 %).

Tabla 1. Porcentaje de aislados resistentes por antimicrobiano (n = 164)

Antimicrobiano	Resistentes (%)	Sensibles (%)
Tetraciclina	78	22
Ampicilina	71	29
Sulfamida-trimetoprim	58	42
Enrofloxacino	34	66
Florfenicol	29	71

Gentamicina	9	91

4. Discusión

Los niveles de resistencia observados son similares a los descritos en otras regiones europeas con producción intensiva. La asociación con los tratamientos preventivos sugiere que la reducción del uso metafiláctico podría tener un impacto directo en la sensibilidad de las cepas circulantes.

La elevada sensibilidad a gentamicina no justifica su uso como primera elección, dado su perfil de toxicidad y su importancia en medicina humana.

5. Conclusiones

Se recomienda basar los tratamientos en antibiogramas, reforzar el encalostrado y limitar los tratamientos preventivos sistemáticos en terneros lactantes.

Nota: documento ficticio generado para la demostración de vetsDB. Autores, centros, datos y resultados son inventados y no deben utilizarse con fines clínicos ni científicos.