Obesidad felina: prevalencia y factores de riesgo en clínicas del área metropolitana de Barcelona

Marta Soler i Puig
Col·legi de Veterinaris de Barcelona (ficticio) · Abril 2025

Resumen

Se evaluó la condición corporal de 1.032 gatos atendidos en 18 clínicas del área metropolitana de Barcelona. La prevalencia de sobrepeso u obesidad fue del 44 %. La esterilización, la vida exclusivamente en interior, la alimentación ad libitum y una edad de entre 5 y 10 años se asociaron de forma independiente a un mayor riesgo. Solo el 23 % de los propietarios de gatos obesos percibía correctamente la condición corporal de su animal.

Palabras clave: gato, felino, obesidad, condición corporal, nutrición, esterilización

1. Introducción

La obesidad es la enfermedad nutricional más frecuente en gatos y se asocia a diabetes mellitus, enfermedad articular y lipidosis hepática. Conocer los factores de riesgo locales permite diseñar campañas preventivas más eficaces.

2. Material y métodos

Estudio transversal durante 2024. Se valoró la condición corporal en escala de 9 puntos y los propietarios completaron un cuestionario sobre alimentación, actividad y percepción del peso de su gato.

3. Resultados

El 31 % de los gatos presentó sobrepeso y el 13 % obesidad. La percepción del propietario fue el factor más discordante con la valoración clínica.

Tabla 1. Factores de riesgo asociados a sobrepeso u obesidad (análisis multivariante)

Factor	Odds ratio	IC 95 %
Esterilizado	2,4	1,7 - 3,3
Vida solo en interior	1,9	1,4 - 2,6
Alimentación ad libitum	2,1	1,5 - 2,9
Edad 5-10 años	1,6	1,2 - 2,2

4. Conclusiones

La obesidad felina es muy prevalente y está infravalorada por los propietarios. Se recomienda incluir la valoración de la condición corporal en todas las consultas y pautar raciones medidas tras la esterilización.

Nota: documento ficticio generado para la demostración de vetsDB. Autores, centros, datos y resultados son inventados y no deben utilizarse con fines clínicos ni científicos.