Brote de salmonelosis en una granja avícola de puesta: investigación epidemiológica y medidas de control

Sergio Blanco Rey
Colegio de Veterinarios de Sevilla (ficticio) · Agosto 2026

Resumen

Se describe la investigación de un brote de Salmonella Enteritidis en una granja de gallinas ponedoras con 42.000 aves, detectado en un control oficial rutinario. La investigación identificó como origen probable una partida de pienso contaminada y deficiencias en el control de roedores. Las medidas de limpieza, desinfección y desratización permitieron obtener resultados negativos en tres muestreos consecutivos.

Palabras clave: aves, avícola, gallinas ponedoras, Salmonella, seguridad alimentaria, zoonosis, bioseguridad

1. Introducción

Salmonella Enteritidis es una de las principales causas de toxiinfección alimentaria asociada al consumo de huevos. Los programas nacionales de control exigen muestreos periódicos en las explotaciones de puesta.

2. Investigación del brote

Tras el resultado positivo se realizaron muestreos ambientales en naves, pienso, agua y roedores capturados. Se revisaron los registros de entrada de pienso y los protocolos de bioseguridad.

3. Resultados

Se aisló S. Enteritidis en polvo de las naves, en una muestra de pienso y en dos roedores. El perfil de los aislados fue coincidente, lo que apoya un origen común.

Tabla 1. Resultados de los muestreos ambientales

Tipo de muestra	Muestras	Positivas
Polvo de nave	24	7
Pienso	6	1
Agua	6	0
Roedores	9	2

4. Conclusiones

El control de roedores y la trazabilidad del pienso son puntos críticos de bioseguridad en explotaciones de puesta.

Nota: documento ficticio generado para la demostración de vetsDB. Autores, centros, datos y resultados son inventados y no deben utilizarse con fines clínicos ni científicos.