Detección precoz de enfermedad renal crónica en gatos mediante SDMA: estudio en 318 pacientes

Lucía Fernández Gil
Colegio de Veterinarios de Madrid (ficticio) · Septiembre 2026

Resumen

La enfermedad renal crónica (ERC) es frecuente en gatos geriátricos y suele diagnosticarse en fases avanzadas. Se analizaron 318 gatos mayores de 7 años sin diagnóstico previo, midiendo creatinina y SDMA. El SDMA identificó alteraciones compatibles con ERC en estadio temprano en 41 gatos (12,9 %) con creatinina dentro del intervalo de referencia. Se propone incluir el SDMA en los chequeos geriátricos anuales.

Palabras clave: gato, felino, enfermedad renal crónica, SDMA, creatinina, medicina geriátrica, riñón

1. Introducción

La creatinina sérica aumenta cuando se ha perdido una parte importante de la función renal. La dimetilarginina simétrica (SDMA) se eleva antes y se ve menos influida por la masa muscular, algo relevante en gatos mayores.

2. Material y métodos

Estudio prospectivo en tres clínicas entre 2025 y 2026. Se midieron creatinina, SDMA, densidad urinaria y presión arterial. Los casos con SDMA elevado se revaluaron a las 4 semanas.

3. Resultados

La elevación persistente de SDMA con creatinina normal se confirmó en 41 gatos. A los 12 meses, el 44 % de ellos había progresado a estadio 2 de la clasificación IRIS.

Tabla 1. Clasificación de los pacientes según creatinina y SDMA

Grupo	Gatos	%
Ambos normales	236	74,2
SDMA elevado, creatinina normal	41	12,9
Ambos elevados	35	11,0
Solo creatinina elevada	6	1,9

4. Conclusiones

El SDMA permite detectar la ERC felina antes que la creatinina y adelantar medidas dietéticas y de seguimiento.

Nota: documento ficticio generado para la demostración de vetsDB. Autores, centros, datos y resultados son inventados y no deben utilizarse con fines clínicos ni científicos.