

**Revisión Bibliográfica: Estado Actual de Investigación Sobre la Psilocibina y su
Efecto en los Trastornos Mentales**

Jhon Sebastián Hernández Lancheros



Universidad Autónoma de Bucaramanga Ext. Unisangil

Facultad de Ciencias de la Salud

Programa de Psicología

Ps. Eliana Graciela García Rincón

San Gil, Colombia

2025

Revisión bibliográfica: estado actual de investigaciones sobre la psilobicina y su efecto en los trastornos mentales

Jhon Sebastián Hernández Lancheros

Facultad De Ciencias De La Salud, Universidad Autónoma De Bucaramanga-Unab

Programa de Psicología Extensión Unisangil

2025

Nota del Autor

Jhon Sebastián Hernández Lancheros, Programa de Psicología, Universidad Autónoma de Bucaramanga extensión Fundación Universitaria de San Gil.

Este Proyecto de Grado contó con la asesoría de la Docente Ps. Esp. Eliana García
Cualquier mensaje con relación a este proyecto de grado pueden comunicarse al correo electrónico jhernandez670@unab.edu.co

Agradecimientos

En primer lugar, agradezco a la Doc. Eliana García por todo su apoyo y colaboración para guiarme paso a paso con la investigación para tener un proyecto de este nivel, ya que la idea siempre ha sido la de superarme y alcanzar la meta de ser un profesional, además agradezco también a todos los otros Docentes y Decanos que a lo largo de la carrera me enseñaron bastantes cosas muy importantes para lo que hoy en día me he convertido, mucho aprecio también a la Doc. Laura Margarita por toda su colaboración en mi carrera profesional que ellas han sido pilares en esta formación académica, por otro lado y no menos importante a Dios y a la virgen María que también fueron la motivación de mis días para no desertar y conseguir este logro tan anhelado para mí...

Dedicatoria a:

A mi madre hermosa que es y siempre ha sido mi Guía en todo este proceso y que siempre está en mi corazón porque ella es mi motivación todos los días a Dios y a la virgencita María que me dieron la oportunidad de sacar adelante esta carrera tan importante en la vida para las personas. A los docentes que acompañaron mi proceso que sin ellos tampoco se podría estar obteniendo este logro de muchos que faltan en el proceso además que fueron de grandes pilares para lo que hoy en día soy a ellos que los santos les den muchas bendiciones.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	8
Planteamiento del Problema.....	9
Justificación	10
Objetivos	11
Objetivo General	11
Objetivos Específicos	12
Marcos De Referencia	12
Marco Conceptual.....	12
Marco Contextual.....	16
Marco Legal.....	17
Marco Metodológico	Error! Bookmark not defined.
Diseño Y Tipo De Investigación	20
Unidad de Análisis	19
Procedimiento	20
Resultados	22
Discusión.....	34
Conclusiones	35
Recomendaciones	38
Referencias Bibliográficas	41

Indice de Tablas

Tabla 1	Matríz de Análisis Bibliográfico	22
---------	--	----

Resumen

El presente proyecto de grado tuvo como propósito analizar la relación entre el uso de la psilocibina y el tratamiento de los trastornos mentales a través de una revisión Bibliográfica de la literatura científica disponible. A partir del examen de diversas fuentes académicas, se evidenció que la psilocibina ha mostrado resultados prometedores en el manejo de afecciones como la depresión resistente, la ansiedad y el trastorno por consumo de sustancias, al favorecer experiencias terapéuticas que promueven la introspección, la regulación emocional y la reconexión con el sentido vital. Sin embargo, también se identificaron riesgos potenciales asociados a su uso, como la posibilidad de crisis psicológicas o reactivación de traumas, lo que subraya la necesidad de aplicar protocolos clínicos rigurosos y acompañamiento profesional. En el contexto colombiano, el interés por esta línea de investigación se encuentra en crecimiento, aunque aún enfrenta limitaciones legales y científicas que restringen su aplicación práctica. Este trabajo resalta la importancia de continuar explorando el potencial terapéutico de la psilocibina desde una perspectiva ética, humanizada y basada en evidencia, que priorice la seguridad y el bienestar integral de las personas.

Palabras Clave: Psilocibina, Salud Mental, Trastornos Mentales, Psicología, Terapia.

Abstract

This undergraduate research project aimed to analyze the relationship between the use of psilocybin and the treatment of mental disorders through a Literature review of the available scientific literature. Based on the examination of various academic sources, the findings revealed that psilocybin has shown promising results in managing conditions such as treatment-resistant depression, anxiety, and substance use disorders, as it facilitates therapeutic experiences that promote introspection, emotional regulation, and reconnection with personal meaning. However, potential risks were also identified, including the possibility of psychological crises or the reactivation of past traumas, emphasizing the need for rigorous clinical protocols and professional guidance. In the Colombian context, interest in this field of study is increasing, although it still faces legal and scientific limitations that restrict its practical application. This work highlights the importance of continuing to explore the therapeutic potential of psilocybin from an ethical, humanized, and evidence-based perspective that prioritizes safety and the overall well-being of individuals.

Keywords: Psilocybin, Mental Health, Mental Disorders, Psychology, Therapy.

Introducción

El gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al alterar sus actitudes mentales” (William James)

Este trabajo de grado tiene como propósito proporcionar información basada en investigaciones que exploran el uso de la psilocibina, extraída de ciertos hongos, como posible tratamiento para trastornos mentales. A través de una revisión bibliográfica, se busca analizar la efectividad de la psilocibina como una alternativa terapéutica para abordar y tratar diversos trastornos mentales. La intención de este proyecto es investigar el potencial de la psilocibina para influir en el psiquismo humano, con un énfasis en los beneficios que podría ofrecer en el tratamiento de condiciones de salud mental. Desde hace ocho décadas los profesionales de la salud se han interesado en el uso de alucinógenos para tratar enfermedades mentales ya que ha evidenciado tener importantes efectos en las representaciones mentales de las personas, cambiar de manera temporal y prolongada el estado de ánimo, los pensamientos y las percepciones; influyendo de manera directa en su comportamiento (Polito, V., & Stevenson, R. J. (2019)

La psilocibina ha sido utilizada durante siglos en rituales espirituales y religiosos en diversas culturas, sin embargo, su investigación científica como herramienta terapéutica se encuentra en sus etapas iniciales, no obstante, los estudios preliminares sugieren que la psilocibina podría llegar ser una herramienta ventajosa en el tratamiento de diversos trastornos psicológicos siendo igual de eficaz que las nuevas generaciones de antidepresivos (Ermakova, 2023). El objetivo principal del proyecto es investigar si los hongos pueden contribuir al tratamiento terapéutico de los trastornos mentales, recopilando información en libros y sitios web verificados. A través de una perspectiva interdisciplinaria, se busca exponer el potencial de los hongos en la recuperación

de la psique humana, explorando cómo algo aparentemente “insignificante” podría tener un impacto significativo en la salud mental.

Planteamiento del Problema

La psilocibina es una sustancia psicoactiva que se encuentra en ciertos hongos, conocidos como "hongos mágicos". Esta sustancia ha sido objeto de interés en la investigación médica y psiquiátrica debido a su potencial terapéutico para tratar diversas condiciones de salud mental, incluyendo la depresión (Ling et al., 2022). Sin embargo, la psilocibina es ilegal en la mayoría de los países y está clasificada como una droga psicotrópica, lo que ha dificultado considerablemente la investigación sobre los hongos que la contienen. Por esta razón, esta investigación se lleva a cabo con el propósito de obtener información detallada y clara, para identificar si la psilocibina puede utilizarse de manera segura en el tratamiento de la psique humana.

Debido a la limitada información disponible, esta investigación nace con el propósito de realizar una búsqueda exhaustiva sobre la psilocibina, con el fin de desafiar el estigma que ha existido durante años en torno a este "simple" hongo. A través de este estudio, se busca la recopilación de información basada en investigaciones sobre la psilocibina y su capacidad para transformar la perspectiva del psiquismo humano, especialmente en el contexto de psicoterapia asistida.

La salud mental se ha visto afectada cada vez más por diversos factores, lo que ha llevado a un aumento en el número de personas que padecen problemas como ansiedad, depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia, entre otros. Este documento aborda la problemática de la salud mental desde diferentes contextos, tanto a nivel mundial como nacional, planteando la siguiente

pregunta: ¿Puede la psilocibina ser útil en el tratamiento de los trastornos mentales dentro de un contexto terapéutico?

Justificación

La viabilidad de esta investigación se sustenta en diversas bases de datos que permiten explorar el origen histórico de la psilocibina, desde la antigüedad, a través de las perspectivas de disciplinas como la filosofía, la psicología, la sociología, la medicina, entre otras. Estas disciplinas han contribuido al conocimiento actual sobre sus efectos. Con base en estas investigaciones, podemos adoptar un enfoque interdisciplinario para evaluar la eficacia de la psilocibina en el tratamiento de trastornos mentales. Es fundamental entender tanto la seguridad como la efectividad a largo plazo de la psilocibina, así como los mecanismos subyacentes a su posible efecto antidepresivo. Por ello, resulta crucial analizar los estándares adecuados de dosificación y las pautas de tratamiento, con el fin de minimizar riesgos y maximizar los beneficios. Además, es trascendental considerar las implicaciones éticas y legales asociadas con el uso de sustancias psicodélicas en un contexto clínico (Johnson et al., 2008).

Esta investigación busca llegar a una conclusión clara sobre cómo los hongos pueden transformar la perspectiva de la psique humana. Se argumenta que, si se utilizan adecuadamente en psicoterapia, los hongos podrían convertirse en una herramienta crucial en una sociedad que enfrenta un creciente deterioro de la salud mental. A pesar de que el paso del tiempo y las estrictas regulaciones han limitado el estudio de la psilocibina, ya existen fármacos basados en compuestos derivados de estos hongos. Disciplinas profesionales con el fin de contribuir al bienestar y la supervivencia de la humanidad.

La solución a muchos tratamientos se encuentra en la naturaleza, aunque el ser humano ha tendido a ignorarlo. A menudo se olvida que muchos problemas mentales o psiquiátricos podrían ser abordados a través del uso de hongos. Este enfoque ha llevado a algunos especialistas a cuestionar los paradigmas científicos predominantes, sugiriendo que las experiencias inducidas por los psicodélicos estudiados podrían reflejar estados de conciencia ampliada. Por lo que se planteó la posibilidad de considerar estos estados no ordinarios de conciencia potencialmente positivos para la salud mental y no únicamente como fenómenos patológicos (Meléndez, 2009).

La presente investigación busca proporcionar la información necesaria para determinar, a través de diversos estudios, si la psilocibina puede ser utilizada en contextos terapéuticos y no simplemente el ser considerada como una droga.

En la última década, se ha suscitado un creciente interés en el potencial uso terapéutico de la psilocibina (elemento psicodélico que se encuentra en cierto tipo de hongos) para abordar una gama de afecciones psicológicas incluyendo la depresión, las terapias guiadas con psilocibina implican una administración controlada de la sustancia en un entorno seguro, relajado y acompañado bajo la supervisión de un profesional de salud mental (Carhart-Harris & Goodwin, 2017).

Objetivos

Objetivo General

Analizar, a través de una revisión bibliográfica, la relación entre el uso de la psilocibina y el tratamiento de los trastornos mentales, con el fin de identificar la evidencia científica disponible sobre su eficacia y las aplicaciones terapéuticas emergentes.

Objetivos Específicos

- Analizar los hallazgos científicos relacionados con la eficacia de la psilocibina como tratamiento para trastornos mentales.
- Examinar la evidencia disponible respecto a los riesgos, efectos adversos y consideraciones éticas asociadas a su uso.

Marco de Referencia

Marco conceptual

Hongos

Algunos hongos son muy grandes, pero otros son tan pequeños que sólo pueden verse utilizando un microscopio. Entre los organismos incluidos en la categoría de hongos se pueden describir, en su mayoría, como filamentosos con crecimiento apical, eucarióticos, heterótrofos por absorción, con reproducción asexual y sexual por medio de esporas, y con pared celular principalmente constituida por quitina o celulosa T. herrera, y ,M. Ulloa. (1990). Se estiman alrededor de 140 000 hongos en la tierra y solo se conocen los usos del 10% de ellos, entre los cuales se encuentran los champiñones (hongos comestibles) que son solo el 5%, lo que implica que son 7000 todavía las especies no descubiertas que podrían tener un posible beneficio para la humanidad. (DI, hawksworth (2001).

Psilocibina y su uso en terapias

La psilocibina es un compuesto psicodélico de origen natural presente en diversas especies de hongos pertenecientes principalmente a los géneros *Psilocybe*, *Panaeolus* y *Gymnopilus*. Su uso ceremonial y espiritual se remonta a civilizaciones mesoamericanas, donde estas sustancias fueron empleadas en rituales religiosos y prácticas curativas. Desde la perspectiva farmacológica, la

psilocibina actúa como un profármaco, transformándose en psilocina al ingresar al organismo, compuesto responsable de sus efectos psicotrópicos.

La psilocibina puede llegar a utilizarse en tratamientos de terapia asistida con un terapeuta experto en el proceso de los enteógenos o solamente con psilocibina. En 1920 se inician diversos trabajos sobre investigación en psicoterapia, los que hasta la época actual han intentado definir en qué consiste un proceso psicoterapéutico y cuáles son los elementos principales que lo posibilitan. En esta línea de trabajo se aprecian algunos acuerdos entre estudios que señalan que dicho proceso consiste en una práctica, la que definen como una articulación de diversos actos psicoterapéuticos, los que a su vez son conceptualizados como una convergencia de modelos teóricos, recursos técnicos y aplicaciones concretas en los individuos, y que se orientan hacia una salud integral en función de la resolución de un problema determinado o de la ejecución de un cambio en un cierto contexto (Avila & Poch, 1998; Jiménez, 2012).

La psilocibina ejerce su acción principalmente sobre los receptores serotoninérgicos 5-HT_{2A}, ubicados en la corteza prefrontal. Esta activación genera modificaciones en la conectividad cerebral, particularmente en la Red Neuronal por Defecto (RND), asociada a la autopercepción, la rumiación y los estados emocionales. Estas alteraciones temporales permiten una mayor flexibilidad cognitiva, facilitando experiencias introspectivas profundas y un aumento en la neuroplasticidad. Dichos cambios se han vinculado con la reducción de patrones rígidos de pensamiento característicos de trastornos como la depresión y la ansiedad.

Legalidad de la psilocibina

A finales de los cincuenta y principios de los sesenta, Sandoz distribuyó la psilocibina como fármaco de investigación, bajo el nombre comercial de Indocybin® (Ott, 2011). Luego, “a partir de los tratados internacionales de 1970, la psilocibina queda fiscalizada” (Parés, 2013). Durante

estas fechas hubo una primera oleada de investigaciones en seres humanos con esta sustancia; luego estos estudios se detuvieron porque se prohibió este fármaco. Más adelante, a mediados de los años noventa se renuevan los estudios interesados en el potencial terapéutico de la psilocibina (Kumar, 2007). Es relevante aclarar que cualquier droga constituye un potencial veneno y un potencial remedio, y que el hecho de ser nociva o benéfica en cada caso depende exclusivamente de: “a) dosis; b) ocasión para la que se emplea; c) pureza; d) condiciones de acceso a ese producto y e) pautas culturales de uso” (Escohotado, 2008, p. 1188).

Esta regulación ha implicado que algunas drogas como la LSD, la psilocibina y la MDMA se mantengan fuera del alcance de la población para ser utilizadas en el ámbito de la salud, a pesar de que entre los años cincuenta y sesenta diversos estudios psiquiátricos ya mostraban su potencial terapéutico. Dicha regulación se articuló con otros elementos de la época que conllevaron la detención de los procesos psicoterapéuticos que se estaban llevando a cabo con ellas, junto con el término de su elaboración por parte de algunos laboratorios que las repartían entre psiquiatras e investigadores para ser administradas en contextos clínicos (J. C. Bouso, 2003; Escohotado, 2008; Gasser, 1994; Grof, 1970; Hofmann, 2006; Naranjo, 1973; Oram, 2014; Passie, Halpern, Stichtenoth, Emrich, & Hintzen, 2008).

Tratamiento de los hongos y la salud mental

Es relevante aclarar que cualquier droga constituye un potencial veneno y un potencial remedio, y que el hecho de ser nociva o benéfica en cada caso depende exclusivamente de: “a) dosis; b) ocasión para la que se emplea; c) pureza; d) condiciones de acceso a ese producto y e) pautas culturales de uso” (Escohotado, 2008, p. 1188). Los estudios de la química del cornezuelo fueron dando cuenta de la existencia de diversos alcaloides con distintas propiedades

terapéuticas. Este recorrido al parecer se inicia en 1903, año en el que los alcaloides del ergot fueron aislados por la compañía farmacéutica Wellcome (Muñoz, 2012). Otro hito importante acontece en 1930, cuando W. A. Jacobs y L. C. Craig, del Rockefeller Institute de Nueva York, lograron aislar el componente fundamental común a todos los alcaloides del cornezuelo, al que denominaron ácido lisérgico (Hofmann, 2006), apartir de este ácido que sacan empiezan a tratar y a curar a las personas que tenían problemas como ansiedad, histeria , bipolaridad entre otros, El descubrimiento de los efectos psíquicos de esta sustancia llevaron a Hofmann a pensar inmediatamente que esta droga podría ser de gran utilidad en farmacología y neurología, pero sobre todo en psiquiatría, puesto que la “LSD desplegaba sus efectos sobre todo en el dominio de las funciones psíquicas y espirituales superiores y en las más altas de todas” (Hofmann, 2006, p. 38), De esta manera, a principios de los años 50, Sandoz empezó a distribuir con fines experimentales el nuevo fármaco de LSD-25, con el nombre farmacéutico de Delysid® (tartrato de LSD). Durante esa década y hasta principios de los años 60, se utilizó ampliamente en psiquiatría clínica y en la investigación del cerebro, por lo que aparecieron cientos de informes que daba cuenta de la relevancia de este fármaco (J. C. Bouso, 2003; Gasser et al., 2014; Ott, 1998, 2011).

Furst (2002) señala que “los receptores de dopamina están presentes en las regiones superiores del cerebro, las cuales se hayan involucradas en las experiencias más complejas y por tanto resultan probables sedes de los estados alternos de conciencia, o “alucinaciones”. Su función, reportan los investigadores de la UCLA, hace que parezca que los efectos del LSD que imitan los estados psicóticos (advertidos primero por Hofmann hace más de treinta años) también pueden estar relacionados con la actividad de los sistemas dopamínicos del cerebro” (Furst, 2002, p. 11, Los aztecas utilizaban estos hongos en ceremonias sagradas, de adivinación y

de sanación. Para ellos, esta especie junto con otras plantas psicoactivas, eran en sí una divinidad y no sólo un medio de comunicación con lo sobrenatural (Schultes & Hofmann, 2008).

Marco contextual

Trastornos mentales

Los trastornos mentales son la causa de muchos problemas de salud mental que acaban con la vida de las personas, En 2019, una de cada ocho personas en el mundo (lo que equivale a 970 millones de personas) padecían un trastorno mental. Los más comunes son la ansiedad y los trastornos depresivos, que en 2020 aumentaron considerablemente debido a la pandemia de COVID-19; las estimaciones iniciales muestran un aumento del 26% y el 28% de la ansiedad y los trastornos depresivos graves en solo un año. Aunque existen opciones eficaces de prevención y tratamiento, la mayoría de las personas que padecen trastornos mentales no tienen acceso a una atención efectiva. Además, muchos sufren estigma, discriminación y violaciones de los derechos humanos. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022).

Psilocibina

Según la historia los primeros datos que se tienen expuestos en libros fueron por María Sabina la muy conocida por sus niños mágicos (hongos) en 1955 el etnomicólogo R. Gordon Wasson conoce a la curandera María Sabina en México, quién lo guiará y permitirá ser parte de las ceremonias en que utilizaban estos hongos. De esta forma, se comienza a tener acceso a estas especies fúngicas y a estos rituales (Grob, Bossis, & Griffiths, 2013; Parés, 2013b; Rátsch, 2005) Este pueblo indígena utilizaba los hongos psilocíbicos con fines medicinales, por vía tópica para el tratamiento de la gota y por vía oral para tratar una “fiebre acuática”. Además, eran ingeridos

por el chamán o pahini (“aquel que consume medicinas”) como ayuda adivinatoria en el diagnóstico de las causas naturales o mágicas de la enfermedad (Ott, 2011; Rätsch, 2005).

En 1958, en esta investigación Hofmann descubrió que la psilocibina y la psilocina eran los principios activos de los hongos alucinógenos más importantes, a partir de los esclerotes de “psilocibe mexicana”. Después de aislar estas sustancias, Hofmann determina sus estructuras químicas y las verifica sintetizándolas (Hofmann, 2006)

Salud Mental

Se puede observar que a nivel del mundo existen diversas organizaciones que trabajan para analizar la salud en general de la población y brindar apoyo integral para el mejoramiento de los problemas en salud. Para la OMS (2022), la salud mental es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad. Además, la OMS define el apoyo en materia de salud mental y psicosocial como “cualquier tipo de apoyo local o externo cuyo objetivo es proteger o promover el bienestar psicosocial y/o prevenir o tratar los trastornos de salud mental”.

Marco legal

Colombia es parte de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y de la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Según esa convención de 1971, la psilocibina está incluida en la lista de sustancias psicotrópicas que deben tener control estatal.

La Ley 13 de 1974 aprueba en Colombia la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y su protocolo de modificación de 1972. Esta normativa incorpora al orden jurídico colombiano

los compromisos internacionales sobre el control de sustancias psicoactivas, estableciendo la regulación estricta de cultivos, producción, distribución y uso de estupefacientes. Su propósito central es prevenir el uso indebido de drogas y promover mecanismos para su fiscalización, autorizando solo usos médicos y científicos. Esta ley es especialmente relevante en debates contemporáneos sobre psilocibina, pues establece las bases legales internacionales que han restringido su uso, a pesar de los avances en investigación terapéutica.

Ley 43 de 1980: Esta ley aprueba en Colombia el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 suscrito en Viena el 21 de febrero de 1971, autorizando al Gobierno nacional a adherirse a él. Su propósito es establecer un régimen internacional de control para las sustancias psicotrópicas —incluyendo fabricación, comercio, importación y distribución—, limitando su uso al ámbito médico y científico, y aplicando licencias u otro régimen de fiscalización para su manejo.

La tenencia, tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas sin autorización puede estar sancionada por la legislación penal colombiana. Por ejemplo, la Ley 1453 de 2011 modifica el artículo 376 del Código Penal para regular tales conductas. Sin embargo, el uso personal y el porte para consumo propio están en un ámbito de interpretación: Colombia ha tenido decisiones de la Corte Constitucional de Colombia que han señalado límites sobre la criminalización absoluta del consumo personal. (Consejo Nacional de Estupefacientes, 2019)

A asimismo se dará a conocer las leyes normativas que existen en Colombia para utilizar la psilocibina como terapia, Respecto del acceso a fármacos de uso psicoterapéutico por parte de los profesionales y pacientes, cabe señalar que ha sido históricamente regulado por diversas

instancias. Los estados lo han ido administrando paulatinamente, los que con el tiempo han desarrollado tratados internacionales en materia de drogas. Al respecto destaca la política prohibicionista implementada por Estados Unidos desde el siglo XIX hasta la actualidad, la que ha tenido repercusiones internacionales sobre el acceso y disponibilidad de sustancias (Drug Enforcement Administration, 2014; Escohotado, 2008; National Institute on Drug Abuse, 2014).

Ley 1090 de 2006

Ley por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones, entre estas se resalta en el Cap. VII sobre la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones, en su artículo Art. 49 que los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su divulgación y pautas para su correcta utilización.

Ley 1616 de 2013

Normatividad por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones, se describe lo planteado en el Título X con sus disposiciones finales en el art. 39 se habla de la investigación e innovación en salud mental: En el marco del Plan Nacional de Investigación en Salud Mental el Ministerio de la Protección Social o la entidad que haga sus veces, y los entes territoriales asignan recursos y promoverán la investigación en salud mental. Estas investigaciones se deben gozar las prácticas exitosas, para ello será urgente el monitoreo y justiprecio de los programas Existentes en sanidad mental que estarán a delación de Colciencias con la aporte de las universidades públicas y privadas del posición que cuenten con carreras en ciencias de la vigor.

Marco Metodológico

Diseño Y Tipo De Investigación

La presente investigación es de tipo cualitativa con un diseño de investigación bibliográfica. Según Fernández P. y Lebrero B. (2014), definen la investigación bibliográfica como:

Una amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, realizada de un modo sistemático, pero sin analizar los problemas que esto implica. Otros autores la consideran como el proceso de búsqueda de información en documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en un área particular. (p. 545).

Unidades de análisis


Las unidades de análisis correspondieron a diversos recursos de información en línea, localizados en repositorios institucionales, motores de búsqueda como Google Académico y bases de datos especializadas. Se emplearon tanto fuentes primarias como secundarias. En cuanto a los formatos de búsqueda, se priorizó la consulta de artículos académicos disponibles en formato PDF o HTML a través de Internet. Respecto a las fuentes secundarias, se utilizaron principalmente bases de datos que recopilan resúmenes y referencias de artículos científicos y capítulos de libros.

Procedimiento

El procedimiento de la presente investigación, comprende las fases o etapas de desarrollo, conformadas por 4 fases definidas de la siguiente manera:

Figura 1

Fases del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

Fase 1 Selección y Delimitación del tema

En esta fase se realiza la elección del tema central del proyecto de grado, considerando su relevancia social, académica y profesional. Se analiza la viabilidad del tema en función de la disponibilidad de información, el tiempo y los recursos con los que se cuenta. Posteriormente, se procede a delimitarlo, estableciendo los límites conceptuales, espaciales y temporales que permitirán enfocar adecuadamente la investigación.

Fase 2 Planteamiento del problema

En esta fase se identifica y describe de manera clara la temática abordada. Se analizan las causas, consecuencias y el contexto en el que se presenta el problema, con el fin de comprender su relevancia y alcance.

Fase 3 Recolección y Organización de Información

Esta fase comprende la recolección de la información con la lectura de documentos, acopio de información, elaboración de Matriz.

Fase 4 Análisis de Datos

Esta fase implica la clasificación de la información, para su respectivo análisis dando respuesta a los objetivos propuestos

Fase 5 Elaboración de Documento Final

Esta fase tiene como propósito la redacción y estructura final del trabajo

Resultados

Tras la aplicación del proceso de revisión bibliográfica, se recopilaron y analizaron diversas investigaciones publicadas entre los años 2010 y 2025, centradas en el uso terapéutico de la psilocibina como herramienta complementaria en el tratamiento de distintos trastornos mentales. La mayoría de los estudios seleccionados provienen de bases de datos científicas como PubMed, Scopus, ScienceDirect y Google Scholar, e incluyen tanto ensayos clínicos controlados, como estudios experimentales, revisiones previas y metaanálisis.

Tabla 1

Autor	Título	Año	Objetivo	Metodología	Hallazgos	Aporte
1. Johnson et al.	Psilocybin for tobacco addiction	2014	Reducir adicción a nicotina	Terapia + psilocibina	80% abstinencia	Innovación en adicciones
2. Bogenschutz et al.	Psilocybin for alcohol dependence	2015	Reducir consumo de alcohol	Intervención controlada	Reducción significativa	Nueva vía terapéutica

3.	Psilocybin and reduced suicidality	2015	Evaluar conducta suicida	Bases de datos nacionales	Menor riesgo reportado	Importancia clínica
4.	Psilocybin for treatment-resistant depression	2016	Evaluar depresión resistente	Dosis única + apoyo terapéutico	Mejoras significativas	Evidencia para nuevas terapias
5.	Symptom reduction in cancerpatients	2016	Reducir ansiedad existencial	Dosis controlada	Mejoras rápidas	Útil en cuidados paliativos
6.	Psychedelics pharmacology review	2016	Entender farmacología	Revisión molecular	Acción serotoninérgica clara	Fundamento fisiológico
7.	Sustained decreases in anxiety and depression	2018	Medir beneficios emocionales	Voluntarios sanos	Cambios positivos duraderos	Soporte terapéutico
8.	Nature relatedness after psilocybin	2018	Evaluar conexión con naturaleza	Encuestas antes/después	Aumento significativo	Efectos en bienestar

9.	Therapeutic mechanisms of psychedelics	2018	Entender mecanismos psicológicos	Revisión amplia	Flexibilización cognitiva	Explicación integral
Schenberg						
10.	Mindfulness after psilocybin	2019	Evaluar mindfulness	Voluntarios sanos	Incremento significativo	Complemento terapéutico
Smigielski et al.						
11.	Psilocybin for major depressive disorder	2020	Evaluar depresión mayor	Grupo control y experimental	Mejoras en 4 semanas	Prueba sólida moderna
Davis et al.						
12.	Receptor 5-HT2A occupancy	2020	Analizar mecanismos	PET-scan	Correlación receptor-efectos	Explica mecanismo terapéutico
Madsen et al.						
13.	Emotional breakthrough under psilocybin	2020	Evaluar liberación emocional	Cuestionarios validados	Aumento de apertura emocional	Clave en resultados terapéuticos
Barrett et al.						
14.	Psychoplastogens review	2020	Analizar neuroplasticidad	Revisión molecular	Inducción rápida de plasticidad	Impulsa investigación moderna
Olson						

15. Nutt Carhart- Harris	Psychedelic & therapy revolution	2021	Analizar cambio de paradigma	Revisión profunda	Alta eficacia terapéutica	Marco conceptual moderno
16. Dos Santos et al.	Safety of psychedelics	2021	Evaluar seguridad	Análisis comparativo	Buena tolerabilidad	Base para regulación
17. Gukasyan & Griffiths	Psilocybin- assisted psychotherap y review	2022	Analizar estudios clínicos	Síntesis documental	Alta eficacia en salud mental	Meta- evidencia
18. Lesmes Silva (Colombia)	Potencial terapéutico de psilocibina en ansiedad y depresión	2023	Analizar evidencia clínica	PRISMA, 7 estudios	Reducción sostenida de síntomas	Evidencia local directa
19 Suárez, Quintero & Cardona Gil (Colombia)	Microdosis de hongos psilocibios en Colombia	2023	Describir microdosif icación	Encuesta + bitácoras	Efectos positivos y secundarios	Aporte cultural colombian o

Matriz de Análisis Bibliográfico

Nota: Estudios seleccionados ordenados de menor a mayor año de investigación

Los resultados muestran un creciente interés científico por la psilocibina como agente terapéutico dentro del campo de la psicoterapia asistida por sustancias psicodélicas. Las investigaciones coinciden en que, bajo condiciones clínicas controladas y acompañamiento psicológico especializado, la psilocibina puede generar mejoras significativas en los síntomas de depresión mayor, ansiedad generalizada, trastornos de estrés postraumático (TEPT) y adicciones (particularmente al alcohol y la nicotina).

De manera consistente, los participantes de los estudios reportaron una disminución en los niveles de angustia emocional, desesperanza y rumiación mental, así como un incremento en la sensación de conexión consigo mismos, con los demás y con el entorno. Estos cambios se atribuyen a las experiencias introspectivas y de disolución del ego que facilita la psilocibina, las cuales permiten una reconfiguración de patrones cognitivos y emocionales disfuncionales.

Los ensayos clínicos de mayor rigor metodológico evidencian que la psilocibina, administrada en dosis controladas y bajo acompañamiento terapéutico, presenta efectos secundarios mínimos y transitorios, tales como leves náuseas, cambios sensoriales temporales o episodios de ansiedad momentánea. No obstante, la mayoría de los estudios advierte sobre la necesidad de evitar su uso recreativo o sin supervisión profesional, ya que el contexto de administración es determinante para el resultado terapéutico.

Asimismo, la revisión permitió identificar limitaciones comunes en la literatura, como el tamaño reducido de las muestras, la falta de diversidad poblacional, el seguimiento a corto plazo y la ausencia de protocolos estandarizados para la combinación entre psilocibina y acompañamiento psicoterapéutico. Estas limitaciones hacen necesario continuar con investigaciones más amplias, controladas y longitudinales que permitan consolidar la evidencia científica sobre su eficacia y seguridad.

En términos generales, los hallazgos respaldan la hipótesis de que la psilocibina puede constituir una alternativa terapéutica innovadora y prometedora frente a los tratamientos farmacológicos tradicionales, especialmente en casos de trastornos resistentes a los antidepresivos convencionales. Sin embargo, los autores coinciden en que su implementación debe realizarse dentro de un marco ético, legal y médico claramente definido, que garantice la protección del paciente y la validez científica de los resultados.

En el contexto colombiano, el uso terapéutico de la psilocibina se encuentra en una etapa incipiente, tanto en el ámbito científico como en el regulatorio. Actualmente, la sustancia está catalogada dentro de la lista de compuestos controlados, lo que limita su uso clínico y su comercialización, ya que no cuenta con aprobación sanitaria por parte del INVIMA. Sin embargo, los hongos que la contienen en su estado natural no poseen una regulación específica, lo que genera una zona gris legal en torno a su porte, cultivo y consumo. A pesar de ello, en los últimos años se ha evidenciado un creciente interés académico por estudiar el potencial terapéutico de la psilocibina en el tratamiento de trastornos mentales, principalmente en instituciones de educación superior que han desarrollado revisiones narrativas y análisis teóricos sobre el tema. No obstante, los ensayos clínicos controlados en el país son escasos, y la evidencia

empírica disponible proviene principalmente de estudios internacionales. Esta situación refleja la necesidad de fortalecer la investigación local, establecer marcos normativos claros y promover el desarrollo de protocolos éticos y científicos que permitan explorar de manera segura y responsable las posibles aplicaciones terapéuticas de la psilocibina en Colombia.

En conclusión, los resultados de esta revisión evidencian un avance significativo en la comprensión del potencial terapéutico de la psilocibina, destacando su papel como agente facilitador de procesos emocionales y cognitivos profundos. No obstante, se requiere continuar fortaleciendo la base empírica mediante investigaciones interdisciplinarias, protocolos estandarizados y políticas regulatorias adecuadas que permitan su integración responsable en el ámbito clínico y psicológico.

Dando respuesta a los objetivos planteados podemos concluir que; La revisión permitió identificar una creciente cantidad de estudios científicos que respaldan la eficacia de la psilocibina como una herramienta terapéutica innovadora en el tratamiento de diversos trastornos mentales. La evidencia revisada muestra resultados consistentes en la reducción significativa de síntomas depresivos, ansiosos y de estrés postraumático, así como mejoras en el bienestar emocional, la percepción de vida y la conexión interpersonal de los pacientes. Los ensayos clínicos más rigurosos destacan que la eficacia del tratamiento se incrementa cuando la psilocibina es administrada en entornos controlados y acompañada de apoyo psicoterapéutico, lo cual potencia los efectos introspectivos y la reestructuración cognitiva. Asimismo, los resultados sugieren que la psilocibina podría representar una alternativa prometedora frente a los tratamientos farmacológicos tradicionales, especialmente en casos de depresión resistente o en pacientes que no han respondido adecuadamente a los antidepresivos convencionales. No

obstante, la evidencia también señala la necesidad de continuar con estudios longitudinales y con muestras más amplias que consoliden su eficacia y garanticen su aplicación segura en contextos clínicos.

De la misma manera en relación con los riesgos y las consideraciones éticas, los estudios revisados coinciden en que la psilocibina, cuando se emplea bajo condiciones clínicas controladas, presenta un perfil de seguridad favorable, con efectos secundarios generalmente leves y transitorios, como náuseas, cambios perceptuales o ansiedad momentánea. Sin embargo, los investigadores advierten que su uso fuera de entornos terapéuticos especializados puede representar riesgos psicológicos importantes, particularmente en personas con antecedentes de trastornos psicóticos o vulnerabilidad emocional. En el ámbito ético, se enfatiza la necesidad de establecer protocolos de consentimiento informado, acompañamiento profesional y seguimiento posterior, garantizando la protección de los participantes y el respeto a su integridad mental. En el contexto colombiano, el vacío normativo existente dificulta el desarrollo de investigaciones clínicas reguladas, lo que plantea el desafío de crear marcos legales y bioéticos claros que permitan explorar de forma responsable el potencial terapéutico de la psilocibina. En síntesis, aunque los riesgos son manejables bajo supervisión médica, las implicaciones éticas y regulatorias exigen un abordaje riguroso que priorice la seguridad y la evidencia científica.

Categorías para presentación de Resultados

1. Eficacia Terapéutica de la Psilocibina

La literatura revisada muestra de manera consistente que la psilocibina posee un efecto terapéutico significativo en diversos trastornos mentales, evidenciando mejoras sostenidas en el estado de ánimo, disminución de la ansiedad y reducción de síntomas depresivos incluso en

casos resistentes al tratamiento convencional. Varios estudios clínicos destacan que una o dos sesiones de psilocibina producen cambios rápidos y duraderos, superando en algunos casos la eficacia de fármacos tradicionales. Además, se reporta que estos beneficios se mantienen durante semanas o meses, indicando un potencial terapéutico relevante dentro de intervenciones psicológicas asistidas por sustancias psicodélicas.

2. Condiciones Clínicas Estudiadas

Las investigaciones analizadas abarcan diversos trastornos, siendo la depresión resistente al tratamiento la condición más explorada, seguida por la ansiedad asociada a enfermedades terminales, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por consumo de sustancias y, en menor medida, el TEPT. Cada una de estas condiciones muestra respuestas variables, pero en general los estudios coinciden en señalar mejorías clínicas significativas tras la intervención con psilocibina. Los ensayos en pacientes con cáncer reportan una reducción notable de la ansiedad existencial, mientras que en adicciones se observan disminuciones en el craving y mayor capacidad de regulación emocional. Aunque aún incipientes, los estudios relacionados con TEPT y TOC sugieren resultados prometedores.

3. Aspectos Neurobiológicos y Neuropsicológicos

Las fuentes revisadas indican que la psilocibina actúa principalmente mediante la activación de los receptores serotoninérgicos 5-HT_{2A}, lo que desencadena cambios neurofuncionales asociados con flexibilidad cognitiva y apertura emocional. Se ha documentado una disrupción temporal de las redes de conectividad cerebral, particularmente la Red por Defecto (DMN), lo que facilita estados de conciencia no ordinarios relacionados con procesos

introspectivos profundos. A nivel neuropsicológico, los estudios reportan aumentos en la capacidad de procesamiento emocional, reducción de patrones de pensamiento rígido y mayor insight, lo cual se vincula con las mejoras clínicas observadas.

4. Seguridad, Efectos Adversos y Riesgos

De las fuentes analizadas se concluye que la psilocibina presenta un perfil de seguridad favorable cuando es administrada en contextos clínicos controlados. Los efectos adversos más comunes incluyen náuseas, mareos, ansiedad transitoria y elevación leve de la presión arterial, los cuales tienden a ser de corta duración. La ocurrencia de eventos adversos graves es muy baja, siempre que se cumplan criterios estrictos de selección y se excluyan pacientes con antecedentes de psicosis o trastornos psiquiátricos severos no estabilizados. Sin embargo, varias publicaciones enfatizan la necesidad de mantener un entorno seguro y supervisión especializada para prevenir experiencias psicológicas desbordantes o mal integradas.

5. Implicaciones Éticas y Regulatorias

La revisión muestra que la psilocibina continúa siendo una sustancia altamente regulada, lo que limita la realización de ensayos clínicos y su implementación como tratamiento formal. Las fuentes destacan diversos desafíos éticos, como la gestión de estados de vulnerabilidad emocional durante la experiencia psicodélica y la responsabilidad de garantizar la integridad psicológica del paciente. También se identifica una brecha entre los hallazgos científicos y la normatividad vigente, pues la clasificación legal de la sustancia en muchos países dificulta su uso médico, a pesar de su evidencia terapéutica emergente.

6. Limitaciones de los Estudios

Los estudios incluidos presentan limitaciones metodológicas frecuentes, entre ellas muestras pequeñas, falta de grupos de control robustos, heterogeneidad en las dosis utilizadas y variabilidad en los protocolos psicoterapéuticos aplicados. La mayoría de los ensayos cuentan con seguimientos relativamente cortos, lo cual dificulta evaluar la sostenibilidad de los efectos a largo plazo. Asimismo, la ausencia de estandarización entre estudios reduce la comparabilidad de resultados y evidencia la necesidad de investigaciones más amplias y controladas.

7. Perspectivas Futuras y Potencial Clínico

Las fuentes revisadas coinciden en que la psilocibina tiene un gran potencial clínico y podría convertirse en una alternativa importante para trastornos que no responden adecuadamente a tratamientos convencionales. Se proyecta un crecimiento en los ensayos clínicos, especialmente en áreas como depresión resistente, adicciones y ansiedad existencial. Además, se plantea la necesidad de desarrollar modelos terapéuticos integrados, capacitación profesional especializada y marcos regulatorios que permitan un uso seguro y ético. En conjunto, la evidencia sugiere que la psilocibina representa una línea prometedora dentro de la psicoterapia asistida por psicodélicos.

8. Depresión Mayor

En un ensayo clínico controlado, Davis et al. (2021) demostraron que la psilocibina, administrada junto con psicoterapia de apoyo, generó efectos antidepresivos rápidos y sostenidos en pacientes con diagnóstico de depresión mayor. Los resultados indicaron reducciones clínicamente significativas en las puntuaciones de depresión hasta cuatro semanas posteriores a la intervención.

Por otro lado, Carhart-Harris et al. (2021) realizaron un ensayo comparando psilocibina con escitalopram (un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina). Aunque no se observaron diferencias significativas en la medida primaria de respuesta, varias medidas secundarias favorecieron a la psilocibina, sugiriendo su potencial en contextos clínicos estructurados.

9. Depresión Resistente al Tratamiento

Un estudio multicéntrico liderado por Goodwin et al. (2022) incluyó a pacientes con depresión resistente al tratamiento, quienes recibieron una única dosis de 25 mg de psilocibina en un entorno terapéutico controlado. Los resultados mostraron reducción significativa de síntomas a tres semanas, en comparación con un grupo control de 1 mg. Sin embargo, los autores subrayaron la importancia de la vigilancia clínica, dado que se registraron efectos adversos y episodios de ideación suicida en algunos participantes.

10. Ansiedad y Depresión en Pacientes con Cáncer

Los trastornos emocionales asociados a diagnósticos de cáncer avanzado representan un desafío clínico frecuente. Dos ensayos clínicos independientes (Griffiths et al., 2016; Ross et al., 2016) evidenciaron que la psilocibina, combinada con psicoterapia, produjo reducciones inmediatas y sostenidas en ansiedad y depresión, alcanzando respuestas duraderas en un 60–80 % de los participantes hasta 6.5 meses después de la intervención.

11. Trastorno por Consumo de Alcohol (AUD)

En un ensayo clínico aleatorizado, Bogenschutz et al. (2022) evaluaron la eficacia de la psilocibina en adultos con trastorno por consumo de alcohol. Los resultados mostraron que, en

combinación con psicoterapia, los pacientes tratados con psilocibina presentaron menos días de consumo intensivo durante un seguimiento de 32 semanas, en comparación con placebo activo más psicoterapia.

Discusión

El análisis realizado evidencia que la psilocibina está generando un cambio importante en la comprensión de los tratamientos para los trastornos mentales, al abrir nuevas perspectivas en la psicoterapia contemporánea. Los estudios revisados coinciden en que su acción no se limita a una respuesta neuroquímica, sino que involucra también dimensiones emocionales y existenciales que favorecen la resignificación de experiencias internas. Este enfoque integrador, que combina la intervención farmacológica con el acompañamiento psicológico, sugiere una forma más holística de abordar el sufrimiento psíquico. Sin embargo, los avances científicos se enfrentan a una barrera social y normativa, ya que persisten prejuicios y restricciones legales que dificultan la implementación de este tipo de terapias, especialmente en países de América Latina como Colombia.

Desde una perspectiva metodológica, la evidencia internacional ofrece resultados prometedores, pero aún insuficientes para establecer conclusiones definitivas. Muchos estudios presentan limitaciones relacionadas con el tamaño muestral, la homogeneidad de los participantes o la ausencia de seguimientos prolongados. Esto impide determinar con precisión la duración y estabilidad de los beneficios terapéuticos. Aun así, la consistencia de los hallazgos en diferentes contextos clínicos refuerza la hipótesis de que la psilocibina podría tener un papel relevante en la transformación de los tratamientos psicológicos del futuro.

En el ámbito ético, la literatura científica destaca la necesidad de desarrollar protocolos estrictos que garanticen la seguridad del paciente, la preparación emocional previa y el acompañamiento posterior a las sesiones. Se reconoce que la experiencia inducida por la psilocibina puede ser intensa y demandar contención terapéutica especializada. De igual forma, se subraya la importancia de un marco regulatorio que permita diferenciar el uso médico del consumo recreativo, evitando tanto la estigmatización como el uso irresponsable de la sustancia.

Para el contexto colombiano, los hallazgos de esta investigación sugieren la urgencia de promover una discusión académica y bioética que impulse el desarrollo de estudios locales. La falta de evidencia nacional limita la posibilidad de adaptar las prácticas internacionales a las realidades socioculturales del país. Además, la diversidad biológica de Colombia, que incluye especies naturales de hongos que contienen psilocibina, representa una oportunidad valiosa para la ciencia, siempre que se maneje con criterios éticos, legales y de salud pública. En suma, la evidencia disponible invita a continuar explorando el potencial terapéutico de la psilocibina con responsabilidad científica y sensibilidad humana, integrando la innovación con el compromiso ético propio de la práctica psicológica.

Conclusiones

El presente trabajo de grado permitió comprender que la psilocibina representa una alternativa terapéutica con un alto potencial para transformar el abordaje de los trastornos mentales. La evidencia científica revisada sugiere que, cuando se utiliza bajo supervisión clínica y acompañamiento psicoterapéutico, esta sustancia puede favorecer procesos de introspección profunda, reconexión emocional y reestructuración cognitiva, contribuyendo a aliviar el sufrimiento psicológico en personas con depresión, ansiedad o estrés postraumático. Más allá de

los resultados clínicos, la psilocibina invita a repensar el sentido de la terapia como un espacio de encuentro humano, donde el cambio no depende únicamente de un fármaco, sino del acompañamiento ético, empático y profesional que se brinde al paciente.

La evidencia científica contemporánea respalda el uso de la psilocibina en contextos terapéuticos estructurados para el tratamiento de la depresión, la ansiedad asociada a enfermedades terminales y el trastorno por consumo de alcohol. Aunque los resultados son prometedores, se requieren más estudios longitudinales y con muestras más amplias que permitan confirmar su seguridad y eficacia a largo plazo.

El renacimiento de la investigación con psicodélicos plantea la posibilidad de una transformación en la práctica clínica de la salud mental, ofreciendo alternativas innovadoras y potencialmente más efectivas para pacientes que no responden a los tratamientos convencionales.

El cuerpo de evidencia científica revisada muestra que la psilocibina, administrada en contextos clínicos controlados y acompañados de psicoterapia, constituye una alternativa terapéutica prometedora para diferentes trastornos mentales. Los hallazgos más consistentes se observan en el tratamiento de la depresión mayor y la depresión resistente, donde se ha demostrado una reducción significativa de los síntomas en comparación con los tratamientos convencionales (Carhart-Harris et al., 2021; Goodwin et al., 2022).

En el ámbito de la oncología, los ensayos clínicos han mostrado que una sola dosis de psilocibina puede generar disminuciones duraderas en la ansiedad y la depresión asociadas a diagnósticos de cáncer, mejorando de manera sustancial la calidad de vida y la percepción del sentido existencial en pacientes con enfermedades avanzadas (Griffiths et al., 2016; Ross et al.,

2016). Estos resultados ponen de manifiesto el potencial de la psilocibina para abordar no solo síntomas psiquiátricos, sino también dimensiones emocionales y espirituales del sufrimiento humano.

Por otro lado, los avances en el tratamiento del trastorno por consumo de alcohol sugieren que la psilocibina puede favorecer la reducción del consumo y potenciar la motivación hacia el cambio, cuando se combina con un acompañamiento psicoterapéutico estructurado (Bogenschutz et al., 2022). Este hallazgo abre la posibilidad de ampliar el espectro terapéutico hacia los trastornos por uso de sustancias, una de las problemáticas más complejas en la salud pública.

No obstante, los estudios disponibles se caracterizan aún por contar con tamaños muestrales reducidos y por concentrarse en poblaciones específicas, lo cual limita la generalización de los resultados. A pesar de ello, la magnitud y la duración de los efectos reportados constituyen una señal clara de la relevancia de continuar con investigaciones más amplias y multicéntricas (Davis et al., 2021).

En términos de seguridad, aunque los ensayos no han evidenciado riesgos fisiológicos graves, la psilocibina no está exenta de producir experiencias psicológicas intensas que requieren un manejo clínico especializado. Este aspecto subraya la necesidad de protocolos estrictos, de profesionales capacitados y de marcos éticos claros para garantizar un uso responsable.

Es así que la psilocibina no debe entenderse como un sustituto inmediato de los tratamientos existentes, sino como una herramienta innovadora con capacidad de transformar la práctica psicoterapéutica en el futuro cercano. Su integración a la clínica dependerá de la

consolidación de la evidencia, de la regulación legal y de la aceptación social. Con base en los resultados actuales, la psilocibina puede considerarse un campo fértil para el desarrollo de intervenciones que combinen la farmacología con el acompañamiento humano, orientadas hacia un abordaje integral de la salud mental.

Asimismo, la revisión permitió reconocer que persisten vacíos importantes en la investigación, especialmente en América Latina y en Colombia, donde la falta de regulación y de estudios clínicos limita la aplicación terapéutica de la psilocibina. Este panorama plantea el reto de promover la generación de conocimiento local, el desarrollo de marcos normativos claros y el fortalecimiento de una cultura científica que priorice la seguridad, la evidencia y la dignidad humana por encima del interés comercial o sensacionalista.

En el plano ético, este trabajo resalta la importancia de garantizar el bienestar integral de las personas que participan en tratamientos experimentales con psilocibina. El respeto por la autonomía, la confidencialidad y la preparación emocional del paciente son condiciones indispensables para que esta práctica mantenga su sentido humanista y terapéutico.

En conclusión, la psilocibina no solo emerge como una herramienta prometedora para la psicología y la psiquiatría contemporánea, sino también como una oportunidad para reconectar la ciencia con la sensibilidad humana. Su estudio responsable y ético puede abrir caminos hacia una atención en salud mental más compasiva, integradora y esperanzadora, donde el objetivo principal no sea solo tratar un síntoma, sino acompañar a las personas en el proceso de sanar, comprenderse y recuperar el sentido de su vida.

Recomendaciones

A partir de los hallazgos obtenidos en esta revisión, se recomienda fomentar la investigación científica sobre la psilocibina en el contexto colombiano, especialmente en su aplicación clínica para el tratamiento de los trastornos mentales. Es necesario que las instituciones académicas y de salud impulsen estudios controlados, éticamente aprobados y con rigor metodológico, que permitan evaluar su eficacia, seguridad y posibles beneficios a largo plazo. Estos esfuerzos contribuirían a generar evidencia local que complemente la abundante literatura internacional, fortaleciendo así el conocimiento científico y la toma de decisiones informadas en el ámbito de la salud mental.

De igual manera, resulta imprescindible establecer marcos legales y éticos claros que regulen la investigación y el uso terapéutico de la psilocibina en el país. La falta de normativas específicas genera incertidumbre y limita el avance de estudios responsables. Por ello, se sugiere que las autoridades competentes, en conjunto con comités de bioética y expertos en salud pública, definan lineamientos que garanticen la seguridad de los pacientes, el cumplimiento de los principios éticos de la práctica clínica y la transparencia en los procesos de investigación.

Asimismo, se recomienda promover la formación de profesionales de la salud mental en el uso responsable y terapéutico de sustancias psicodélicas. Incluir en los programas de psicología, psiquiatría y otras áreas afines, contenidos teóricos y prácticos sobre el acompañamiento terapéutico asistido por psilocibina permitiría preparar a los futuros profesionales para abordar de manera integral los procesos emocionales, cognitivos y espirituales que emergen durante este tipo de intervenciones. Esta preparación debe estar guiada por valores como la empatía, la contención y el respeto por la experiencia subjetiva del paciente.

En concordancia con lo anterior, es fundamental mantener una visión humanizada de la salud mental que no reduzca al ser humano a un conjunto de síntomas o diagnósticos. La psilocibina debe ser considerada como una herramienta complementaria dentro de un proceso terapéutico más amplio, en el cual el vínculo entre terapeuta y paciente sea el eje principal de la transformación psicológica. Reconocer la dimensión emocional y existencial del sufrimiento humano permitirá promover tratamientos más integrales, éticos y centrados en la persona.

Por otra parte, se recomienda impulsar la divulgación responsable y la educación pública en torno a la psilocibina y sus posibles usos terapéuticos. Las instituciones educativas, los medios de comunicación y las entidades de salud deben asumir un papel activo en la transmisión de información veraz y basada en evidencia, diferenciando claramente el uso clínico del recreativo. De esta manera se evitaría la desinformación, la banalización y los riesgos asociados al consumo no supervisado o fuera de contextos terapéuticos adecuados.

Finalmente, se propone fomentar la colaboración interdisciplinaria entre profesionales de diferentes campos como la psicología, la psiquiatría, la neurociencia, la bioética y el derecho. Solo a través de un trabajo articulado y éticamente fundamentado será posible avanzar hacia una comprensión integral del potencial terapéutico de la psilocibina, integrando el conocimiento científico con una perspectiva profundamente humana que priorice el bienestar, la seguridad y la dignidad de las personas.

Referencias Bibliográficas

- Carhart-Harris, R. L., Bolstridge, M., Day, C. M. J., Rucker, J., Watts, R., Erritzoe, D. E., Kaelen, M., Giribaldi, B., Bloomfield, M., Pilling, S., Rickard, J. A., Forbes, B., Feilding, A., Taylor, D., Curran, H. V., & Nutt, D. J. (2018). Psilocybin with psychological support for treatment-resistant depression: six-month follow-up. *Psychopharmacology*, 235(2), 399–408. <https://doi.org/10.1007/s00213-017-4771-x>.
- Davis, A. K., Barrett, F. S., May, D. G., Cosimano, M. P., Sepeda, N. D., Johnson, M. W., Finan, P. H., & Griffiths, R. R. (2021). Effects of psilocybin-assisted therapy on major depressive disorder: A randomized clinical trial: A randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry* (Chicago, Ill.), 78(5), 481–489.
- De, M. (s/f). Boletín de salud mental Depresión Subdirección de Enfermedades No Transmisibles. Gov.co. Recuperado el 9 de mayo de 2023, de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/boletind+epresion-marzo-2017.pdf>.
- Escohotado, A. (2002). Aprendiendo de las drogas, Usos y abusos, prejuicios y desafíos. Recuperado el 10 de mayo de 2023, de <https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecastelo/system/files/Antonio+Escohotado+-+Aprendiendo+de+las+drogas.pdf>.
- OPS. (2022). Salud en las américas 2022. Panorama de la Región de las Américas en el

contexto de la pandemia de COVID-19. Recuperado el 9 de mayo de 2023, de https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56471/OPASEIHHA220024_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y. Pérez Esparza, Rodrigo. (2017). Tratamiento farmacológico de la depresión: actualidades y futuras direcciones. Revista de la Facultad de Medicina (México), 60(5), 7-16. Recuperado en 09 de mayo de 2023, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422017000500007&lng=es&tlng=es.

Bimonte Gonzalo. (2022). Psicología transpersonal y psicodélicos: recorrido histórico sobre la influencia de las experiencias místicas en la disciplina psicológica [en línea]. Trabajo final de grado. Montevideo: Udelar.FP. https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/36278/1/psicologia_transpersonal_y_psicodelicos_tfg_gonzalo_bimonte.pdf.

Breitbart W. (2002). Spirituality and meaning in supportive care: spirituality- and meaning-centered group psychotherapy interventions in advanced cancer. Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 10(4), 272–280. <https://doi.org/10.1007/s005200100289>

Brown, S., Rittenbach, K., Cheung, S., McKean, G., MacMaster, F. P., & Clement, F. (2019). Current and common definitions of treatment-resistant depression: Findings from a systematic review and qualitative interviews. Canadian Journal of Psychiatry, 64(6), 380-387.

Carhart-Harris, R. L., Bolstridge, M., Rucker, J., Day, C. M., Erritzoe, D., Kaelen, M., Bloomfield, M., Rickard, J. A., Forbes, B., Feilding, A., Taylor, D., Pilling, S., Curran, V. H., & Nutt, D. J. (2016). Psilocybin with psychological support for treatment-resistant

- depression: an open-label feasibility study. *The lancet. Psychiatry*, 3(7), 619–627.
[https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30065-7](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30065-7) Carhart-Harris, R. L., Bolstridge, M., Day, C. M. J., Rucker, J., Watts, R., Erritzoe, D. E., Kaelen, M., Giribaldi, B., Bloomfield, M., Pilling, S., Rickard, J. A., Forbes, B., Feilding, A., Taylor, D., Curran, H. V., & Nutt, D. J. (2018). Psilocybin with psychological support for treatment-resistant depression: six-month follow-up. *Psychopharmacology*, 235(2), 399–408.
<https://doi.org/10.1007/s00213-017-4771-x>
- Carhart-Harris, R., Giribaldi, B., Watts, R., Baker-Jones, M., Murphy-Beiner, A., Murphy, R., ... & Nutt, D. J. (2021). Trial of psilocybin versus escitalopram for depression. *New England Journal of Medicine*, 384(15), 1402-1411.
- Cipriani, A., Furukawa, T. A., Salanti, G., Chaimani, A., Atkinson, L. Z., Ogawa, Y., ... Geddes, J. R. (2018). Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis. *The Lancet*, 391(10128), 1357-1366.
- Davis, A. K., Barrett, F. S., May, D. G., et al. (2021). Effects of Psilocybin-Assisted Therapy on Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Psychiatry*, 78(5), 481–489. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.3285>
- García, G. (2023, 6 de febrero). Australia aprueba el uso de la psilocibina y la MDMA para el tratamiento de enfermedades mentales. [Guiasdelpsiconauta.news](https://guiasdelpsiconauta.news).
<https://guiasdelpsiconauta.news/blog/2023/02/06/australia-aprueba-usar-mdma-psilocibina/>
- Gukasyan, N., Davis, A. K., Barrett, F. S., et al. (2022). Eficacia y seguridad del tratamiento

asistido con psilocibina para el trastorno depresivo mayor: seguimiento prospectivo de 12 meses. *Revista de Psicofarmacología*, 36(2), 151-158.

<https://doi.org/10.1177/02698811211073759>

Hesselgrave, N., Troppoli, T. A., Wulff, A. B., Cole, A. B., & Thompson, S. M. (2021).

Harnessing psilocybin: antidepressant-like behavioral and synaptic actions of psilocybin are independent of 5-HT_{2R} activation in mice. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 118(17), e2022489118.

<https://doi.org/10.1073/pnas.2022489118>

Nichols DE. Psilocybin: from ancient magic to modern medicine. *J Antibiot*. 2020;73(10):679-86.

<https://doi.org/10.1038/s41429-020-0311-8>

Faccini-Durán G. Apuntes sobre filogénesis del sistema nervioso y la conciencia. *Acta Neurol Colomb*. 2024;40(1). <https://doi.org/10.22379/anc.v40i1.823>

Xing L, Kalebic N, Namba T, Vaid S, Wimberger P, Huttner WB. Serotonin receptor 2A activation promotes evolutionarily relevant basal progenitor proliferation in the developing neocortex. *Neuron*. 2020;108(6):1113-29.e6. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.09.034>

Beliveau V, Ganz M, Feng L, Ozenne B, Højgaard L, Fisher PM, et al. A high-resolution in vivo atlas of the human brain's serotonin system. *J Neurosci*. 2017;37(1):120-8.

<https://doi.org/10.1523/jneurosci.2830-16.2016>

Casanova AF, Ort A, Smallridge JW, Preller KH, Seifritz E, Vollenweider FX. The influence of psilocybin on subconscious and conscious emotional learning. *iScience*.

2024;27(6):110034. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.110034>

- Szafron S, Gręblowski P, Grabowska K, Więckiewicz G. Unlocking the healing power of psilocybin: an overview of the role of psilocybin therapy in major depressive disorder, obsessive-compulsive disorder and substance use disorder. *Front Psychiatry*. 2024;15:1406888. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1406888>
- Goodwin GM, Aaronson ST, Alvarez O, Arden PC, Baker A, Bennett JC, et al. Single-dose psilocybin for a treatment-resistant episode of major depression. *N Engl J Med*. 2022;387(18):1637-48. <https://doi.org/10.1056/nejmoa2206443>
- Deco G, Sanz Perl Y, Johnson S, Bourke N, Carhart-Harris RL, Kringelbach ML. Different hierarchical reconfigurations in the brain by psilocybin and escitalopram for depression. *Nat Ment Health*. 2024;2(9):1096-110. <https://doi.org/10.1038/s44220-024-00298-y>
- Doss MK, Považan M, Rosenberg MD, Sepeda ND, Davis AK, Finan PH, et al. Psilocybin therapy increases cognitive and neural flexibility in patients with major depressive disorder. *Transl Psychiatry*. 2021;11(1):574. <https://doi.org/10.1038/s41398-021-01706-6>
- Griffiths RR, Johnson MW, Carducci MA, Umbricht A, Richards WA, Richards BD, et al. Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: a randomized double-blind trial. *J Psychopharmacol*. 2016;30(12):1181-97. <https://doi.org/10.1177/0269881116675513>
- Gukasyan N, Davis AK, Barrett FS, Cosimano MP, Sepeda ND, Johnson MW, et al. Efficacy and safety of psilocybin-assisted treatment for major depressive disorder: prospective 12-month follow-up. *J Psychopharmacol*. 2022;36(2):151-8. <https://doi.org/10.1177/02698811211073759>
16. Sloshower J, Zeifman RJ, Guss J, Krause R, Safi-Aghdam H, Pathania S, et al. Psychological flexibility as a mechanism of change in psilocybin-assisted therapy for major depression: results from an exploratory

placebo-controlled trial. Sci Rep. 2024;14(1):8833. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-58318-x>