

Tabla Formulación de la pregunta de investigación según la guía PICO con una variante (S) [1] ¿En pacientes con trastornos depresivos y/o ansiedad, el tratamiento con psilocibina, en comparación con placebo, o con tratamientos habituales, ofrece mejores resultados clínicos como alternativa terapéutica?				
	Elemento	INCLUSIÓN	EXCLUSIÓN	Términos de búsqueda (MEDLINE)
P	Población	Adultos de 18–65 años (edad laboral) con diagnóstico de trastorno depresivo (p. ej., trastorno depresivo mayor) y/o trastorno de ansiedad o ansiedad generalizada, como padecimiento primario. Que requieren mantener su rutina diaria y funcionalidad ocupacional sin necesidad de cuidados paliativos.	Depresión/ansiedad secundaria a enfermedad física grave, explícitamente la depresión reactiva o secundaria a patologías somáticas como cáncer, enfermedad de Parkinson, demencia u otras enfermedades graves con implicaciones conductuales como alcoholismo y trastornos alimenticios [2]	"depressi*"[Title/Abstract] "anxiety*"[Title/Abstract] "depression"[MeSH Terms] "anxiety"[MeSH Terms]
I	Intervención	Terapia con psilocibina como intervención principal, para trastorno depresivo y/o trastorno ansioso o ansiedad generalizada con o sin psicoterapia asistida. (dosis únicas, micro dosis o regímenes definidos) Administración oral	Se excluyen estudios de psilocibina en combinación con otros psicodélicos (ayahuasca, MDMA, LSD) o con metanfetamina, así como intervenciones centradas en trastornos de conducta como alcoholismo y trastornos alimenticios, sin resultados por separado de la terapia con psilocibina para depresión y o ansiedad Contexto recreativo	"psilocyb*"[Title/Abstract] "psilocybin"[MeSH Terms] "psilocybe"[MeSH Terms] (therapy[Subheading] OR treatment[Text Word] OR treatment outcome OR investigational therapies)[3]
C	Comparación	placebo, tratamiento habitual con antidepresivos, tratamiento activo (otros fármacos o psicoterapias), o estudios sin comparador	Comparaciones en encuestas, sin escalas validas.	psilocybin"[MeSH Terms] "psilocybe"[MeSH Terms] "depression"[MeSH Terms] "anxiety"[MeSH Terms]
O	Outcome	Cambios en severidad de depresión y ansiedad (escalas validadas), respuesta/remisión, funcionamiento, calidad de vida, y eventos adversos aplicando terapia de psilocibina en donde se observan cambios medibles en síntomas medidos con escalas estándares	Resultados centrados solo en metodologías analíticas (farmacocinética, detección, etc.) o que solo reporten resultados biológicos o de neuroimagen sin datos clínicos depresivos/ansiosos. Así como centrados en otras patologías Estudios que no midan ni reporten resultados de depresión/ansiedad ni eventos adversos relevantes.	psilocybin"[MeSH Terms] "psilocybe"[MeSH Terms] "depression"[MeSH Terms] "anxiety"[MeSH Terms]
S	Diseño de estudio	ensayos clínicos controlados o aleatorizados de fase 2, 3 y 4 de 2022 a 2026 Medidas validadas de severidad de depresión (p. ej., MADRS, HAM-D, PHQ-9, BDI) y/o ansiedad (p. ej., HAM-A, GAD-7, STAI, BAI). Preprints de ensayos en proceso	Revisiones sistemáticas Metanálisis Ensayos clínicos de fase 1 (pacientes sanos) Ensayos en animales Ensayos con seguimiento a corto plazo, Informes sin acceso	NOT ("systematic review"[Publication Type], "meta analysis"[Publication Type], "clinical trial, phase i"[Publication Type]) LÍMITES: Free full text, Humans, from 2022 - 2026

- [1] Salut B. BiblioguiesUV: Revisiones sistemáticas en Ciencias de la Salud: Pregunta de investigación: modelo PICO, https://uv-es.libguides.com/revisiones_sistematicas_Salud/pregunta_inves/PICO (accessed 28 April 2026).
- [2] Galora Mullo LE, Freire Montesdeoca JM. Uso de Psilocibina como tratamiento en pacientes diagnosticados con trastornos depresivos. *Ciencia y Educación* 2025; 6: 110–123.
- [3] Guitián CG. Buscar en MEDLINE con PubMed.