

2025 ACLS Update Course 重點

心跳停止後照護 (Post-Cardiac Arrest Care)

- 氧氣與通氣管理：血氧目標值微調為 90% – 98%
- 血壓目標：統一維持最低 MAP 至少 65 mmHg
- 心導管：對於無 ST 段上升穩定的患者，不建議例行急做緊急心導管
- 溫度控制：從目標體溫管理 (TTM)重新定義為溫度控制 (Temperature Control)，強調預防發燒。溫度目標區間擴大為 32 – 37.5°C。持續時間至少 36 小時，回溫速率應控制在每小時 0.5°C 以下。
- 癲癇處置：由腦電圖診斷出的非抽搐性癲癇發作，也可考慮進行治療
- 神經學預後評估：維持多重模式並提出多項良好/不良預後判斷指標

特殊情況下導致的心跳停止 (Cardiac Arrest due to Special Circumstances)

- 環境性低體溫：若核心體溫 <30°C，應電擊 1 次後暫停，且延後給予強心針 (Epinephrine)，直到體溫 ≥30°C
- 妊娠相關心跳停止：從瀕死剖腹產術語變更為復甦性分娩 (Resuscitative Delivery)，並在一開始就主動積極進行
- 鴉片類藥物過量：觀察，重複給藥並於出院時發放
- 心室輔助裝置 (Ventricular Assist Devices)：新增評估循環緊急處置流程
- ECLS：對於病因可能可逆的成人與兒童心跳停止患者，可使用 ECLS 裝置進行支持
- 其他：靜脈鈣劑、碳酸氫鈉及胰島素/葡萄糖對於高血鉀引發之心跳停止之療效果臨床證據不足，避免因給藥延誤 CPR