

Задача 1104

Найти общее решение дифференциального уравнения:

$$(1-x)y'' - 2y' + y = 0$$

Решение. Решим задачу методом рядов.

1) Предположим, что решение имеет вид:

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} y_k x^k$$

2) Тогда:

$$y' = \sum_{k=0}^{\infty} y_k k x^{k-1}$$

$$y'' = \sum_{k=0}^{\infty} y_k k(k-1) x^{k-2}$$

3) Подставляем в исходное уравнение:

$$\sum_{k=0}^{\infty} y_k k(k-1) x^{k-2} - y_k k(k-1) x^{k-1} - 2y_k k x^{k-1} + y_k x^k = 0$$

4) Приравнявая коэффициенты при x^k :

$$y_k - k(k+1)y_{k+1} - 2(k+1)y_{k+1} + y_{k+2}(k+1)(k+2) = 0$$

5) Рекуррентное соотношение:

$$y_{k+2} = \frac{y_{k+1}(k+1)(k+2) - y_k}{(k+1)(k+2)}$$

6) Два линейно независимых решения:

Первое решение ($y_0 = 1, y_1 = 0$):

$$y_1 = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{11}{24}x^3 + \dots$$

Второе решение ($y_0 = 0, y_1 = 1$):

$$y_2 = x + \frac{5}{6}x^2 + \frac{3}{4}x^3 + \dots$$

Таким образом, общее решение:

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

где c_1 и c_2 — произвольные константы.

Задача 1106

Найти общее решение дифференциального уравнения:

$$y'' - xy' + xy = 0$$

Решение. 1) Предположим решение в виде степенного ряда:

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} y_k x^k$$

2) Производные:

$$y' = \sum_{k=0}^{\infty} y_k k x^{k-1}$$

$$y'' = \sum_{k=0}^{\infty} y_k k(k-1) x^{k-2}$$

3) Подставляем и приравниваем коэффициенты:

$$y_{k+3} = \frac{y_{k+1}(k+1) - y_k}{(k+3)(k+2)}$$

4) Три линейно независимых решения:

Первое решение ($y_0 = 1, y_1 = 0, y_2 = 0$):

$$y_1 = 1 - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{40}x^5 + \dots$$

Второе решение ($y_0 = 0, y_1 = 1, y_2 = 0$):

$$y_2 = x + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{40}x^5 + \dots$$

Третье решение ($y_0 = 0, y_1 = 0, y_2 = 1$):

$$y_3 = x^2 + \frac{1}{6}x^4 - \frac{1}{40}x^5 + \dots$$

Таким образом, общее решение:

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + c_3 y_3$$

где c_1, c_2 и c_3 — произвольные константы.

Задача 1110

Найти общее решение дифференциального уравнения:

$$xy'' + 2y' + xy = 0$$

Решение. 1) При $x_0 = 0 : p_0(0) = 0 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} y_k x^{k+\alpha}$

2) Преобразуем:

$$\sum_{k=0}^{\infty} y_k (k + \alpha)(k + \alpha - 1) x^{k+\alpha-2+1} + 2 \sum_{k=0}^{\infty} y_k (k + \alpha) x^{k+\alpha-1} + \sum_{k=0}^{\infty} y_k x^{k+\alpha+1} = 0$$

3) min степень x : $k + \alpha - 1, k = 0 \Rightarrow \alpha - 1 \Rightarrow$

при $k = 0$: $y_0 \alpha(\alpha - 1) x^{\alpha-1} + 2y_0 \alpha x^{\alpha-1} + y_0 x^{\alpha+1}$

$y_0(\alpha(\alpha - 1) + 2\alpha)$, где $(\alpha(\alpha - 1) + 2\alpha) = 0$, при $x^{\alpha-1}$ (минимальная степень x)

$\alpha(\alpha + 1) = 0 \Rightarrow \alpha = 0; -1$, но берем -1 , т.к. $\alpha = 0$ делает ряд обычным.

4) Получаем ряд:

$$\sum_{k=0}^{\infty} y_k (k - 1)(k - 2) x^{k-2} + 2 \sum_{k=0}^{\infty} y_k (k - 1) x^{k-2} + \sum_{k=0}^{\infty} y_k x^k = 0$$

5) При x^p :

$$y_{p+2}(p + 1) + 2y_{p+2}(p + 1) + y_p = 0$$

$$y_{p+2}(p + 1)(p + 2) + y_p = 0$$

$$y_{p+2} = -\frac{y_p}{(p + 1)(p + 2)}$$

1) 2)

6) Построим матрицу: $y_0 = \begin{matrix} 1 & 0 \end{matrix}$

$$y_1 = \begin{matrix} 0 & 1 \end{matrix}$$

$$1) y_2 = -\frac{1}{2} = -\frac{1}{2!}, y_3 = 0, y_4 = -\frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{1}{24} = \frac{1}{4!}, \dots \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y_1 = \frac{1}{x} - \frac{x}{2!} + \frac{x^3}{4!} - \frac{x^5}{6!} + \dots$$

$$2) y_2 = 0, y_3 = -\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} = -\frac{1}{3!}, y_4 = 0, \dots \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y_2 = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots$$

7) Общее решение будет выглядеть так: $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$

Задача 1109

Найти общее решение дифференциального уравнения:

$$y''' - xy'' + (x - 2)y' + y = 0$$

Решение. 1) При $x_0 = 0$, $p_0(0) \neq 0 \Rightarrow y = \sum_{k=0}^{\infty} y_k x^k$.

2) Преобразуем:

$$\sum_{k=0}^{\infty} k(k-1)(k-2)y_k x^{k-3} - \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1)y_k x^{k-2+1} + \sum_{k=0}^{\infty} k y_k x^{k-1+1} - 2 \sum_{k=0}^{\infty} k y_k x^{k-1} + \sum_{k=0}^{\infty} y_k x^k = 0$$

При x^p :

$$(p+3)(p+2)(p+1)y_{p+3} - (p+1)py_{p+1} + py_p - 2(p+1)y_p + y_p = 0$$

Сократим $(p+1)$:

$$(p+3)(p+2)y_{p+3} - (p+2)y_{p+1} + y_p = 0$$

3) Выразим y :

$$y_{p+3} = \frac{y_{p+1}}{p+3} - \frac{y_p}{(p+3)(p+2)}$$

4) Построим единичную матрицу:

$$\begin{array}{rcccl} & & & 1) & 2) & 3) \\ y_0 = & & 1 & 0 & 0 \\ y_1 = & & 0 & 1 & 0 \\ y_2 = & & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$$1) y_3 = 0 - \frac{1}{6} = -\frac{1}{6}, y_4 = 0, y_1 = 1 - \frac{x^3}{6} + 0 + \dots$$

$$2) y_3 = \frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}, y_4 = -\frac{1}{12}, y_2 = x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{12} + \dots$$

$$3) y_3 = 0, y_4 = \frac{1}{4}, y_3 = x^2 + \frac{x^4}{4} + \dots$$

5) Таким образом общее решение:

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + c_3 y_3$$

где c_1 , c_2 и c_3 - произвольные константы.

Задача 1114

Найти общее решение дифференциального уравнения:

$$x^2 y'' + 2xy' - (x^2 + 2x + 2)y = 0.$$

Решение. 1) При $x_0 = 0, p_0(0) = 0 \Rightarrow$ Общий случай $y = \sum_{k=0}^{+\infty} y_k x^{k+\alpha}$

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+\alpha)(k+\alpha-1)x^{k+\alpha-2+2}y_k + 2 \sum_{k=0}^{\infty} (x+\alpha)x^{k+\alpha-1+1}y_k - \sum_{k=0}^{\infty} x^{k+\alpha+2}y_k - 2 \sum_{k=0}^{\infty} x^{k+\alpha+1}y_k - 2 \sum_{k=0}^{\infty} x^{k+\alpha}y_k,$$

min степень икса: $k + \alpha, k_{min} = 0 \Rightarrow \alpha$

2) По x^α :

$$y_0(\alpha(\alpha-1) + 2\alpha - 2)$$

$$\alpha(\alpha-1) + 2\alpha - 2 = 0$$

$$\alpha^2 + \alpha - 2 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = -2, \alpha_2 = 1.$$

3) Рассмотрим $\alpha = 1$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)ky_k x^{k+1} + 2 \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)y_k x^{k+1} - \sum_{k=0}^{\infty} y_k x^{k+3} - 2 \sum_{k=0}^{\infty} y_k x^{k+2} - 2 \sum_{k=0}^{\infty} y_k x^{k+1}$$

По x^p :

$$p(p-1)y_{p-1} + 2py_{p-1} - y_{p-3} - 2y_{p-2} = 0$$

$$(p^2 + p - 2)y_{p-1} = y_{p-3} + 2y_{p-2}$$

$$y_{p-1} = \frac{y_{p-3} + 2y_{p-2}}{p^2 + p - 2}$$

1. 2.

4) Построим матрицу: $y_0 = \begin{matrix} 1 & 0 \end{matrix}$

$$y_1 = \begin{matrix} 0 & 1 \end{matrix}$$

$$1. \ p = 2, y_1 = \frac{0 + 2 * 1}{1 + 2 * 0} = \frac{1}{2}$$

$$p = 3, y_2 = \frac{1 + 2 * 0}{10} = \frac{1}{10}$$

$$p = 4, y_3 = \frac{1}{2}$$

$$2. \ p = 2, y_1 = 0$$

$$p = 3, y_2 = \frac{2}{10}$$

$$p = 4, y_3 = \frac{0 + \frac{4}{10}}{18} = \frac{1}{45}$$

5) $y_1 =$

Задача 900

С помощью теоремы Ляпунова об устойчивости по первому приближению исследовать на устойчивость нулевое решение

$$\begin{cases} \dot{x} = x^2 + y^2 - 2x \\ \dot{y} = 3x^2 - x + 3y. \end{cases}$$

Решение.

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -2 - \lambda & 0 \\ -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$-(2 + \lambda)(3 - \lambda) = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -2, 3 \Rightarrow \lambda_{1,2} = -2, 3 \Rightarrow \text{решение не устойчиво}$$

Задача 902

С помощью теоремы Ляпунова об устойчивости по первому приближению исследовать на устойчивость нулевое решение

$$\begin{cases} \dot{x} = \ln(4y + e^{-3x}) \\ \dot{y} = 2y - 1 + \sqrt[3]{1 - 6x} \end{cases}$$

Решение. Матрица первого приближения:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \frac{\delta f_1}{\delta x} & \frac{\delta f_1}{\delta y} \\ \frac{\delta f_2}{\delta x} & \frac{\delta f_2}{\delta y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{std} :: \text{this_hread} :: \text{get_id}() - \frac{3}{4ye^{3x} + 1} & \frac{4e^{3x}}{4ye^{3x} + 1} \\ -\frac{2}{\sqrt[3]{(1 - 6x)^2}} & 2 \end{pmatrix}$$

$$A_{(0,0)} = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|A_{(0,0)} - \lambda E| = \begin{vmatrix} -3 - \lambda & 4 \\ -2 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = -(3 + \lambda)(2 - \lambda) + 8 = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda + 2 = 0$$

$$D = 1 - 4 \cdot 2 = -7$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{7} \cdot i}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{7}i}{2} \Rightarrow$$

\Rightarrow решение устойчиво.

Задача 916

Найти все положения равновесия и исследовать их на устойчивость.

$$\begin{cases} \dot{x} = (x-1)(y-1) \\ \dot{y} = xy - 2 \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{cases} (x-1)(y-1) = 0 \\ xy = 2 \end{cases}$$

$$1) (x, y) = (1, 2)$$

$$2) (x, y) = (2, 1)$$

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} y-1 & x-1 \\ y & x \end{pmatrix}$$

1)

$$\tilde{A}_{(1,2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|\tilde{A} - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1-\lambda)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = 1 > 0 \Rightarrow$$

\Rightarrow не устойчива.

2)

$$\tilde{A}_{(2,1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|\tilde{A} - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda - 1 = 0$$

$$D = 4 + 4 = 8$$

$$\lambda_{1,2} = 1 \pm \sqrt{2}$$

$$\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0 \Rightarrow$$

\Rightarrow не устойчива.

Задача 918

Найти все положения равновесия и исследовать их на устойчивость.

$$\begin{cases} \dot{x} = \ln(-x + y^2) \\ \dot{y} = x - y - 1 \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{cases} y^2 - x = 1 \\ y = x - 1 \end{cases} = \begin{cases} x = y^2 - 1 \\ y^2 - 1 - y - 1 = 0 \end{cases}$$

$$D = (-1)^2 - 4 \cdot (-2) = 9$$

$$1)(x, y) = (3, 2)$$

$$2)(x, y) = (0, -1)$$

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{y^2 - x} & \frac{2y}{y^2 - x} \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

1)

$$\tilde{A}_{(3,2)} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$|\tilde{A} - \lambda E| = \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 4 \\ 1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0$$

$$D = 4 - 4 \cdot 3 = 16$$

$$\lambda_{1,2} = -1 \pm 2 \Rightarrow$$

\Rightarrow не устойчиво.

2)

$$\tilde{A}_{(0,-1)} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$|\tilde{A} - \lambda E| = \begin{vmatrix} -1 - \lambda & -2 \\ 1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 3 = 0$$

$$D = 4 - 4 \cdot 3 = -8$$

$$\lambda_{1,2} = -1 \pm i\sqrt{2} \Rightarrow$$

\Rightarrow устойчиво.

Номер 962

Исследовать особые точки. Дать чертеж расположения интегральных кривых на плоскости (x, y) .

$$y' = \frac{x - 4y}{2y - 3x}$$

Решение.

$$\begin{cases} \dot{x} = -3x + 2y \\ \dot{y} = x - 4y \end{cases}$$

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -3 - \lambda & 2 \\ 1 & -4 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 + 7\lambda + 10 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -2, -5 \Rightarrow$$

\Rightarrow узел (устойчивый).

Номер 973

Исследовать особые точки. Дать чертеж расположения интегральных кривых на плоскости (x, y) .

$$\begin{cases} x' = x + 3y \\ y' = -6x - 5y \end{cases}$$

Решение.

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 3 \\ -6 & -5 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda^2 + 4\lambda + 13 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -\frac{2 \pm 3 \cdot i}{1} \Rightarrow$$

\Rightarrow фокус.

Задача 976


Исследовать особые точки. Дать чертеж расположения интегральных кривых на плоскости (x, y) .

$$\begin{cases} x' = 3x + y \\ y' = y - x \end{cases}$$

Решение.

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)(1 - \lambda) + 1 = 3 - 3\lambda - 1\lambda + \lambda^2 + 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2 = 0$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2$$



Задача 980

Найти и исследовать особые точки.

$$y' = 2x + yx - 2y - 5$$

Решение.

$$\begin{cases} 2x + y = 0 \\ x - 2y - 5 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 1, y = -2$$

Запишем матрицу 1-го приближения:


$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|\tilde{A} - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -2 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 + 4 = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda_{1,2} = 1 \pm 2 \cdot i \Rightarrow$$

\Rightarrow фокус.



Номер 1145

$$\begin{cases} 2zy' = y^2 - z^2 + 1 \\ z' = z + y \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{cases} 2z(z' - z)' = (z' - z)^2 - z^2 + 1 \\ y = z' - z \end{cases}$$

$$2zz'' - 2zz' = (z')^2 - 2z'z + z^2 - z^2 + 1$$

$$2zz'' - (z')^2 - 1 = 0 - \text{понижить порядок.}$$

Нет явно заданного аргумента \Rightarrow замена $z' = p(z); z'' = p'_z \cdot p$

$$2z \cdot p'p - p^2 - 1 = 0$$

$$2z \cdot \frac{dp}{dz} \cdot p = p^2 + 1 = 0 \mid \cdot \frac{dz}{(p^2 + 1) \cdot 2z}$$

$$\int \frac{p}{p^2 + 1} dp = \int \frac{dz}{2z} = 0$$

Пусть $t = p^2 + 1, t' = 2p$. Тогда: $dp = \frac{1}{t'} dt \Rightarrow dp = \frac{1}{2p} dt$.

$$\int \frac{p}{p^2 + 1} dp = \int \frac{p}{2p \cdot t} dt = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \ln |t|$$

$$\frac{1}{2} \ln |p^2 + 1| = \frac{1}{2} \ln |z| - C$$

$$e^{\ln |p^2 + 1|} = e^{\ln |z| - C}$$

$$p^2 + 1 = \frac{z}{C_1}$$

$$p = \pm \sqrt{\frac{z}{C_1} - 1}$$

$$\frac{dz}{dx} = \pm \sqrt{\frac{z}{C_1} - 1}$$

$$\pm \int \frac{dz}{\sqrt{\frac{z}{C_1} - 1}} = \int dx$$

$$\pm 2\sqrt{C_1 z - C_1^2} + C_2 = x + C_3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow z = C_1 + \frac{1}{4C_1}(x + C_2)^2 \Rightarrow$$

Ответ: $y = z' - z = \frac{1}{C_2}(x + C_2) - \frac{1}{4C_1}(x + C_2)^2 - C_1$

Номер 1153

$$\frac{dx}{z^2 - y^2} = \frac{dy}{z} = \frac{dz}{-y}$$

Решение.

$$\frac{dx}{z^2 - y^2} = \frac{dy}{z} = \frac{dz}{-y} = \frac{zdy + ydz}{z^2 - y^2}$$

$$\frac{dx}{z^2 - y^2} = \frac{zdy + ydz}{z^2 - y^2}$$

$$\int dx = \int d(zy)$$

$$x = zy + C_1$$

$$C_1 = x - zy$$

$$\frac{dy}{z} = -\frac{dz}{y} \Rightarrow \int ydz \Rightarrow y^2 + z^2 = C_2$$

Ответ: $C_1 = x - zy, C_2 = y^2 + z^2$

Номер 1163

$$\frac{dx}{y} = -\frac{dy}{x} = \frac{dz}{u} = -\frac{du}{z}$$

Решение. Пусть $\phi = yz - ux$. Тогда:

$$\frac{\delta\phi}{\delta y} = z; \frac{\delta\phi}{\delta z} = y; \frac{\delta\phi}{\delta u} = -x; \frac{\delta\phi}{\delta x} = -u$$

Проверить, чтобы $\frac{\delta\phi}{\delta x} \cdot F_x + \frac{\delta\phi}{\delta y} \cdot F_y + \frac{\delta\phi}{\delta z} \cdot F_z + \frac{\delta\phi}{\delta u} \cdot F_u = 0$

$$\frac{dx}{y} = -\frac{dy}{x} \Rightarrow F_x = y; F_y = -x$$

$$\frac{dz}{u} = -\frac{du}{z} \Rightarrow F_u = -z; F_z = u$$

Имеем: $-u \cdot y + z \cdot (-x) + y \cdot u + (-x) \cdot (-z) = 0$

$0 = 0 \Rightarrow \phi$ - первый \int -л системы

Номер 1180

$$(z - y)^2 \frac{\delta z}{\delta x} + xz \cdot \frac{\delta z}{\delta y} = xy$$

Решение.

$$\frac{dx}{(z - y)^2} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{xy}$$

•

$$\frac{dy}{xz} = \frac{dz}{xy}; \quad \frac{dy}{z} = \frac{dz}{y}; \quad \int y dy = \int z dz$$

$$y^2 - z^2 = C_1$$

•

$$\frac{dy - dz}{x(z - y)} = \frac{dx}{(z - y)^2}; \quad \frac{dy - dz}{x} = \frac{dx}{z - y}$$

$$(z - y) \cdot d(z - y) + x dx = 0$$

$$d((z - y)^2 + x^2) = 0 \quad \Rightarrow \quad (z - y)^2 + x^2 = C_2$$

$$F(y^2 - z^2, x^2 + (z - y)^2) = 0$$

Номер 1182

$$y \frac{\delta z}{\delta x} + z \frac{\delta z}{\delta y} = \frac{y}{x}$$

Решение.

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{z} = x \frac{dz}{y}$$

•

$$\frac{dx}{y} = \frac{x dz}{y}; \quad \int \frac{dx}{x} = \int dz \quad \Rightarrow \quad \ln |x| = z + C_1$$

•

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{z}, \quad z = \ln |x| - C_1$$

$$dx \cdot (\ln |x| - C_1) = y dy$$

$$\int \ln |x| dx - \int C_1 dx = \int y dy$$

$$\int \ln |x| \cdot 1 dx = \ln x \cdot x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = \ln x \cdot x - x$$

•

$$x \cdot \ln |x| - x - x C_1 = \frac{1}{2} y^2 + C_2$$

$$-x + xz - \frac{1}{2} y^2 = C_2$$

$$-2x + 2xz - y^2 = C_2$$

$$F(\ln |x| - z, 2x(z - 1) - y^2) = 0$$

Номер 1198

$$\begin{cases} x \cdot \frac{\delta z}{\delta x} - y \cdot \frac{\delta z}{\delta y} = z^2 \cdot (x - 3y) \\ x = 1 \\ yz + 1 = 0 \end{cases}$$

Решение.

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{-y} = \frac{dz}{z^2(x - 3y)}$$

•

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{dy}{-y}; \quad e^{\ln|x| + \ln|y|} = e^{\ln C_1}$$

$$xy = C_1$$

•

$$\frac{dy}{-y} = \frac{dz}{z^2(x - 3y)}; \quad (x - 3y) \cdot \frac{dy}{-y} = \frac{dz}{z^2}$$

$$\int \left(-\frac{C_1}{y^2} + 3\right) \cdot dy = \int \frac{dz}{z^2}$$

$$\frac{C_1}{y} + 3y = -\frac{1}{z} + C_2$$

•

$$\begin{cases} C_1 = yx \Rightarrow y \\ C_2 = 1 + 2C_1 \\ x = 1 \\ y = -\frac{1}{z} \end{cases}$$

Получается, что $C_1 = xy$ и $C_2 = 1 + 2C_1 = x + 3y + \frac{1}{z} = 1 + 2xy$.

Ответ: $2xy + 1 = x + 3y + \frac{1}{z}$

Номер 1181

$$xy \frac{\delta z}{\delta x} + (x - 2z) \cdot \frac{\delta z}{\delta y} = yz$$

Решение.

$$\frac{dx}{xy} = \frac{dy}{x - 2z} = \frac{dz}{yz}$$

•

$$\frac{dx}{xy} = \frac{dz}{yz}; \quad \int \frac{dx}{x} = \int \frac{dz}{z};$$

$$\ln |z| - \ln |x| = C_1 \quad \Rightarrow \quad \frac{z}{x} = C_1$$

•

$$\frac{dx - 2dz}{y(x - 2z)} = \frac{dy}{x - 2z}; \quad \int dx - \int 2dz = \int y dy$$

$$x - 2z - \frac{y^2}{2} = C_2$$

$$2x - 4z - y^2 = C_2$$

Ответ: $F\left(\frac{z}{x}, 2x - 4z - y^2\right) = 0$

Номер 1183

$$\sin^2 x \cdot \frac{\delta z}{\delta x} + \operatorname{tg} z \cdot \frac{\delta z}{\delta y} = \cos^2 x$$

Решение.

$$\frac{dx}{\sin^2 x} = \frac{dy}{\cos^2 z} = \frac{dz}{\cos^2 z}$$

•

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = \frac{dz}{\cos^2 z}$$

$$-\operatorname{ctg} x = \operatorname{tg} z + C_1$$

$$C_1 = \operatorname{tg} z + \operatorname{ctg} x$$

•

$$\frac{dy}{\operatorname{tg} z} = \frac{dz}{\cos^2 z}; \quad \int \frac{\operatorname{tg} z}{\cos^2 z} dz$$

$$\int \frac{\operatorname{tg} z}{\cos^2 z} dz = \int \frac{\sin z}{\cos^3 z} dz = \int \frac{1}{\cos^3 z} d(\cos z) = \frac{1}{2 \cdot \cos^2 z} + C_2$$

$$y = \frac{1}{2 \cdot \cos^2 z} + C_2$$

Ответ: $F(\operatorname{tg} z + \operatorname{ctg} x, \quad y - \frac{1}{2 \cdot \cos^2 z})$

Номер 1201

$$z \cdot \frac{\delta z}{\delta x} - xy \cdot \frac{\delta z}{\delta y} = 2xz; \quad x + y = 2; \quad yz = 1$$

Решение.

$$\frac{dx}{z} = \frac{dy}{-xy} = \frac{dz}{2xz}$$

•

$$\frac{dy}{-xy} = \frac{dz}{2xz} \quad \Rightarrow \quad -2 \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dz}{z};$$

$$e^{\ln|z| + \ln|y|^2} = e^{C_1}$$

$$y^2 z = C_1$$

•

$$\frac{dx}{z} = \frac{dz}{2xz} \quad \Rightarrow \quad \int 2x dx = \int \frac{dz}{z}; \quad x^2 + C_2 = z$$

С учетом заданных доп. условий:

$$\begin{cases} C_1 = y^2 z = yz \cdot y = y \\ C_2 = x^2 - z = (2 - y)^2 - z = (2 - C_1)^2 - z \\ x + y = 2 \quad \Rightarrow \quad x = 2 - y \\ yz = 1 \end{cases}$$

Ответ: $(2 - y^2 z)^2 = x^2$

Номер 772

Рассмотрим дифференциальное уравнение:

$$y'' = f(x) \quad (1)$$

с граничными условиями:

$$y(0) = 0, \quad y(x) \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow +\infty. \quad (2)$$

Решение. • Общее решение уравнения:

$$y'' = 0 \Rightarrow y(x) = Ax + B. \quad (3)$$

- Для области $0 \leq x \leq s$:

$$G(x, s) = Ax + B. \quad (4)$$

Условие $G(s, s) = 0$ даёт $B = 0$, следовательно:

$$G(x, s) = Ax. \quad (5)$$

- Для области $x > s$:

$$G(x, s) = Cx + D. \quad (6)$$

Так как $G(x, s) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow +\infty$, необходимо $C = 0$, откуда:

$$G(x, s) = D. \quad (7)$$

- Условие разрыва первой производной:

$$G'(s+0, s) - G'(s-0, s) = 1. \quad (8)$$

Подставляя $G'(x, s)$:

$$0 - A = 1 \Rightarrow A = -1. \quad (9)$$

Так как $As = D$, получаем $D = -s$.

Таким образом, функция Грина:

$$G(x, s) = \begin{cases} -x, & 0 \leq x \leq s, \\ -s, & x \geq s. \end{cases} \quad (10)$$

Номер 765

Решение.

$$y'' + y = f(x) \quad y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

$$G(x, s) = A(s) \cos x + B(s) \sin x, \text{ где } 0 \leq x \leq s$$

$$G'(0, s) = 0$$

$$A(s) \sin(0) + B(s) \cos(0) = 0 \Rightarrow B(s) = 0$$

$$G(x, s) = A(s) \cos(x)$$

при $s \leq x \leq \pi$.

$$G(x, s) = C(s) \cos(x) + D(s) \sin(x)$$

$$G(\pi, s) = 0 : \quad C(s) \cos(\pi) + D(s) \sin(\pi) = 0$$

$$C(s) = 0$$

$$G(x, s) = D(s) \sin(x)$$

$$A(s) \cos(x) = D(s) \sin(x)$$

$$G'(s+0, s) - G'(s-0, s) = 1$$

•

$$D(s) \cos(s) = -A(s) \sin(s) = 1$$

$$D(s) \cos(s) + A(s) \sin(s) = 1$$

•

$$\begin{cases} A(s) \cos(s) - D(s) \sin(s) = 1 \\ D(s) \cos(s) + A(s) \sin(s) = 1 \end{cases}$$

Преобразуем:

$$A(s) \cos(s) + D(s) \cos^2(s) + A(s) \sin^2(s) = \cos(s)$$

$$A(s)(\sin^2(s) + \cos^2(s)) = \cos(s)$$

$$A(s) = \cos(s)$$

•

$$A(s) \cos(s) = D(s) \sin(s) \Rightarrow A(s) = \sin(s)$$

$$D(s) = \cos(s)$$

Ответ:

$$G(x, s) = \begin{cases} \sin(s) \cos(x), & 0 \leq x \leq s, \\ \cos(s) \sin(x), & s < x \leq \pi. \end{cases}$$

Номер 770

$$xy'' - y' = 0$$

$$y'(1) = 0, \quad y(2) = 0$$

Решение. Обозначим $z = y'$, тогда уравнение принимает вид:

$$xz' - z = 0$$

Решаем уравнение:

$$xz' = z$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{dx}{x}$$

$$\ln |z| = \ln |x| + C$$

$$z = Cx$$

$$y' = Cx$$

$$y = \frac{Cx^2}{2} + C_1$$

Рассмотрим области $1 \leq x \leq s$:

$$G(x, s) = A(s) \frac{x^2}{2} + B(s)$$

$$G'(x, s) = A(s)x$$

Так как $G'(1, s) = 0$, то:

$$A(s) = 0$$

$$G(x, s) = B(s)$$

Рассмотрим область $s \leq x \leq 2$:

$$G(x, s) = C(s) \frac{x^2}{2} + D(s)$$

$$C(s) \frac{2^2}{2} + D(s) = 0$$

$$D(s) = -2C(s)$$

$$G(x, s) = C(s) \left(\frac{x^2}{2} - 2 \right)$$

$$G(s+0, s) - G(s-0, s) = 1$$

$$C(s)s - 0 = 1$$

$$C(s) = \frac{1}{s}$$